Clínica Dr. Lobatón

100
214

Adrián Hermosilla

ALERGIA A ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS

1) Deberá llevar consigo estas instrucciones siempre que necesite someterse a cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico.

---

2) MEDICAMENTOS QUE NO PUEDE UTILIZAR:

---

a) PENICILINAS:

- Penicilina G sódica o potásica.
- Penicilina G procaina.
- Penicilina V.
- Meticilina.
- Nafcilina.
- Ampicilina.
- Amoxicilina.
- Carbenicilina.

b) CEFALOSPORINAS:

- Primera generación: Cefalotina, Cefaloridina, Cefazolina, Cefapirina, Cefradina, Cefacetrilo, Cefaloglicina, Cefalexina, Cedroxilo.
- Segunda generación: Cfamandol, Cefaxitina, Cefmatazol, Cafatricina, Cefaclor, Cefotiam, Cefuroxima, Ceforanida.
- Tercera generación: Cefatoxima, Cefrizoxima, Ceftacidima, Moxalactan, Cefsulodin, Cefoperazona, Ceftrizona, Cefotetan, Cefmenoxima.

Y demas derivados del grupo betalactámico.

---

3) ANTIBIOTICOS QUE PUEDE EMPLEAR:

---

Midecamicina, Diritromicina, Azitromicina, Roxitromicina, Claritromicina, Eritromicina, Joxamicina, Tao, Espiramicina, Fosfomicina, Rifampicina, Lincomicina, Clindamicina, Gentamicina, Sisomicina, Tetraciclinas, Doxiciclina, Minociclina, Ribastamicina, Kanamicina, Novobiocina, Neomicina, Colimicina, Tiamfenicol, Cloranfenicol, Quetólidos: Telitromicina (Ketek) o cualquier otro antibiótico que no pertenezca al grupo betalactámico.

4) Siempre que necesite utilizar medicamentos antibióticos, lo hará preferentemente por via oral.

5) Utilizar siempre JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES.

6) Especial cuidado deberá tener con el empleo de asociaciones antibióticas, utilizar medicamentos puros.

Cádiz, 9 de marzo de 2006

Clínica Dr. Lobatón

Adrián Hermosilla Ruiz

no: 956 292 100
x: 956 260 214

# INTOLERANCIA A AINE

Las siglas AINE corresponden a las de Anti- Inflamatorios No Esteroideos, refiriéndose a un grupo de medicamentos que se emplean cotidianamente en el tratamiento del dolor, de procesos inflamatorios o bien como antitérmicos.

---

MEDICAMENTOS QUE NO PUEDE TOMAR:

---

DERIVADOS DEL ACIDO ACETIL SALICILICO: AAS 500, Aspirina, Couldina, Okal, Mejoral, Rhonal, Casprium, Fiorinal, Calmante Vitaminado, Bristaciclina 3 A, Darvón Compuesto, Veganin, Propalgina, Desenfriol, Tromaly, Adiro etc.
PIRAZOLONAS: Nolotil, Optalidón, Cibalgina, Piramidón, Butozolina Neomelubrina, Irgapirina, Baralgón, Buscapina Compositum, Artrodesmol, Saldeva, etc. Los preparados "balsámicos" suelen contener pirazolona así como los espasmolíticos en sus formas "COMPOSITUM".
DERIVADOS INDOL-ACETICO: Indometacina (Inacid), Sulindac (Sulindal), Diclofenaco (Voltarén), Acetamicina (Oldán), Aceclofenaco (Airtal).
DERIVADOS DEL ACIDO ARILACETICO: Naproxeno (Naprosán).
DERIVADOS DEL ACIDO PROPIONICO: Ibuprofen (Neobrufen), Ketoprofen (Orudis), Flubioprofen (Tulip), Ketorolaco (Droal).
OXICANOS:
Tenoxicam (Tilcotil), Piroxicam (Feldene), Meloxicam (Parocin), Droxicam.
Siempre que necesite utilizar medicación, lo hará preferentemente por vía oral.
Especial cuidado deberá tener con el empleo de asociaciones, utilizar únicamente medicamentos puros.

---

MEDICAMENTOS QUE SI PUEDE EMPLEAR

---

ANALGÉSICOS/ ANTIINFLAMATORIOS.
- Celecoxib (Celebrex) o Eferocoxib (Arcoxia).
- Paracetamol.

ANTIAGREGANTES:
- Ticlopidina (Tiklid), Coplidogrel (Plavix, Iscover).

ANALGÉSICOS DERIVADOS OPIÁCEOS
- Codeina.
- Dextropropoxifeno: Darvón 65, Deprancol.
- Tramadol: Adolonta.
- Pentazocina: Sosegón, Pentazocina.
- Metadona: Metasedin.
- Meperidina: Dolantina, Dolonquite.
- Bupremorfina: Buprex.

ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS
- Deflazacor: Dezacor, Zamene.
- Prednisona: Dacortin, Prednisona Alonga.

ESPASMOLÍTICOS:
- Bromuro Hioscina (Buscapina Simple).

RELAJANTES MUSCULARES:
- Benzodiacepinas: Tetracepam (Myolastán).
- Metocarbamol.

Los salicilatos se encuentran en determinados alimentos. Están prohibidos los alimentos o bebidas que puedan contener colorantes artificiales, particularmente, aquellos que contengan tartracina (colorante amarillo) como son: Avecren, sopas de sobre, flanes de sobre, cremas de pasteles, helados, bebidas refrescantes, etc. Tampoco ingerir ningún tipo de alimento que esté envasado en lata, plástico o cristal y que contenga algún conservante, particularmente ácido salicílico.

Cádiz, 9 de marzo de 2006

Clínica
Dr. Lobatón

Tel : 956 292 100
Ono: 956 070 025
Fax: 956 260 214

F. Consulta: 09/03/2006
Edad: 10 Años y 2 Meses
NºHª: 35048 *

Hermosilla Ruiz, Adrian
Avda. Madrid, Blq. 1, Ptal. 3 Bajo B
51002 CEUTA

DIAGNÓSTICO:

Rinitis alérgica y asma bronquial moderado persistente, con sensibilización a ácaros de polvo de casa (D.Pteronyssinus).
Hipersensibilidad a antibióticos Betalactámicos. Intolerancia a AINE.
Agenesia de peroné.
Peso corporal 45.5 kg (percentil 98). Talla 136 cm (percentil 39).

TRATAMIENTO:

REGIMEN DE VIDA:
Seguir las normas del impreso adjunto.
En general nadie debería fumar en el domicilio de un paciente alérgico, ni convivir con animales domésticos (gato, perro, hamster, etc) dentro de la casa.

MEDICACION:
STALORAL 300 (100% D.Pteronyssinus) Entregar la solicitud adjunta en farmacia y cuando reciba la vacuna se administrará del vial violeta una aplicación sublingual diariamente hasta volver a revisión.

SYMBICORT 160/4.5 mcg, un envase.
Hacer una inhalación al levantarse y al acostarse diariamente durante tres meses, luego hacer sólo una inhalación al acostarse hasta volver a revisión. Puede volver a hacer una inhalación cada doce horas si lo necesita.

XAZAL (Levocetirizina), comprimidos.
Tomar un comprimido al acostarse diariamente durante tres meses.

SINGULAIR 10 mg. (Montelukast) comprimidos.
Tomar un comprimido diario al acostarse durante tres meses.

Si todo va bien volver a revisión el día , 29 de Agosto de 2006 a las 12:00 h. de la mañana.
Si no puede asistir ese día a consulta, por favor, pongase en contacto con nosotros antes de la fecha indicada.

Jueves, 9 de Marzo de 2006

Fdo: Dr. Pedro Lobatón Sanchez de Medina
Colegiado Nº: 111101583
Alergólogo, Neumólogo y Medicina Interna