Carcinome Basocellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) représente la néoplasie cutanée la plus fréquente et, plus largement, le canc

I. Épidémiologie

L'épidémiologie du carcinome basocellulaire est complexe, marquée par une incidence en augmentation constar

I.A. Incidence et Tendances Globales

L'incidence des carcinomes cutanés, y compris le CBC, est en augmentation constante, principalement en raison

I.B. Défis de la Collecte de Données

Il existe une variation considérable dans la littérature concernant les taux d'incidence du CBC (Thomson et al., 2

I.C. Variations Géographiques de l'Incidence

Les comparaisons directes des taux d'incidence entre pays sont limitées par l'utilisation fréquente de méthodes d

* **France** : L'incidence des CBC est supérieure à 150 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 202
* **Royaume-Uni** : Entre 2013 et 2015, le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen du CBC était de
* **Australie** : Ce pays présente l'incidence la plus élevée de CBC. Dans le Queensland, entre 1997 et 2006,
* **États-Unis** : La Californie a enregistré le taux d'incidence le plus élevé, avec 1069 pour 100 000 hommes
* **Europe Continentale** : L'incidence varie considérablement selon les pays et le sexe. Le taux le plus élevé a
* **Afrique** : Certaines régions d'Afrique présentent les taux d'incidence les plus bas, inférieurs à 1 pour 100 0

I.D. Âge et Sexe

Le CBC survient principalement après l'âge de 50 ans (Dermatologie, 2022). L'âge d'apparition est généralemen

Historiquement, le sexe masculin était plus fréquemment touché. Cependant, une très forte augmentation de l'in

II. Facteurs de Risque et Carcinogenèse

Les facteurs de risque et les mécanismes de carcinogenèse sont largement communs aux carcinomes basocellu

II.A. Facteurs de Risque

Les principaux facteurs de risque du CBC incluent (Dermatologie, 2022; Thomson et al., 2020; Wu et al., 2013, c

* **Exposition solaire** : C'est le facteur de risque le plus important. Les expositions intermittentes aiguës, parti
* **Phototype clair** : Les individus ayant une peau claire (phototypes I et II), une faible capacité à bronzer et u
* **Âge avancé** : La survenue est plus fréquente après 50 ans (Dermatologie, 2022; Thomson et al., 2020).
* **Sexe masculin** : Bien que la tendance chez les jeunes femmes soit à la hausse, le sexe masculin reste un