Carcinome Basocellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Carcinome Basocellulaire : Épidémiologie et Introduction

I. Introduction au Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente, représentant une part prépo

Le CBC se développe à partir des kératinocytes de la couche basale de l'épiderme et de ses annexes. Il survien

La sémiologie clinique du CBC est souvent caractérisée par la présence d'une "perle", une papule rosée arrondi

Plusieurs variétés cliniques de CBC sont décrites, chacune présentant des caractéristiques morphologiques dist
* **Carcinome basocellulaire nodulaire (Fig. 20.7)** : C'est la forme la plus fréquente. Il se présente comme une
* **Carcinome basocellulaire superficiel (ou pagétoïde) (Fig. 20.8)** : Il apparaît comme une plaque érythémate
* **Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (Fig. 20.9)** : Cette forme prend l'aspect d'une cicatrice blanch
* **Carcinome basocellulaire ulcéro-végétant (Fig. 20.10)** : Il s'agit d'une forme ulcérée, pouvant survenir au c

L'évolution du CBC est principalement marquée par un risque de récidive locale et d'extension locorégionale à b

II. Épidémiologie des Carcinomes Cutanés et du Carcinome Basocellulaire

A. Incidence et Tendances Globales

L'incidence des carcinomes cutanés, incluant le CBC et le CE, est en augmentation constante à l'échelle mondia

Il existe une variation considérable des taux d'incidence du CBC dans la littérature, en grande partie due à la lati

B. Données d'Incidence Spécifiques

En France, l'incidence des CBC est supérieure à 150 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022). À

Les taux d'incidence varient significativement d'un pays à l'autre :
* **Royaume-Uni** : Le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen pour le CBC était de 285 pour 100 0
* **Australie** : Ce pays présente l'incidence la plus élevée, avec un taux de 1813 pour 100 000 hommes et 12
* **Europe continentale** : L'incidence varie, avec un taux maximal de 164,7 pour 100 000 hommes aux Pays-B
* **États-Unis** : La Californie a enregistré un taux d'incidence de 1069 pour 100 000 hommes annuellement. L
* **Afrique** : Certaines régions d'Afrique affichent les taux d'incidence les plus bas, inférieurs à 1 pour 100 000

Il est important de noter que la comparaison directe des taux d'incidence entre pays est limitée par l'utilisation de

C. Âge et Sexe

L'âge d'apparition du CBC est généralement supérieur à 40 ans, avec une survenue ++ après 50 ans (Dermatolo