

Lista de Exercícios Aula VII – Comandos no R

1

```
v1 <- c(2, 6) # Primeira coluna da matriz
```

```
v2 <- c(5, 1) # Segunda coluna da matriz
```

```
v3 <- c(2, 4) # Terceira coluna da matriz
```

```
# Cria a matriz (por colunas)
```

```
A <- cbind(v1, v2, v3)
```

```
A_multiplicada <- A * 3
```

```
A_multiplicada
```

2

```
v1 <- c(15, 27, 14) # Primeira coluna da matriz
```

```
v2 <- c(18, 18, 5) # Segunda coluna da matriz
```

```
v3 <- c(21, 10, 4) # Terceira coluna da matriz
```

```
D <- cbind(v1, v2, v3)
```

```
D_multiplicada <- D * 2
```

```
D_multiplicada
```

3

```
m1_c1 <- c(1, 2, 7)
```

```
m1_c2 <- c(2, 4, 6)
```

```
M1 <- cbind(m1_c1, m1_c2)
```

```
m2_c1 <- c(10, 30, 50)
```

```
m2_c2 <- c(20, 40, 60)
```

```
M2 <- cbind(m2_c1, m2_c2)
```

```
Subtracao <- M1 - M2
```

```
B <- (2/7) * Subtracao
```

```
B
```

```
# 4
```

```
# A <- cbind(c(2, 6), c(5, 1), c(2, 4))
```

```
# M1 <- cbind(c(1, 2, 7), c(2, 4, 6))
```

```
# M2 <- cbind(c(10, 30, 50), c(20, 40, 60))
```

```
# B <- (2/7) * (M1 - M2)
```

```
Produto_BA <- B %*% A
```

```
Produto_BA
```

```
# 5
```

```
amplitude_A <- range(A)
```

```
amplitude_A
```

```
# 6
```

```
soma_A <- sum(A)
```

```
soma_A
```

```
# 7
```

```
produto_A <- prod(A)
```

```
produto_A
```

```
# 8
```

```
soma_colunas_A <- colSums(A)
```

```
soma_colunas_A
```

```
# 9
```

```
soma_menores_que_4_B <- sum(B[B < 4])
```

```
soma_menores_que_4_B
```