

О группе Шафаревича-Тейта алгебраических торов

Алексей Самойленко

1 Введение

Теория Ивасава возникла из изучения поведения групп классов идеалов в циклотомических башнях числовых полей. В функциональном случае аналогичные вопросы связаны с расширениями поля констант кривой над конечным полем. В классическом случае абелевых расширений поля рациональных чисел основные результаты были получены Ивасавой, Вашингтоном, Мазуром и Уайлсом. Ивасава заложил структурную теорию модулей над пополненной групповой алгеброй, установил связь с p -адическими дзета-функциями и сформулировал Основную гипотезу. Вашингтон доказал обращение в нуль μ -инварианта в циклотомических башнях, а Мазур и Уайлс доказали Основную гипотезу в абелевом случае. Изложение этих результатов можно найти в книгах Вашингтона [5] или Ленга [6].

Другая часть работы посвящена арифметике алгебраических торов. Эта теория изучает инварианты торов над глобальными полями, а также инварианты их моделей над кольцами целых числовых полей или над кривыми. Существенный вклад в эту область был внесён Воскресенским и его школой. В частности, в работах Воскресенского исследовались группы Шафаревича-Тейта торов, слабая аппроксимация и связанные с ними точные последовательности (см. [1]). С другой стороны, Оно и его ученики изучали формулы для чисел классов торов, в том числе норменных торов, а также получили важные результаты о числах Тамагавы торов (см. [7], [8], [9]).

Группа классов тора является естественным обобщением группы классов идеалов, так как для тривиального тора $\mathbb{G}_m$ эти понятия совпадают 4.1.2. Поэтому естественно попытаться перенести идеи теории Ивасава с групп классов идеалов на группы классов алгебраических торов. Иными словами, возникает задача изучать поведение арифметических инвариантов не только для $\mathbb{G}_m$, но и для более общих торов в циклотомических башнях. Цель данной работы – начать изучение этого направления.

В ходе работы были получены следующие результаты. Доказано 3.6, что проективный предел групп Шафаревича-Тейта тора в циклотомической башне является конечным модулем. Из этого следует 4.3.5, что в рассматриваемой ситуации проективные пределы групп классов тора и первых этальных когомологий совпадают. Это позволяет описывать элементы соответствующего предела как классы эквивалентности торсоров.

При анализе последовательности Воскресенского получен пример 3.5.7, показывающий, что достаточные условия одного из предложений Воскресенского не являются необходимыми. Этот же пример даёт контрпример к утверждению, сформулированному в работе [14].

Изучение групп классов торов начато с простейшего функционального случая: постоянного тора на кривой. В этом случае доказано совпадение группы классов тора с первыми этальными когомологиями 6.1.2. Затем, для норменных торов группа

классов интерпретируется как группа точек на скрученном якобиане кривой 6.3. Такая интерпретация позволяет в вычислительных примерах увидеть, что рост группы классов постоянного норменного тора на кривой контролируется поведением некоторой L -функции, связанной с исходной кривой и тором 6.4.

2 Предварительные сведения

Здесь приведены некоторые сведения об алгебраических торах, более подробное изложение можно найти в книге В. Е. Воскресенского – Алгебраические торы (см. [1]).

2.1 Алгебраические торы

Для произвольного поля K обозначим $\overline{K}$ и K_s алгебраическое и сепарабельное замыкания соответственно. Для расширения L/K обозначим $X_L = X \otimes_K L$ – L -схему, полученную расширением скаляров K -схемы X .

2.1.1 Определение. Групповая схема T над полем K называется тором, если

$$T_{\overline{K}} \simeq \mathbb{G}_m^n,$$

где $n = \dim(T)$ – размерность T .

Пусть $\text{Gal}(K)$ – абсолютная группа Галуа поля K .

2.1.2 Определение. $\text{Gal}(K)$ -модулем рациональных характеров K -групповой схемы G называется $\text{Gal}(K)$ -модуль

$$\text{Hom}_{K_s}(G_{K_s}, \mathbb{G}_m).$$

Он обозначается $\widehat{G}$ и определяет контравариантный функтор D из категории групповых K -схем в категорию непрерывных $\text{Gal}(K)$ -модулей.

Торы над K можно описывать с помощью следующей теоремы.

2.1.3 Теорема (см. [1], гл. III, теорема 3.33). При сужении на категорию K -групповых схем конечного мультипликативного типа, функтор D задает эквивалентность категории непрерывных $\text{Gal}(K)$ -модулей конечного типа.

2.2 Операция ограничения по Вейлю

Пусть L/K – конечное сепарабельное расширение, X – аффинная K -схема конечного типа. На категории K -схем рассмотрим функтор в категорию множеств, заданный на объектах следующим образом:

$$\mathcal{X}(S) = X(S \otimes L).$$

Оказывается, что он представим аффинной K -схемой, обозначаемой $R_{L/K}(X)$ (см. [1, гл. III, §5]).

2.2.1 Определение. Ограничением по Вейлю L -схемы X называется K -схема, представляющая функтор $\mathcal{X}$.

2.2.2 Замечание. Если G – групповая L -схема, то $R_{L/K}(G)$ – групповая K -схема. Причем группы $R_{L/K}(G)(K)$ и $G(L)$ изоморфны.

2.3 Норменные торы

Пусть L/K – конечное сепарабельное расширение полей.

2.3.1 Конструкция. Построим норменное отображение

$$N: R_{L/K}(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_{m,K}.$$

Для этого достаточно задать естественное преобразование функторов точек соответствующих схем, так как функтор

$$h: (K\text{-схемы}) \rightarrow \text{Fun}((K\text{-алгебры}), (\text{множества})),$$

сопоставляющий схеме её функтор точек, задает эквивалентность категории K -схем с полной подкатегорией категории функторов (см. [17, предложение VI-2]). Для K -алгебры A , пользуясь описанием A -точек ограничения по Вейлю (см. 2.2.2), определим N_A следующим образом:

$$N_A: (A \otimes L)^\times \rightarrow A^\times,$$

где отображение задано формулой

$$x \mapsto \det(m_x),$$

m_x – линейный оператор на $A \otimes L$, заданный умножением на элемент $x \in (A \otimes L)^\times$.

2.3.2 Определение. Ядро норменного отображения называется норменным тором, и обозначается $R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)$.

(Определение ядра гомоморфизма групповых схем см. [1, гл. I, начало §5].)

2.3.3 Замечание. На K -точках (см. 2.2.2), норменное отображение совпадает с обычной операцией нормы в расширении L/K , поэтому

$$R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)(K) = \{x \in L^\times \mid N_{L/K}(x) = 1\}.$$

2.3.4 Предложение (см. [1], гл. VI, §8). Зафиксируем $\{v_1, \dots, v_n\}$ – базис расширения L/K . Пусть

$$F(x_1, \dots, x_n) = N(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n),$$

где $x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$ – элемент $L[x_1, \dots, x_n]$, свободной алгебры на множестве образующих $\{x_1, \dots, x_n\}$. Тогда

$$R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \simeq \text{Spec}(K[x_1, \dots, x_n] / (F(x_1, \dots, x_n) = 1)).$$

Следующая лемма понадобится в пункте про вычисления групп Шафаревича-Тейта 3.7.

2.3.5 Лемма. Рассмотрим диаграмму расширений полей

$$\begin{array}{ccc} & L' & \\ L & \swarrow \quad \searrow & K' \\ & K & \end{array}.$$

Пусть L' – композит полей L и K' , а K – их пересечение. Тогда

$$R_{L'/K'}^1(\mathbb{G}_m) \simeq R_{L/K}^1(\mathbb{G}_m) \otimes_K K'.$$

Доказательство. Зафиксируем $\{v_1, \dots, v_n\}$ – базис расширения L/K . Рассмотрим многочлен F из предложения 2.3.4, задающий норменный тор, соответствующий расширению L/K .

$$F(x_1, \dots, x_n) = N(x_1v_1 + \dots + x_nv_n).$$

Так как L и K' линейно разделены, элементы $\{v_1, \dots, v_n\}$ можно взять в качестве базиса расширения L'/K' . Поэтому многочлен, задающий норменный тор, соответствующий расширению L'/K' , равен $N(x_1v_1 + \dots + x_nv_n)$ и, следовательно, равен многочлену F . Тогда, дважды используя предложение 2.3.4, получаем:

$$\begin{aligned} R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \otimes_K K' &\simeq \operatorname{Spec}(K[x_1, \dots, x_n]/(F=1)) \otimes_K K' \simeq \\ &\simeq \operatorname{Spec}(K'[x_1, \dots, x_n]/(F=1)) \simeq R_{L'/K'}^{(1)}(\mathbb{G}_m). \end{aligned}$$

□

2.3.6 Предложение (см. [1], гл. IV, пример 4.10). Пусть F – расширение Галуа поля K содержащее L , $G = \operatorname{Gal}(F/K)$, $H = \operatorname{Gal}(F/L)$. Пусть $I = \operatorname{Ker}(\varepsilon)$, где $\varepsilon: \mathbb{Z}[G/H] \rightarrow \mathbb{Z}$ – отображение аугментации, заданное формулой

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \mapsto \sum_{i=1}^n a_i,$$

$\{x_1, \dots, x_n\}$ – базис $\mathbb{Z}[G/H]$ из классов смежности. Тогда

$$\widehat{R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)} = \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(I, \mathbb{Z}).$$

2.4 Группа слабой аппроксимации

Пусть L/K – расширение Галуа глобальных полей, T – K -тор разложимый над L .

2.4.1 Определение. Группу слабой аппроксимации тора T определяют следующим образом:

$$A(T) = \left(\prod_v T(k_v) \right) / \overline{T(K)},$$

где произведение берется по всем нормированиям K , а $\overline{T(K)}$ – топологическое замыкание $T(K)$.

Говорят, что T обладает свойством слабой аппроксимации, если $A(T) = 0$.

2.4.2 Предложение (см. [1], гл. VI, теорема 6.36). Если все группы разложения в расширении L/K циклические, то $A(T) = 0$.

Обратное утверждение не верно (см. 3.5.7).

3 Группа Шафаревича-Тейта тора

3.1 Определение

Пусть L/K – расширение Галуа глобальных полей с группой Галуа G , T – K -тор разложимый над L .

3.1.1 Определение. Группу Шафаревича-Тейта тора T определяют следующим образом:

$$\text{Ш}(T) = \text{Ker}\left(H^1(G, T(L)) \rightarrow H^1(G, T(A_L))\right),$$

где отображение на когомологиях индуцировано вложением $T(L) \hookrightarrow T(A_L)$, а A_L – кольцо аделей.

3.1.2 Предложение (см. [1], гл. VI, следствие 6.27).

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}\left(H^1(K, T(\bar{K})) \rightarrow \bigoplus_v H^1(K_v, T(\bar{K}_v))\right),$$

где сумма берется по всем нормированиям K , а отображение является суммой гомоморфизмов ограничения.

В частности, $\text{Ш}(T)$ не зависит от выбора поля разложения тора T .

3.1.3 Следствие. Пусть G_w – группа разложения, соответствующая нормированию w поля L . Тогда

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}\left(H^1(G, T(L)) \rightarrow \bigoplus_v H^1(G_w, T(L_w))\right),$$

где в сумме, для каждого нормирования v поля K , берётся одно из нормирований w лежащих над v . Для архимедова нормирования группа разложения понимается в следующем смысле: это либо $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, если соответствующее нормирование комплексное и лежит над вещественным, либо 0 , иначе.

3.2 Двойственность Тейта-Накаямы

Далее, наряду с обычными когомологиями групп, будут использоваться когомологии Тейта (см. [4, гл. VI]). Для них принято обозначение

$$\hat{H}^i(G, A),$$

где i – целое число, G – группа, A – G -модуль.

При $i \geq 1$ они совпадают с когомологиями G с соответствующим индексом, а при $i \leq -2$ совпадают с гомологиями G с индексом $(-i - 1)$.

Обозначим $A^\vee$ группу, двойственную к группе A . Иными словами

$$A^\vee = \text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

3.2.1 Теорема (см. [2], гл. I, следствие 2.3). Пусть T – тор над локальным полем K . Тогда имеется изоморфизм

$$\hat{H}^r(K, T(K_s)) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^{2-r}(K, \hat{T})^\vee.$$

3.2.2 Определение. Пусть T – тор над глобальным полем K . Определим группу классов идеалов тора T следующим образом:

$$C_K(T) = T(A_K)/T(K).$$

3.2.3 Теорема (см. [2], гл. I, рассуждение после теоремы 4.6). Пусть T – тор над глобальным полем K , разложимый над полем L . Тогда имеется изоморфизм

$$\hat{H}^r(K, C_L(T)) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^{2-r}(K, \hat{T})^\vee.$$

3.2.4 Замечание. Если K -торы в теоремах 3.2.1 и 3.2.3 разложимы над некоторым конечным расширением Галуа L , то когомологии абсолютной группы Галуа в формулировках можно заменить на когомологии конечной группы $\text{Gal}(L/K)$.

3.2.5 Следствие (Теорема Пуату-Тейта). Пусть L/K – конечное расширение Галуа, T – тор над глобальным полем K , разложимый над L . Тогда

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}[H^2(G, \hat{T}) \rightarrow \prod_v H^2(G_v, \hat{T})]^\vee.$$

Доказательство. В длинной последовательности когомологий Тейта, связанной с короткой точной последовательностью

$$0 \rightarrow T(L) \rightarrow T(A_L) \rightarrow C_L(T) \rightarrow 0,$$

рассмотрим фрагмент

$$\hat{H}^0(G, T(A_L)) \xrightarrow{\nu} \hat{H}^0(G, C_L(T)) \xrightarrow{\varphi} \hat{H}^1(G, T(L)) \xrightarrow{\psi} \hat{H}^1(G, T(A_L)).$$

Отсюда получаем, что

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}(\psi) \simeq \text{Coker}(\nu).$$

Когомологии аделльных точек вычисляются через локальные характеристики (см. [1, гл. VI, предложение 6.25]):

$$\hat{H}^0(G, T(A_L)) \simeq \bigoplus_v \hat{H}^0(G_w, T(L_w)),$$

где в сумме для каждого нормирования v поля K , берётся одно из нормирований w лежащих над v . По двойственности Тейта-Накаямы (см. 3.2.1 и 3.2.3)

$$\hat{H}^0(G_w, T(L_w)) \simeq \hat{H}^2(G_w, \hat{T})^\vee, \quad \hat{H}^0(G, C_L(T)) \simeq \hat{H}^2(G, \hat{T})^\vee.$$

Откуда

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}[H^2(G, \hat{T}) \rightarrow \prod_v H^2(G_v, \hat{T})]^\vee.$$

□

3.2.6 Замечание. Так как модуль характеров – конечно порожденный модуль над групповой алгеброй конечной группы, то из следствия вытекает, что соответствующие группы когомологий конечны (см. [12, гл. IV, теорема 7.1]). Поэтому конечна и группа Шафаревича-Тейта тора.

3.3 Способ вычисления для норменного тора

Данный способ вычисления групп Шафаревича-Тейта норменных торов был найден автором в работе [14].

Для доказательства теоремы 3.3.2 нам понадобится предварительная лемма.

3.3.1 Лемма. *Для конечной абелевой группы G ,*

$$H^3(G, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(\Lambda^2 G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

Доказательство. Известно (см. [4, гл. V, теорема 6.4]), что

$$H_2(G, \mathbb{Z}) \simeq \Lambda^2 G.$$

Так как $H_2(G, \mathbb{Z}) = \hat{H}^{-3}(G, \mathbb{Z})$, произведение на когомологиях Тейта задает двойственность (см. [4, гл. VI, §7])

$$\hat{H}^3(G, \mathbb{Z}) \simeq \hat{H}^{-3}(G, \mathbb{Z})^\vee,$$

откуда

$$H^3(G, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(\Lambda^2 G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

□

Следующая теорема дает простой способ вычисления группы Шафаревича-Тейта в случае норменного тора.

3.3.2 Теорема. *Пусть $T = R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)$ – норменный тор, соответствующий конечному абелевому расширению L/K глобальных полей с группой Галуа G . Тогда*

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Coker} \left[\prod_v (\Lambda^2 G_w) \rightarrow \Lambda^2 G \right],$$

где в произведении для каждого нормирования v поля K , берётся одно из нормирований w лежащих над v , а $\Lambda^2 G$ – внешний квадрат абелевой группы G .

Доказательство. Для норменного тора $\hat{T} = I^* = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(I, \mathbb{Z})$ (см. 2.3.6). Рассмотрим точную последовательность

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[G] \rightarrow I^* \rightarrow 0,$$

двойственную к точной последовательности

$$0 \rightarrow I \rightarrow \mathbb{Z}[G] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Откуда заметим, что

$$H^i(G, \hat{T}) \simeq H^i(G, I^*) \simeq H^{i+1}(G, \mathbb{Z}).$$

Подставляя в выражение для $\text{Ш}(T)$ из следствия 3.2.5, получаем

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker} [H^3(G, \mathbb{Z}) \rightarrow \prod_v H^3(G_w, \mathbb{Z})]^\vee.$$

По лемме 3.3.1 $H^3(G, \mathbb{Z}) = (\Lambda^2 G)^\vee$. Поэтому

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Coker} \left[\prod_v \Lambda^2 G_w \rightarrow \Lambda^2 G \right].$$

□

3.4 Поведение при расширении скаляров

Пусть K – глобальное поле, T – K -тор, а K' – расширение Галуа поля K . Обозначим T' тор, полученный расширением скаляров тора T до K' . В этой ситуации построим отображения ограничения и коограничения на группах Шафаревича-Тейта:

$$\text{res}: \text{Ш}(T) \rightarrow \text{Ш}(T'), \quad \text{cor}: \text{Ш}(T') \rightarrow \text{Ш}(T),$$

удовлетворяющие соотношению $\text{cor} \circ \text{res} = [K' : K] \cdot \text{id}$, и такие, что при последовательном расширении скаляров $K \subset K' \subset K''$, композиция отображений ограничения (или коограничения), соответствующих $K \subset K'$ и $K' \subset K''$, совпадает с отображением ограничения (соответственно коограничения) для $K \subset K''$.

3.4.1 Конструкция. Рассмотрим стандартные отображения ограничения и коограничения между когомологиями групп Галуа полей K и K' (см. [4, гл. III, §3 и §9])

$$\text{res}: H^1(K, T(\overline{K})) \rightarrow H^1(K', T'(\overline{K'})), \quad \text{cor}: H^1(K', T'(\overline{K'})) \rightarrow H^1(K, T(\overline{K})),$$

а также для когомологий групп Галуа всех пополнений соответствующих полей. Так как отображения ограничения и коограничения коммутируют с отображениями ограничения в когомологии групп Галуа пополнений (см. [4, гл. III, предложение 9.5(iii)]), то на ядрах отображений ограничения во все пополнения можно достроить отображения, которые мы будем называть ограничением и коограничением на группе Шафаревича-Тейта

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ш}(T) & \longrightarrow & H^1(K, T(\overline{K})) & \longrightarrow & \bigoplus_v H^1(K_v, T(\overline{K}_v)) \\ \uparrow \text{cores} & & \updownarrow & & \updownarrow \\ \text{Ш}(T') & \longrightarrow & H^1(K', T'(\overline{K'})) & \longrightarrow & \bigoplus_{v'} H^1(K'_{v'}, T'(\overline{K}'_{v'})) \end{array}$$

Из соотношения

$$\text{cor} \circ \text{res} = [K' : K] \cdot \text{id}$$

на когомологиях (см. [4, гл. III, предложение 9.5(ii)]) следует, что оно выполняется для построенных отображений между группами Шафаревича-Тейта. Так же из того, что при последовательном расширении скаляров отображения ограничения и коограничения композируются (см. [4, гл. III, предложение 9.5(i)]) следует, что это верно для соответствующих отображений на группах Шафаревича-Тейта.

3.4.2 Предложение. Если отображение, заданное умножением на $[K' : K]$, обратимо на группе $\text{Ш}(T)$, то отображение ограничения – инъективно, а коограничения – сюръективно. В частности, это условие выполнено, когда тор T разложим над полем L , степень которого над K взаимно проста с $[K' : K]$.

Доказательство. Из условия следует, что отображение $\text{cor} \circ \text{res}$ – автоморфизм, следовательно, res – инъекция, а cor – сюръекция. Замечание следует из того, что по теореме 3.2.5 $\text{Ш}(T)$ – конечная группа, аннулируемая порядком группы Галуа расширения L/K , то есть степенью $[L : K]$. $\square$

3.4.3 Следствие. При расширении скаляров тора T , как в предложении 3.4.2, группа Шафаревича-Тейта не уменьшается.

Доказательство. По замечанию 3.2.6 группа Шафаревича-Тейта тора T – конечная группа. Предложение 3.4.2 говорит, что $\text{Ш}(T)$ вкладывается в группу Шафаревича-Тейта тора, полученного расширением скаляров. $\square$

Примеры вычислений групп Шафаревича-Тейта торов приведены в пункте 3.7.

3.5 Последовательность Воскресенского

Пусть L/K – расширение Галуа с группой Галуа G , T – K -тор разложимый над L .

3.5.1 Определение (см. [1], гл. IV, 4.34). G -модуль S называется пермутационным G -модулем, если он изоморфен конечной прямой сумме модулей вида

$$\mathbb{Z}[G/H],$$

где H – подгруппа G , а G/H – множество классов смежности.

G -модули M и N называются подобными, если:

$$M \oplus S_1 \simeq N \oplus S_2,$$

где S_1, S_2 – пермутационные G -модули.

Отношение подобия является отношением эквивалентности, классы эквивалентности в этом случае называются классами подобия.

3.5.2 Определение (см. [1], гл. IV, рассуждение после леммы 4.52). Для модуля характеров тора T рассмотрим точную последовательность G -модулей:

$$0 \rightarrow \hat{T} \rightarrow S \rightarrow N \rightarrow 0,$$

где S – является пермутационным, а N таков, что $\hat{H}^{-1}(H, N) = 0$, для всякой подгруппы $H \subseteq G$. Класс подобия модуля N называют классом Пикара тора T и обозначают $p(T)$. Такая последовательность всегда существует, и класс $p(T)$ не зависит от выбора последовательности (см. [1, гл. IV, лемма 4.52 и рассуждения после неё]).

3.5.3 Замечание. Так как первые когомологии Галуа подобных модулей изоморфны, определим $H^1(L/K, p(T))$ как когомологии любого из представителей.

3.5.4 Теорема (см. [1], гл. VI, теорема 6.38). Пусть T – тор над глобальным полем K , разложимый над L . Тогда существует точная последовательность групп

$$0 \rightarrow A(T) \rightarrow H^1(L/K, p(T))^\vee \rightarrow \text{Ш}(T) \rightarrow 0. \quad (1)$$

3.5.5 Теорема (см. [1], гл. VI, теорема 6.46). Пусть L/K – расширение Галуа, T – норменный тор соответствующий этому расширению. Тогда

$$H^1(L/K, p(T)) \simeq H^3(L/K, \mathbb{Z}).$$

В частности, точная последовательность Воскресенского для норменного тора принимает следующий вид:

$$0 \rightarrow A(T) \rightarrow H^3(L/K, \mathbb{Z})^\vee \rightarrow \text{Ш}(T) \rightarrow 0.$$

3.5.6 Следствие. Если тор T расщепляется над циклическим расширением, то

$$\text{Ш}(T) = 0 \text{ и } A(T) = 0.$$

Доказательство. Для циклических расширений группа, стоящая в середине последовательности 1, равна 0 (см. [1, гл. IV, следствие 4.50])

$$H^1(L/K, p(T)) = 0.$$

□

3.5.7 Пример (Замечание к 2.4.2). Рассмотрим числовое поле L , заданное уравнением

$$x^8 - x^7 - 4x^6 + 9x^5 + 11x^4 + 45x^3 - 100x^2 - 125x + 625.$$

Оно является расширением Галуа поля $\mathbb{Q}$ с группой Галуа $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$ и совпадает с композитом своих подполей $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ и $\mathbb{Q}(\sqrt{-19})$.

В этом расширении ветвятся только 5, 19 и архимедова точка, с группами разложения $\mathbb{Z}/4$, $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ и $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ соответственно. Отображение

$$\Lambda^2(\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2) \rightarrow \Lambda^2(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2)$$

является нулевым. Отображения, соответствующие остальным простым, тоже нулевые, так как в этих случаях группы разложения циклические, и их внешний квадрат равен нулю, поэтому, по теореме 3.3.2,

$$\text{Ш}(T) = \mathbb{Z}/2.$$

Так как

$$H^3(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = \Lambda^2(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$$

(см. 3.3.1). Из последовательности Воскресенского следует, что $A(R_{L/\mathbb{Q}}^{(1)}) = 0$, но при этом в расширении есть группа разложения, соответствующая 19, не являющаяся циклической.

Данный пример является контрпримером к утверждению, сформулированному в работе [14, лемма 6.7].

3.6 Применение к торах в круговых башнях

Пусть T — $\mathbb{Q}$ -тор, разложимый над полем L . Рассмотрим ℓ -круговую башню, где ℓ -простое число:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_\ell) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^2}) \subset \cdots \subset \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^\infty}).$$

Обозначим

$$K_n = \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^n}), \quad L_n = L(\zeta_{\ell^n}).$$

Пусть L таково, что L и K_n линейно разделены для всех n , T_n — тор, полученный расширением скаляров тора T до $\mathbb{Q}(\zeta_{\ell^n})$. Из условия следует, что он разложим над полем L_n . В этом случае возникают следующие отображения (см. 3.4), при $n \geq m$:

$$\text{Ш}(T_m) \xrightarrow{\text{res}} \text{Ш}(T_n), \quad \text{Ш}(T_n) \xrightarrow{\text{cor}} \text{Ш}(T_m).$$

Из последовательности Воскресенского 1 следует ограниченность $\text{Ш}(T_n)$.

3.6.1 Следствие. *Порядки групп $\text{Ш}(T_n)$ ограничены порядком группы $H^1(L/K, p(T))$, не зависящем от n .*

Отображения коограничения в данной ситуации образуют проективную систему (см. 3.4)

$$\text{Ш}(T_n) \xrightarrow{\text{cor}} \text{Ш}(T_m).$$

Обозначим $\text{Tate}_\ell(\text{Ш}(T))$ – предел этой проективной системы. Следствие выше тогда говорит, что $\text{Tate}_\ell(\text{Ш}(T))$ – конечный $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}_\ell^\times]$ -модуль.

3.7 Вычисления групп Шафаревича-Тейта торов

Пусть T – норменный тор, соответствующий расширению L/K , T_n – тор, определенный в 3.6. В силу леммы 2.3.5 тор T_n полученный заменой базы, изоморфен норменному тору, соответствующему расширению L_n/k_n . Иными словами

$$T_n \simeq R_{L_n/k_n}^{(1)}(\mathbb{G}_m).$$

В отличие от группы $H^1(L/K, p(T))$, изоморфной $H^3(L/K, \mathbb{Z})$, поведение групп $\text{Ш}(T)$ и $A(T)$ зависит не только от группы Галуа, но и от арифметики расширения L/K .

3.7.1 Пример. *Рассмотрим следующую ситуацию,*

$$K = \mathbb{Q}, \quad L = \mathbb{Q}(\sqrt{13}, \sqrt{17}),$$

ℓ – простое как в пункте 3.6. В этом случае, все группы разложения циклические. Из предложения 2.4.2 получаем $A(T) = 0$. Для вычисления группы, стоящей в середине последовательности 1, воспользуемся леммой 3.3.1, откуда

$$H^1(L/K, p(T)) \simeq H^3(L/K, \mathbb{Z}) \simeq \Lambda^2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Из последовательности Воскресенского тогда следует, что $\text{Ш}(T) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Так как группа Шафаревича-Тейта тора на нулевом уровне баини вкладывается во все $\text{Ш}(T_n)$ на бóльших уровнях и их порядок ограничен порядком $H^1(L/K, p(T))$, получаем, что для всякого n

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ш}(T_n) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

3.7.2 Пример. *Рассмотрим*

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{-7}, \sqrt{13}), \quad K = \mathbb{Q},$$

пусть $\ell = 3$. В этом случае, группы разложения простых, лежащих над 7 и 13, равны

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

а остальные группы разложения циклические. Поэтому, из теоремы 3.3.2, получаем $\text{Ш}(T) \simeq 0$. Однако, так как $7 \equiv 1 \pmod{3}$ и $13 \equiv 1 \pmod{3}$, то простые 7 и 13 полностью раскладываются в расширении K_1 , поэтому на первом уровне все группы разложения становятся циклическими. Тогда, по теореме 3.3.2, $\text{Ш}(T_1) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Итого, так как группы Шафаревича-Тейта на бóльших уровнях содержат группы меньших уровней, получаем

$$\text{Ш}(T) \simeq 0, \quad \text{Ш}(T_1) \simeq \text{Ш}(T_n) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

4 Группа классов тора

4.1 Определение

4.1.1 Определение. Пусть K — числовое поле. Группа классов тора T определяется как фактор

$$\mathrm{Cl}(T) = T(A_K)/T(K)T(A_K^{S_\infty}),$$

где A_K — кольцо аделей, а $A_K^{S_\infty}$ — подкольцо аделей, неархимедовы компоненты которых лежат в кольцах целых соответствующих пополнений.

Если K — функциональное поле, то группа классов тора T определяется как фактор

$$\mathrm{Cl}(T) = T^{(1)}(A_K)/T(K),$$

где

$$T^{(1)}(A_K) = \{a \in T(A_K) \mid \chi(a) \in I_K^{(1)} \text{ для всех } \chi \in \widehat{T}\},$$

а $I_K^{(1)}$ — группа идеалов единичной нормы.

Эти факторы конечны (см. [1, гл. VI, рассуждение после теоремы 6.29]). Обозначим их порядки h_T .

4.1.2 Пример. Из адельного описания группы классов числового поля K следует, что

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{G}_{m,K}) = I_K/K^\times I_K^{S_\infty} = \mathrm{Cl}(K),$$

где I_K — группа идеалов K .

Аналогично, в случае функционального поля K , из адельного описания группы классов дивизоров нулевой степени получаем, что

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{G}_{m,K}) = I_K^{(1)}/K^\times = \mathrm{Pic}^0(C),$$

где C — гладкая модель кривой, соответствующая полю K .

4.1.3 Предложение ([1], предложение 6.31). Пусть L/K — расширение глобальных полей, T — L -тор. Тогда для тора полученного ограничением $\mathbb{G}_{m,L}$ по Вейлю верно следующее утверждение

$$\mathrm{Cl}(R_{L/K}(T)) = \mathrm{Cl}(T).$$

4.2 Поведение при расширении скаляров

Для построения нормы на группах классов торов нам понадобится обобщить конструкцию норменного отображения, определенного ранее для $\mathbb{G}_m$ (см. 2.3.1), на случай произвольного тора.

4.2.1 Конструкция ([15], глава IX, §5). Пусть K'/K — конечное сепарабельное расширение полей, T — K -тор, а T' — расширение скаляров T до K' . В этой ситуации построим норменное отображение

$$N: R_{K'/K}(T') \rightarrow T.$$

Для этого рассмотрим тор T как пучок на этальном сайте $\mathrm{Spec}(K)_{\acute{e}t}$. Обозначим f морфизм, соответствующий расширению полей. Он этальный, поэтому возникает пара сопряженных функторов между категория пучков абелевых групп

$$f_! : \mathrm{Sh}((\mathrm{Spec} K')_{\acute{e}t}) \rightleftarrows \mathrm{Sh}((\mathrm{Spec} K)_{\acute{e}t}) : f^*, \quad f_! \dashv f^*,$$

где f^* – функтор обратного образа, а $f_!$ – функтор продолжения нулем. Так как f конечный этальный, то $f_! = f_*$. Поэтому

$$f_!(T') = f_*(T') = R_{K'/K}(T').$$

Коединица сопряжения дает искомый гомоморфизм

$$\varepsilon : f_! f^* T \simeq f_* f^* T = R_{K'/K}(T') \rightarrow T.$$

4.2.2 Замечание. С помощью единицы сопряжения $f^* \dashv f_*$ можно построить отображение в обратную сторону:

$$\mathrm{res} : T \rightarrow R_{K'/K}(T'),$$

называемое ограничением. Композиция $N \circ \mathrm{res}$ равна отображению умножения на степень расширения $[K' : K]$ (см. [15, глава IX, §5]).

4.2.3 Определение. Пусть K – глобальное поле, T – K -тор, K'/K – конечное сепарабельное расширение полей. Обозначим T' тор, полученный расширением скаляров тора T до K . Для произвольного поля K обозначим $V(K)$ множество всех нормирований. Отображение нормы на группах классов тором,

$$N : \mathrm{Cl}(T') \rightarrow \mathrm{Cl}(T),$$

определим следующим образом:

$$\left[(a_w)_{w \in V(K')} \right] \mapsto \left[(a_v)_{v \in V(K)} \right],$$

где

$$a_v = \prod_{w|v} (N_{w/v} a_w),$$

а $N_{w/v}$ – норменное отображение для тора T_{K_v} , соответствующее расширению K'_w/K_v , вычисленное на K_v -точках, то есть

$$N_{w/v} : T'(K'_w) \rightarrow T(K_v).$$

Это определение корректно, так как норма переводит $T'(K')$ в $T(K)$, в числовом случае $T'(A_{K'}^\infty)$ в $T(A_K^\infty)$, а в функциональном $T'^{(1)}(A_{K'})$ в $T^{(1)}(A_K)$.

4.2.4 Замечание. Аналогично, при помощи отображения ограничения

$$\mathrm{res} : T \rightarrow R_{K'/K}(T'),$$

можно построить отображение ограничения между группами классов тором:

$$\mathrm{res} : \mathrm{Cl}(T) \rightarrow \mathrm{Cl}(T').$$

Композиция $N \circ \mathrm{res}$ равна отображению умножения на степень расширения $[K' : K]$ по построению N и res .

Отображение нормы композицируются при последовательном расширении скаляров. Поэтому рассмотрим ситуацию, как в пункте 3.6. Отображения нормы формируют проективную систему, обозначим предел ℓ -частей этих групп следующим образом:

$$\text{Tate}_\ell(\text{Cl}(T)).$$

4.3 Связь с когомологиями Нисневича и этальными когомологиями

Пусть S – спектр Дедекиндова кольца с полем частных K , нас будут интересовать случаи, когда S является кольцом целых числового поля или кольцом функций открытой аффинной подсхемы кривой над конечным полем. Пусть $\mathcal{T}$ – групповая схема на S , такая, что её слой над общей точкой – тор T . Определим $\text{Cl}(\mathcal{T})$ как группу классов тора над общей точкой.

Введем обозначение $H^n(X_{cd}, F)$ для когомологий Нисневича схемы X , с коэффициентами в пучке F на сайте X_{cd} (см. [10]), а $H^n(X_{\acute{e}t}, G)$ для этальных когомологий X , с коэффициентами в пучке G на сайте $X_{\acute{e}t}$ (см. [3]).

4.3.1 Теорема (см. [11], теорема 1). *Имеется следующий изоморфизм:*

$$\text{Cl}(\mathcal{T}) \simeq H^1(S_{cd}, \mathcal{T}).$$

Построим теперь отображение нормы на первых этальных когомологиях, в случае когда групповая схема $\mathcal{T}$ – связная компонента единицы lft -модели Нерона K -тора T ([16, глава 10, §5, предложение 6]).

4.3.2 Конструкция. Пусть K'/K – расширение глобальных полей, S' – целое замыкание S в K' . Построим в этой ситуации отображение нормы на первых этальных когомологиях с коэффициентами в $\mathcal{T}$, в случае когда групповая схема $\mathcal{T}$ – связная компонента единицы lft -модели Нерона K -тора T ([16, глава 10, §5, предложение 6]). Для этого построим отображение на пучках. Рассмотрим построенное норменное отображение для торов над полями 4.2.1. Обозначим

$$\mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')_{\text{lft}} \text{ и } \mathcal{T}_{\text{lft}},$$

lft -модели Нерона торов $R_{K'/K}(\mathcal{T}')$ и T . Такое обозначение уместно, так как ограничение по Вейлю и модель Нерона коммутируют [16, глава 7, §6, предложение 6]. Благодаря свойству модели Нерона (см. [16, глава 1, §2, определение 1]) примененному к норменному отображению для торов над полями, получаем

$$N: \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')_{\text{lft}} \rightarrow \mathcal{T}_{\text{lft}}.$$

Так как полученный морфизм является морфизмом групповых схем, он спускается до морфизма между связными компонентами единицы:

$$N: \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}') \rightarrow \mathcal{T}.$$

Отображение на когомологиях получается следующим образом

$$H^1(S'_{\acute{e}t}, \mathcal{T}') \simeq H^1(S_{\acute{e}t}, \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')) \rightarrow H^1(S_{\acute{e}t}, \mathcal{T}),$$

так как $\mathcal{R}_{S'/S}(-) = f_*$, где $f: S' \rightarrow S$.

Как и в прошлых случаях возникновения отображения нормы, при последовательной замене базы нормы композицируются. Рассмотрим ситуацию к в пункте 3.6. Отображения нормы формируют проективную систему, обозначим предел ℓ -частей этих групп

$$\text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})).$$

Группа классов тора, первые этальные кохомологии базы с коэффициентом в торе и его группа Шафаревича-Тейта связаны следующей короткой точной последовательностью.

4.3.3 Теорема ([11], теорема 2). *Имеется следующая короткая точная последовательность:*

$$0 \rightarrow \text{Cl}(T) \rightarrow H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}) \rightarrow \text{Ш}(T) \rightarrow 0.$$

Отображение $\text{Cl}(T) \rightarrow H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})$ получается из функтора сравнения топологий Нисневича и этальной топологии на S (см. 4.3.1). Так как построенные отображения нормы на группе классов и на первых этальных кохомологиях возникают из одного норменного отображения на групповых схемах, то они коммутируют с функтором сравнения и, следовательно, с отображением $\text{Cl}(T) \rightarrow H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})$.

4.3.4 Определение. *Назовем два R -модуля M и N псевдоизоморфными, если существует отображение $M \rightarrow N$ такое, что ядро и коядро конечны.*

Пусть χ – характер $\text{Gal}(K_1/\mathbb{Q})$. Обозначим χ -изотипические компоненты пределов групп классов и предела этальных кохомологий следующим образом:

$$\text{Tate}_\ell(\text{Cl}(T))_\chi \text{ и } \text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}))_\chi.$$

4.3.5 Следствие. *Пусть χ – характер $\text{Gal}(K_1/\mathbb{Q})$, $\Gamma = \text{Gal}(K_\infty/K_1) \simeq \mathbb{Z}_\ell$. Тогда $\mathbb{Z}_\ell[[\Gamma]]$ -модули*

$$\text{Tate}_\ell(\text{Cl}(T))_\chi \text{ и } \text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}))_\chi$$

являются псевдоизоморфными.

5 Группа классов тора в числовом случае

5.1 Случай норменного тора

Рассмотрим случай норменных торов $T = R_{L/K}^1$, соответствующих расширению Галуа глобальных полей L/K , с группой Галуа G . В этом случае порядок группы классов тора вычисляется по формулам, полученным Оно.

5.1.1 Теорема ([7], теорема 2.1).

$$\frac{h_L}{h_T h_k} = \frac{|\text{Ш}(T)| \cdot \prod_v |H^0(G_w, \mathcal{O}_w^\times)|}{[L' : K] \cdot |H^0(G, \mathcal{O}_L)|},$$

где L' – максимальное абелево подрасширение L/K , а в произведении для каждого v берется один w над v .

5.2 Норменные торы мнимых квадратичных расширений

Рассмотрим простейшие среди норменных торов, соответствующие мнимым квадратичным расширениям $\mathbb{Q}(\sqrt{-m})/\mathbb{Q}$. Пусть ℓ – простое, для которого рассматриваем $\mathbb{Z}_\ell$ -расширение $\mathbb{Q}(\sqrt{-m}, \zeta_\ell)$.

В этом случае формулы упрощаются до

$$h(n) = h(R_{L_n/k_n}^1) = \frac{h(L_n)}{h(k_n)2^{\tau(L_n/k_n) - \varepsilon(L_n/k_n) - 1}},$$

где $\tau(n) = \tau(L_n/k_n)$ – число нормирований, которые ветвятся,

$$\varepsilon(n) = \varepsilon(L_n/k_n) = v_2\left(\hat{H}^0(G_n, \mathcal{O}_{L_n}^\times)\right).$$

5.3 Вычисления

Следующая таблица получена используя пакет компьютерной алгебры PARI/GP [18] и содержит экспериментальные данные о подскоках на первых этажах круговой башни группы классов норменного тора, соответствующего мнимому квадратичному полю. Обозначения взяты из пункта 5.2.

m	n	$\varepsilon(n)$	$\tau(n)$	$h(L_n)$	$h(k_n)$	$h(T_n)$
1	1	0	1	1	1	1
1	2	0	1	1	1	1
2	1	0	1	1	1	1
2	2	0	1	3	1	3
5	1	1	2	2	1	2
5	2	1	2	6	1	6
7	1	1	2	1	1	1
7	2	1	2	1	1	1
10	1	1	2	2	1	2
10	2	1	2	14	1	14
11	1	0	1	1	1	1
11	2	0	1	3	1	3
13	1	1	3	4	1	2
13	2	1	3	52	1	26
14	1	1	3	4	1	2
14	2	1	3	36	1	18
17	1	1	2	4	1	4
17	2	3	4	48	1	48
19	1	1	2	1	1	1
19	2	3	6	4	1	1
22	1	1	2	2	1	2
22	2	1	2	38	1	38
23	1	0	1	3	1	3
23	2	0	1	9	1	9
26	1	0	3	12	1	3
26	2	0	3	252	1	63
29	1	1	2	6	1	6
29	2	1	2	126	1	126
31	1	1	2	3	1	3
31	2	1	2	9	1	9
34	1	1	2	4	1	4
34	2	3	4	112	1	112
35	1	1	3	2	1	1
35	2	1	3	18	1	9
37	1	1	3	4	1	2
37	2	3	7	208	1	26
38	1	1	3	6	1	3
38	2	3	7	288	1	36
41	1	1	2	8	1	8
41	2	1	2	216	1	216
43	1	1	2	1	1	1
43	2	1	2	13	1	13
46	1	1	2	4	1	4
46	2	1	2	172	1	172
47	1	0	1	5	1	5
47	2	0	1	45	1	45

6 Группа классов тора в геометрическом случае

Пусть K – поле функций на кривой C , определенной над конечным полем $k = \mathbb{F}_q$, где q – степень простого числа p .

6.1 Связь с этальными когомологиями и когомологиями Нисневича

6.1.1 Теорема (см. [11], теорема 1). Пусть C – кривая над конечным полем K , T – групповая схема на X , такая, что её слой над общей точкой – тор. Определим $Cl(T)$ как группу классов тора над общей точкой. Тогда

$$Cl(T) \times \mathbb{Z}^r \simeq H^1(C_{cd}, T),$$

где r – размерность максимального расщепленного подтора в слое над общей точкой.

Пусть теперь T – постоянный тор на кривой C , то есть тор, полученный заменой базы k -тора на C . Групповая схема на кривой C естественно определяет пучки, представимые схемой T , на сайтах C_{et} и C_{cd} . В этом случае когомологии Нисневича кривой C , с коэффициентами в пучке T , совпадают с этальными.

6.1.2 Предложение.

$$H^1(C_{cd}, T) \simeq H^1(C_{et}, T)$$

Доказательство. Для этого достаточно проверить $H^1(\mathcal{O}_{C,x}^h, T_x^h) = 0$ для всякой x – схемной точки C (см. [10, лемма 1.38]), где $\mathcal{O}_{C,x}^h$ – гензелизация локального кольца $\mathcal{O}_{C,x}$, а T_x^h – слой пучка, соответствующего тору T . Воспользуемся тем, что

$$H^1\left((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{et}, T_x^h\right) = (T_x^h\text{-торсеры над } \mathcal{O}_{C,x}^h).$$

Если x не общая точка, по теореме Ленга (см. [2, следствие 17.98]), у алгебраических групп над конечными полями нет нетривиальных торсеров. Иными словами у всякого торсера есть сечение. T_x^h и его редукция в точке x – гладкие алгебраические группы, так как тор T – постоянный, поэтому по лемме Гензеля для гензелевых колец (см. [16, гл. 2, пункт 3, предложение 5]), это сечение торсера над полем вычетов можно поднять до сечения над $\mathcal{O}_{C,x}^h$. Следовательно, у T_x^h нет нетривиальных торсеров над $\mathcal{O}_{C,x}^h$ и

$$H^1\left((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{et}, T_x^h\right) = 0.$$

Над общей точкой η , так как тор является постоянными, то он разложим после расширения базового конечного поля на кривой, пусть $k(\eta)$ – поле вычетов в общей точке, а $k'(\eta)$ – поле вычетов в общей точке на кривой, после расширения базового поля до конечного поля k' , над которым тор T раскладывается. В этом случае возникает точная последовательность ограничения и инфляции для когомологий групп Галуа (см. [12, гл. IV, предложение 5.1])

$$0 \rightarrow H^1(k'/k, T) \rightarrow H^1(k(\eta), T) \rightarrow H^1(k'(\eta), T).$$

По теореме Ленга, $H^1(k'/k, T) = 0$. Так как над $k'(\eta)$ тор T разложим, то $H^1(k'(\eta), T) \simeq H^1(k'(\eta), \mathbb{G}_m^n) = 0$, где последнее равенство – теорема Гильберта 90. Из точной последовательности выше получаем, что $H^1(k(\eta), T) = 0$. $\square$

6.2 Постоянные норменные торы

Пусть теперь T – постоянный норменный тор на кривой C , соответствующий расширению l/k базового поля. Нам понадобится факт о том, что норменное отображение сюръекция пучков в этальной топологии.

6.2.1 Теорема (см. [9]). *Норменное отображение*

$$N : R_{C_L/C} \rightarrow \mathbb{G}_{m,C}$$

является сюръекцией этальных пучков, представимых соответствующими схемами.

6.2.2 Следствие.

$$Cl(T) \simeq \text{Ker}[N : \text{Pic}(C_L) \rightarrow \text{Pic}(C)]$$

Доказательство. Рассмотрим фрагмент длинную точную последовательность когомологий связанную со следующей короткой точной последовательностью

$$0 \rightarrow R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \rightarrow R(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow 0,$$

она имеет вид:

$$H^0(R(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^0(\mathbb{G}_m) \rightarrow H^1(R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^1(R(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^1(\mathbb{G}_m).$$

Когомологии $R(\mathbb{G}_m)$ и $\mathbb{G}_m$ известны: $H^0(R(\mathbb{G}_m)) = l^\times$, $H^0(\mathbb{G}_m) = k^\times$, $H^1(R(\mathbb{G}_m)) = \text{Pic}(C_L)$ и $H^1(\mathbb{G}_m) = \text{Pic}(C)$. Так как отображение нормы из $l^\times$ в $k^\times$ сюръективно, то, используя теорему 6.1.1, получаем

$$Cl(T) \simeq H^1(R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) \simeq \text{Ker}[H^1(R(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^1(\mathbb{G}_m)] \simeq \text{Ker}[N : \text{Pic}(C_L) \rightarrow \text{Pic}(C)].$$

□

6.3 Скрученные якобианы

Так как $\text{Pic}(C_{K'}) = J_C(K') \times \mathbb{Z}$, а $\text{Pic}(C) = J_C(K) \times \mathbb{Z}$, и норменное отображение действует на $\mathbb{Z}$ умножением на 2, получаем что

$$\text{Ker}[N : \text{Pic}(C_L) \rightarrow \text{Pic}(C)] = \text{Ker}[N : J_C(K') \rightarrow J_C(K)].$$

На самом деле это ядро является K -точками некоторого абелева многообразия над полем K , называемого $\hat{T}$ -скрученным якобианом кривой C (см.[13]). В силу следствия 6.2.2 получаем, что группа $Cl(T)$ является группой K -точек скрученного якобиана кривой C . Так как эти рассуждения не зависят от базового поля K , получаем что $Cl(T_{K'})$ является группой K' -точек скрученного якобиана кривой C .

Закономерно возникает вопрос: всегда ли для постоянного тора T на кривой C , группа $Cl(T)$ является группой K -точек $\hat{T}$ -скрученного якобиана кривой C ? Мы показали это для норменных торов выше, так же это верно для торов полученных ограничением по Вейлю торов $\mathbb{G}_m^n$.

6.4 Вычисления

Рассмотрим наиболее простой нетривиальный пример, когда кривая является эллиптической, обозначим её E над $\mathbb{F}_p$, а тор T – постоянный норменный тор соответствующий квадратичному расширению $\mathbb{F}_{p^2}/\mathbb{F}_p$. Благодаря рассуждениям в пункте 6.3 группы классов тора T можно вычислять с помощью точек на скрученной эллиптической кривой. Вычисления в PARI/GP [18] показывают, что в этом случае μ -инвариант всегда равен 0, а λ -инвариант равен 0 или 2, в зависимости от того, является ли обратимыми в кольце $\mathbb{Z}_\ell[[T]]$ следующий многочлен:

$$1 + a_p(E)t + pt^2,$$

где $t = 1+T$. Этот многочлен является характеристическим многочленом фробениуса действующего на скрученном модуле Тейта.

Список литературы

- [1] В.Е. Воскресенский, *Алгебраические торы*, Наука, 1977.
- [2] J. Milne, *Algebraic groups*
- [3] Дж. Милн, *Этальные когомологии*
- [4] K.S. Brown, *Cohomology of Groups*, Springer, 1982.
- [5] L. Washington - *Introduction to Cyclotomic Fields*
- [6] S. Lang - *Cyclotomic fields I and II*
- [7] T. Ono, *On some class number relations for Galois extensions*, Nagoya Math. J., 1987.
- [8] T. Ono, *On the Tamagawa number of algebraic tori*, Ann. of Math., 1963
- [9] M. Morishita, *On S-Class number relations of algebraic tori in Galois extensions of global fields*
- [10] Y. Nisnevich, *The completely decomposed topology on schemes and associated descent spectral sequences in algebraic K-theory*, 1989.
- [11] Е. Нисневич, *Арифметические и когомологические инварианты полупростых групповых схем и компактификаций локально симметрических пространств*, 1980.
- [12] Дж. Касселс, А. Фрелих, *Алгебраическая теория чисел*.
- [13] B. Mazur, K. Rubin, A. Silverberg, *Twisting commutative algebraic groups*.
- [14] C. Frei, D. Loughran, R. Newton, *The Hasse norm principle for abelian extensions*, American Journal of Mathematics, 2018.
- [15] M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 3*, SGA4.

- [16] S. Bosch, W. Lütkebohmert, M. Raynaud, *Neron models*.
- [17] D. Eisenbud, J. Harris, *The Geometry of Schemes*, Springer, 1999.
- [18] The PARI Group, Univ. Bordeaux, *PARI/GP*