

## PRÁCTICA PRIMER PARCIAL

**Instrucciones:** Este es un examen de desarrollo, todos los procedimientos que justifiquen su respuesta deben aparecer en el cuaderno de examen.

1. [20 pts.] Usando serie de potencias centrada en cero, hallar una solución general de:

$$(x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 0$$

**SOLUCIÓN:**

$$y'' + \frac{4x}{x^2 - 1}y' + \frac{2}{x^2 - 1}y = 0$$

$p(x) = \frac{4x}{x^2 - 1}$  y  $q(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$  son analíticas en cero, este es un punto ordinario de la ecuación diferencial.

Entonces existe solución:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Sustituye en la ecuación diferencial:

$$(x^2 - 1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 4x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} 4n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 4n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - 2a_2 - 6a_3 x + \sum_{n=2}^{\infty} 4a_n x^n + 4a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} 2a_n x^n + 2a_0 + 2a_1 x = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} [n(n-1)a_n - (n+2)(n+1)a_{n+2} + 4na_n + 2a_n] x^n + (2a_0 - 2a_2) + (6a_1 - 6a_3)x = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} [(n^2 + 3n + 2)a_n - (n+2)(n+1)a_{n+2}] x^n + (2a_0 - 2a_2) + (6a_1 - 6a_3)x = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} [(n+1)(n+2)a_n - (n+1)(n+2)a_{n+2}] x^n + (2a_0 - 2a_2) + (6a_1 - 6a_3)x = 0$$

$$\begin{cases} 2a_0 - 2a_2 = 0 \\ 6a_1 - 6a_3 = 0 \\ (n+2)(n+1)a_n - (n+2)(n+1)a_{n+2} = 0 \end{cases} \quad n = 2, 3, \dots$$

$$\begin{cases} a_2 = a_0 \\ a_3 = a_1 \\ a_{n+2} = a_n \end{cases} \quad n = 2, 3, \dots$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1}$$

$$= a_0 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}$$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) [15 pts.]  $y' = y^4 \cos(x) + y \tan(x)$

**SOLUCIÓN:** Ecuación diferencial de *Bernoulli*.

$$y' - y \tan(x) = \cos(x) y^4$$

$$y^{-4} y' - y^{-3} \tan(x) = \cos(x)$$

Tomamos la sustitución  $u = y^{-3}$  y  $u' = -3y^{-4} y'$  entonces:

$$-\frac{u'}{3} - u \tan(x) = \cos(x)$$

La ecuación diferencial se convierte en una ecuación diferencial lineal.

$$u' + 3u \tan(x) = -3 \cos(x)$$

Se calcula el factor integrante:

$$\mu(x) = e^{3 \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx} = e^{-3 \ln |\cos(x)|} = \sec^3(x)$$

$$\int (\sec^3(x) \cdot u)' = -3 \int \sec^2(x) dx$$

$$\sec^3(x) \cdot u = -3 \tan(x) + C$$

$$y^{-3} = -3 \sin(x) \cos^2(x) + C \cos^3(x)$$

(b) [15 pts.]  $2x^3y' = y(2x^2 - y^2)$

**SOLUCIÓN:**

$$y' = \frac{y(2x^2 - y^2)}{2x^3} = \frac{2x^2y - y^3}{2x^3} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^3 = G\left(\frac{y}{x}\right)$$

Tomando la sustitución  $v = \frac{y}{x} \rightarrow y = vx \rightarrow y' = v + xv'$

$$v + xv' = v - \frac{v^3}{2}$$

$$xv' = -\frac{v^3}{2}$$

$$\int \frac{dv}{v^3} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x}$$

$$\left(\frac{y}{x}\right)^{-2} = \ln(x) + C$$

3. Dada la siguiente ecuación diferencial:

$$y' = \frac{y(2xy + 1)}{x(xy - 1)}$$

(a) [10 pts.] Demuestre que el cambio de variable  $v = xy$  hace que la ecuación diferencial sea separable.

**SOLUCIÓN:**

$$v = xy \rightarrow y = \frac{v}{x} \rightarrow y' = -vx^{-2} + x^{-1}v'$$

$$\frac{xv' - v}{x^2} = \frac{\frac{v}{x}(2v + 1)}{x(v - 1)}$$

$$xv' = \frac{3v^2}{v - 1}$$

Ecuación diferencial separable.

(b) [10 pts.] Resuelva la ecuación diferencial.

**SOLUCIÓN:**

$$\begin{aligned}\int \frac{(v-1)dv}{v^2} &= 3 \int \frac{dx}{x} \\ \int \frac{1}{v} dv - \int \frac{1}{v^2} dv &= 3 \ln |x| + C \\ \ln |v| + v^{-1} &= 3 \ln |x| + C \\ \ln |xy| + (xy)^{-1} &= 3 \ln |x| + C\end{aligned}$$

4. Dada la ecuación diferencial:

$$x^2(\ln^2 x)y'' - 2x(\ln x)y' + (\ln x + 2)y = 0$$

(a) [5 pts.] Muestre que  $y_1 = \ln x$  es una solución de la ecuación diferencial.

**SOLUCIÓN:**

Si  $y_1 = \ln x$ , entonces  $y_1' = \frac{1}{x}$   $y_1'' = -\frac{1}{x^2}$ .

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow x^2(\ln^2(x)) \underbrace{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}_{y_1''} - 2x(\ln(x)) \underbrace{\frac{1}{x}}_{y_1'} + (\ln(x) + 2) \underbrace{\ln x}_{y_1} &= 0 \\ \Leftrightarrow -\ln^2(x) - 2\ln(x) + \ln^2(x) + 2\ln(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow 0 &= 0\end{aligned}$$

(b) [10 pts.] Encuentre la solución general de la ecuación diferencial.

**SOLUCIÓN:**

Usando Abel:

$$\begin{aligned}y_2 &= \ln(x) \int \frac{e^{-\int \frac{-2x(\ln(x))}{x^2 \ln^2(x)} dx}}{\ln^2(x)} dx \\ y_2 &= \ln(x) \int \frac{e^{2 \int \frac{1}{x \ln(x)} dx}}{\ln^2(x)} dx\end{aligned}$$

$$y_2 = \ln(x) \int \frac{e^{\ln(\ln^2(x))}}{\ln^2(x)} dx = \int dx = x$$

$$y_2 = x \ln(x)$$

La solución general es:  $y = A \ln(x) + Bx \ln(x)$

5. [20 pts.] Resuelva la ecuación diferencial:

$$y'' + \frac{1}{4}y = \sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right), \text{ en } 0 < x < \pi$$

**SOLUCIÓN:**

Primero se busca la solución de la homogénea complementaria:

$$y'' + \frac{1}{4}y = 0$$

Tomando el tipo de solución  $y = e^{rx}$  tenemos la ecuación característica:

$$r^2 + \frac{1}{4} = 0 \quad r = \pm \frac{1}{2}i$$

$$y_c = A \cos\left(\frac{x}{2}\right) + B \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

La solución general está dada por  $y = A \cos\left(\frac{x}{2}\right) + B \sin\left(\frac{x}{2}\right) + y_p$ . Para buscar  $y_p$  usamos el método de variación de parámetros.

$$W\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right), \sin\left(\frac{x}{2}\right)\right) = \begin{vmatrix} \cos\left(\frac{x}{2}\right) & \sin\left(\frac{x}{2}\right) \\ -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{x}{2}\right) & \frac{1}{2}\cos\left(\frac{x}{2}\right) \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin\left(\frac{x}{2}\right) \\ \sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right) & \frac{1}{2}\cos\left(\frac{x}{2}\right) \end{vmatrix} = -\sin\left(\frac{x}{2}\right)\left(\sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} \cos\left(\frac{x}{2}\right) & 0 \\ -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{x}{2}\right) & \sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right) \end{vmatrix} = \cos\left(\frac{x}{2}\right)\left(\sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$\Delta_1 = -2 \int \sin\left(\frac{x}{2}\right)\left(\sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx = 4 \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) - 2x$$

$$\Delta_2 = 2 \int \cos\left(\frac{x}{2}\right)\left(\sec\left(\frac{x}{2}\right) + \csc\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx = 2x + 4 \ln\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$y_p = \Delta_1(x)y_1 + \Delta_2(x)y_2$$

$$y_p = \underbrace{\left(4 \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2}\right)\right) - 2x\right)}_{\Delta_1(x)} \underbrace{\left(\cos \left(\frac{x}{2}\right)\right)}_{y_1} + \underbrace{\left(2x + 4 \ln \left(\sin \left(\frac{x}{2}\right)\right)\right)}_{\Delta_2(x)} \underbrace{\left(\sin \left(\frac{x}{2}\right)\right)}_{y_2}$$

$$y_p = 4 \cos \left(\frac{x}{2}\right) \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2}\right)\right) - 2x \cos \left(\frac{x}{2}\right) + 2x \sin \left(\frac{x}{2}\right) + 4 \sin \left(\frac{x}{2}\right) \ln \left(\sin \left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$y = y_c + y_p$$

$$y = A \cos \left(\frac{x}{2}\right) + B \sin \left(\frac{x}{2}\right) + 4 \cos \left(\frac{x}{2}\right) \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2}\right)\right) - 2x \cos \left(\frac{x}{2}\right) + 2x \sin \left(\frac{x}{2}\right) + 4 \sin \left(\frac{x}{2}\right) \ln \left(\sin \left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

6. Dada la ecuación diferencial:

$$(3x + 2y + y^2) dx + (x + 4xy + 5y^2) dy = 0$$

(a) [10pts.] Encuentre un factor integrante de la forma  $\eta = \eta(x + y^2)$ .

**SOLUCIÓN:**

$$\eta(x + y^2)(3x + 2y + y^2)dx + \eta(x + y^2)(x + 4xy + 5y^2)dy = 0$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \eta(x + y^2)(2 + 2y) + \eta'(x + y^2)(6xy + 4y^2 + 2y^3)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \eta(x + y^2)(1 + 4y) + \eta'(x + y^2)(x + 4xy + 5y^2)$$

$$\eta'(x + y^2)((x + y^2)(2y - 1)) = \eta(x + y^2)(2y - 1)$$

Tome  $u = x + y^2$ , entonces:

$$\frac{\eta'(u)}{\eta(u)} = \frac{1}{u}$$

$$\int \frac{d\eta(u)}{\eta(u)} = \int \frac{du}{u}$$

$$\eta(u) = u, \quad \underbrace{\eta(x + y^2) = x + y^2}_{\text{factor integrante}}$$

(b) [10pts.] Resuelva la ecuación diferencial.

**SOLUCIÓN:**

La nueva ecuación diferencial:

$$(3x^2 + 2xy + xy^2 + 3xy^2 + 2y^3 + y^4)dx + (x^2 + 4x^2y + 5xy^2 + xy^2 + 4xy^3 + 5y^4)dy = 0$$

Verificamos que la ecuación diferencial es exacta.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + 8xy + 6y^2 + 4y^3$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2x + 8xy + 6y^2 + 4y^3$$

Luego buscamos una función  $U$  tal que  $U = C$  sea una solución general de la ecuación diferencial.

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 3x^2 + 2xy + xy^2 + 3xy^2 + 2y^3 + y^4$$

$$U = \int (3x^2 + 2xy + xy^2 + 3xy^2 + 2y^3 + y^4)dx + f(y)$$

$$U = x^3 + x^2y + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3 + xy^4 + f(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 + x^2y + 3x^2y + 6xy^2 + 4xy^3 + f'(y)$$

$$x^2 + x^2y + 3x^2y + 6xy^2 + 4xy^3 + f'(y) = x^2 + 4x^2y + 6xy^2 + 4xy^3 + 5y^4$$

$$f'(y) = 5y^4 \rightarrow f(y) = y^5$$

$$U = x^3 + x^2y + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3 + xy^4 + \underbrace{y^5}_{f(y)}$$

$$U = C$$