


PHARMACODEPENDANCE SUBSTANCES

ILLICITES

DROGUE ?

- Toute substance qui **modifie la manière de percevoir les choses**, de **ressentir les émotions**, de **penser** et de **se comporter**
 - Les dangers liés à l'usage varient selon les **substances**, les **individus**, les **façons de consommer**, les **quantités**,...
 - Classification des drogues ?
 - Statut juridique : Légale ou non
 - Dangereuse ou non
 - En fonction de leurs effets
 - Drogues autorisées (légales) mais réglementées : Alcool, tabac ou certains médicaments
 - Drogues interdites dont la loi interdit l'usage et la vente : cannabis, héroïne, cocaïne
- ⇒ L'autorisation ou l'interdiction d'une drogue n'est **pas strictement fondée sur sa dangerosité**. D'autres facteurs entrent en ligne de compte : **histoire, culture, intérêt thérapeutique éventuel, ...**

Dangerosité



La dangerosité des drogues est une autre manière de les classer. Se pose alors le problème des critères retenus. Les substances sont ici classées selon :

- Leur toxicité, c'est à dire leur **capacité à provoquer des atteintes physiologiques**
 - **L'intensité des modifications psychiques**, c'est-à-dire la faculté de perturber les perceptions, la cognition, l'humeur, etc.
 - **Leur potentiel addictif**, c'est-à-dire leur capacité à **créer une dépendance** qui dépend de l'impact de la substance sur le système intracérébral de la récompense
 - D'autres critères pourraient être pris en compte comme le **risque d'accident** ou encore la **nocivité sociale** (délinquance, coût des soins, coût pour la collectivité)
- ⇒ Le potentiel de dangerosité d'une drogue n'est **pas forcément le même d'un critère à l'autre**

Effets

Classification des substances psychoactives en fonction de leurs effets :

- **Les déprimeurs du système nerveux**
 - Agissent sur le cerveau en ralentissant certaines fonctions ou sensations
 - Ralentissement de la fonction respiratoire et l'endormissement sont souvent des effets secondaires de ces drogues
 - **Les stimulants**
 - Augmentent les sensations et certaines fonctions organiques comme le rythme cardiaque ou la sensation d'éveil
 - Leur réaction est souvent suivie d'un contre coup avec des sensations inverses de fatigue et d'irritabilité
 - **Les hallucinogènes**
 - Modifient les perceptions visuelles, auditives et corporelles
 - Ces modifications sont très dépendantes du contexte et de la personne qui utilise de telles drogues
- ⇒ **Les substances psychoactives** sont soit des médicaments soit des drogues illicites

SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Sédatifs :

- **Forte dépendance physique et psychique**
- Accrochage **lent** à **rapide** (héroïne)
- En cas de surdosage : **coma**
- A long terme : **troubles neurocomportementaux**

Stimulants :

- Dépendance **psychique forte**
- Accrochage **très rapide**
- Accidents de surdosage **gravissimes** et responsables de **décès** malgré une prise en charge médicale précoce
- Risques de **troubles comportementaux** ou **cardiovasculaires graves**

Hallucinoènes :

- **Dépendance psychique faible à modérée**
- Risques de **décompensation psychotique**


Un usage sans risque ?

- **Aucune consommation de drogue n'est sans risque** ; même et peut-être surtout lorsqu'il s'agit d'une **1ère fois**
 - Le manque d'expérience peut provoquer des ressentis négatifs face à des effets inconnus allant parfois jusqu'au bad trip ou entraîner une consommation excessive, des prises de risques importants voire des accidents (coma éthylique, prise de risque liée aux hallucinations, décès par overdose, etc)
- **Consommer une drogue n'est jamais banal**. L'envie d'essayer de nouveau ou l'impression de gérer peut pousser à consommer de plus en plus souvent exposant alors aux risques d'une addiction

- La plupart du temps, les usages de drogue sont des **expérimentations uniques** ou des **pratiques occasionnelles** mais l'installation d'une **dépendance** est possible et nous ne sommes **pas égaux face à l'addiction**

Individu

- Génétique
- Événements de vie
- Age de début
- Traits de caractère
- Comorbidités psychiatriques (troubles de la personnalité, anxiété...)



Environnement

- Facteurs familiaux
- Education
- Facteurs culturels et sociaux
- Effet d'entraînement
- Professions à risque
- Disponibilité du produit

Produit

- +/- Intense
- +/- Addictif
- +/- Toxique

Dépendance !

La Loi

- **> 200 substances psychoactives interdites** = LISTE française des stupéfiants
 - Pour interdire une substance, un arrêté est promulgué par le ministre de la Santé, l'ajoutant à la liste française des stupéfiants
 - Le terme stupéfiant désigne toutes les drogues interdites
 - Les recommandations européennes ou de l'OMS peuvent également conduire au classement de certaines drogues parmi les stupéfiants
 - La liste française a été créée à partir des conventions internationales sur les stupéfiants et psychotropes dont la France est signataire
 - En fonction de sa **toxicité**, de son **intérêt thérapeutique** et de son **potentiel d'abus** et de **dépendance** (ANSM)
 - Interdiction de faire **usage**, de **produire**, **d'importer** ou **exporter**, de **transporter**, de **posséder**, de **proposer** ou de **vendre**
 - Objectif : **protéger la Santé publique** et **d'éviter la libre circulation** de substances jugées dangereuses
- ⇒ La loi française sur les stupéfiants cherche à **réprimer l'usage**, leur **offre sur le marché** (c'est-à-dire le trafic des stupéfiants) et la **publicité sur les drogues**


Protection des mineurs

- **Des règles spécifiques de protection, peines plus lourdes :**
 - Lorsque les mineurs sont visés : sont des personnes vulnérables et influençables
 - Dans ou à proximité d'un établissement scolaire
- **L'école, lieu de règles :**
 - Le règlement intérieur des établissements scolaires rappelle l'interdiction par la loi de l'usage et de la possession de stupéfiants
 - Sanctions disciplinaires + signalement au Procureur de la République + gendarmerie

Lieu de prévention et d'aide :

- Rencontrer le personnel de santé de l'établissement
- Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), maison des adolescents, etc

Épidémiologie



CANNABIS

- Plante **Cannabis sativa** (chanvre indien), classé en France comme stupéfiant
- Caractère **collectif** de la consommation
- Effets **neuropharmacologiques** essentiellement dus au **THC** (delta9-tétrahydrocannabinol)
- Provient majoritairement du **Maroc** => culture de variétés hybrides se développe (augmentation teneur en THC)

3 formes :

- **L'herbe** : feuilles, tiges et sommités fleuries séchées
 - Consommation sous forme de joint avec du tabac
 - Concentration : 10% en moyenne
- La **résine** ou « **haschisch** », obtenue en pressant les fleurs
 - Consommation sous forme de joint avec du tabac
 - Concentration : 10% en moyenne
- **L'huile** : résine macérée dans de l'alcool (+ concentrée en principe actif)
 - Consommation à l'aide d'une pipe
 - Concentration : 30% en moyenne

⇒ Plus la concentration est élevée et plus les effets du cannabis peuvent être importants

Autres méthodes de consommation :

- **Ingestion, incorporation** dans des préparations alimentaires (les space cake) ou **bu en infusion**.
- **Cigarette électronique**

Obtention :

- **Gratuitement** (dons) ou **consommation partagée**
 - Le réseau d'amis ou de proches constitue la principale source d'achat, suivi par le recours à un dealer, qu'il soit intermédiaire habituel ou inconnu
- **L'autoculture de cannabis** est déclarée par moins de 1 usager sur 20 et **l'achat sur Internet** est presque inexistant

Teneur et prix

- **Prix : 10 €/g herbe, 5-7 €/g résine**
 - Augmentation prix => les consommateurs privilégient les produits de « bonne qualité »
- La teneur moyenne en THC dans les **résines**, a presque triplé en 15 ans, pour atteindre **26,5 % en 2018**
- Pour **l'herbe**, la teneur moyenne est stable autour de **11 % en 2018**

En population adolescente
<u>Collégiens :</u> • 1ère substance illicite consommée par les adolescents • À partir de la 4ème • Très forte progression entre la 6ème (1,4 %) et la fin du collège, où elle est rapportée par près d'un jeune sur quatre (23,9 %) • Essentiellement les ♂ parmi les + jeunes, mais les écarts s'amenuisent ensuite nettement <u>Fin de l'adolescence :</u> • En 2017, près de quatre adolescents de 17 ans sur dix ont déjà fumé du cannabis au cours de leur vie (39,1 %) • Les consommations sont d'autant + masculines que leur fréquence est élevée
Risques liés à la consommation
• Les effets neuropsychiques apparaissent environ 15 à 20 min après son inhalation chez un consommateur occasionnel, un peu + tard chez un usager régulier • <u>Prise unique :</u> ○ Euphorie modérée et sentiment de bien être suivi d'une somnolence, d'un affaiblissement de la mémoire à court terme et des troubles de l'attention ○ ↑ du temps de réaction ○ Troubles de la coordination motrice susceptibles d'augmenter les risques associés à la conduite, potentialise les effets de l'alcool ○ Symptômes psychiatriques : hallucinations, troubles anxieux • <u>Usage régulier :</u> ○ ↓ des capacités de mémorisation et d'apprentissage, désintérêt pour les activités habituelles, fatigue physique et intellectuelle, humeur dépressive • <u>A un niveau élevé de consommation :</u> dépendance, problèmes relationnels, scolaires et professionnels • A 17 ans, 7,4 % des adolescents seraient susceptibles de présenter un risque élevé d'usage problématique de cannabis • <u>Les études montrent l'impact de la consommation de cannabis sur la santé dans plusieurs domaines :</u> les accidents de la route, certains cancers, certaines pathologies de l'appareil circulatoire et respiratoire et certaines pathologies mentales ○ Les effets peuvent être liés soit au THC soit aux substances résultant de sa combustion (goudron) ○ Les produits ajoutés au cannabis de manière intentionnelle (= produits de coupe) ou involontaire (=les contaminants) pourraient plus rarement intervenir dans l'apparition de pathologies
COCAÏNE (chlorhydrate de cocaïne)
• Substance d'origine végétale, obtenue par transformation de la feuille de coca • Stimulant • Poudre blanche, consommé par voie nasale (sniff), par inhalation ou IV • En 2017, parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d'expérimentation de la cocaïne est de 2,8 % (2,4 % ♀, 3,1 % ♂) • La cocaïne base, « crack » ou « free base », résulte de l'adjonction de bicarbonate ou d'ammoniac => cristallisation de la poudre en petits cailloux, destinés à être fumés ou + rarement injectés ○ Effets beaucoup + puissants et rapides ○ L'apparition des effets est plus rapide : 1 à 2 min contre 15 à 30 min avec la cocaïne ○ Leur durée est beaucoup plus courte : 10 à 15 min contre 1h avec la cocaïne
Teneur et prix
• Prix : 70-80 €/g • ↑ très nette de la pureté de la cocaïne depuis plusieurs années = 60 % en 2017 • Principal produit de coupe : lévamisole (80 % des échantillons saisis) ○ Vermifuge utilisé en médecine vétérinaire ○ Faible coût, disponibilité dans les pays producteurs ○ Propriétés physico chimiques semblables à la cocaïne ○ Responsable de nombreuses complications • Le crack est consommé surtout en région parisienne et dans les départements d'outre-mer • En métropole, la vente de crack est présente auprès d'une population d'usagers souvent extrêmement marginalisés. Dans le reste de la France métropolitaine, la vente de crack est quasi inexistante mais on note une extension géographique de son usage

Risques liés à la consommation

- Sensation de **puissance intellectuelle et physique**, engendrant une **indifférence à la fatigue**, couplée à un **sentiment d'euphorie**
- Puis « **phase de descente** », marquée par des symptômes de **type dépressif, une anxiété et une forte irritabilité**
- **Forte dépendance psychique**, conduisant à des **envies irrépressibles de consommer** (craving) pouvant survenir très rapidement ou à distance de la dernière prise
- Les complications :
 - **Cardiaques** : Augmentation PA et vasoconstriction
 - **Neurologiques** : AVC, convulsions
 - **Lésions de la cloison nasale** : parfois très rapidement si consommation excessive
 - **Infections bactériennes ou virales** (VIH, VHB et surtout VHC) : partage matériel
 - **Troubles délirants** : Episodes psychotiques avec hallucinations auditives, visuelles et sensorielles

MDMA (ECSTASY)/AMPHETAMINE (SPEED)

- Drogues de **synthèse**
- MDMA (cristal ou poudre, ecstasy = comprimé) :
 - **Dérivé amphétaminique** : chef de file = amphetamine
 - **Hallucinogène** à forte dose : modifications de perceptions sensorielles
 - **Avalée**, mais aussi **snifée**, + rarement **fumée ou injectée**
 - Appellations : ecsta, E (prononcé à l'anglo-saxonne « i »), X et XTC, Molly, MD
 - **Nouvelles formes apparues** : Des comprimés plus gros aux couleurs plus vives, représentant des personnages, des logos, des marques
 - Exemple ecstaTRUMP, ecstaPIKATCU ou ecstaYOUTUBE
- L'amphétamine (speed) :
 - **Psychostimulant** + puissant
 - Poudre **snifée**, + marginalement **injectée**
 - La forme **poudre et pâte** sont les plus répandues mais la forme **comprimé ou cristal** sont disponibles
 - Très présente dans les espaces festifs => moins chère que la cocaïne et effets proches
 - Appellations : speed, amphet, amphé, crank, Tina
 - Consommation marginale en France
 - Obtenue par internet ou lors de déplacements à l'étranger
 - **Méthamphétamine** : marginale en France
 - Effets puissants et durables
 - Potentiel addictif+++

Teneur, prix et expérimentation

- MDMA :
 - Prix : **54 €/g cristal, 2,5 à 10 €/comprimé d'ecstasy**
 - Les usagers ont tendance à acheter des lots de plusieurs dizaines de comprimés permettant ainsi de faire baisser le prix jusqu'à **2,5€ le comprimé**
 - Cristal : 21 % en 2010 à 72 % en 2017
 - Ecstasy : 44 mg de MDMA dans un comprimé en 2009, 128 mg en 2017
 - Teneur max observée : 300mg alors que la **dose toxique = 120 mg**
- Amphétamine :
 - Prix : **15 €/g**
 - Teneur à près 40 %

⇒ Parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d'expérimentation de la MDMA s'établit à 3,4 % et 2,3 % pour l'amphétamine

Risques liés à la consommation

- Les dérivés amphétaminiques **dissipent les sensations de fatigue et de faim**, prodiguent un **sentiment d'euphorie et d'hyperconcentration**, de **confiance en soi**, et facilitent **contacts et communication**
- Phase de descente :
 - Sensation d'épuisement, dépression, anxiété, confusion, troubles du sommeil peuvent durer parfois plusieurs semaines
- Complications :
 - Troubles neuropsychiatriques (crise d'angoisse, confusion, désorientation, hallucinations), hypertonie, hyperthermie, troubles cardiovasculaires potentiellement mortels

HEROÏNE

- **Opioïde**
- **Poudre blanche** (sel acide) ou **marron** (sel basique) injectée en **IV**, **sniffée ou fumée en** « chassant le dragon »
- Propriétés **comparables à celles de la morphine**, mais action + **rapide**, + **intense** et + **brève**
- Prix de l'héroïne brune : **35-40 €/g**, pureté : **14-17 %**
- Provient surtout d'Afghanistan, elle est brune et transite via la route des Balkans
- La vigueur du marché de l'héroïne en France est fortement déterminée par la proximité des **Pays Bas et de la Belgique** qui sont en Europe deux grand pays de **stockage de l'héroïne**
 - Marché est fortement régionalisé avec une large disponibilité des produits dans le nord et Nord-est de la France et une moindre présence dans le Sud
- **Des particularités régionales** : Lyon, Annemasse, Annecy, etc. (nouveaux acteurs : albanais)
- **Un usage rare en population adolescente** : 0,7 % des jeunes âgés de 17 ans en 2017
- **Dépendance ++** et « **overdose** » souvent mortelle par dépression respiratoire
- Appellations : héro, came, meca, rabla, poudre, blanche, smack, brown sugar, black tar

HALLUCINOGENES

- **Naturels** : champignons⁺⁺⁺ ou plantes
 - **Champignons France** : psilocybes (France)
 - **Champignons Exotique** : Mexicains, hawaïens, colombiens
 - La **sauge divinatoire** est la plante hallucinogène la plus consommée
- **De synthèse** :
 - **LSD** ou acide lysergique
 - Produit à partir d'un champignon : ergot de seigle
 - Retrouvé sous forme de liquide ou de gouttes déjà déposées sur un buvard et destiné à être avalé
 - Modifications sensorielles intenses, hallucinations et perte plus ou moins marquée des réalités.
 - Angoisses, des crises de paniques ou des bouffées délirantes.
 - La descente peut être très désagréable et générer un profond mal-être
 - **Kétamine**
 - Anesthésique vétérinaire et humain
 - Dose modérée : effets euphorisants + ébriété cotonneuse
 - Dose forte : hallucinations + effets dissociatifs
 - Sous forme liquide ou cuisinée sous forme de poudre.
 - Peut être à l'origine de pertes de connaissances voire de comas
 - **GHB/GBL**
 - Substance anesthésique
 - D'abord euphorisante puis sédatrice et amnésiante
 - Son précurseur le GBL est un solvant industriel transformé en GHB par l'organisme après absorption.
 - Seul le GHB est classé dans la liste des stupéfiants, est interdit à la vente notamment en raison des risques de soumissions chimiques

⇒ SOUSSION CHIMIQUE

- **Distorsions** des perceptions visuelles, auditives, spatiales, temporelles et de la perception de son corps
- Les effets peuvent être **durables** parfois **sur plusieurs jours**
- Les **risques d'accidents mortels sont réels** car l'utilisateur perd toutes notions avec la réalité (risque de défenestration, de noyade etc.)
- Complications : « bad trips », épisodes délirants, effets parfois durables, traumatismes graves, comas
- En 2017, 1,6 % de jeunes de 17 ans déclarent avoir consommé du LSD au cours de leur vie (1,3 % ♀ et 1,9 % ♂)
- Kétamine et GHB entraînent très facilement la survenue de comas parfois recherchés par les usagers

NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHÈSE (NPS)


- Très **hétérogènes**
- « **Imitent** » les effets d'autres substances (ecstasy, cannabis, etc.)
- Des structures **proches mais pas identiques** (détournement temporaire de la législation)
- Certains classés **stupéfiants**, d'autres n'ont **pas de statut juridique** clair
- Sont connus : soit par leur nom chimique soit à travers des noms commerciaux
- **Internet ++** : présente les produits sous la forme d'autres produits de consommation (engrais, bains, encens...)
- En France :
 - **Cannabinoïdes de synthèse** ou « **Spice** », proches du THC
 - **Phénéthylamines**, proches soit de la MDMA (cathinones), soit du LSD
 - **Méthoxétamine** (MXE) : proche de la kétamine (mais plus puissant et plus durable)

- Problèmes :
 - Véritable nature des produits ?
 - Grande variabilité des dosages, donc des effets

Classification

Le cercle intérieur montre les substances actives dites classiques.

Le cercle extérieur les NPS correspondants



Identification	
----------------	--

- La plupart des NPS ont été principalement produits puis importés de Chine et dans une moindre mesure l'Inde
- Au total 222 nouvelles substances ayant circulées au moins une fois en France ont été recensées depuis l'apparition des premières molécules.
- En Europe, on dénombre plus de 450 nouveaux produits de synthèses depuis 97 dont + des 2/3 sont apparus depuis 2008.

Prix et expérimentation

- Prix : 8 à 20 €/g sur internet, 3x > dans la rue
- Associés à des pratiques dites « **Slam** » ou « **Chemsex** »
- 3,8 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà consommé un produit imitant les effets d'une drogue
- 11,8 % d'entre eux ont précisé de quel produit il s'agissait, principalement un cannabinoïde de synthèse

LICITES MAIS PAS SANS RISQUE : POPPERS, PROTOXYDE D'AZOTE

Poppers

- **Dérivés du nitrite alkyles aliphatiques ou cycliques, autorisés** en France
- Préparation **liquide très volatiles**
- **Inhalation** : euphorie, rire, vasodilatation, contexte sexuel +
- Les effets ne durent pas plus de **2 minutes**

Appellations : arôme, encens liquide (room odorizer), Rush®, Jungle Juice®, Pig Juice®, Fuck Me®, Sex Line®, Gate®, Hot®, Bronx®, Girly Power®, Wesh Cousin® (liste non exhaustive)

Risques et expérimentation

- **Prise unique** : nausées, vomissements, céphalées
- **Prises répétées** : lésions nasales et du visage, atteintes hépatiques
- **Intoxication** : hypotension artérielle et troubles cardio-vasculaires exceptionnellement mortels, anémie aiguë et grave (méthémoglobinémie) et perte prolongée de l'acuité visuelle
- En 2017, 8,8 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté les poppers

Protoxyde d'azote « gaz hilarant »

- **Gaz détourné** de son usage initial pour ses **propriétés euphorisantes**
- **Inhalation** : euphorie comparée à une ivresse, rire, distorsions visuelles et auditives
- **Risques immédiats** : brûlures par le froid, céphalées, confusion, chute, troubles du rythme cardiaque, asphyxie et décès
- **Usage régulier** : atteintes hématologiques et neurologiques graves (carences vitamine B12)
- L'inhalation **modifie la voix** qui devient plus grave pendant quelques secondes
- Les effets disparaissent pendant **2 à 3 minutes**

Appellations : gaz hilarant, bonbonne, proto, ballon, oxyde nitreux, N2O

- Toute consommation expose à des risques !
- Toujours préférable de s'abstenir ou de ↓ les risques :
 - Reporter la consommation quand on se sent fatigué, stressé, mal ou qu'on éprouve de l'appréhension
 - Ne pas consommer seul mais avec des gens de confiance, dans un contexte rassurant, certains ne consommant pas (hallucinogènes)
 - Etre attentif aux doses, surtout les 1ères fois
 - Eviter de consommer plusieurs produits en même temps, alcool compris
 - Limiter la fréquence de consommation
 - L'injection est à éviter
 - Ne jamais partager le « matériel » (paille, seringues, etc.) + kits
 - Ne pas utiliser de bangs artisanaux
 - Ne pas conduire de véhicule ou entreprendre une activité « à risques »
 - Boire régulièrement de l'eau (stimulants)
 - Appeler les secours si vous vous sentez mal ou si vous êtes témoin
 - Rassurer face à une réaction de panique (« bad trip »)