

Агар питательный DEV

(NUTRIENT AGAR DEV REGULATIONS)

Кат. № 1314

Хранить при температуре 2–25°C

Среда подсчета микроорганизмов в воде и других материалах

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л)

Бактериологический агар	18
Экстракт говядины	10
Пептон мясной	10
Натрия хлорид	5

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение

Неселективный подсчет

Категории

Общее применение

Область применения: Анализ воды / Пищевая промышленность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар питательный DEV — это среда общего назначения, неселективная, но подходящая для культивирования широкого спектра микроорганизмов.

Он рекомендован немецкими стандартными методами (Deutsche Einheitsverfahren), немецкими правилами питьевой воды (Trinkwasser-Verordnung) (1990) и немецкими правилами экспертизы пищевых продуктов (LMBG).

Американская ассоциация общественного здравоохранения (APHA) предложила эту стандартную питательную среду для обнаружения бактерий для анализа воды. В «Стандартных методах анализа воды» и «Стандартных методах анализа молока» APHA выступает за использование сухих сред для бактериального исследования воды и молока.

Мясной пептон и экстракт говядины содержат азот, витамины, минералы и аминокислоты, необходимые для роста. Хлорид натрия поставляет необходимые электролиты для транспортного и осмотического баланса. Бактериологический агар - отвердитель.

Поскольку эта среда содержит хлорид натрия, ее можно использовать в качестве основы для обогащения кровью или других добавок для культивирования требовательных микроорганизмов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 43 грамма среды в одном литре дистиллированной воды. Хорошо перемешать и растворить, нагревая при частом помешивании. Кипятить одну минуту до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при 121 °C в течение 15 минут. Охладить до 45 °C, хорошо перемешать и разлить по чашкам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Засейте среду исследуемым образцом и инкубируйте при 20 ± 2 °C или 35 ± 1 °C в течение 44 ± 4 часов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Внешний вид	Цвет сухой среды	Цвет готовой среды	Финальный pH (25°C)
Равномерный хлопьевидный осадок	Мелкодисперсный порошок	Белесый	Светло-янтарный	7,3 _{+0,2}

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Условия инкубации: (20 ± 2 °C или 35 ± 1 °C / 44 ± 4 ч)

Микроорганизмы	Рост
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 11700	Хороший
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Хороший