

Сусло-агар

WORT AGAR

Кат. № 1316

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2–25°C

Среда для культивирования и подсчета дрожжей

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л)

Хлорид аммония	1,0	Бактериологический агар	15,0
Дикалий фосфат	1,0	Солодовый экстракт	15,0
Пептон	0,75	Декстрин	2,75
D-мальтоза	12,75		

Окончательная величина pH $4,8 \pm 0,2$ при 25°C

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 48,25 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Добавить 2,35 г (1.9 мл) глицерина. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до полного растворения. Стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 15 минут. Охладить до 45-50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки. Избегать любого ненужного нагрева или повторного растапливания, так как это приведет к изменению гидролиза агара и не позволит ему правильно подействовать после охлаждения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сусло-агар часто используется для выявления и подсчета грибов и дрожжей.

Сусло-бульон широко используется для обнаружения и подсчета дрожжей и грибов, в частности дрожжей в сливочном масле, сиропах и других веществах, особенно в производстве безалкогольных напитков. Среда повторяет состав натурального сусла, а ее кислотность оптимальна для большинства дрожжей, но при этом ингибирует большинство других микроорганизмов.

Солодовый экстракт и пептон является источником азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот, необходимых для роста микроорганизмов. Среда подходит для роста дрожжевых и плесневых грибов, так как содержит мальтозу и другие углеводы в высокой концентрации в качестве источников энергии. Декстрин является источником углерода. Дикалий фосфат служит буферным агентом. Бактериологический агар используется в качестве отвердителя. Глицерин снижает активность воды с 0,999 до 0,95, уменьшая, таким образом, рост микроорганизмов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах, с добавлением глицерина, после инкубации при 30°C в течение 40-48 часов.

Микроорганизмы	Рост
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Хороший
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9763	Хороший
<i>Saccharomyces uvarum</i> ATCC 9080	Хороший