


健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



吴玲(女)

项目号 T012530101

单位 北京世纪好未来教育科技有限公司

联系电话 186****6502

项目简称 好未来

员工号

类别 员工

卡号 0010900227231621

部门

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 2120250809361



爱康国宾北京中关村方正国际大厦分院 (北京爱康国宾中关村门诊部有限公司)

检查日期 2025.08.09

38/1001

爱康国宾®

360° 健康全管理

爱康集团是中国领先的以人工智能驱动的、基于医疗大数据云端服务的数字化健康管理平台。通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老、康复医疗等健康管理及医疗服务。通过爱康智汇康云laaS开放平台，赋能第三方体检与医疗机构，建立起辐射全国主要城市的服务网络，打造“医疗实体+智能云端”的立体化健康管理服务体系。截至2025年7月，爱康集团已在54大城市设有173家体检、齿科与医疗中心。同时，

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



下载爱康体检宝APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	07
	检查详细结果	
4	口腔检查结果	18
	口腔健康整体解决方案/建议	
5	历年主要异常指标对比	20
	历年数据对比及健康预测	
6	深度咨询或风险评估产品建议	21
	历年指标变化疾病风险评估	
7	健康咨询类项目说明	23
	咨询类项目说明	
8	医学名词科普知识	24
	医学名词科普知识内容	


尊敬的吴玲女士，您好！

爱康国宾北京中关村方正国际大厦分院（北京爱康国宾中关村门诊部有限公司）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2025年08月09日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 甲状腺结节
- 【2】 双侧甲状腺腺体回声欠均匀；抗甲状腺微粒体抗体增高
- 【3】 乳腺囊性结节
- 【4】 乳腺增生
- 【5】 视力减退原因待查
- 【6】 双肾囊肿可能
- 【7】 肝血管瘤可能
- 【8】 阴道分泌物过多
- 【9】 宫颈TCT提示轻度炎症反应性细胞改变
- 【10】 外伤性瞳孔散大
- 【11】 血白细胞减少；中性粒细胞绝对值降低
- 【12】 肺纹理增多
- 【13】 完全性右束支阻滞



下载爱康体检宝APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 甲状腺结节

甲状腺结节是临床常见的病征，大多数属于良性结节，恶性病变虽不常见，但性质难以鉴别。建议您去医院专科就诊，进一步检查明确诊断。

02 双侧甲状腺腺体回声欠均匀；抗甲状腺微粒体抗体增高

- 1、诊断甲状腺自身免疫性疾病的一项指标。
- 2、增高见于慢性淋巴细胞性甲状腺炎、甲状腺功能亢进或亚急性甲状腺炎等。
- 3、建议内分泌科就诊。

03 乳腺囊性结节

建议及时到医院乳腺专科诊治和随访，根据医院医嘱进一步检查和定期复查。

04 乳腺增生

- 1、其发生与全身内分泌失调和精神因素密切相关，因此建议您少食高热量、高脂肪食品，避免食用或使用含雌激素的保健品和化妆品，保持乐观情绪，加强有氧运动，维持理想体重。
- 2、每月进行1次乳房自我检查，方法为：平卧位，手指并拢，按顺序轻压乳房，观察有无疼痛、肿块，检查腋下有无淋巴结肿大，最后轻压乳头注意有无异常分泌物。
- 3、建议定期复查。

05 视力减退原因待查

您目前的视力低于正常标准，引起视力减低的原因较多，常见于屈光不正、也可见于斜视、弱视、角膜病变、白内障、眼底病变等。建议您到医院眼科进一步就诊。

06 双肾囊肿可能

- 1、发生机理尚未完全明了，可能是肾小管憩室发展致肾部分组织囊性变。
- 2、如为首次发现，建议专科复查明确诊断。若直径大于50毫米，或有症状者、逐渐增大者等，请及时专科诊治。

07 肝血管瘤可能

- 1、是肝脏常见的良性毛细血管畸形，多为先天性的，多呈团块样表现，因此称为血管瘤。
- 2、多数肝血管瘤病例无症状，常在体检时偶然发现。建议到医院专科明确诊断。

08 阴道分泌物过多

建议到医院妇科做进一步检查治疗。

09 宫颈TCT提示轻度炎症反应性细胞改变

当宫颈炎症时，可出现良性反应性细胞改变，多数情况下属正常现象，建议一年后复查。

10 外伤性瞳孔散大

建议临床观察，如有不适请到眼科诊治。



下载爱康体检APP
查看彩色报告

11 血白细胞减少；中性粒细胞绝对值降低

- 1、白细胞在机体防御中起重要作用，引起白细胞减少的原因很多，可见于病毒感染，如感冒、流感等一过性偏低，也可见于某些药物影响、接触射线、脾功能亢进等。
- 2、轻度减少，病因有时难以确定，可暂观察，必要时复查，若长期白细胞减少，建议内科进一步检查。

12 肺纹理增多

- 1、常见于急性或慢性支气管疾患。
- 2、尽量避开烟雾环境，杜绝主动吸烟，减少被动吸烟；避开过敏物，保暖，防止伤风感冒。
- 3、若出现咳、喘、痰多等症状，请到医院呼吸内科诊治。

13 完全性右束支阻滞

- 1、可见于正常人。
- 2、病理情况常见于风湿性心肌炎、冠心病、高血压、肺心病等。
- 3、有症状请及时到心血管内科就诊。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：李娜

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	154.5	cm		
体重	45.0	Kg		
体重指数	18.9			18.5—23.99
收缩压	102	mmHg		90.0—139.0
舒张压	61	mmHg		60.0—89.0

初步意见

未见明显异常

内科

检查者：武秋凡

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	64	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见

未见明显异常

外科

检查者：牛晓丽

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	



下载爱康体检宝APP
查看彩色报告

浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	双侧甲状腺扪及结节	
乳房	双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，结节不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	1.双侧甲状腺结节 2.乳腺增生	

妇科

检查者：简爱梅

检查项目	检查所见	单位
外阴	未见明显异常	
阴道	阴道分泌物过多	
宫颈	未见明显异常	
子宫	未见明显异常	
附件	未扪及明显异常	
妇科其它	无	
初步意见	阴道分泌物过多	

眼科

检查者：张佳睿、李金霞

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)	0.4	
裸视力(左)	1.0	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		
色觉	正常	

外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
裂隙灯检查	右眼有外伤性史，瞳孔散大。	

初步意见	1.外伤性瞳孔散大 2.视力减退原因待查	
------	-------------------------	--

耳鼻咽喉科

检查者：肖从科

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	

初步意见	未见明显异常
------	--------

血常规

操作者：郭幼凌 审核者：葛百芝

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
白细胞计数	WBC	3.1	↓	3.5—9.5	10 ⁹ /L	本院	血	
红细胞计数	RBC	3.92		3.8—5.1	10 ¹² /L	本院	血	
血红蛋白	Hb	125.0		115—150	g/L	本院	血	
红细胞比容	HCT	0.370		0.350—0.450	L/L	本院	血	

平均红细胞体积	MCV	94.0		82.0—100.0	fL	本院	血	
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.9		27.0—34.0	pg	本院	血	
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	341		316—354	g/L	本院	血	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.7		11—16	%	本院	血	
血小板计数	PLT	168		125—350	10 ⁹ /L	本院	血	
平均血小板体积	MPV	8.7		6—11	fL	本院	血	
血小板分布宽度	PDW	15.3		11—18	%	本院	血	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	42.4		20.0—50.0	%	本院	血	
中性粒细胞百分比	NEUT%	47.1		40—75	%	本院	血	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.31		1.1—3.2	10 ⁹ /L	本院	血	
中性粒细胞绝对值	NEUT	1.46	↓	1.8—6.3	10 ⁹ /L	本院	血	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	49.0		39—52	fL	本院	血	
血小板压积	PCT	0.15		0.15—0.50	%	本院	血	
单核细胞百分比	MONO%	8.0		3—10	%	本院	血	
单核细胞绝对值	MONO	0.25		0.1—0.6	10 ⁹ /L	本院	血	
嗜酸性细胞百分比	EOS%	2.5		0.4—8.0	%	本院	血	
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.08		0.02—0.52	10 ⁹ /L	本院	血	
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.0		0—1	%	本院	血	
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0.00—0.06	10 ⁹ /L	本院	血	

小结

- 1.中性粒细胞绝对值降低
- 2.血白细胞减少

7B22980E642317F2490E2B284511F3DD960358C224F41F73447FF8214A986189 7B22980E642317F2490E2B284511F3DD960358C224F41F73447FF8214A986189

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

尿常规

操作者：李江兰 审核者：葛百芝

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
尿比重	SG	1.015		1.005—1.030		本院	尿液	
尿酸碱度	PH	7.0		4.5—8.0		本院	尿液	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性		本院	尿液	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性		本院	尿液	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性		本院	尿液	
尿糖	GLU	阴性		阴性		本院	尿液	
尿酮体	KET	阴性		阴性		本院	尿液	
尿胆原	URO	阴性		阴性		本院	尿液	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性		本院	尿液	
尿隐血	BLD	阴性		阴性		本院	尿液	
小结	未见明显异常							

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

呼气实验室

操作者：李江兰 审核者：葛百芝

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
幽门螺杆菌检测（C14呼气试验）	C14	0.00		0.00—100.00		本院	气	
小结	未见明显异常							

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

妇科检验项目

操作者：宫晓梦 审核者：洪蒋宝

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
------	----	------	----	------	----	------	------	-----

未见上皮内病变及恶性细胞
(NILM) 良性反应细胞改变
(轻度炎症)

迪安检验中心

细胞样本

宫颈TCT

小结

宫颈TCT：轻度炎症反应性细胞改变

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

实验室检查

操作者：杨婷 张钰妹 秦甜甜 李洁 张碧盈 关雪晴 周春宏 李旭倩 审核者：王友友 杨森 郭富 吴文静 康志敏 庞文华 邢红娜 王博雅 蔡翔宇

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
★梅毒螺旋体特异抗体测定	TPPA	阴性		阴性		迪安检验中心	血	
★梅毒甲苯胺红不加热血清试验(TRUST)	TRUST	阴性		阴性		迪安检验中心	血	
★抗缪勒管激素	AMH	1.78		0.24—11.78	ng/mL	北京区检验中心	血	
HR 丙氨酸氨基转移酶	ALT	8		0—40	U/L	北京区检验中心	血	
HR 天门冬氨酸氨基转移酶	AST	17		0—35	U/L	北京区检验中心	血	
HR γ-谷氨酰转移酶	GGT	13		7—45	U/L	北京区检验中心	血	
HR 尿素	UREA	3.04		2.6—7.5	mmol/L	北京区检验中心	血	
HR 肌酐	Cr	48		41—73	μmol/L	北京区检验中心	血	

HR 尿酸	UA	202		150—360	μmol/L	北京区 检验中 心	血	
HR 空腹血葡萄糖	FBG	5.03		3.9—6.1	mmol/L	北京区 检验中 心	血	
HR 总胆固醇	TC	3.78		<5.2	mmol/L	北京区 检验中 心	血	
HR 甘油三酯	TG	0.74		0.40—1.70	mmol/L	北京区 检验中 心	血	
HR 高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.39		1.0—2.1	mmol/L	北京区 检验中 心	血	
HR 低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	1.91		0—3.37	mmol/L	北京区 检验中 心	血	
HR 磷酸肌酸激酶	CK	58		40—200	U/L	北京区 检验中 心	血	
磷酸肌酸激酶同工酶	CK-MB	6		0—24	U/L	北京区 检验中 心	血	
HR 乳酸脱氢酶	LDH	149		0—250	U/L	北京区 检验中 心	血	
★ 甲型肝炎病毒抗体-IgG	HAV-IgG	阴性		阴性		迪安检 验中心	血	
★ 甲型肝炎病毒抗体-IgM	HAV-IgM	阴性		阴性		迪安检 验中心	血	
★ 丙型肝炎病毒抗体	HCVAbs	阴性		阴性		迪安检 验中心	血	
★ 艾滋病抗体	HIV-Ab	阴性		阴性		迪安检 验中心	血	

HR 甲胎蛋白定量	AFP	1.97		0—20	ng/ml	北京区 检验中心	血	
HR 癌胚抗原定量	CEA	0.68		0—5	ng/ml	北京区 检验中心	血	
糖类抗原242	CA242	1.740		<25	U/mL	北京区 检验中心	血	
HR 糖类抗原15-3	CA15-3	9.28		0—31.65	U/ml	北京区 检验中心	血	
HR 糖类抗原125	CA125	10.56		0—35	U/ml	北京区 检验中心	血	
鳞状上皮细胞癌相关抗原	SCC	0.800		0—1.65	ng/ml	北京区 检验中心	血	
HR 游离三碘甲状腺原氨酸	FT3	3.13		2.3—4.2	pg/ml	北京区 检验中心	血	
HR 游离甲状腺素	FT4	1.06		0.89—1.76	ng/dl	北京区 检验中心	血	
HR 促甲状腺激素	TSH	2.166		0.38—4.34	μIU/mL	北京区 检验中心	血	
HR ★ 三碘甲状腺原氨酸	T3	0.81		0.6—1.81	ng/ml	北京区 检验中心	血	
HR ★ 甲状腺素	T4	7.4		4.3—12.5	μg/dl	北京区 检验中心	血	
★ 抗甲状腺球蛋白抗体	TG-Ab	<1.3		0—4.5	IU/ml	北京区 检验中心	血	

★ 甲状腺过氧化物酶抗体	TPO-Ab	42		0—60	U/ml	北京区 检验中心	血	
★ 抗甲状腺微粒体抗体	TM-Ab	12.49	↑	<10	IU/ml	迪安检 验中心	血	
★ 促甲状腺素受体抗体	TR-AB	1.14		<1.71	IU/L	迪安检 验中心	血	

小结	抗甲状腺微粒体抗体增高							
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

心电图室

检查者：马琳

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律；完全性右束支阻滞	

初步意见	完全性右束支阻滞							
------	----------	--	--	--	--	--	--	--

腹部彩超

检查者：魏兰萍

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，表面光滑，包膜完整，肝内回声分布均匀，血管纹理走行清晰，门静脉正常。肝右叶可见一个偏强回声结节，大小约19×16mm，边界清楚，CDFI：结节内未见明显血流信号。	
胆	胆囊形态大小正常，囊壁光整，胆汁充盈良好，胆总管内径正常	
胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张，CDFI:血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	双肾可见无回声区，右侧大小约8×5mm，左侧多发最大约23×20mm。CDFI：血流显示正常	

初步意见	1.肝血管瘤可能 2.双肾囊肿可能							
------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

子宫、附件彩超

检查者：魏兰萍

检查项目	检查所见	单位
------	------	----

7B22980E642317F2490E2B284511F3DD960358C224F41F73447FF8214A986189 7B22980E642317F2490E2B284511F3DD960358C224F41F73447FF8214A986189

子宫	子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范围，宫颈厚度正常	
附件	双侧附件区未见明显异常	
初步意见	未见明显异常	

乳腺彩超



检查者：魏兰萍

检查项目	检查所见	单位
乳腺	双侧乳腺腺体致密内部回声增强，结构紊乱，分布不均腺管未见明显扩张，CDFI;未见明显异常血流信号； 双侧乳腺可见边界清晰的无回声结节，左侧大小约4×3mm，右侧多发最大位于内上象限近乳头处，大小约5×3mm。CDFI:血流未见明显异常	
初步意见	1.乳腺增生 2.双侧乳腺囊性结节	

甲状腺彩超

检查者：魏兰萍

检查项目	检查所见	单位
甲状腺	甲状腺形态大小正常，表面尚光滑，包膜完整，腺体增粗，回声欠均匀。CDFI:血流显示正常； 甲状腺双侧叶见边界尚清晰的多发偏强回声结节，左侧最大约7×4 mm，右侧最大约10×6mm。CDFI：血流未见明显异常	
初步意见	1.双侧甲状腺腺体回声欠均匀 2.双侧甲状腺结节	



* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

放射科

检查者：计旭 审核者：计旭

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理增多。心影未见明确增大，膈面光整，肋膈角清晰。	

初步意见	肺纹理增多
------	-------

主检医师：李春学

iKang爱康




想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康体检宝APP，检前检后全管理

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



操作者：杜玫

序号	症状描述	建议
1	牙结石不同程度附着于牙颈部	牙结石为局部刺激因素，可引发牙龈炎、牙周炎，建议龈上洁治，去除局部危险因素。
2	牙龈出血	牙龈出血与牙龈炎、牙周炎或某些系统性疾病相关，建议口腔科诊治。
3	口腔异味、牙龈红肿、牙龈质地松软、咬硬物时易出血	常表现为牙龈红肿、出血。此病主要由牙菌斑和牙石的刺激所致，建议龈上洁治，定期洁牙，养成早晚刷牙、饭后漱口的良好口腔卫生习惯。
4	(18,28,38,48)智齿萌出受阻	建议拔除

巴氏刷牙法

1



刷毛与牙齿、牙龈成45°角，略加力使部分刷毛进入牙沟与间隙

2



轻柔水平颤动，向牙冠旋转，在2到3颗牙齿间左右震颤8~10次

3



刷毛垂直接触龈缘或进入龈沟，在前牙做上下提拉颤动

4



刷咬合面时把刷毛指向咬合面，稍用力做前后来回刷

5



每次刷2-3颗牙，轻柔水平颤动、按摩8~10次

6



由内而外轻刷舌头表面，让口气保持清新

清洁建议



使用牙线、牙间刷



使用含氟牙膏



舌苔刷清理舌头



使用漱口水漱口



喷口气清新剂

齿科咨询热线

4006-190-920



爱康齿科官方微信




看齿科 来爱康

5.历年主要异常指标对比

体重指数

2014年到2025年对比图



年份	测量结果	单位	参考区间
2014/11	18.45		18.5-24
2015/11	18.7		18.5-23.99
2016/10	19.6		18.5-23.99
2018/10	20.7		18.00-24.00
2023/07	19.3		18.5-23.99
2025/08	18.9		18.5-23.99



下载爱康体检宝APP
查看彩色报告

6.深度咨询或风险评估产品建议

甘预-肝癌早期筛查

肝癌，一般是指原发性肝细胞癌，约占全部原发性肝癌的85-90%，是最常见的恶性肿瘤之一[1]。2020年世界卫生组织最新数据显示，我国肝癌年新发病例约占全球的45.3%，肝癌年死亡病例约占全球的47.1% [2]。

肝癌高居我国癌症死因的第二位，其发生和发展一般会经历一个漫长的过程。由于早期肝癌无明显痛感，早期发现将有助于肝癌的诊断和治疗。

甘预——肝癌全维度超早期筛查管理方案，能够在无症状期发现3cm以下的肿瘤，为有需求的患者提供覆盖全国多家名牌医院的诊疗绿色通道，使患者能够获得及早诊治机会，5年生存率有效提升至80%以上。

甘预所采用的无创液态活检技术，我国首个获得美国FDA“突破性医疗器械”认定的肝癌早期筛查产品，能够比常见的影像学及血清标志物检测更早期发现癌变，该技术获得了权威指南和共识的推荐[3,4]，并建议您每隔6-12个月进行1次检查。（注：对于罹患肝癌的患者，建议前往医院就诊）

参考文献：

- [1] Grandhi MS, Kim AK, Ronnekleiv-Kelly SM, et al. Hepatocellular carcinoma: From diagnosis to treatment. Surg Oncol. 2016;25(2):74-85.
- [2] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.
- [3] 原发性肝癌诊疗规范（2019年版）[J].传染病信息,2020,33(06):481-500.
- [4] 陆荫英,赵海涛,程家敏,姬峻芳.肝胆肿瘤分子诊断临床应用专家共识[J].临床肝胆病杂志,2020,36(07):1482-1488.



甘预

爱康关爱您的肝脏健康

扫描右侧二维码购买



扫码购买



下载爱康体检APP
查看彩色报告

Mosaic 胶原蛋白支持

Mosaic由康奈尔医学院（Weill Cornell Medical College）皮肤系主任Richard Granstein教授指导研制而成。

随着年龄的增长，皮肤会失去弹性和水分，更容易受到环境和内部压力的影响。要保持年轻肌肤，需要从内部推动变化。

Mosaic由类胡萝卜素、生育酚（维生素E）和鼠尾草酸组成的配方，可协同提供强大的抗氧化功效，改善和保护皮肤。

经临床证明，Mosaic可从内层对抗皮肤衰老，补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质[1]。

- 1) 3周，皮肤水分含量有明显的增加[2]。
- 2) 4周，皮肤中的类胡萝卜素水平将增加15%，支持胶原蛋白[3,4]。
- 3) 12周，皮肤光滑度、弹性、干燥度等有改善[2,5]。
- 4) 16周，皮肤中的类胡萝卜素水平将提高31%，从而改善肤色、亮度、光泽，并减少细纹和皱纹的出现[5]。

产品为美国原装进口，保税仓直邮发货。

参考文献：

[1]doi:10.4172/2167-065X.1000195

[2]doi:186.1475/2891-13-70

[3]doi:3390.26071931

[4]doi:10.4172/2167-065X.1000195

[5]doi:3390.13072220/nu

注：*个人结果可能有所不同。此时间表可能与典型用户的体验不同，并不代表或保证每个用户都会获得相同或相似的结果。



Mosaic 胶原蛋白支持

可补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质
扫描右侧小程序码购买



扫码查看

7. 健康咨询类项目说明

以下项目属于健康咨询类服务，不作为体检诊断项目，仅作为参考，评测结果将以独立的报告形式呈现。本体检报告不包含独立检测项目

★ 泌思优-卵巢癌外泌体检测

项目说明

本产品通过体外测定血清外泌体中的外泌体CA125、外泌体HE4和外泌体C5a浓度，并经给定的计算公式计算后得到受试者罹患上皮性卵巢恶性肿瘤的评估分值（OCS），适用于临床上发现有附件包块的妇女患者，用于上皮性卵巢癌（EOC）的辅助诊断。

★ 艾为定-胃癌多基因甲基化检测

项目说明

该产品基于PCR-荧光探针检测技术，用于体外定性检测人外周血血浆中Reprimo、SDC2、TCF4基因的甲基化水平，进行胃癌相关筛查。




下载爱康体检宝APP
随时随地看报告

8.医学名词科普知识


医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

■ 什么是肺纹理？



由肺动脉和肺静脉组成，支气管壁、淋巴和少量间质组织也参与肺纹理形成。正常情况下肺纹理自肺门向外围肺野逐渐减少变淡，管径依次缩小，分布渐次稀疏，至肺外带不易辨清。肺纹理多少、粗细与个体差异、呼吸状态有关。异常肺纹理阴影结构紊乱、粗细不均、边缘模糊、密度增高，在某种程度上能反映肺血流量和心脏功能的情况，对诊断某些呼吸系统、循环系统疾病有一定的帮助。

■ 什么是血管瘤？




一种瘤状的先天性血管畸形。常见于婴儿及儿童。好发于颜面、躯干。单发或多发，亦可呈弥漫性生长。切面有大小不等的管腔，含血液，质软，多在生后不久即出现，与身体的生长相平行，儿童期生长较快，以后逐渐变慢缩小，甚至消失，但也有长期存在或持久生长者。表现为红色斑痣、杨梅状、海绵状和混合型等。偶可引起出血和所在器官的功能障碍。

■ 什么是甲状腺结节？



甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄>70岁；④结节增长迅速且直径>2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质地硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

■ 什么是乳腺增生？



乳腺增生又名乳腺结构不良，可分为囊性小叶增生、腺性小叶增生和纤维性小叶增生。乳腺增生是生理过程中，或在某些激素分泌失调情况下，表现出乳腺组织成分的大小和数量构呈比例及形态上的周期性变化，是一组临床综合征。乳腺增生并非炎症性或肿瘤性疾病，甚至其大多数情况下都是代表乳腺组织对激素的生理性反应，而不是真正的疾病。仅有少部分可能属于疾病，其中极少数出现非典型增生，可再发展成原位癌，甚至最终演变为浸润性乳腺癌。注意，这个过程并非线性进展，随时可以在浸润性乳腺癌之前的任一环节停下来，所以不能把乳腺增生视作癌前期病变。乳腺增生可发生于青春期末至绝经期的任何年龄，以20~40岁多见，35~40岁为高峰。常为双侧，亦可单侧发病，病变呈多发、弥漫性分布。多无明显症状；少数可有疼痛感或胀痛，疼痛与月经周期有关，经前明显，经后减轻；部分患者疼痛与情绪有关。发病初期可无明显体征，到一定阶段表现出乳腺组织增厚感或结节感，可有压痛。腋下淋巴结不肿大。



下载爱康体检APP
查看彩色报告

■ 什么是阻生齿？



阻生齿是指由于各种原因骨或软组织的障碍，使牙齿只能部分萌出或完全不能萌出，且以后也不能萌出的牙。最常见的为第三恒磨牙，其次为上颌尖牙。阻生齿的拔除较一般牙齿拔除困难。

■ 什么是牙结石？




是一种沉积于牙面或修复体表面的钙化或正在钙化的菌斑，由唾液或龈沟液中的矿物盐逐渐沉积而形成，且不易去除。牙石是牙龈病和牙周病的重要病因。按其附着位置不同分为龈上牙石和龈下牙石。龈上牙石颜色较浅，常为白黄色或灰黄色，质地较软，易为洁治器所除去，常分布于全口，但以唾液腺管口邻接的牙面沉积最多。龈下牙石沉积于龈沟或牙周袋中的牙面上，颜色较深，常为黑褐色，质地较硬，不易为刮治器所刮尽，不一定分布于全口牙，与唾液腺管口也无明显的关系。

体检号:2120250809361

客户信息:吴玲/女/38

HR: 73bpm
RR: 821ms
SV1+RV5: 1.79mV
SV1/RV5: 0.52/1.27mV
PR: 122ms
QRS: 122ms
QT/QTc: 414/440ms
P/QRS/T: 49° /74° /25°



7B22980E642317F2490E2B284511F3DD960358C224F41F73447FF8214A986189 7B22980E642317F2490E2B284511F3DD960358C224F41F73447FF8214A986189

检查时间: 2025-08-09 11:25:59

诊断医生

马瑞玲

吴玲(女)

项目号 T012530101

单位 北京世纪好未来教育科技有限公司

联系电话 186****6502

员工号

卡号 0010900227231621

项目简称 好未来

类别 员工

部门

递送方式 电子报告

接收人 吴玲

体检号 2120250809361

递送地址

爱康国宾北京中关村方正国际大厦分院（北京爱康国宾中关村门诊部有限公司）

检查日期 2025.08.09

乙肝项目检测报告

尊敬的 吴玲 女士，您好！

爱康国宾北京中关村方正国际大厦分院（北京爱康国宾中关村门诊部有限公司）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您 2025年08月09日 的体检报告呈上，希望能为维护您的健康提供参考。

第一部分：乙肝项目检测结果

实验室检查

操作者：张碧盈 审核者：庞文华

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
HR★乙型肝炎病毒表面抗原定量	HBsAg	<0.05		<0.05	IU/ml	北京区 检验中心	血	
HR★乙型肝炎病毒表面抗体定量	Anti-HBs	219.08	↑	<10	mIU/ml	北京区 检验中心	血	
★乙型肝炎病毒e抗原定量	HBeAg	<0.050		<0.1	IU/ml	北京区 检验中心	血	
★乙型肝炎病毒e抗体定量	Anti-HBe	<0.100		<0.15	IU/ml	北京区 检验中心	血	
★乙型肝炎病毒核心抗体定量	Anti-HBc	<0.10		<0.35	IU/ml	北京区 检验中心	血	

小结

乙肝表面抗体阳性

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

第二部分：总检专家建议和健康指导

01 乙肝表面抗体阳性

- 1、乙肝“两对半”检查结果为乙肝表面抗体阳性，这说明您可能通过预防接种或过去自然感染产生了对乙肝病毒的免疫力。乙肝表面抗体是保护性抗体，阳性者可以抵御乙肝病毒的侵袭。
- 2、请定期监测乙肝表面抗体消减情况，必要时加强注射。

主检医师：李春学

第三部分：特别提示

- 01 乙肝项目检测结果涉及您的个人隐私，请谨慎向他人出示。
- 02 本次乙肝项目检测结果不得用于入职，入学事项。