

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



吴玲(女)

项目号 T012630118

单位 北京世纪好未来教育科技有限公司

联系电话 186****6502

项目简称 好未来

员工号

类别 员工

卡号 0010900230052913

部门 STAFF

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 3222608080099



北京爱康国宾西三旗门诊部

检查日期 2026.08.08

39/1001

爱康国宾®

3 6 0 * 健 康 全 管 理

爱康集团是中国领先的以人工智能驱动的、基于医疗大数据云端服务的数字化健康管理平台。通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老、康复医疗等健康管理及医疗服务。通过爱康智汇康云laaS开放平台，赋能第三方体检与医疗机构，建立起辐射全国主要城市的服务网络，打造“医疗实体+智能云端”的立体化健康管理服务体系。截至2025年7月，爱康集团已在54大城市设有173家体检、齿科与医疗中心。同时，

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



下载爱康体检APP

www.ikang.com

尊敬的 吴玲女士，您好！

您于 2026年08月08日在我中心进行了健康体检，感谢您的信任，现将体检结果及健康管理指导呈上，请您详阅。

基本信息

姓名				性别		婚否	
民族		出生日期		联系方式			
身份证件类别				身份证件号码			
职业		家庭住址					

既往病史

☐ 高血压	☐ 糖尿病	☐ 血脂异常	☐ 冠心病	☐ 脑卒中
☐ 慢性阻塞性肺病	☐ 消化性溃疡	☐ 慢性肾功能不全	☐ 甲亢/甲减	☐ 高尿酸血症
☐ 骨关节疾病	☐ 慢性肝炎	☐ 肺结核	☐ 精神疾病	☐ 其他
☐ 无上述病史				

恶性肿瘤病史

☐ 肺癌	☐ 食道癌	☐ 胃癌	☐ 结肠/直肠癌	☐ 肝癌
☐ 甲状腺癌	☐ 乳腺癌	☐ 卵巢癌	☐ 宫颈癌	☐ 前列腺癌
☐ 膀胱癌	☐ 白血病	☐ 淋巴瘤	☐ 脑肿瘤	☐ 其他恶性肿瘤
☐ 无上述病史				

家族史

	高血压	糖尿病	冠心病	脑卒中	乳腺癌	肺癌	结肠/直肠癌	精神疾病	无上述病史
父亲	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
母亲	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
兄弟	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
姐妹	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

药物过敏史 是☐ 否☐

传染病史 是☐ 否☐

手术史 是☐ 否☐

输血史 是☐ 否☐

提示：以上呈现内容均依据您在预约体检时首次填写信息所生成。 本人签字:_____

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	05
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	06
	建议与指导	
3	健康体检结果	08
	检查详细结果	
4	口腔检查结果	18
	口腔健康整体解决方案/建议	
5	历年主要异常指标对比	20
	历年数据对比及健康预测	
6	深度咨询或风险评估产品建议	21
	历年指标变化疾病风险评估	
7	医学名词科普知识	23
	医学名词科普知识内容	


尊敬的吴玲 女士，您好！

北京爱康国宾西三旗门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2026年08月08日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适应症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 双侧甲状腺结节（多发）
- 【2】 双侧乳腺囊性结节（右侧多发）；乳腺增生
- 【3】 完全性右束支阻滞
- 【4】 碱性磷酸酶降低
- 【5】 肝血管瘤可能
- 【6】 双肾囊肿可能（左侧多发）
- 【7】 宫颈柱状上皮异位；宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变
- 【8】 右侧卵巢囊肿
- 【9】 外伤性瞳孔散大
- 【10】 血小板压积降低
- 【11】 视力减退原因待查



下载爱康体检宝APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 双侧甲状腺结节（多发）

- 1、甲状腺结节是甲状腺细胞的异常局灶性生长形成的离散病变，双侧多发结节提示甲状腺存在多灶性病理改变，其性质需结合超声特征、甲状腺功能及病理学检查综合评估，恶性风险虽低但需警惕孤立结节、快速无痛性增大或家族史等高危因素。
- 2、双侧甲状腺结节需关注其动态变化，若出现结节迅速增大、质地变硬或伴有声音嘶哑、吞咽困难等症状，可能提示恶性转化风险增加，需及时评估。
- 3、保持均衡饮食，避免过量摄入碘或高碘食物，减少颈部放射线暴露，定期自我触诊颈部，如发现结节增大或出现不适及时就医。
- 4、建议到医院专科就诊，进一步明确结节性质，评估是否需要穿刺活检或定期超声随访。

02 双侧乳腺囊性结节（右侧多发）；乳腺增生

- 1、乳腺增生与双侧乳腺囊性结节均与体内雌激素水平波动密切相关，雌激素周期性刺激导致乳腺腺体结构紊乱、回声增强，并促进导管扩张形成囊性结构，右侧多发结节提示局部激素反应更为活跃。
- 2、乳腺增生及囊性结节均为良性病变，但需关注结节形态变化，若出现快速增大或形态异常可能增加恶变风险，需定期监测。
- 3、保持心情舒畅，避免精神紧张和情绪波动；注意膳食平衡，减少高脂肪食物摄入，增加蔬菜水果；慎用含雌激素的化妆品或药物，避免外源性激素刺激。
- 4、建议及时到乳腺专科诊治和随访，根据医院医嘱进一步检查和定期复查，如出现乳房疼痛加重、触及新发肿块或乳头溢液等异常情况，请及时就医。

03 完全性右束支阻滞

- 1、可见于正常人。
- 2、病理情况常见于风湿性心肌炎、冠心病、高血压、肺心病等。
- 3、有症状请及时到心血管内科就诊。

04 碱性磷酸酶降低

- 1.偶见于甲状腺功能低下、恶性贫血等。先天性碱性磷酸酶缺乏或减少症临床罕见，可引起骨中矿物质严重缺乏，并易发骨折。
- 2.建议复查，必要时到医院进一步综合诊治。

05 肝血管瘤可能

- 1、肝脏影像学检查显示的血管瘤样改变可能源于先天性血管发育异常或局部组织密度变异，这些良性病变通常与肝脏代谢功能无直接关联。
- 2、虽然多数为良性过程，但仍需关注病变大小变化对周围组织的机械压迫风险以及极少数情况下与恶性肿瘤的鉴别需求。
- 3、建议保持健康生活方式，避免饮酒，控制体重，均衡饮食，减少高脂肪食物摄入，同时注意保护腹部免受外力撞击。
- 4、建议到医院进一步明确诊断。

06 双肾囊肿可能（左侧多发）



下载爱康体检APP
查看彩色报告

- 1、双肾囊肿是指肾脏内出现充满液体的囊性结构，通常为良性病变，左侧多发囊肿可能与肾小管结构异常或局部扩张有关，多数情况下生长缓慢，对肾功能影响较小。
- 2、目前囊肿体积较小，一般不会对肾功能或周围组织造成明显压迫，但需关注囊肿大小及数量的变化，极少数情况下囊肿增大可能引起腰酸、腹胀或影响肾脏功能。
- 3、建议保持规律作息，避免腰部剧烈碰撞或挤压，适量饮水，控制血压和血糖在正常范围，减少高盐饮食以减轻肾脏负担。
- 4、建议复查，关注囊肿大小及形态变化，如出现腰部疼痛、血尿或腹部包块等症状，请及时就医。

07 宫颈柱状上皮异位；宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变

- 1、宫颈柱状上皮异位与宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变均与宫颈局部微环境相关，前者可因雌激素水平波动导致鳞柱交界外移，后者提示宫颈存在轻微炎症刺激，两者共同反映宫颈局部生理或病理状态，需结合临床综合评估。
- 2、虽然轻度炎症反应性细胞改变通常为良性，但若炎症持续存在，可能影响宫颈局部免疫功能，需关注其动态变化，避免潜在风险。
- 3、保持外阴清洁卫生，避免不洁性生活，适当增加富含维生素C和抗氧化食物的摄入，如新鲜蔬菜水果，减少辛辣刺激性食物，规律作息，避免过度劳累，以增强机体免疫力。
- 4、建议定期复查，关注宫颈细胞学变化趋势，如有白带异常、接触性出血等症状请及时就医。

08 右侧卵巢囊肿

育龄女性多见，较小的（10-30mm）多为功能性囊肿，可与月经周期变化有关，部分囊肿可自行消退，建议定期复查。若囊肿大于40mm，B超检查为非单纯囊性，增长较快，应及时到医院妇科诊治。

09 外伤性瞳孔散大

建议临床观察，如有不适请到眼科诊治。

10 血小板压积降低

- 1、血小板压积降低通常反映血液中血小板所占体积比例减少，可能与血小板生成减少、破坏增多或分布异常有关，需结合血小板计数等指标综合评估其临床意义。
- 2、轻度血小板压积降低可能无明显健康影响，若持续显著降低可能影响机体正常凝血功能，增加出血倾向，如皮肤瘀点、牙龈出血或月经量增多等。
- 3、建议保持均衡饮食，适当摄入富含优质蛋白、铁及维生素B12的食物，避免过度劳累和熬夜，减少可能引起血小板减少的药物或化学物质接触。
- 4、建议定期复查，关注血小板相关指标的变化趋势，如有皮肤瘀斑、牙龈出血或月经量异常增多等不适症状请及时就医。

11 视力减退原因待查

- 1、视力减退可能由多种因素引起，包括长时间用眼疲劳、屈光不正、眼部干涩或年龄相关的生理变化，这些情况通常提示我们需要关注眼睛的休息与营养支持。
- 2、建议日常注意用眼卫生，每工作或学习45分钟远眺5分钟，多摄入富含维生素A、叶黄素和花青素的食物如胡萝卜、菠菜和蓝莓，同时保证充足睡眠和适度户外活动以缓解眼疲劳。
- 3、如果视力减退持续或加重，建议在1至2个月内前往眼科进行常规视力检查和眼底评估，以便及时了解眼部健康状况。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：刘宇

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	154.0	cm		
体重	43.8	Kg		
体重指数	18.5			18.5—23.99
收缩压	105	mmHg		90.0—139.0
舒张压	64	mmHg		60.0—89.0

初步意见

未见明显异常

内科

检查者：王宝梅

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	60	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见

未见明显异常

外科

检查者：刘宇

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	



下载爱康体检宝APP
查看彩色报告

浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	双侧甲状腺扪及结节	
乳房	双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，结节不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	1.双侧甲状腺结节 2.乳腺增生	

妇科

检查者: 赵丽霞

检查项目	检查所见	单位
外阴	未见明显异常	
阴道	未见明显异常	
宫颈	宫颈呈现糜烂样改变，范围：I度	
子宫	未见明显异常	
附件	未扪及明显异常	
妇科其它	无	
初步意见	宫颈柱状上皮异位	

眼科

检查者: 宋佩伟、李淑华

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)	0.8	
裸视力(左)	0.8	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		

色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
裂隙灯检查	右眼有外伤性史，瞳孔散大。	
初步意见	1.外伤性瞳孔散大 2.视力减退原因待查	

耳鼻咽喉科

检查者：刘绍华

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：尚然 审核者：曹梅

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	3.9		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	4.03		3.8—5.1	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	131.0		115—150	g/L
红细胞比容	HCT	0.390		0.350—0.450	L/L
平均红细胞体积	MCV	97.0		82—100	fL

平均红细胞血红蛋白含量	MCH	32.4		27—34	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	333.0		316—354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.0		11—16	%
血小板计数	PLT	157.0		125—350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	8.2		6.0—11.0	fL
血小板分布宽度	PDW	14.5		11.0—18.0	%
淋巴细胞百分比	LYMPH%	44.9		20—50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	46.2		40.0—75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.8		1.1—3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	1.8		1.8—6.3	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	42.0		39—52	fL
血小板压积	PCT	0.130	↓	0.15—0.5	%
单核细胞百分比	MONO%	6.40		3.0—10.0	%
单核细胞绝对值	MONO	0.25		0.1—0.6	10 ⁹ /L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	2.50		0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.10		0.02—0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.00		0.0—1.0	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0.00—0.06	10 ⁹ /L

小结

血小板压积降低

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者： 尚然 审核者： 曹梅

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.015		1.010—1.025	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5—8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL

尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

呼气实验室

操作者：朱湘军 审核者：曹梅

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
幽门螺杆菌检测（C14呼气试验）	C14	45		0—100	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

妇科检验项目

操作者：宫晓梦 审核者：洪蒋宝

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
宫颈TCT		未见上皮内病变及恶性细胞（NILM）良性反应细胞改变（轻度炎症）			

小结

宫颈TCT：轻度炎症反应性细胞改变

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：房慧聪 魏博 张碧盈 周春宏 李红惠 审核者：曹文倩 康志敏 宫美欣 庞文华 周丽娜 周颖

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
★ 碱性磷酸酶	ALP	31	↓	35—100	U/L
★ 总胆汁酸	TBA	2.4		0—10	μmol/L

★ 胆碱酯酶	CHE	7396	5000—12000	U/L
★ 总胆红素	TBIL	13.9	0—21	μmol/L
★ 直接胆红素	DBIL	2.8	0—10	μmol/L
★ 间接胆红素	IBIL	11.1		μmol/L
★ 总蛋白	TP	71.2	65—85	g/L
★ 白蛋白	ALB	47.7	40—55	g/L
★ 球蛋白	GLb	23.5	20—40	g/L
★ 白蛋白/球蛋白比值	A/G	2.0	1.2—2.4	
丙氨酸氨基转移酶	ALT	9	0—40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	17	0—35	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	14	7—45	U/L
尿素	UREA	3.30	2.6—7.5	mmol/L
肌酐	Cr	49	41—73	μmol/L
尿酸	UA	194	150—360	μmol/L
空腹血糖	FBG	5.18	3.9—6.1	mmol/L
总胆固醇	TC	4.13	<5.2	mmol/L
甘油三酯	TG	0.59	0.40—1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.52	1.0—2.1	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.12	0—3.37	mmol/L
甲胎蛋白定量	AFP	1.82	0—7	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	0.88	0—5	ng/ml
糖类抗原15-3	CA15-3	8.10	0.00—25	U/ml
糖类抗原125	CA125	10.10	0.00—35	U/ml
★ 游离三碘甲状腺原氨酸	FT3	3.09	2.3—4.2	pg/ml
★ 游离甲状腺素	FT4	1.25	0.89—1.76	ng/dl
★ 三碘甲状腺原氨酸	T3	0.98	0.6—1.81	ng/ml

★ 甲状腺素	T4	8.3	4.3—12.5	μg/dl
★ 促甲状腺激素	TSH	3.089	0.38—4.34	μIU/mL
★ 抗甲状腺球蛋白抗体	TG-Ab	<1.3	0—4.5	IU/ml
★ 甲状腺过氧化物酶抗体	TPO-Ab	<6.6	<14.02	IU/ml
★ 抗甲状腺微粒体抗体	TM-Ab	5.51	<10	IU/ml
★ 促甲状腺素受体抗体	TR-AB	0.81	<1.71	IU/L

小结

碱性磷酸酶降低

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：张景丽

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律；完全性右束支阻滞	

初步意见

完全性右束支阻滞

腹部彩超




检查者：李英

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，表面光滑，包膜完整，肝内回声分布均匀，血管纹理走行清晰，门静脉正常。肝右叶可见一个偏强回声结节，大小约14×13mm，边界清楚，CDFI：结节内未见明显血流信号。	
胆	胆囊形态大小正常，囊壁光整，胆汁充盈良好，胆总管内径正常	
胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张，CDFI：血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	双肾形态大小位置正常，包膜完整，右肾可见无回声区，大小约9×6mm，左肾可见多个无回声区，最大约15×11mm。CDFI：血流显示正常	

初步意见

1.肝血管瘤可能
2.双肾囊肿可能（左侧多发）

ACF5FD6DEF43DF0BEF6F3C8F3A80CF9B294668FEFEA28C3D67A5211D7AF3EF82 ACF5FD6DEF43DF0BEF6F3C8F3A80CF9B294668FEFEA28C3D67A5211D7AF3EF82



* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

子宫、附件彩超

检查者：郭欣

检查项目	检查所见	单位
子宫	子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范	

ACF5FD6DEF43DF0BEF6F3C8F3A80CF9B294668FEFEA28C3D67A5211D7AF3EF82 ACF5FD6DEF43DF0BEF6F3C8F3A80CF9B294668FEFEA28C3D67A5211D7AF3EF82

北京爱康国宾西三旗门诊部

全国统一报告解读专线：400-081-8899

注：★ 自费增项



围，宫颈厚度正常

附件

右侧附件区可见无回声，大小约22×19mm，左侧附件区未见明显异常

初步意见

右侧卵巢囊肿



* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

乳腺彩超

检查者：李英

检查项目	检查所见	单位
乳腺	双侧乳腺腺体致密内部回声增强，结构紊乱，分布不均腺管未见明显扩张，右侧乳腺可见多个边界清晰的无回声结节，最大位于内上象限，大小约5×3mm，左侧乳腺外上象限可见边界清晰的无回声结节，大小约4×2mm。CDFI:血流未见明显异常，双侧腋下未见明显肿大淋巴结。	

初步意见

1.乳腺增生（建议定期复查）
2.双侧乳腺囊性结节（右侧多发，建议定期复查）




* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

甲状腺彩超

检查者: 李英

检查项目	检查所见	单位
甲状腺	甲状腺大小形态正常, 甲状腺双侧叶见边界尚清晰的多个低回声结节, 左侧最大约6×4mm, 右侧最大约10×5mm。CDFI: 周边可见血流信号	

初步意见 双侧甲状腺结节 (多发, 建议定期复查)



* 温馨提示: 本报告所含图片, 均是为了配合文字表述所配发, 不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

放射科

检查者: 王丽然 审核者: 董强

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰, 肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整, 肋膈角锐利。	

初步意见 未见明显异常

终审医生: 石荣华

iKang 爱康




下载爱康体检宝APP

想随时随地看报告?
想对比您的历史体检报告?
爱康体检宝APP, 检前检后全管理

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



操作者：张

序号	症状描述	建议
1	(28)龅	建议充填治疗，必要时需拍片辅助明确诊断。如果是无对颌的正位智齿龅坏，也可考虑拔除。

2

(38,48)智齿萌出受阻

建议拔除

巴氏刷牙法

1



刷毛与牙齿、牙龈成45°角，略加力使部分刷毛进入牙沟与间隙

2



轻柔水平颤动，向牙冠旋转，在2到3颗牙齿间左右震颤8~10次

3



刷毛垂直接触龈缘或进入龈沟，在前牙做上下提拉颤动

4



刷咬合面时把刷毛指向咬合面，稍用力做前后来回刷

5



每次刷2-3颗牙，轻柔水平颤动、按摩8~10次

6



由内而外轻刷舌头表面，让口气保持清新

清洁建议



使用牙线、牙间刷



使用含氟牙膏



舌苔刷清理舌头



使用漱口水漱口



喷口气清新剂

齿科咨询热线

4006-190-920



爱康齿科官方微信




看齿科 来爱康

5.历年主要异常指标对比

体重指数

2014年到2026年对比图



年份	测量结果	单位	参考区间
2014/11	18.45		18.5-24
2015/11	18.7		18.5-23.99
2016/10	19.6		18.5-23.99
2018/10	20.7		18.00-24.00
2023/07	19.3		18.5-23.99
2025/08	18.9		18.5-23.99
2026/08	18.5		18.5-23.99



下载爱康体检宝APP
查看彩色报告

6.深度咨询或风险评估产品建议

甘预-肝癌早期筛查

肝癌，一般是指原发性肝细胞癌，约占全部原发性肝癌的85-90%，是最常见的恶性肿瘤之一[1]。2020年世界卫生组织最新数据显示，我国肝癌年新发病例约占全球的45.3%，肝癌年死亡病例约占全球的47.1% [2]。

肝癌高居我国癌症死因的第二位，其发生和发展一般会经历一个漫长的过程。由于早期肝癌无明显痛感，早期发现将有助于肝癌的诊断和治疗。

甘预——肝癌全维度超早期筛查管理方案，能够在无症状期发现3cm以下的肿瘤，为有需求的患者提供覆盖全国多家名牌医院的诊疗绿色通道，使患者能够获得及早诊治机会，5年生存率有效提升至80%以上。

甘预所采用的无创液态活检技术，我国首个获得美国FDA“突破性医疗器械”认定的肝癌早期筛查产品，能够比常见的影像学及血清标志物检测更早期发现癌变，该技术获得了权威指南和共识的推荐[3,4]，并建议您每隔6-12个月进行1次检查。（注：对于罹患肝癌的患者，建议前往医院就诊）

参考文献：

- [1] Grandhi MS, Kim AK, Ronnekleiv-Kelly SM, et al. Hepatocellular carcinoma: From diagnosis to treatment. Surg Oncol. 2016;25(2):74-85.
- [2] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.
- [3] 原发性肝癌诊疗规范（2019年版）[J].传染病信息,2020,33(06):481-500.
- [4] 陆荫英,赵海涛,程家敏,姬峻芳.肝胆肿瘤分子诊断临床应用专家共识[J].临床肝胆病杂志,2020,36(07):1482-1488.



甘预

爱康关爱您的肝脏健康

扫描右侧二维码购买



扫码购买



下载爱康体检APP
查看彩色报告

Mosaic 胶原蛋白支持

Mosaic由康奈尔医学院（Weill Cornell Medical College）皮肤系主任Richard Granstein教授指导研制而成。

随着年龄的增长，皮肤会失去弹性和水分，更容易受到环境和内部压力的影响。要保持年轻肌肤，需要从内部推动变化。

Mosaic由类胡萝卜素、生育酚（维生素E）和鼠尾草酸组成的配方，可协同提供强大的抗氧化功效，改善和保护皮肤。

经临床证明，Mosaic可从内层对抗皮肤衰老，补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质[1]。

- 1) 3周，皮肤水分含量有明显的增加[2]。
- 2) 4周，皮肤中的类胡萝卜素水平将增加15%，支持胶原蛋白[3,4]。
- 3) 12周，皮肤光滑度、弹性、干燥度等有改善[2,5]。
- 4) 16周，皮肤中的类胡萝卜素水平将提高31%，从而改善肤色、亮度、光泽，并减少细纹和皱纹的出现[5]。

产品为美国原装进口，保税仓直邮发货。

参考文献：

[1]doi:10.4172/2167-065X.1000195

[2]doi:186.1475/2891-13-70

[3]doi:3390.26071931

[4]doi:10.4172/2167-065X.1000195

[5]doi:3390.13072220/nu

注：*个人结果可能有所不同。此时间表可能与典型用户的体验不同，并不代表或保证每个用户都会获得相同或相似的结果。



Mosaic 胶原蛋白支持

可补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质
扫描右侧小程序码购买



扫码查看

7.医学名词科普知识


医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

■ 什么是卵巢囊肿？



卵巢肿瘤是常见的妇科肿瘤，其中最为常见的是卵巢囊肿。良性卵巢囊肿的常见并发症为蒂扭转、破裂、感染和恶变。

■ 什么是血管瘤？




一种瘤状的先天性血管畸形。常见于婴儿及儿童。好发于颜面、躯干。单发或多发，亦可呈弥漫性生长。切面有大小不等的管腔，含血液，质软，多在生后不久即出现，与身体的生长相平行，儿童期生长较快，以后逐渐变慢缩小，甚至消失，但也有长期存在或持久生长者。表现为红色斑痣、杨梅状、海绵状和混合型等。偶可引起出血和所在器官的功能障碍。

■ 什么是甲状腺结节？



甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄>70岁；④结节增长迅速且直径>2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质地硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

■ 什么是乳腺增生？



乳腺增生又名乳腺结构不良，可分为囊性小叶增生、腺性小叶增生和纤维性小叶增生。乳腺增生是生理过程中，或在某些激素分泌失调情况下，表现出乳腺组织成分的大小和数量构呈比例及形态上的周期性变化，是一组临床综合征。乳腺增生并非炎症性或肿瘤性疾病，甚至其大多数情况下都是代表乳腺组织对激素的生理性反应，而不是真正的疾病。仅有少部分可能属于疾病，其中极少数出现非典型增生，可再发展成原位癌，甚至最终演变为浸润性乳腺癌。注意，这个过程并非线性进展，随时可以在浸润性乳腺癌之前的任一环节停下来，所以不能把乳腺增生视作癌前期病变。乳腺增生可发生于青春期至绝经期的任何年龄，以20~40岁多见，35~40岁为高峰。常为双侧，亦可单侧发病，病变呈多发、弥漫性分布。多无明显症状；少数可有疼痛感或胀痛，疼痛与月经周期有关，经前明显，经后减轻；部分患者疼痛与情绪有关。发病初期可无明显体征，到一定阶段表现出乳腺组织增厚感或结节感，可有压痛。腋下淋巴结不肿大。



下载爱康体检APP
查看彩色报告

■ 什么是阻生齿？



阻生齿是指由于各种原因骨或软组织的障碍，使牙齿只能部分萌出或完全不能萌出，且以后也不能萌出的牙。最常见的为第三恒磨牙，其次为上颌尖牙。阻生齿的拔除较一般牙齿拔除困难。

■ 什么是龋齿？




称龋病、龋牙。俗称虫牙、蛀牙。是口腔科常见病、多发病之一。是由多种因素复合作用下，牙齿硬组织破坏的一种疾病。临床表现为牙齿硬组织的变色、变软和实质性缺损，形成龋洞。早期无自觉症状，后期有冷、热、酸、甜刺激痛。病变继续发展可引起牙髓炎、根尖周炎、颌骨感染等。根据龋坏程度分为浅龋、中龋和深龋。好发于牙面窝沟、邻接面、牙颈部和不易刷洗干净的部位。

体检号: 3222608080099

客户信息: 吴玲/女/39

HR: 71bpm
PR: 124ms
RR: 839ms
QRS: 144ms
P/QRS/T: 0° / 71° / 51°
QT/QTc: 401/437ms
SV1/RV5: 0.3/1.18mV
SV1+RV5: 1.48mV

心电图诊断:
窦性心律
完全性右束支阻滞



(本报告仅供临床医生结合临床参考, 不作诊断证明之用)

检查者:

诊断医生: 张景丽

检查时间: 2026-08-08 08:35:26