

Disciplina: Supervised Machine Learning Análise de Regressão Sim e Múltipla III

Pedro Zavitoski Malavolta

Não entendi o resultado da função confint. Ela está com intervalo de significância de 5%, mas apresenta 2,5% e 97,5%. Não deveria ser 2,5%, 95% e 2,5%?

Resposta: Pedro, te encaminho dois links com uma discussão bem interessante sobre a sua questão:

https://bookdown.org/logan_kelly/r_practice/p09.html

<https://mgimond.github.io/Stats-in-R/CI.html>

Jeferson Galvão Trindade

Moderadores, ref. exemplo de empresas, o quesito "disclosure", ainda que seja "numérica e contínua", por se tratar de uma nota (atribuição), e não uma medida, deveria ainda assim ser tratada como variável quantitativa? Ou deveria ser convertida para qualitativa primeiro?

Resposta: Jeferson, variáveis qualitativas, isto é, variáveis que expressam diferenciais semânticos e não grandezas numéricas, devem ser tratadas como qualitativas.

Marcos Rocha Rodriguez Alves

A padronização pelo Z-score não precisa ser feita antes de rodar o teste de Box-Cox? A diferença de escalas não afeta o resultado?

Resposta: Marcos, não necessariamente. Te encaminho um link com uma discussão bem interessante sobre a sua questão:

<https://statisticsbyjim.com/regression/standardize-variables-regression/>

Gustavo Meireles Lessa

Eu poderia ter realizado os mesmos procedimentos com as variáveis padronizadas com o Z-Score? Tem benefícios, malefícios, ou é a mesma coisa?

Resposta: Gustavo, te encaminho um link com uma discussão bem interessante sobre a sua questão:

<https://statisticsbyjim.com/regression/standardize-variables-regression/>

Talvez possa te ajudar no entendimento. Caso persistam dúvidas, basta nos acionar pelo e-mail da monitoria monitordsa@pecege.com que iremos prontamente lhe auxiliar.