



EBADEP-A

Escala Baptista de Depressão
Versão Adulto

Makilim Nunes Baptista

Formato Completo

DADOS DO AVALIADO

NOME

Avaliado

DATA DA APLICAÇÃO

06/01/2026

CPF

SEXO

Feminino

IDADE

35

ESCOLARIDADE

Ensino Superior Completo

ESTADO DA APLICAÇÃO

Paraná

E-MAIL

avaliado@email.com.br

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Iris - CRP: 1234

TABELA NORMATIVA

Percentis - 2012 - Tabela Geral



Introdução

Os transtornos depressivos vêm sendo considerados altamente frequentes na atualidade. No entanto, os sintomas depressivos podem ser observados nas pessoas independentemente da presença de transtornos mentais (de humor ou outros quaisquer). Assim, com a visão dimensional dos transtornos mentais, em todos os seres humanos pode haver variação em termos de sintomas depressivos como traço latente, podendo o indivíduo não expressar sintoma algum ou mesmo ter todos os sintomas presentes (frequência) em uma medida específica, variando, também, em termos de intensidade e duração.

Os sintomas clinicamente significativos de depressão podem estar relacionados a diversos fatores de risco e proteção, bem como ocasionar sofrimento importante nas pessoas, interferência nas relações sociais e alterações cognitivas, afetivas e comportamentais, podendo até culminar e/ou estar associados ao comportamento suicida. Ainda, os sintomas de depressão podem ter consequências negativas nas atividades e relações do cotidiano, tais como ocupacionais, familiares, de lazer, entre outras.

Diante da importância da avaliação da frequência, da intensidade e da duração dos sintomas depressivos, a Escala Baptista de Depressão Versão Adulto (EBADEP-A) oferece contribuição fundamental para a avaliação dos sintomas de depressão, partindo da construção de itens baseados nos principais manuais psiquiátricos e nas teorias psicológicas mais relevantes e cientificamente comprovadas (cognitiva e comportamental). O objetivo da EBADEP-A é situar o indivíduo em categorias específicas de sintomas de depressão, a saber: sem sintomas ou sintomas mínimos, sintomas depressivos leves, sintomas depressivos moderados e sintomas depressivos severos, em graus crescentes de sintomas, comparados à amostra normativa expressiva.

Definição

A Escala Baptista de Depressão Versão Adulto (EBADEP-A) avalia a presença de sintomatologia depressiva nos indivíduos, independentemente de diagnóstico prévio, sendo uma ferramenta útil no rastreamento e no auxílio de detecção de transtornos de humor e/ou sintomas clinicamente significativos de depressão.

Utilização do relatório

Este documento não se constitui em um laudo técnico, tampouco tem por finalidade traçar o perfil psicológico ou comportamental da pessoa avaliada. Expressa os dados qualitativos ou quantitativos traduzidos em medidas e conceitos objetivos que não esgotam a necessidade de uma maior compreensão do significado do construto avaliado, descrito no manual do instrumento.



Resultados

Pontos	Percentil	Classificação
82	91	Sintomatologia Depressiva Moderada

Percentis - 2012 - Tabela Geral

Interpretação dos resultados

Avaliado foi submetido(a) à EBADEP-A e obteve uma pontuação bruta total de 82 ponto(s), que corresponde ao percentil 91. Esse resultado sugere que Avaliado se encontra na categoria *sintomas depressivos moderados*. Nessa categoria, as pessoas já podem apresentar sofrimento psicológico significativo e/ou limitações importantes para o desempenho de atividades laborais e/ou escolares, entre outras. A chance de haver um possível diagnóstico de transtorno de humor nesta faixa é relativamente alta, principalmente se houver a presença dos dois sintomas fundamentais para um possível diagnóstico de transtorno de humor (humor deprimido e perda de interesse ou prazer – anedonia). É importante que o clínico avalie a presença de alguns dos sintomas fundamentais para um possível diagnóstico (em uma etapa subsequente, com a presença de uma entrevista ou avaliação aprofundada), tais como os sintomas referentes ao humor deprimido (p. ex., 1, 2, 6 e 18) e à anedonia (p. ex., 5 e 17). É importante, também, avaliar a presença de possíveis sintomas de desesperança e/ou ideação suicida (p. ex., 10, 12, 28, 29 e 33), já que esses sintomas, com a presença de diversos outros, podem aumentar as chances de tentativa de suicídio, principalmente se já houver histórico de tentativas anteriores.



Legenda

Considerando a posição dos círculos na folha de respostas, da esquerda para a direita:

- (1) para o primeiro círculo
- (2) para o segundo círculo
- (3) para o terceiro círculo
- (4) para o quarto círculo
- (99) sem resposta

#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R	#	R
001	4	002	3	003	4	004	4	005	3	006	3	007	3	008	2	009	2	010	3
011	4	012	3	013	2	014	3	015	4	016	3	017	2	018	1	019	1	020	1
021	2	022	3	023	3	024	2	025	1	026	2	027	3	028	3	029	3	030	4
031	3	032	3	033	2	034	3	035	3	036	2	037	2	038	2	039	3	040	3
041	4	042	4	043	4	044	4	045	4										

