

A
1D stepping stones (25 demes, $M = 811$, $N = 200$ total)
$\phi = 0.2$ (5/25 demes)
$n = 40$ per deme
$\langle \hat{u}_{0.2}, u_1 \rangle^2 = 0.91$
$\phi = 0.4$ (10/25 demes)
$n = 20$ per deme
$\langle \hat{u}_{0.4}, u_1 \rangle^2 = 0.89$
$\phi = 0.6$ (15/25 demes)
$n = 13$ per deme
$\langle \hat{u}_{0.6}, u_1 \rangle^2 = 0.90$
-0.1
0.0
0.1
PC1
B
2D stepping stones (9×9 demes, $M = 4$, $N = 600$ total)
$\phi = 0.2$ (16/81 demes)
$n = 37$ per deme
$\langle \hat{u}_{0.2}, u_1 \rangle^2 = 0.89$
$\phi = 0.4$ (32/81 demes)
$n = 18$ per deme
$\langle \hat{u}_{0.4}, u_1 \rangle^2 = 0.95$
$\phi = 0.6$ (49/81 demes)
$n = 12$ per deme
$\langle \hat{u}_{0.6}, u_1 \rangle^2 = 0.99$
PC2
0.05
0.00
-0.05
PC1