

PREVENÇÃO DE
LESÃO POR
PRESSÃO



O QUE É LESÃO POR PRESSÃO



Lesão na pele e no tecido subjacente resultante da pressão prolongada sobre a pele.



O que causa lesão por pressão?



Como o próprio nome diz, ela é causada por uma pressão sobre uma superfície em conjunto com o cisalhamento

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO

Mudança de decúbito:

O paciente deve ser reposicionado no mínimo a cada duas horas para redistribuir as áreas de pressão.



Hidratação da pele:

A pele deve ser hidratada com movimentos circulares e suaves, após o banho e em áreas ressecadas.



Controle da umidade: Deve-se usar absorventes, fraldas e dispositivos urinários para minimizar a exposição da pele à umidade.



Colchão ideal:

O uso de colchão pneumático é recomendado.



Cabeceira do leito elevada:


A cabeceira do leito deve ser mantida elevada a 30 graus.



Coxins de conforto: O uso de coxins de conforto é recomendado



PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO



- Reposicionar o paciente: Redistribuir a pressão sobre a pele é a principal preocupação, por isso, o paciente deve ser reposicionado a cada duas horas.

A ENFERMAGEM TAMBÉM DEVE:



- *Descrever o estágio da LPP no prontuário do paciente.*
- *Verificar se o paciente possui a avaliação do risco de LPP na pulseira de risco.*
- *Verificar se as práticas de prevenção estão sendo realizadas conforme o protocolo da instituição.*

TURMA I4M PROF:
GLEICIMARA



- Alunos:
- Aline Castelo
- Arianne Sousa
- Charles Paiva
- Gabriela Ferreira
- Mayra Ferreira