

ANATOMİ

Sınav Öncesi Tam Konu Anlatımı ve Sorular

Bölüm	Soru Sayısı	Tekrar Durumu
Nöroanatomi	8-10	İlk 5-6 soru birebir kopya — garantili puan
Karın (Abdomen)	6-8	Yüksek tekrar — oesophagus, mesenterica, mide
Toraks	4-5	Orta tekrar — mediastinum, bronşiyal ağaç
Pelvis & Perine	3-4	Orta tekrar — mesane, üreme organları
Baş & Boyun	3-4	Orta tekrar — tiroit, paranasal sinüsler
Böbrek & Üriner	2-3	Düşük tekrar

BÖLÜM 1: NÖROANATOMİ

1.1 Ventriküler Sistem

Lateral ventriküller (I. ve II.) → Foramen interventriculare (Monro deliği) → III. ventrikül → Aqueductus mesencephali (Sylvius) → IV. ventrikül → Foramen Magendie (mediana) ve Foramen Luschkae (lateralis) → Subaraknoid aralık

SINAV SORUSU: Lateral ventriküller ile 3. ventrikülleri birbirine bağlayan açıklık hangisidir? → Foramen interventriculare. 3 yılda birebir çıktı.

Beyin-omurilik sıvısı (BOS) nerede üretilir: Koroid pleksus (tüm ventriküllerde)

Nerede emilir: Araknoid villiler (pakyon granülasyonları) → venöz sinüsler

1.2 Beyin Lobları ve Sulkuslar

Sulcus centralis (Rolando yarığı):

Önünde: Gyrus precentralis — primer motor korteks (Brodmann 4)

Arkasında: Gyrus postcentralis — primer somatosensory korteks (Brodmann 1,2,3)

Lobus frontalis ile Lobus parietalis'i ayırır.

SINAV SORUSU: Sulcus centralis hangi lobları ayırır? → Lobus frontalis - Lobus parietalis. 3 yılda birebir çıktı.

Sulcus lateralis (Sylvius): Frontalis + Parietalis ile Temporalis'i ayırır.

Sulcus parietooccipitalis: Parietalis ile Occipitalis'i ayırır.

1.3 Önemli Korteks Alanları

Alan	Brodmann	Gyrus	İşlev
Primer motor korteks	4	Gyrus precentralis	İstemli hareket
Premotor korteks	6	Gyrus frontalis sup/med	Motor planlama, ardışık hareketler
Primer somatosensory	1,2,3	Gyrus postcentralis	Dokunma, basınç, propriosepsiyon
Primer görme	17	Gyrus calcarinus	Görsel bilgi işleme
Primer işitme	41	Gyrus temporalis transversus (Heschl)	İşitsel bilgi işleme
Wernicke alanı	22	Gyrus temporalis superior	Konuşmayı anlama
Broca alanı	44,45	Gyrus frontalis inferior	Konuşma üretimi
Prefrontal korteks	9,10,11,12	Lobus frontalis önü	Planlama, karar, ahlak, kişilik

SINAV SORUSU: Primer işitme sahası → Gyrus temporalis transversus, Brodmann 41. saha. 2 yılda birebir çıktı.

1.4 Medulla Spinalis — Columnalar ve Nükleuslar

Columna anterior (ön boynuz): Motor nükleus — alfa ve gama motor nöronlar burada.

Columna posterior (arka boynuz): Duysal nükleus. Nükleusları:

- Nuc. posteromarginalis (I. Rexed tabaka): ağrı ve ısı
- Nuc. gelatinosus (II. tabaka): ağrı modülasyonu
- Nuc. proprius (III-IV. tabaka): genel duysal
- Nuc. intermediomedialis: genel visseral

Columna lateralis: Sempatik pregangliyonik — Nuc. intermediolateralis (C8-L2)

SINAV SORUSU: Columna posterior'a ait bir nükleus hangisidir? → Nuc. posteromarginalis. 3 yılda birebir çıktı. Nuc. intermediolateralis lateral kolumda — yanıltıcı seçenek!

1.5 Duysal Yollar

Yol	Taşıdığı Duygu	1. Nöron	2. Nöron	3. Nöron
Tractus spinothalamicus lateralis	Ağrı, ısı	Spinal ganglion	Arka boynuz (çaprazlaşır)	Talamus
Tractus spinothalamicus anterior	İtme, dokunma, basınç	Spinal ganglion	Arka boynuz (çaprazlaşır)	Talamus
Fasciculus gracilis (alt ext.)	Bilinçli propriosepsiyon, incinme	Spinal ganglion	Nucleus gracilis (çaprazlaşır)	Talamus
Fasciculus cuneatus (üst ext.)	Bilinçli propriosepsiyon, incinme	Spinal ganglion	Nucleus cuneatus (çaprazlaşır)	Talamus
Tr. spinocerebellaris posterior	Bilinçsiz propriosepsiyon (ağrı)	Spinal ganglion	Clarke nükleusu (çaprazlaşır)	Serebellum
Tr. spinocerebellaris anterior	Bilinçsiz propriosepsiyon	Spinal ganglion	Arka boynuz (çaprazlaşır)	Serebellum

SINAV SORUSU: Gövde ve alt ekstremiteye hareket yaptıran, eklem ve kasların bilinçsiz proprioseptif duyusunu taşıyan yol → Tractus spinocerebellaris posterior. 3 yılda birebir çıktı.

1.6 Trigeminal Sistem — Yüz ve Baş Ağrı Duyusu

N. trigeminus (5. kafa çifti) yüz bölgesinin duyusunu taşır.

1. Nöron: Ganglion trigemini (semilunare = Gasser ganglionu) — pons yanında, orta kranial fossada.
2. Nöron: Nucleus spinalis nervi trigeminalis (ağrı-ısı) veya Nucleus principalis (ince dokunma).
3. Nöron: Talamus

SINAV SORUSU: Yüz ve baş bölgesinin ağrı-ısı duyusunu taşıyan yolun BİRİNCİ nöronu hangisidir? → Ganglion trigemini (semilunare). 3 yılda birebir çıktı.

Trigeminal 3 dalı:

- V1 (oftalmik): alın, burun üstü, üst göz kapağı
V2 (maksiller): yanaklar, üst dudak, üst dişler
V3 (mandibüler): çene, alt dudak, alt dişler, dil 2/3 ön

1.7 Kafa Çiftleri — Önemli Noktalar

No	İsim	Çıkış Yeri	İşlev	Not
I	N. olfactorius	Telencephalon	Koku	Beyinle direkt bağlantı
II	N. opticus	Diencephalon	Görme	Gerçek sinir değil, beyin uzantısı
III	N. oculomotorius	Mesencephalon önden	Göz hareketleri (4 kas), ptöz, pupil dilatasyonu	Edinger-Westphal çekirdeği
IV	N. trochlearis	Mesencephalon ARKADAN	M. obliquus superior	Tek arkadan çıkan kafa çifti!
V	N. trigeminus	Pons	Yüz duyusu, çiğneme kasları	Ganglion semilunare
VI	N. abducens	Pons-medulla sınırı	M. rectus lateralis	En uzun intrakranial seyir
VII	N. facialis	Pons-medulla sınırı	Yüz mimik kasları, tat (2/3 ön)	Ganglion geniculi
VIII	N. vestibulocochlearis	Pons-medulla sınırı	İşitme, denge	-
IX	N. glossopharyngeus	Medulla oblongata	Yutma, tat (1/3 arka), tükürük	Ganglion jugulare/petrosum
X	N. vagus	Medulla oblongata	Parasempatik, yutma, ses	En geniş dağılım
XI	N. accessorius	Medulla + servikal MS	M. SCM, M. trapezius	-
XII	N. hypoglossus	Medulla oblongata	Dil kasları	-

SINAV SORUSU: Beyin sapında arkadan başlayan kafa çiftini işaretleyiniz → N. trochlearis (4.). Tek arkadan çıkan kafa siniri. 2 yılda birebir çıktı.

1.8 Wallenberg Sendromu

Lateral medulla oblongata infarktıdır. A. cerebellaris posterior inferior (PICA) tıkanmasına bağlı gelişir.

Klinik bulgular:

- İpsilateral yüz: ağrı-ısı duyusu kaybı (N. trigeminus çekirdeği)
- Kontralateral vücut: ağrı-ısı duyusu kaybı (tractus spinothalamicus)
- İpsilateral Horner sendromu: pitoz, miyozis, anhidroz
- Yutma güçlüğü, ses kısıklığı (N. vagus, N. glossopharyngeus)
- Serebellar bulgu: ipsilateral ataksi (serebellar yollar)
- Nistagmus, baş dönmesi (vestibüler çekirdekler)

SINAV SORUSU: Wallenberg Sendromu hangi arterin lezyonuna bağlı gelişir? → A. cerebellaris posterior inferior (PICA). 3 yılda birebir çıktı.

1.9 Otonom Gangliyonlar

Parasempatik baş gangliyonları (4 tane):

- Ganglion ciliare: göz (pupil daralması, akomodasyon)
- Ganglion pterygopalatinum: lakrimal bez, nazal bezler
- Ganglion submandibulare: submandibüler ve sublingual tükürük bezi
- Ganglion oticum: parotis bezi

Ganglion semilunare (= trigemini = Gasser): SOMATİK DUYSAL — otonom değil!

Ganglion aorticorenale, Ganglion coeliacum, Plexus mesentericus: sempatik gangliyonlar.

SINAV SORUSU: Otonom ganglion OLMAYAN yapıyı işaretleyiniz → Ganglion semilunare. 4 yılda tekrar etti — en çok tekrar eden anatomi sorusu!

1.10 Diencephalon

Diencephalon bölümleri: Talamus, Hipotalamus, Epitalamus (pineal bez, habenular çekirdekler), Subtalamus.

Diencephalon'da BULUNAN yapılar:

Corpus geniculatum mediale (işitme), Corpus geniculatum laterale (görme), Chiasma opticum, İfundibulum, Stria medullaris, Nucleus arcuatus.

Diencephalon'da BULUNMAYAN yapılar:

Filum terminale (medulla spinalise ait), Lamina terminalis (telencephalon), Fossa rhomboidea (rhombencephalon — IV. ventrikülün tabanı).

SINAV SORUSU: Diencephalon'da bulunmayan yapı → Filum terminale. 2 yılda birebir çıktı.

NÖROANATOMİ — SORU BANKASI

Soru 1

Lateral ventriküller (ventriculus lateralis) ile 3. ventriküllü (ventriculus tertius) birbirine bağlayan açıklık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Foramen interventriculare
- B) Apertura mediana (Magendie)
- C) Apertura lateralis (Luschkae)
- D) Villi arachnoidale
- E) Aqueductus mesencephali

Cevap: A — Foramen interventriculare (Monro deliği)

Lateral ventriküller ile 3. ventrikülü Foramen interventriculare bağlar. Aqueductus mesencephali ise 3. ile 4. ventriküllü bağlar. 3 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Sulcus centralis hangi gyrusları ve lobları birbirinden ayırır?

- A) Lobus frontalis - Lobus temporalis
- B) Lobus temporalis - Lobus occipitalis
- C) Lobus frontalis - Lobus occipitalis
- D) Lobus temporalis - Lobus parietalis
- E) Lobus frontalis - Lobus parietalis

Cevap: E — Lobus frontalis - Lobus parietalis

Sulcus centralis önünde motor korteks (gyrus precentralis), arkasında somatosensory korteks (gyrus postcentralis) bulunur. Frontali parietalden ayırır. 3 yılda birebir çıktı.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi columna posterior'a ait bir nükleus'tur?

- A) Nuc. medialis
- B) Nuc. lateralis
- C) Nuc. intermediolateralis
- D) Nuc. posteromarginalis
- E) Nuc. intermediomedialis

Cevap: D — Nuc. posteromarginalis

Columna posterior nükleusları: posteromarginalis, gelatinosus, proprius, intermediomedialis. Nuc. intermediolateralis LATERAL kolumda — sempatik pregangliyonik nöronlar burada. Yanıltıcı seçenek! 3 yılda birebir çıktı.

Soru 4

Yüz ve baş bölgesinin ağrı-ısı duyusunu taşıyan yolun birinci nöronu hangisidir?

- A) Ganglion spinale
- B) Nucleus spinalis nervi trigeminale
- C) Ganglion trigemini (semilunare)
- D) Nucleus ventralis posteromedialis
- E) Nucleus intralaminaris

Cevap: C — Ganglion trigemini (semilunare)

Trigeminal sinirin duysal gangliyon'u = Gasser ganglionu = Ganglion trigemini = Ganglion semilunare. Hepsi aynı yer. 1. nöron burada. 3 yılda birebir çıktı.

Soru 5

Gövde ve alt ekstremiteye hareket yaptıran, eklem ve kasların bilinçsiz proprioseptif duyusunu taşıyan yol hangisidir?

- A) Fasciculus gracilis
- B) Tractus spinocerebellaris posterior
- C) Tractus cuneocerebellaris
- D) Tractus trigeminothalamicus posterior
- E) Tractus trigeminocerebellaris

Cevap: B — Tractus spinocerebellaris posterior

Bilinçsiz proprioepsiyon alt ekstremitte → spinocerebellaris POSTERIOR. Çaprazlaşmaz, ipsilateral. Clarke nükleusundan başlar. 3 yılda birebir çıktı.

Soru 6

Beyin sapında arkadan başlayan kafa çiftini işaretleyiniz.

- A) N. oculomotorius
- B) N. opticus
- C) N. trochlearis
- D) N. vagus
- E) N. abducens

Cevap: C — N. trochlearis (4. kafa çifti)

N. trochlearis mesencephalonun arka (dorsal) yüzünden çıkan TEK kafa siniridir. Diğer tüm kafa sinirleri önden (ventral) çıkar. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 7

Primer işitme sahası için hangisi doğrudur?

- A) Gyrus temporalis medius (Brodmann 22. saha)
- B) Gyrus temporalis transversus (Brodmann 41. saha)
- C) Gyrus frontalis superior (Brodmann 25. saha)
- D) Gyrus cinguli (Brodmann 49. saha)
- E) Gyrus precentralis (Brodmann 4. saha)

Cevap: B — Gyrus temporalis transversus, Brodmann 41

Primer işitme korteksi = Heschl girusu = Brodmann 41 = Gyrus temporalis transversus. Superior temporal girusun içinde yer alır. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 8

Wallenberg Sendromu hangi arterin lezyonuna bağlı gelişir?

- A) A. cerebellaris posterior inferior
- B) A. choroidea anterior
- C) A. cerebri anterior
- D) A. cerebri media
- E) A. communicans anterior

Cevap: A — A. cerebellaris posterior inferior (PICA)

Wallenberg = lateral medulla sendromu. PICA tıkanması. İpsilateral yüz + kontralateral vücut ağrı-ısı kaybı, ipsilateral Horner, serebellar ataksi. 3 yılda birebir çıktı.

Soru 9

Otonom ganglion OLMAYAN yapıyı işaretleyiniz.

- A) Ganglion ciliare
- B) Ganglion oticum
- C) Ganglion semilunare
- D) Ganglion pterygopalatina
- E) Ganglion aorticorenale

Cevap: C — Ganglion semilunare

Ganglion semilunare = Gasser ganglionu = Ganglion trigemini. Bu somatik DUYUSAL ganglyon, otonom değil. Diğerleri hepsi otonom (parasempatik veya sempatik). 4 yılda tekrar etti — en çok tekrar eden soru!

Soru 10

Diencephalon'da bulunmayan yapıyı işaretleyiniz.

- A) Corpus geniculatum mediale
- B) Infundibulum
- C) Chiasma opticum
- D) Stria medullaris
- E) Filum terminale

Cevap: E — Filum terminale

Filum terminale medulla spinalise ait bir yapıdır (conus medullaris'ten aşağı uzar). Diğer seçeneklerin hepsi diencephalon'da bulunur. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 11

Sağ atriumda yer almayan yapı hangisidir?

- A) Crista terminalis
- B) Fossa ovalis
- C) Ostium sinus coronarii
- D) M. pectinati
- E) M. papillaris

Cevap: E — M. papillaris

Musculi papillares ventriküllerde bulunur, atriumlarda değil. Sağ atriumda: crista terminalis, fossa ovalis, ostium sinus coronarii, m. pectinati, auricula dextra. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 12

Ekstrapiramidal sisteme ait efferent yollardandır?

- A) Ansa lenticularis
- B) Fasciculus arcuatus
- C) Fasciculus mamillothalamicus
- D) Tractus tegmentalis anterior
- E) Tractus spinoreticularis

Cevap: A — Ansa lenticularis

Ansa lenticularis globus pallidus'tan çıkar, talamusa gider — bazal ganglia devresidir, ekstrapiramidal. Fasciculus arcuatus Broca-Wernicke bağlantısı. Mamillothalamicus limbik sistem.

Soru 13

Hangisi limbik loba ait yapılardandır?

- A) Nuc. emboliformis
- B) Colliculus superior
- C) Nuc. arcuatus
- D) Gyrus occipitalis
- E) Gyrus dentatus

Cevap: E — Gyrus dentatus

*Limbik lob: gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, gyrus dentatus, hippocampus, amigdala.
Gyrus dentatus hipokampüsün bir parçası → limbik sistem. Nuc. emboliformis serebellum.*

BÖLÜM 2: KARIN (ABDOMEN) ANATOMİSİ

2.1 Oesophagus

Genel bilgiler:

- Pharynx'ten mideye kadar uzanan 23-25 cm uzunluğunda musküler bir kanaldır.
- Diaphragma'daki hiatus oesophageus yoluyla karın boşluğuna çıkar (11. th. vertebra karşısında) → midenin ostium cardiacum'unda sonlanır.
- Pars cervicalis, pars thoracalis, pars abdominalis olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

Pars cervicalis komşulukları:

Önünde: Trachea (ve pars thoracalis'te de devam eder)
Arkasında: Columna vertebralis
Yanında: A. carotis communis

Pars abdominalis: Karaciğer lobus sinistra'da impressio (iz) bırakır — LOBUS DEXTRA DEĞİL!

SINAV SORUSU: Oesophagus'un pars abdominalis'i karaciğer lobus dextra'da bir takım izler bırakır → YANLIŞ. Lobus SINISTRA'da bırakır. 2 yılda birebir çıktı.

2.2 Mide Arka Yüzü Komşulukları

Midenin arka yüzünde (bursa omentalis aracılığıyla) şunlar bulunur:

- Diaphragma
- Splen (Dalak)
- Gl. suprarenalis sinistra
- Pankreas
- Sol böbrek üst kısmı
- Mesocolon transversum

Mide arka yüzünde BULUNMAYAN:

Flexura coli dextra — bu karaciğerin alt yüzüne komşu, midenin arka yüzüne değil.

SINAV SORUSU: Mide arka yüzünde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? → Flexura coli dextra. 3 yılda çıktı.

2.3 A. Mesenterica Superior ve Inferior

Arter	Beslediği Yapılar
-------	-------------------

A. mesenterica superior (AMS)	İnce bağırsakların tümü (duodenum distal kısmı, jejunum, ileum) Caecum, appendix Colon ascendens Colon transversum sağ 2/3'ü
A. mesenterica inferior (AMI)	Colon descendens Colon sigmoideum Rectum üst kısmı Dalları: A. colica sinistra, Aa. sigmoideae, A. rectalis superior

SINAV SORUSU: A. mesenterica inferior'un dallarından birisidir → A. colica sinistra. Caecum/colon ascendens/transversum beslenmesi → A. mesenterica superior. 3 yılda tekrar etti.

2.4 Pankreas

Pankreas retroperitoneal bir organdır.

Baş kısmı: duodenum C şeklinde sararlar. Processus uncinatus aşağı uzar.

Boyun kısmı: V. portae'nin önünde olduğu yer.

Gövde kısmı: Sol tarafta, L1-L2 vertebra önünde.

Kuyruk kısmı: Dalağa uzanır, splenik hilumun hemen önünde.

Pankreas baş kısmının arka komşuluğunda: V. cava inferior, V. portae.

Pankreas ağrısı: n. splanchnicus major aracılığıyla T5-T9 segmentlerine iletilir.

SINAV NOTU: Pankreasın arka pozisyonunda yer alması ve sol hypochondrium'da bulunması sık sorulan bilgiler.

2.5 Karaciğer

Karaciğer 4 lob'dan oluşur: Lobus dexter, Lobus sinister, Lobus caudatus (Spiegel), Lobus quadratus.

Lig. falciforme hepatis: karaciğeri sağ ve sol loba ayırır. Karaciğerin ön yüzünde diaphragmaya asar.

Lig. coronarium hepatis: karaciğerin üst yüzüyle diaphragma arasında, area nuda burada.

Porta hepatis (karaciğer kapısı): karaciğerin visseral yüzünde 'H' harfi şeklinde.

Porta hepatis'ten geçenler:

- V. portae (arkada)
- A. hepatica propria (solda önde)
- Ductus choledochus (sağda önde)
- Lenfatikler ve sinirler

Karaciğer arka yüzünde vena cava inferior için sulcus bulunur.

2.6 Dalak (Splen)

Sol hypochondriumda, 9-11. kaburgalar hizasında retroperitoneal değil — peritonla kaplı.

Komşulukları: önde mide, arkada sol böbrek ve adrenal, aşağıda flexura coli sinistra, altında pankreas kuyruğu.

Lig. gastrosplenicum: mide ile dalak arasında (kısa gastrik damarlar burada).

Lig. splenorenale: dalak ile sol böbrek arasında (splenik damarlar ve pankreas kuyruğu burada).

2.7 Mesane ve Erkek Pelvik Organlar

Mesenenin komşulukları:

Üst yüz: periton ile örtülü, üst yüzde uterus (kadın) veya sigmoid kolon

Arka yüz erkekte: Vesicula seminalis + Ampulla ductus deferentis + Rectum

Arka yüz kadında: Uterus + Vagina

Alt yüz (fundus): Prostat (erkek), Pelvic diaphragma (kadın)

SINAV SORUSU: Erkekte hangi oluşum mesenenin arka yüz komşusudur? → Vesicula seminales. 2 yılda birebir çıktı.

2.8 Retroperitoneal Yapılar

Primer retroperitoneal (başından beri retroperitoneal):

Böbrekler, adrenal bezler, üreterler, aorta, vena cava inferior, pankreas (baş, boyun, gövde), duodenum (2-4. kısım), kolon ascendens, kolon descendens, rektum.

Intraperitoneal (peritonla kaplı):

Mide, jejunum, ileum, transvers kolon, sigmoid kolon, dalak, karaciğer, safra kesesi.

SINAV NOTU: Duodenum'un 1. kısmı (pars superior) intraperitoneal, 2-4. kısımları retroperitoneal.

Soru 1

Oesophagus ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru DEĞİLDİR?

- A) Pharynx'ten mideye kadar uzanan 23-25 cm uzunluğunda musküler bir kanaldır
- B) Diaphragma'daki hiatus oesophageus yoluyla karın boşluğuna çıkar, 11. th. vertebra karşısında midenin ostium cardiacum'unda sonlanır
- C) Trachea, oesophagus'un hem pars cervicalis hem de pars thoracalis'i ile ön tarafta komşuluk yapar
- D) Pars abdominalis'i karaciğer lobus dextra'da bir takım izler bırakır
- E) Sindirim kanalının en dar yeridir

Cevap: D — Pars abdominalis lobus dextra'da iz bırakır ifadesi YANLIŞ

Oesophagus'un pars abdominalis'i karaciğer LOBUS SINISTRA'da impressio bırakır, lobus dextra'da değil. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Mide'nin arka yüzünde aşağıda verilen oluşumlardan hangisi bulunmaz?

- A) Diaphragma
- B) Flexura coli dextra
- C) Splen (Dalak)
- D) Gl. suprarenalis sinistra
- E) Pankreas

Cevap: B — Flexura coli dextra

Mide arka yüzü komşuları: diaphragma, dalak, sol adrenal bez, pankreas, sol böbrek üst kısmı, mesocolon transversum. Flexura coli dextra karaciğer alt yüzü komşusu. 3 yılda çıktı.

Soru 3

A. mesenterica inferior'un dallarından birisidir hangisi?

- A) A. rectalis inferior
- B) A. ileocolica
- C) A. colica dextra
- D) A. colica sinistra
- E) A. rectalis media

Cevap: D — A. colica sinistra

AMI dalları: A. colica sinistra, Aa. sigmoideae, A. rectalis superior. AMS dalları: A. ileocolica, A. colica dextra, A. colica media, intestinal arterler. 3 yılda tekrar etti.

Soru 4

Kalın bağırsakların bölümleri olan Caecum, Appendix vermiformis, Colon ascendens ve Colon transversum'un büyük kısmının beslenmesi hangi arter tarafından sağlanmaktadır?

- A) A. thoracica interna
- B) A. mesenterica superior
- C) A. mesenterica inferior
- D) A. colica dextra
- E) Aa. sigmoideae

Cevap: B — A. mesenterica superior

AMS sağ yarı kolon + ince bağırsakları besler. AMI sol yarı kolonu besler. Basit kural: AMS = sağ taraf, AMI = sol taraf. 3 yılda tekrar etti.

Soru 5

Erkeklerde hangi oluşum mesanenin arka yüz komşusudur?

- A) Testis
- B) Plexus testicularis
- C) Vesicula seminales
- D) Cowper bezleri
- E) Epididymis

Cevap: C — Vesicula seminales

Erkeklerde mesanenin arka yüzü: Vesicula seminalis + Ampulla ductus deferentis + Rectum. Cowper bezleri üretra yakınında. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 6

Pancreas ile ilgili tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

- A) İncisura pancreatis'ten arka pozisyonda a.v. mesenterica superior, pancreas önüne doğru çıkar
- B) Epigastrium ve sol hypochondrium bölgesinde bulunur
- C) Pankreasın ağrısı n. splanchnicus major bölgesinden ilgili major bölgesine akseder
- D) Sempatikler T1-T3 segmentlerinden gelir
- E) Cauda pancreatis, arkada sol böbrek hilum'u ile komşuluk yapar

Cevap: D — Sempatikler T1-T3 değil T5-T9'dan gelir

Pankreas ağrısı n. splanchnicus major aracılığıyla T5-T9 segmentlerine iletilir. T1-T3 üst ekstremiteler ve boyun bölgesiyle ilgili.

Soru 7

Hangisi retroperitoneal bir oluşumdur?

- A) Jejunum
- B) Dalak
- C) Mide
- D) V. cava inferior
- E) İleum

Cevap: D — V. cava inferior

V. cava inferior primer retroperitoneal. Jejunum, ileum, dalak, mide intraperitoneal. Retroperitoneal: böbrek, adrenal, üreter, aorta, VCI, pankreas (çoğu), duodenum (2-4. kısım), kolon ascendens/descendens.

Soru 8

A. uterina hangi arterin dalıdır?

- A) A. iliaca communis
- B) A. iliaca externa
- C) A. pudenda interna
- D) A. pudenda externa
- E) A. iliaca interna

Cevap: E — A. iliaca interna

A. uterina, A. iliaca interna'nın (A. hypogastrica) dalıdır. Ureter ile çaprazlaşır — 'su köprü'nün altından geçer' (üreter alttan, A. uterina üstten). Önemli cerrahi nokta.

Soru 9

Hangi yapının içinde a. ve v. epigastrica inferior bulunur?

- A) Plica gastrolienalis
- B) Plica gastroepiploica
- C) Plica umbilicalis lateralis
- D) Plica umbilicalis medialis
- E) Plica umbilicalis mediana

Cevap: C — Plica umbilicalis lateralis

Plica umbilicalis lateralis içinde a. ve v. epigastrica inferior bulunur. Plica umbilicalis medialis = oblitere umbilikal arter. Plica umbilicalis mediana = urachus kalıntısı.

Soru 10

Hangisi nefron yapısında bulunmaz?

- A) Ureter
- B) Proksimal kıvrıntılı tübül
- C) Distal kıvrıntılı tübül
- D) Henle kulpu
- E) Glomerulus

Cevap: A — Ureter

Nefron: glomerulus + Bowman kapsülü + proksimal tübül + Henle kulpu + distal tübül + toplayıcı tübül. Ureter böbrekten mesaneye uzanan ayrı bir yapı, nefronun parçası değil.

BÖLÜM 3: TORAKS ANATOMİSİ

3.1 Bronşiyal Ağaç

Hava yolu sırası:

Trachea → Bronchus principalis (dextra ve sinistra) → Bronchus lobaris → Bronchus segmentalis → Bronchiolus → Bronchiolus terminalis → Bronchiolus respiratorius → Ductus alveolaris → Saccus alveolaris → Alveolus

Gaz alışverişinin yapıldığı yapılar:

Bronchiolus respiratorius, Ductus alveolaris, Saccus alveolaris, Alveolus

Bronchiolus terminalis'te gaz alışverişi OLMAZ — hala iletim yolu!

SINAV SORUSU: Arbor bronchialis (trakebronkial ağaç) yapılarından hangisi gaz alışverişinin yapıldığı yerlerden biri değildir? → Bronchiolus terminalis veya Bronchus lobaris. 2 yılda çıktı.

Sağ bronchus principalis özellikleri: Kısadır, geniştir, daha dik açılıdır → yabancı cisim sağa gider!

Segmentum bronchopulmonale: Anatomi, fonksiyon ve cerrahi açıdan ayrı birim. Her segmentin kendi arteri var.

3.2 Mediastinum

Bölüm	İçindeki Yapılar
Mediastinum superius	Arcus aortae ve dalları, V. cava superior, Trachea, Oesophagus, Ductus thoracicus, N. vagus, N. p.
Mediastinum anterius	Thymus kalıntısı, bağ dokusu, lenf düğümleri
Mediastinum medius	Kalp ve perikard, Aorta ascendens, A. pulmonalis, V. cava inferior başlangıcı
Mediastinum posterius	Oesophagus, Aorta descendens, V. azygos, Ductus thoracicus, N. vagus, Truncus sympathicus

SINAV SORUSU: Mediastinum superius'ta yer almaz → Kalp (mediastinum medius'ta). V. brachiocephalica mediastinum superius'ta. 2 yılda çıktı.

3.3 Kalp Anatomisi

Sağ atriumun önemli yapıları:

- Crista terminalis: pars trabecullata ile pars venosa arasındaki sınır
- Fossa ovalis: foramen ovalenin kalıntısı
- M. pectinati: kaslı trabeküller (auricula'da da var)
- Ostium sinus coronarii: koroner venöz kanın döküldüğü yer

Trabecula septomarginalis (moderatör bant): SAĞ VENTRİKÜLDE. İletim sisteminin bir parçası.

SINAV SORUSU: Sağ atriumda yer almaz → M. papillaris (ventriküllerde). 2 yılda birebir çıktı.

A. coronaria dextra: SA düğümü, AV düğümü, sağ ventrikül, sol ventrikül alt kısmı besler.

A. coronaria sinistra: sol ventrikül büyük kısmını, interventriküler septum besler.

3.4 Akciğer

Sağ akciğer: 3 lob (üst, orta, alt), 10 segment, daha büyük ve ağır.

Sol akciğer: 2 lob (üst, alt), 8-9 segment, Lingula (dil kısmı) üst lobun bir parçası.

Sağ akciğer facies mediastinalis'teki komşular:

- V. azygos (üst kısımda)
- Trachea ve bronchus principalis dextra
- Oesophagus (arka)
- A. subclavia dextra
- Arcus aortae (sol akciğerde)

SINAV SORUSU: Sağ akciğer (pulmo dexter) facies mediastinalis'te bulunmaz → Arcus aortae (sol akciğer komşusu). 2 yılda çıktı.

Soru 1

Aşağıda yer alan arbor bronchialis (trakebronkial ağaç) yapılarından hangisi gaz alışverişinin yapıldığı yerlerden biri DEĞİLDİR?

- A) Bronchiolus respiratorius
- B) Ductus alveolaris
- C) Saccus alveolaris
- D) Alveolus pulmonis
- E) Bronchus lobaris

Cevap: E — Bronchus lobaris

Gaz alışverişi: Bronchiolus respiratorius, Ductus alveolaris, Saccus alveolaris, Alveolus. Bronchus lobaris iletim yolu, gaz alışverişi yapmaz. Bronchiolus terminalis da yapmaz. 2 yılda çıktı.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Mediastinum superius'ta bulunur?

- A) Kalp
- B) Oesophagus
- C) Arcus aortae
- D) V. cava inferior
- E) Perikard

Cevap: C — Arcus aortae

Mediastinum superius: Arcus aortae ve dalları, VCS, Trachea, Oesophagus, N. vagus, N. phrenicus, Thymus, Ductus thoracicus. Kalp mediastinum mediusmda. VCI mediastinum mediusta başlar.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mediastinum superius'ta yer almaz?

- A) Arcus aortae
- B) V. cava superior
- C) V. azygos
- D) Trachea
- E) V. brachiocephalica

Cevap: C — V. azygos

V. azygos mediastinum posterius'ta uzanır ve mediastinum superius'a girmez. Arcus aortae, VCS, trachea ve V. brachiocephalica mediastinum superius'tadır.

Soru 4

Trabecula septomarginalis nerede bulunur?

- A) Sağ ventrikül
- B) Sağ atrium
- C) Sol ventrikül
- D) Sol atrium
- E) Sinus venarum cavarum

Cevap: A — Sağ ventrikül

Trabecula septomarginalis (moderatör bant) sağ ventrikülde septumdan anterior papiller kasa uzanır. İletim sisteminin Purkinje liflerini taşır. Sağ ventriküle özgü yapı.

Soru 5

Sağ akciğer (pulmo dexter) facies mediastinalis'te bulunmaz hangisi?

- A) V. azygos
- B) Trachea
- C) A. subclavia
- D) Arcus aortae
- E) Oesophagus

Cevap: D — Arcus aortae

Arcus aortae SOL akciğerin mediastinal yüzünde iz bırakır. Sağ akciğer mediastinal yüzünde: V. azygos, Trachea, A. subclavia dextra, Oesophagus, V. cava superior bulunur. 2 yılda çıktı.

Soru 6

Hangisi A. thoracica interna'nın dalı değildir?

- A) A. musculophrenica
- B) A. intercostalis anterior
- C) Rami mammarica
- D) A. epigastrica inferior
- E) Rami timici

Cevap: D — A. epigastrica inferior

A. epigastrica inferior, A. iliaca externa'nın dalıdır, A. thoracica interna'nın değil. A. thoracica interna dalları: A. intercostalis anterior, A. musculophrenica, A. epigastrica superior (inferior değil!), rami mammarica, rami timici.

Soru 7

Hangi ven sinus coronarius'a açılmaz?

- A) V. cardiaca magna
- B) V. cardiaca parva
- C) V. cava inferior
- D) V. cardiaca media
- E) V. ventriculi sinistri posterior

Cevap: C — V. cava inferior

Sinus coronarius'a açılan venler: V. cardiaca magna, V. cardiaca parva, V. cardiaca media, V. ventriculi sinistri posterior, V. obliqua atrii sinistri. V. cava inferior sağ atriuma direkt açılır.

BÖLÜM 4: BAŞ & BOYUN ANATOMİSİ

4.1 Glandula Thyroidea (Tiroit Bezi)

Tiroit bezi boynun ön-orta kısmında, larynx ve tracheanın önünde yer alır.

2 lateral lob + isthmus'tan oluşur. Bazı kişilerde pyramidal lob da olabilir.

Tiroit bezinin komşulukları:

Ön komşusu: M. sternohyoideus, M. sternothyroideus, M. omohyoideus

Arka-medial: Larynx, trachea, oesophagus, N. laryngeus recurrens

Arka-lateral: A. carotis communis, V. jugularis interna, N. vagus

SINAV SORUSU: Glandula thyroidea'nın ön komşusudur → M. sternohyoideus. 2 yılda çıktı.

Gl. parathyroidea: Tiroit bezinin arka yüzünde, genellikle 4 tane (üst 2, alt 2).

4.2 Paranasal Sinüsler

Sinüs	Açıldığı Yer	Not
Sinus maxillaris	Meatus nasi medius	En büyük paranasal sinüs
Sinus frontalis	Meatus nasi medius (infundibulum) içinde	Alın
Cellulae ethmoidales anteriores	Meatus nasi medius	-
Cellulae ethmoidales mediae	Meatus nasi medius	-
Cellulae ethmoidales posteriores	Meatus nasi superior	Dikkat — superior!
Sinus sphenoidalis	Recessus sphenoethmoidalis	En arkada

SINAV SORUSU: Aşağıdaki paranasal sinüslerden hangisi meatus nasi superior'a drene olur? → Cellulae ethmoidales posteriores. 2024-25'te çıktı.

4.3 Dış Kulak — Orta Kulak

Dış kulakta BULUNAN yapılar:

Helix, Antihelix, Tragus, Antitragus, Lobulus auriculae, Scapha, Concha auriculae, Meatus acusticus externus.

Dış kulakta BULUNMAYAN: Stapes — bu orta kulak kemiği!

Orta kulak kemikçikleri (ossiküller): Malleus → İncus → Stapes

Stapes tabanı: Oval pencereye (Fenestra vestibuli) oturur.

Yuvarlak pencere (Fenestra cochleae): membranla örtülü, ses titreşimlerinin sonlandığı yer.

4.4 Burun Boşluğu Lateral Duvarı

Lateral duvarda 3 konka (turbinate) bulunur: Concha nasalis inferior, media, superior.

Her konkanın altında bir meatus (geçit) var.

Burundaki önemli açılımlar:

- Meatus nasi inferior: Ductus nasolacrimalis (gözyaşı kanalı) açılır
- Meatus nasi medius: Sinus maxillaris, frontalis, ethmoid anterior-medius açılır
- Meatus nasi superior: Sinus ethmoidalis posterior açılır
- Recessus sphenoethmoidalis: Sinus sphenoidalis açılır

Limen nasi: Dış burun açıklığından (nares anterior) girilince ilk yapı.

Atrium nasi: Limen nasi'nin hemen arkasındaki genişleme.

Agger nasi: Limen nasi'nin hemen önünde küçük çıkıntı.

BAŞ & BOYUN — SORU BANKASI

Soru 1

Hangisi glandula thyroidea'nın ön komşusudur?

- A) Gl. parathyroidea
- B) M. sternohyoideus
- C) V. jugularis interna
- D) A. carotis communis
- E) N. vagus

Cevap: B — M. sternohyoideus

Tiroit bezinin ön komşuları: M. sternohyoideus, M. sternothyroideus, M. omohyoideus.

Arka-lateral komşuları: A. carotis communis, V. jugularis interna, N. vagus. 2 yılda çıktı.

Soru 2

Hangisi diaphragma pelvina'nın yapısına katılır?

- A) M. levator ani
- B) M. obturator externus
- C) M. ischiocavernosus
- D) M. transversus perinei superficialis
- E) M. bulbospongiosus

Cevap: A — M. levator ani

Diaphragma pelvis: M. levator ani (pubococcygeus + iliococcygeus + puborectalis) + M. coccygeus'tan oluşur. Diğerleri diaphragma urogenitalis veya perine yüzeyel kasları.

Soru 3

Hangisi dış kulakta yer alan yapılardan biri DEĞİLDİR?

- A) Helix
- B) Tragus
- C) Stapes
- D) Lobulus auriculæ
- E) Scapha

Cevap: C — Stapes

Stapes orta kulak kemikçigidir (malleus-incus-stapes). Dış kulakta bulunmaz. Dış kulak: helix, antihelix, tragus, antitragus, lobulus, scapha, concha, meatus acusticus externus. 2 yılda çıktı.

Soru 4

Aşağıdaki paranasal sinüslerden hangisi meatus nasi superior'a drene olur?

- A) Sinus maxillaris
- B) Sinus frontalis
- C) Cellulae ethmoidales anteriores
- D) Sinus sphenoidalis
- E) Cellulae ethmoidales posteriores

Cevap: E — Cellulae ethmoidales posteriores

Meatus nasi superior'a yalnızca ethmoid hücrelerin posterior grubu drene olur. Maxillaris, frontalis ve ethmoid anterior-medius → meatus nasi medius. Sphenoidalis → recessus sphenoethmoidalis. 2024-25'te çıktı.

Soru 5

Hangisi A. basillaris'in uç dalıdır?

- A) A. cerebri anterior
- B) A. cerebri media
- C) A. cerebri posterior
- D) A. communicantes anterior
- E) A. choroidea anterior

Cevap: C — A. cerebri posterior

A. basillaris'in uç dalı = A. cerebri posterior (ikiye ayrılır). A. cerebri anterior ve media A. carotis interna'nın dalları. A. communicans anterior ön birleşim arteri.

Soru 6

Burunda nares anterior'dan girilerek burun boşluğunun dış duvarından sinus sphenoidale'e ulaşmak istendiğinde tel hangi oluşumdan GEÇMEZ?

- A) Limen nasi
- B) Atrium nasi
- C) Agger nasi
- D) Area olfactoria
- E) Vomer

Cevap: E — Vomer

Vomer burun septumunun kemik kısmı, lateral duvarda değil. Sinus sphenoidalis'e gitmek için lateral duvardan ilerlemek gerekir: limen nasi → atrium nasi → agger nasi → meatus → recessus sphenoethmoidalis. Vomer septumda kalır.

Soru 7

Wallenberg Sendromu hangi arterin lezyonuna bağlı gelişir?

- A) A. cerebellaris posterior inferior
- B) A. choroidea anterior
- C) A. cerebri media
- D) A. cerebellaris anterior inferior
- E) A. communicans anterior

Cevap: A — A. cerebellaris posterior inferior (PICA)

Wallenberg = lateral medulla sendromu. PICA tıkanması. İpsilateral yüz + kontralateral vücut ağrı-ısı kaybı. 3 yılda birebir çıktı.

BÖLÜM 5: PELVİS, PERİNE ve ÜROGENİTAL

5.1 Diaphragma Pelvis ve Urogenitalis

Diaphragma pelvis (pelvic taban):

- M. levator ani: pubococcygeus, iliococcygeus, puborectalis lifleri
- M. coccygeus

Diaphragma urogenitalis:

- M. transversus perinei profundus
- M. sphincter urethrae externus

Yüzeyel perine kasları (diaphragmaya katılmaz):

- M. transversus perinei superficialis
- M. ischiocavernosus
- M. bulbospongiosus

SINAV SORUSU: Hangisi diaphragma pelvina'nın yapısına katılır? → M. levator ani. 2 yılda çıktı.

SINAV SORUSU: Hangisi diaphragma urogenitalis'in yapısına katılır? → M. transversus perinei profundus.

5.2 Erkek Üreme Sistemi

Spermatogenez testiste gerçekleşir (seminifer tübüllerde).

Sperm olgunlaşması epididimisin gövde ve kuyruk kısmında olur.

Spermatozoa depolanır: Epididimis kuyruğu + Ductus deferens.

Mesane arka yüzü komşuları erkekte:

- Vesicula seminalis (en yakın komşu)
- Ampulla ductus deferentis
- Rectum (daha geride)

Uterus'un hangi kısmı vagina içine invajinasyon gösterir? → Portio vaginalis (Cervix uteri'nin alt kısmı). 2024-25'te çıktı.

5.3 Kadın Üreme Sistemi

Uterus bölümleri: Fundus, Korpus, İsthmus, Serviks (Portio supravaginalis + Portio vaginalis).

Kadın iç genital organlar ve homologlar:

- Labium majus pudendi = Scrotum
- Labium minus pudendi = Penis derisi
- Klitoris = Penis corpus cavernosum
- Bulbus vestibuli = Corpus spongiosum
- Gl. vestibularis majores (Bartholin) = Gl. bulbourethralis (Cowper)

SINAV SORUSU: Kadın ve erkek genital organlarına ait homolog isimler verilmiştir. Yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. → Bulbus vestibuli - Corpus spongiosum doğru çift. Gl. vestibularis minores - Gl. bulbourethralis YANLIŞ (minores = Skene bezi).

PELVİS & PERİNE — SORU BANKASI

Soru 1

Erkeklerde hangi oluşum mesanenin arka yüz komşusudur?

- A) Testis
- B) Plexus testicularis
- C) Vesicula seminales
- D) Cowper bezleri
- E) Epididymis

Cevap: C — Vesicula seminales

Erkeklerde mesanenin arka yüzü: Vesicula seminalis + Ampulla ductus deferentis + Rectum. Cowper bezleri üretra yakınında, mesane komşusu değil. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Hangisi diaphragma pelvina'nın yapısına katılır?

- A) M. levator ani
- B) M. obturator externus
- C) M. ischiocavernosus
- D) M. transversus perinei superficialis
- E) M. bulbospongiosus

Cevap: A — M. levator ani

Diaphragma pelvis: M. levator ani + M. coccygeus. İschio-cavernosus, bulbospongiosus, transversus perinei superficialis yüzeyel perine kasları. Obturator externus pelvis yan duvarı kası. 2 yılda çıktı.

Soru 3

Uterus'un hangi kısmı vagina içine invajinasyon gösterir?

- A) Fundus uteri
- B) Cervix uteri
- C) Isthmus uteri
- D) Corpus uteri
- E) Cavum uteri

Cevap: B — Cervix uteri (Portio vaginalis)

Cervix uteri'nin alt kısmı portio vaginalis vagina içine uzanır ve ectocervix olarak adlandırılır. Portio vaginalis'in ortasında ostium uteri externum açılır.

Soru 4

A. uterina hangi arterin dalıdır?

- A) A. iliaca communis
- B) A. iliaca externa
- C) A. pudenda interna
- D) A. pudenda externa
- E) A. iliaca interna

Cevap: E — A. iliaca interna

A. uterina, A. iliaca interna'nın (A. hypogastrica) dalıdır. Ureter ile çaprazlaşır — 'su köprü'nün altından geçer'. Önemli cerrahi nokta: histerektomide üreter hasarı riski buradadır.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kadın dış genital organlardan biri DEĞİLDİR?

- A) Mons pubis
- B) Labium majus pudendi
- C) Labium minus pudendi
- D) Uterus
- E) Vestibulum vaginae

Cevap: D — Uterus

Kadın dış genital organlar (vulva): Mons pubis, Labium majus pudendi, Labium minus pudendi, Klitoris, Vestibulum vaginae, Gl. vestibulares. Uterus iç genital organ.

Soru 6

Hangisi Oddi sfinkterini oluşturan yapılar arasında BULUNMAZ?

- A) M. sphincter choledochus
- B) M. sphincter pancreaticus
- C) M. sphincter ampullae
- D) Longitudinal düz kaslar
- E) M. sphincter ani externus

Cevap: E — M. sphincter ani externus

Oddi sfinkteri: M. sphincter choledochus, M. sphincter pancreaticus, M. sphincter ampullae, Longitudinal düz kaslar. M. sphincter ani externus anüsün etrafında, Oddi sfinkteri ile ilgisi yok.

HIZLI TEKRAR — EN ÇOK ÇIKAN SORULAR

Soru	Cevap	Kaç Yıl Çıktı
Lateral ventriküller ↔ 3. ventrikül bağlantısı	Foramen interventriculare	3 yıl — birebir
Sulcus centralis hangi lobları ayırır	Frontalis - Parietalis	3 yıl — birebir
Columna posterior nükleusu	Nuc. posteromarginalis	3 yıl — birebir
Yüz ağrı 1. nöronu	Ganglion trigemini (semilunare)	3 yıl — birebir
Bilinçsiz propriosepsiyon yolu	Tr. spinocerebellaris posterior	3 yıl — birebir
Beyin sapında arkadan çıkan kafa çifti	N. trochlearis (4.)	2 yıl — birebir
Primer işitme sahası	Brodmann 41, Gyrus temporalis transverse	2 yıl — birebir
Wallenberg sendromu — arter	A. cerebellaris posterior inferior (PICA)	3 yıl — birebir
Otonom ganglion değil	Ganglion semilunare	4 yıl — birebir
Diencephalon'da bulunmayan	Filum terminale	2 yıl — birebir
Sağ atriumda yer almaz	M. papillaris	2 yıl — birebir
Mide arka yüzünde bulunmaz	Flexura coli dextra	3 yıl — çok benzer
Oesophagus pars abdominalis	Lobus sinistra'da iz bırakır (dextra değil)	2 yıl — birebir
A. mesenterica inferior dalı	A. colica sinistra	3 yıl — çok benzer
Caecum/colon beslenmesi	A. mesenterica superior	3 yıl — çok benzer
Mesane arka komşusu (erkek)	Vesicula seminalis	2 yıl — birebir
Arbor bronchialis — gaz alışverişi yapmaz	Bronchus lobaris	2 yıl — birebir
Dış kulakta bulunmaz	Stapes (orta kulak kemiği)	2 yıl — çok benzer
Glandula thyroidea ön komşusu	M. sternohyoideus	2 yıl — çok benzer
Paranasal sinüs — meatus superior	Cellulae ethmoidales posteriores	2024-25'te çıktı

ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Adım	Ne Yapılacak	Süre
1	Yukarıdaki özet tabloyu ezberle — bunlar garantili puan	2 saat
2	Nöroanatomisi soru bankasını çöz (en çok tekrar eden bölüm)	1 gün
3	Karın anatomisi soru bankasını çöz	0.5 gün

4	Toraks, baş-boyun, pelvis sorularını çöz	0.5 gün
5	Yanlışlarına dönerek tekrar et	0.5 gün