

GUIA DO PACIENTE

Tirzepatida

*um caminho de cuidado
e bem-estar*

Um material exclusivo para acompanhar você durante o tratamento — com orientações claras, dicas práticas e tudo o que precisa saber para aproveitar os melhores resultados com segurança.



ENDOCRINOLOGIA • MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Estamos juntos nessa jornada

Este guia foi preparado com carinho para acompanhar você na fase ativa do tratamento. Aqui, você vai encontrar informações claras sobre como usar a medicação, o que esperar do corpo e como cuidar de si com mais leveza.

A **fase ativa** é o início do tratamento — geralmente é o momento em que se observa a maior perda de peso, mas também quando podem surgir alguns efeitos adversos. É natural. Cada corpo responde de um jeito, e estarei aqui para ajustar o que for preciso.

A dose máxima da tirzepatida é de **15 mg, uma vez por semana**. Mas vale lembrar: nem todos os pacientes precisam chegar a essa dosagem para alcançar bons resultados. O aumento da dose costuma ser feito de forma gradual, a cada 4 semanas, conforme a sua adaptação.



APRESENTAÇÕES DA CANETA

A tirzepatida está disponível em seis apresentações de dose: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. Cada dose tem cor de embalagem distinta, o que facilita a identificação durante o ajuste progressivo.

O **platô da perda de peso** costuma acontecer por volta de 72 semanas de tratamento. Por isso, paciência e consistência são fundamentais. Cada etapa importa.

LEMBRE-SE

Estou aqui para acompanhar você em cada passo desse processo. Qualquer dúvida ou desconforto, entre em contato — não pule doses ou faça ajustes por conta própria.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR


Sumário

- 01 Como aplicar a medicação.....
- 02 Locais de aplicação.....
- 03 Como armazenar corretamente.....
- 04 Levando a medicação em viagens.....
- 05 Efeitos adversos: o que esperar.....
- 06 Manejando sintomas no dia a dia.....
- 07 Alimentação durante o tratamento.....
- 08 Hidratação e atenção ao corpo.....
- 09 Preservando massa muscular.....
- 10 Esquecimento de doses.....
- 11 Descarte seguro.....
- 12 Contracepção e gravidez.....
- 13 Como adquirir a medicação com desconto.....

01

Como aplicar a medicação

Antes de explicar a aplicação, vale conhecer o dispositivo que você vai usar.



CONHECENDO O DISPOSITIVO

A caneta é um dispositivo pré-cheio, com agulha já acoplada e dose pré-ajustada. O design permite a aplicação autônoma e segura em casa.

A medicação é administrada por **injeção subcutânea** (logo abaixo da pele) e pode ser aplicada em **qualquer horário do dia**, com ou sem alimentação. O importante é manter sempre o mesmo dia da semana.


ESCOLHENDO O MELHOR DIA DA SEMANA

A tirzepatida tem **meia-vida de aproximadamente 5 dias**. Na prática, isso significa que a concentração do medicamento no organismo se mantém estável durante a maior parte da semana, mas pode reduzir discretamente nos **dois últimos dias antes da próxima dose**. Alguns pacientes percebem essa variação como leve aumento da fome ou retorno parcial do apetite — é um fenômeno esperado do ponto de vista farmacocinético.

Por esse motivo, pode ser estratégico aplicar a medicação na **quarta ou quinta-feira**: assim, o efeito máximo coincide com o **fim de semana** — período em que costuma haver mais eventos sociais, refeições fora de casa e maior exposição a tentações alimentares.

ANTES DE APLICAR

Antes de iniciar, prepare-se com três cuidados simples:



1 Retire da geladeira.

Mantenha a tampa cinza até o momento do uso.



2 Lave suas mãos.



3 Verifique o Rótulo.

Confirme medicamento, dose e validade.


Retire a caneta da geladeira mantendo a tampa cinza até o momento do uso, lave bem as mãos e confirme no rótulo o medicamento, a dose e a validade. Em caso de dúvida, assista ao vídeo tutorial que acompanha o produto.

IMPORTANTE


Nunca pule a dose por medo ou insegurança na aplicação — entre em contato com o consultório para orientação. Estamos aqui para isso.

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO


Siga as etapas na ordem indicada — a aplicação correta garante a absorção adequada da medicação e reduz o risco de desconforto local.




Remova a tampa cinza da base puxando para baixo.



Apoie a caneta firmemente sobre a pele, em ângulo reto.



Gire o anel de travamento até a posição destravada (verde).



Pressione o botão roxo. Você ouvirá o **1º clique** (início) — mantenha a caneta apoiada por até 10 segundos até o **2º clique** (fim). Só então retire da pele.

02

Locais de aplicação

O **abdome é o local preferencial de aplicação**, pois possui maior quantidade de tecido subcutâneo e permite absorção mais previsível da medicação. É possível — e recomendado — alternar os pontos de aplicação dentro da própria região abdominal, mantendo distância do umbigo.

Como alternativas, também podem ser utilizadas a **parte superior das coxas** e a **parte de trás dos braços**.

DICAS IMPORTANTES PARA UMA APLICAÇÃO CONFORTÁVEL

- **Faça rodízio** dos pontos de aplicação — pode ser dentro da própria região do abdome.
- Deixe pelo menos **2 dedos de distância** entre uma aplicação e outra.
- Evite aplicar em pele machucada, com hematoma ou irritada.
- **Sangramento leve após a aplicação é normal** — apenas pressione o local com um algodão, sem esfregar.

DÚVIDAS NA APLICAÇÃO?

Assista ao vídeo tutorial que acompanha o produto, entre em contato com o consultório antes de aplicar e, principalmente, nunca pule a dose por medo — me chame para orientação.

03

Como armazenar corretamente

O armazenamento adequado preserva a eficácia da medicação. É um cuidado simples, mas essencial.

GELADEIRA

Entre **2 °C e 8 °C** — guarde na gaveta das verduras (temperatura mais estável).

FORA DA GELADEIRA

Pode permanecer por **até 21 dias**, em ambiente abaixo de 30 °C.

PROTEÇÃO CONTRA LUZ

Mantenha sempre dentro da caixa original.

CONGELAMENTO

Nunca congele a caneta — isso danifica o medicamento.

ATENÇÃO

Não armazene a caneta na porta da geladeira nem encostada nas paredes internas — esses locais sofrem grandes variações de temperatura e podem comprometer a medicação.

04

Levando a medicação em viagens

Estar em tratamento não significa abrir mão das viagens. Com alguns cuidados simples, dá para levar a medicação com tranquilidade.

TRANSPORTE

Use uma **embalagem com proteção térmica** que evite mudanças bruscas de temperatura. Evite incidência de luz direta e vibração excessiva durante o trajeto.

NA VIAGEM (CARRO, ÔNIBUS OU AVIÃO)

- Leve o dispositivo já em uso na **bolsa de mão (de colo)**.
- Evite deixar em malas ou no compartimento de bagagens — esses locais variam muito de temperatura.
- Tenha em mãos a **receita digital ou impressa** — facilita em qualquer abordagem.

DICA DE ORGANIZAÇÃO

Separe o material com antecedência: caneta na bolsa de mão, álcool em gel, algodão e a receita. Pequenos cuidados evitam grandes contratemplos.

05

Efeitos adversos: o que esperar

Saber o que pode acontecer ajuda você a passar pelas primeiras semanas com mais tranquilidade. Muitos pacientes não apresentam efeitos colaterais — e, quando aparecem, costumam ser leves.

Os efeitos adversos da tirzepatida geralmente estão relacionados à **dose utilizada** e à **tolerância gastrointestinal**. Costumam aparecer mais durante o aumento da dose e tendem a melhorar com o tempo.

FREQUÊNCIA DOS EVENTOS MAIS COMUNS

MUITO COMUM

MAIS DE 10% DOS CASOS

Náusea e diarreia

COMUM

ENTRE 1% E 10% DOS PACIENTES

Dor abdominal e constipação

OUTROS POSSÍVEIS

Vômitos e redução da sede (que pode levar à desidratação)

BOA NOTÍCIA

A maioria dos sintomas é leve a moderada e diminui com o tempo. Eles podem ser gerenciados com ajustes na dose, na frequência e nos hábitos alimentares — sempre com acompanhamento médico.

06

Manejando sintomas no dia a dia

Algumas estratégias práticas fazem grande diferença no conforto durante o tratamento.

PARA ALIVIAR NÁUSEAS E VÔMITOS

- Fracione as refeições em **porções menores** ao longo do dia.
- Evite alimentos gordurosos.
- Evite bebidas alcoólicas e gaseificadas.
- Coma devagar e pare ao se sentir satisfeito(a).

PARA TRATAR A CONSTIPAÇÃO

As primeiras medidas são não medicamentosas:

- Aumente a ingestão de **fibras** (frutas, legumes, integrais). Como complementos, podem ser utilizados **psyllium** e **farelo de aveia**.
- Beba mais **líquidos** — evitando cafeína em excesso.
- Pratique **exercícios físicos** regularmente.
- Mantenha um **cronograma de evacuação** — sempre no mesmo horário.

Caso essas medidas não sejam suficientes, existem **opções farmacológicas** que podem ser indicadas em consulta: **Lactulona** (laxante osmótico), **20Bi Fibras** (fibras solúveis associadas a probióticos) e, em **casos selecionados**, o **Orlistate**, sempre com prescrição individualizada. Não inicie nenhuma dessas medicações por conta própria — converse comigo no consultório.

QUEDA DE CABELO OU FRAQUEZA?

Como a medicação reduz bastante o apetite, pode haver um déficit calórico inicial — o corpo leva um tempo para se adaptar. Isso pode causar queda de cabelo ou cansaço nas primeiras semanas. Se persistir, me procure para avaliação.

07

Alimentação durante o tratamento

A alimentação certa potencializa os resultados e reduz o desconforto. Pense em refeições leves, refrescantes e nutritivas.

Priorize alimentos **leves e menos gordurosos**. Evite opções como pizzas, queijos amarelos, frituras e até alguns alimentos que parecem inofensivos — como sorvete, que tem bastante gordura escondida.

Coma devagar e pare assim que se sentir satisfeito(a), sem forçar. Pequenas quantidades já são suficientes para nutrir o corpo.

Inclua opções que ajudam na digestão, como **água com limão** ou **chá de gengibre**. Aposte em refeições leves e refrescantes, parecidas com as que você escolheria num dia quente — alimentos cítricos e gelados trazem frescor e leveza.

PREFIRA

- Refeições pequenas e fracionadas
- Proteínas magras em todas as refeições
- Frutas cítricas e alimentos refrescantes
- Água com limão, chá de gengibre
- Comer devagar, mastigando bem

EVITE

- Refeições muito volumosas
- Bebidas alcoólicas
- Frituras, doces e gordurosos
- Dieta low carb estrita
- Líquidos durante as refeições

08

Hidratação e atenção ao corpo

A medicação pode reduzir a sensação de sede — e isso merece atenção redobrada.

Como a tirzepatida pode diminuir a sede, existe risco de **desidratação**, o que sobrecarrega os rins. Por isso, beba água mesmo sem sentir vontade.

RECOMENDAÇÃO

- Mínimo de **1,5 litro de água por dia**.
- Tenha sempre uma garrafinha por perto — visualizar ajuda a lembrar.
- Distribua a ingestão ao longo do dia, não toda de uma vez.

SINAIS DE ALERTA

Procure atendimento médico se sentir **tontura**, **boca muito seca** ou notar **urina escura**. Esses são sinais de que o corpo está pedindo mais hidratação — e pode haver impacto renal.

09

Preservando sua massa muscular

Emagrecer com saúde é perder gordura — não músculos. Esse cuidado é essencial.

O emagrecimento rápido pode levar à perda de massa muscular, condição chamada de **sarcopenia**. Isso reduz sua força física e diminui o metabolismo basal — ou seja, o corpo passa a queimar menos calorias mesmo em repouso.

O QUE ESPERAR DA COMPOSIÇÃO DA PERDA DE PESO

Cerca de **20% a 25% do peso perdido** pode ser de massa magra. Por isso, exercícios e alimentação adequada não são complementos — são parte do tratamento.

A SOLUÇÃO É PRÁTICA

- Priorize **proteínas em todas as refeições** (carnes magras, ovos, laticínios, leguminosas).
- Reforce a **hidratação diária**.
- Mantenha **treino de força regular** — fundamental para preservar músculos.
- Inclua atividade aeróbica de forma equilibrada.

LEMBRE-SE

Perder peso é importante, mas perder gordura preservando músculo é o que garante resultados duradouros e saúde a longo prazo.

10

E se eu esquecer uma dose?

Acontece — e tem solução. O importante é não tomar decisões por conta própria.

SE ESQUECER DUAS DOSES SEGUIDAS

Se você esquecer **duas doses consecutivas**, não retome simplesmente onde parou. A recomendação é **reiniciar o tratamento na dose mais baixa** e progredir a titulação novamente — isso evita o retorno dos efeitos adversos com mais intensidade.

EM CASO DE DÚVIDA

Sempre que esquecer uma ou mais doses, entre em contato com o consultório antes de aplicar. Vamos ajustar juntos o melhor caminho.

11

Descarte seguro

O descarte correto protege você, sua família e o meio ambiente.

- Descarte sempre em **recipiente para perfurocortantes**.
- **Não recicle** a caneta.
- **Não jogue no lixo doméstico comum**.
- Se não tiver um recipiente próprio, use um **pote de plástico rígido com tampa** (como uma garrafa de amaciante), devidamente identificado.

ONDE DESCARTAR

Você pode levar o recipiente cheio a postos de saúde ou farmácias que recebem materiais perfurocortantes. Outra opção é trazê-lo ao meu consultório, onde fazemos o descarte adequado.

12

Contracepção e gravidez

*As orientações deste capítulo dizem respeito especificamente a **mulheres com possibilidade de engravidar**. Se esse não é o seu caso, sinta-se à vontade para pular esta seção. As recomendações abaixo são da FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).*

Ainda são necessários mais estudos sobre a interação entre a tirzepatida e os contraceptivos hormonais orais. Por isso, alguns cuidados são recomendados.

1. ATENÇÃO AOS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS

Se você usa pílula anticoncepcional, é orientado **trocar de método** ou **associar métodos de barreira** (preservativo) por **pelo menos 4 semanas** após o início do uso ou após qualquer ajuste de dose.

2. MÉTODOS DE LONGA DURAÇÃO SÃO PREFERIDOS

Recomenda-se oferecer métodos altamente eficazes, como **DIU (hormonal ou de cobre)** ou **implante contraceptivo**. Como ainda não se conhece bem o potencial teratogênico desses medicamentos, a contracepção precisa ser firme.

3. PLANEJAMENTO DE GRAVIDEZ

Não há evidência de segurança para o uso da tirzepatida durante a **gestação** e a **amamentação**. Caso queira engravidar, a recomendação é **suspender a medicação por pelo menos um mês antes** de tentar a gravidez.

IMPORTANTE

A bula brasileira está sendo atualizada para reforçar a necessidade de métodos contraceptivos adicionais nas 4 semanas após cada ajuste de dose. Vamos conversar sobre a melhor estratégia para o seu momento.

13

Como adquirir a medicação com desconto

Existe um programa oficial do laboratório que oferece desconto na medicação. Para garantir o benefício, é necessário seguir uma sequência simples — explico abaixo.

PASSO A PASSO PARA OBTER O DESCONTO

- 1 Realize o cadastro no programa oficial do laboratório.**
Esse é o pré-requisito para acessar qualquer desconto. Sem cadastro prévio, o benefício não é aplicado.
- 2 Efetue a compra pelo e-commerce de farmácias participantes.**
A compra deve ser feita pelo aplicativo ou site das farmácias — Raia, Pacheco, Venâncio ou outras participantes do programa. É no e-commerce que o desconto é processado.
- 3 Retire a medicação na unidade física escolhida.**
Após a compra online, basta dirigir-se à farmácia selecionada para a retirada, respeitando as condições de transporte e armazenamento descritas neste guia.

ATENÇÃO

Compras realizadas **diretamente no balcão da farmácia**, sem cadastro prévio e sem passar pelo e-commerce, costumam apresentar valor mais elevado. Para aproveitar o desconto, siga os três passos acima na ordem correta.

PARA FINALIZAR

Caminho de cuidado

*"Cada corpo tem seu tempo.
Cada jornada, sua singularidade.
O que importa é caminhar com cuidado,
paciência e consistência."*

Estou aqui para acompanhar você em cada etapa.
Qualquer dúvida, sintoma novo ou mudança que
perceber,
entre em contato com o consultório.

Você não está só nessa jornada.

Com cuidado,

Dra. Ariane Pagnoncelli

ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA

CRM/RJ 108.910-2 | RQE 30.309

