O que são ISTs.

IST é **Infecção Sexualmente Transmissível**. Quem causa são vírus, bactérias e protozoários. O caminho mais comum é o sexo oral, vaginal ou anal sem camisinha.



vírus · bactérias · protozoários

HIV, HPV, herpes, hepatites B e C	vírus
Sífilis, gonorreia, clamídia	bactéria
Tricomoníase	protozoário

Boa parte não dá sintoma nenhum.

Quando aparece algo: corrimento diferente, ferida, bolha ou verruga na região genital, dor ou ardência ao fazer xixi. Vá ao posto. Pomada e antibiótico por conta própria só escondem o problema.

Onde buscar orientação e atendimento.

Tudo de graça pelo SUS. O que você conta fica entre você e a equipe, e adolescente tem direito a ser atendido com privacidade.

UBS (posto de saúde)
Camisinha na hora, teste rápido, vacina e consulta.

CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento. Teste e conversa com um profissional.

UPA ou pronto-socorro
Transou sem camisinha ou ela estourou? Comece a PEP em até 72 horas.

Na escola
Professores e coordenação tiram dúvidas e encaminham para o posto.

136 **Disque Saúde**
Ligue de graça e tire suas dúvidas.

Informação protege. Camisinha, vacina e teste também.

Pegar camisinha no posto e fazer teste é rotina de quem se cuida. Faz bem para você e para quem está com você.

ISTs.

Informação e prevenção.

O que é, como pega, como evitar e onde fazer o teste.



Folder de conscientização sobre saúde sexual

Como se pega.

Sexo sem camisinha	oral, vaginal ou anal
Da gestante para o bebê	gravidez, parto, amamentação
Seringa e agulha	inclusive tatuagem e piercing
Ferida ou verruga	herpes, HPV e sífilis
Transfusão	rara: todo sangue doado é testado

Mito ou verdade?

Beijo no rosto passa HIV.
Mito

Sexo oral passa sífilis.
Verdade

Copo e talher passam HIV.
Mito

A gestante pode passar sífilis ao bebê.
Verdade

Picada de mosquito passa HIV.
Mito

Indetectável não transmite HIV pelo sexo.
Verdade

Dá para dividir a casa, a sala de aula e o lanche com quem vive com HIV. O que atrapalha é o preconceito: tem gente que deixa de fazer o teste com medo de ser julgada.

Monte sua prevenção.

Ninguém precisa ficar com um método só. A **prevenção combinada** mistura vários. Cada cor do anel é um deles.



- Camisinha — externa ou interna
- Vacina — HPV e hepatite B
- Teste de rotina — uma vez por ano
- PrEP — remédio antes, contra HIV
- PEP — até 72 h depois do risco
- Tratamento — da IST e da parceria
- Pré-natal — com testes
- Seringa descartável — nunca compartilhada

A camisinha vem primeiro.

Barra a maioria das ISTs e ainda evita gravidez. No posto é de graça e sem receita.

Aperte a embalagem
tem que ter ar dentro

Antes de tudo
coloque antes de qualquer contato

Uma por relação
duas juntas rasgam

Lubrificante à base de água
óleo estraga o látex

Testagem e diagnóstico.



É quanto demora o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites B e C. Uma picada no dedo, de graça e com sigilo.

Quando fazer

- Depois de transar sem camisinha
- Antes de dispensar a camisinha num namoro
- Na gravidez, junto com a parceria
- Uma vez por ano, no mínimo

Têm cura
Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase e hepatite C.

Têm controle
HIV, hepatite B, herpes e HPV.

Se não tratar

Infertilidade (clamídia e gonorreia), câncer pelo HPV, cirrose (hepatites), lesões no coração e no cérebro (sífilis), aids (HIV) e sífilis congênita no bebê.

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br/aids) e PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022).