O que são ISTs?

IST é **Infecção Sexualmente Transmissível**. Quem causa são vírus, bactérias e protozoários. O caminho mais comum é o sexo oral, vaginal ou anal sem camisinha.

Boa parte delas **não dá sintoma nenhum**. Dá para ficar meses com uma IST, passar para outra pessoa e nem desconfiar.

As mais comuns

HIV
vírus

Sífilis
bactéria

HPV
vírus

Gonorreia
bactéria

Clamídia
bactéria

Herpes genital
vírus

Hepatites B e C
vírus

Tricomoníase
protozoário

Fique de olho

Corrimento diferente, ferida, bolha ou verruga na região genital. Dor ou ardência para fazer xixi. Viu algo assim? Vá ao posto. Pomada e antibiótico por conta própria só escondem o problema.

Desde 2016 o Ministério da Saúde fala IST, e não DST. A infecção existe e passa adiante mesmo quando o corpo não dá sinal.

Onde buscar orientação e atendimento

Tudo aqui é de graça pelo SUS, e o que você conta na consulta fica entre você e a equipe. Adolescente tem direito a ser atendido com privacidade.

UBS (posto de saúde)
Camisinha na hora, teste rápido, vacina e consulta.

CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento. Você faz o teste e conversa com um profissional sobre o resultado.

UPA ou pronto-socorro
Transou sem camisinha ou ela estourou? Vá logo começar a PEP. O prazo é de 72 horas.

Na escola
Professores e coordenação podem tirar dúvidas e encaminhar você para o posto.

136 **Disque Saúde**
Ligue de graça e tire suas dúvidas.

Informação protege. Camisinha, vacina e teste também.

Pegar camisinha no posto e fazer teste é rotina de quem se cuida. Faz bem para você e para quem está com você.



ISTs

Informação e prevenção

O que é, como pega, como evitar e onde fazer o teste. Está tudo aqui dentro.

Folder de conscientização sobre saúde sexual

Como se pega uma IST

- **Sexo sem camisinha** com alguém infectado, seja oral, vaginal ou anal. É de longe o jeito mais comum.
- **Da gestante para o bebê**, na gravidez, no parto ou ao amamentar.
- **Seringa e agulha compartilhadas**, inclusive em tatuagem e piercing feitos sem material descartável.
- **Contato com ferida ou verruga** na pele e na mucosa. É assim que herpes, HPV e sífilis costumam passar.
- **Transfusão de sangue**, hoje rara no Brasil. Todo sangue doado passa por teste.

Isso não transmite HIV

Abraço · Aperto de mão · Beijo no rosto · Copos e talheres · Piscina · Banheiro · Suor e lágrima · Picada de inseto

Dá para dividir a casa, a sala de aula e o lanche com quem vive com HIV. O que atrapalha é o preconceito: tem gente que deixa de fazer o teste com medo de ser julgada.

Como se proteger

Ninguém precisa ficar com um método só. A **prevenção combinada** mistura vários, e você monta a combinação que cabe na sua rotina.



- Camisinha externa ou interna
- Vacina contra HPV e hepatite B
- Teste de rotina
- PEP: remédio depois da exposição
- PrEP: remédio antes, contra o HIV
- Tratar a IST e a parceria
- Pré-natal com testes
- Seringa e agulha só descartáveis

Por que a camisinha vem primeiro

Ela barra a maioria das ISTs e ainda evita gravidez. Nenhum outro método faz as duas coisas. No posto é de graça e sem receita.

- Olhe a validade e aperte a embalagem: tem que ter ar dentro.
- Coloque antes de qualquer contato.
- Uma por relação. Duas juntas rasgam com o atrito.
- Lubrificante à base de água. Óleo estraga o látex.

HPV e herpes passam pela pele que a camisinha não cobre. Contra o HPV, a vacina cobre essa parte.

Testagem e diagnóstico

30 min É quanto demora o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites B e C. Uma picada no dedo, de graça e com sigilo.

Quando fazer

- Depois de transar sem camisinha.
- Antes de dispensar a camisinha num namoro.
- Na gravidez, junto com a parceria.
- Uma vez por ano, no mínimo, se você tem vida sexual.

Têm cura
Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase e hepatite C.

Têm tratamento e controle
HIV, hepatite B, herpes e HPV.

O que acontece se não tratar

- Infertilidade (clamídia e gonorreia).
- Câncer de colo do útero, ânus, pênis e garganta (HPV).
- Cirrose e câncer de fígado (hepatites B e C).
- Sífilis no coração, no cérebro e nos nervos.
- Aids, quando o HIV fica sem remédio.
- Sífilis congênita: aborto, parto prematuro e sequelas no bebê.

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br/aids) e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022).