O que são ISTs?

Infecções Sexualmente Transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas passam de uma pessoa para outra principalmente pelo sexo oral, vaginal ou anal sem camisinha.

Muitas ISTs **não dão sintomas**. A pessoa pode estar infectada e transmitir sem saber.

Algumas das mais comuns

HIV
vírus

Sífilis
bactéria

HPV
vírus

Gonorreia
bactéria

Clamídia
bactéria

Herpes genital
vírus

Hepatites B e C
vírus

Tricomoníase
protozoário

Sinais de alerta

Corrimento, feridas, bolhas ou verrugas na região genital, e dor ou ardência ao urinar. Notou algo? Procure atendimento e não use remédio por conta própria.

Desde 2016, o Ministério da Saúde usa o termo IST no lugar de DST, porque é possível ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais de doença.

Onde buscar orientação e atendimento

Todos os serviços abaixo são gratuitos pelo SUS. O atendimento é sigiloso, e adolescentes têm direito a privacidade na consulta.

UBS (posto de saúde)
Camisinha, testes rápidos, vacinas e consulta.

CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento: teste e conversa com profissional.

UPA ou pronto-socorro
Para iniciar a PEP em até 72 horas após uma exposição de risco.

Na escola
Converse com professores, coordenação ou a equipe do Programa Saúde na Escola.

136 **Disque Saúde**
Ligação gratuita para tirar dúvidas.

Informação protege.
Camisinha, vacina e teste também.

Cuidar da saúde sexual não é motivo de vergonha. É respeito por você e por quem está com você.



ISTs

Informação e prevenção

Conhecer é o primeiro passo para se proteger. Abra e veja como cuidar de você.

Folder de conscientização sobre saúde sexual

Como as ISTs são transmitidas

- **Sexo sem camisinha** (oral, vaginal ou anal) com uma pessoa infectada. É a forma mais comum.
- **Da gestante para o bebê**, na gravidez, no parto ou na amamentação.
- **Compartilhar seringas, agulhas** e outros objetos cortantes.
- **Contato com feridas ou verrugas** na pele e nas mucosas, como no herpes, no HPV e na sífilis.
- **Transfusão de sangue contaminado**, hoje rara no Brasil porque todo sangue doado é testado.

Isso não transmite HIV

Abraço · Aperto de mão · Beijo no rosto · Copos e talheres · Piscina · Banheiro · Suor e lágrima · Picada de inseto

Conviver com quem vive com HIV é seguro. Preconceito também faz mal à saúde: ele afasta as pessoas do teste e do tratamento.

Formas de prevenção

Não existe um único jeito de se proteger. A **prevenção combinada** junta vários métodos, e cada pessoa escolhe os que fazem sentido para a sua vida.



- Camisinha externa e interna
- Vacinas contra HPV e hepatite B
- Testagem regular
- PEP: remédio após exposição de risco
- PrEP: remédio antes, contra o HIV
- Tratar as ISTs e as parcerias
- Pré-natal com testes
- Não compartilhar seringas

Por que usar camisinha?

É o único método que protege, ao mesmo tempo, contra a maioria das ISTs e contra a gravidez não planejada. É gratuita nas UBS.

- Confira a validade e se a embalagem está intacta.
- Coloque antes de qualquer contato íntimo.
- Use uma nova a cada relação e nunca duas ao mesmo tempo.
- Prefira lubrificante à base de água.

HPV e herpes podem passar pela pele que a camisinha não cobre. Por isso a vacina contra o HPV também é importante.

Testagem e diagnóstico

30 min Tempo do resultado dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. São gratuitos e sigilosos no SUS.

Quando fazer o teste

- Depois de uma relação sem camisinha.
- Ao começar um novo relacionamento.
- Na gravidez, junto com a parceria.
- Pelo menos uma vez por ano, se tem vida sexual ativa.

Têm cura

Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase e hepatite C.

Têm tratamento e controle

HIV, hepatite B, herpes e HPV.

Sem tratamento, as ISTs podem causar

- Infertilidade, por inflamação pélvica (clamídia e gonorreia).
- Câncer de colo do útero, ânus, pênis e garganta (HPV).
- Cirrose e câncer de fígado (hepatites B e C).
- Lesões no coração, no cérebro e nos nervos (sífilis).
- Aids, quando o HIV não é tratado.
- Sífilis congênita e outros riscos para o bebê.

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br/aids) e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022).