O que são ISTs?

IST é **Infecção Sexualmente Transmissível**. Quem causa são vírus, bactérias e protozoários. O caminho mais comum é o sexo oral, vaginal ou anal sem camisinha.

Boa parte delas **não dá sintoma nenhum**. Dá para ficar meses com uma IST, passar para outra pessoa e nem desconfiar.

As mais comuns

HIV
vírus

HPV
vírus

Clamídia
bactéria

Hepatites B e C
vírus

Sífilis
bactéria

Gonorreia
bactéria

Herpes genital
vírus

Tricomoníase
protozoário

Fique de olho

Corrimento diferente, ferida, bolha ou verruga na região genital. Dor ou ardência para fazer xixi. Viu algo assim? Vá ao posto. Pomada e antibiótico por conta própria só escondem o problema.

Desde 2016 o Ministério da Saúde fala IST, e não DST. A infecção existe e passa adiante mesmo quando o corpo não dá sinal.

Onde buscar orientação e atendimento

Tudo aqui é de graça pelo SUS, e o que você conta na consulta fica entre você e a equipe. Adolescente tem direito a ser atendido com privacidade.

- **UBS (posto de saúde)**
  Camisinha na hora, teste rápido, vacina e consulta.
- **CTA**
  Centro de Testagem e Aconselhamento. Você faz o teste e conversa com um profissional sobre o resultado.
- **UPA ou pronto-socorro**
  Transou sem camisinha ou ela estourou? Vá logo começar a PEP. O prazo é de 72 horas.
- **Na escola**
  Professores e coordenação podem tirar dúvidas e encaminhar você para o posto.

136 **Disque Saúde**
Ligue de graça e tire suas dúvidas.

Informação protege. Camisinha, vacina e teste também.

Pegar camisinha no posto e fazer teste é rotina de quem se cuida. Faz bem para você e para quem está com você.

ISTs

Informação e prevenção

O que é.
Como pega.
Como evitar.
Onde fazer o teste.

Está tudo aqui dentro.

Folder de conscientização sobre saúde sexual

Como se pega uma IST

- **Sexo sem camisinha** com alguém infectado, seja oral, vaginal ou anal. É de longe o jeito mais comum.
- **Da gestante para o bebê**, na gravidez, no parto ou ao amamentar.
- **Seringa e agulha compartilhadas**, inclusive em tatuagem e piercing feitos sem material descartável.
- **Contato com ferida ou verruga** na pele e na mucosa. É assim que herpes, HPV e sífilis costumam passar.
- **Transfusão de sangue**, hoje rara no Brasil. Todo sangue doado passa por teste.

Isso não transmite HIV

- ✓ Abraço
- ✓ Beijo no rosto
- ✓ Piscina
- ✓ Suor e lágrima
- ✓ Aperto de mão
- ✓ Copo e talher
- ✓ Banheiro
- ✓ Picada de inseto

Dá para dividir a casa, a sala de aula e o lanche com quem vive com HIV. O que atrapalha é o preconceito: tem gente que deixa de fazer o teste com medo de ser julgada.

Como se proteger

Ninguém precisa ficar com um método só. A **prevenção combinada** mistura vários, e você monta a combinação que cabe na sua rotina.

Camisinha externa ou interna	**Vacina** de HPV e hepatite B
PrEP remédio antes, contra o HIV	**PEP** remédio depois da exposição
Teste de rotina	**Tratamento** da IST e da parceria
Pré-natal com testes	**Seringa** só descartável

Grátis no SUS

Por que a camisinha vem primeiro

Ela barra a maioria das ISTs e ainda evita gravidez. Nenhum outro método faz as duas coisas. No posto é de graça e sem receita.

- Olhe a validade e aperte a embalagem: tem que ter ar dentro.
- Coloque antes de qualquer contato.
- Uma por relação. Duas juntas rasgam com o atrito.
- Lubrificante à base de água. Óleo estraga o látex.

HPV e herpes passam pela pele que a camisinha não cobre. Para o HPV, a vacina resolve essa parte.

Testagem e diagnóstico

30 min É quanto demora o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites B e C. Uma picada no dedo, de graça e com sigilo.

Quando fazer

- Depois de transar sem camisinha.
- Antes de dispensar a camisinha num namoro.
- Na gravidez, junto com a parceria.
- Uma vez por ano, no mínimo, se você tem vida sexual.

Têm cura

Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase e hepatite C.

Têm tratamento e controle

HIV, hepatite B, herpes e HPV.

O que acontece se não tratar

- Infertilidade (clamídia e gonorreia).
- Câncer de colo do útero, ânus, pênis e garganta (HPV).
- Cirrose e câncer de fígado (hepatites B e C).
- Sífilis no coração, no cérebro e nos nervos.
- Aids, quando o HIV fica sem remédio.
- Sífilis congênita: aborto, parto prematuro e sequelas no bebê.

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br/aids) e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022).