

1 Estabilidade Estrutural

Definição 1.1. Sejam $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funções de classe \mathcal{C}^k . A \mathcal{C}^k -distância entre f e g é definida por

$$d_k(f, g) = \sup_{x \in D} \{|f(x) - g(x)|, |f^{(2)}(x) - g^{(2)}(x)|, \dots, |f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x)|\}$$

Definição 1.2. Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é \mathcal{C}^k -estável se existe $\varepsilon > 0$ tal que $d_k(f, g) < \varepsilon$ implica que f e g são topologicamente conjugadas.

Exemplo 1.3. Seja $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $L(x) = \frac{x}{2}$. Se g é uma função com $d_1(L, g) < \frac{1}{2}$, vamos mostrar que L e g são topologicamente conjugadas.

Inicialmente, g possui pelo menos 1 ponto fixo. Como $|\frac{x}{2} - g(x)| < \frac{1}{2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$, temos que $-\frac{1}{2} < \frac{x}{2} - g(x) < \frac{1}{2}$ e, portanto, $-\frac{1}{2} - \frac{x}{2} < g(x) - x < \frac{1}{2} - \frac{x}{2}$. Definindo $h(x) = g(x) - x$, temos que $0 < h(-1) < 1$ e $-1 < h(1) < 0$. Pelo Teorema do Valor Intermediário, existe $x_0 \in (-1, 1)$ tal que $h(x_0) = 0$ e, portanto, $g(x_0) = x_0$.

Além disso, g possui no máximo 1 ponto fixo. Como $|\frac{1}{2} - g'(x)| < \frac{1}{2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$, temos que $0 < g'(x) < 1$. De acordo com o Teorema do Valor Médio, se g possui 2 pontos fixos, então existe x_0 tal que $g'(x_0) = 1$, o que é um absurdo.

Seja $J = [-10, -5] \cup (5, 10]$. Observe que se $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, então existe um único $n_x \in \mathbb{Z}$ tal que $L^{n_x}(x) \in J$. Analogamente, se $x \in \mathbb{R}$ e x não é ponto fixo de g , então existe um único n_x tal que $g^{n_x}(x) \in [-10, g(-10)) \cup (g(10), 10]$.

Seja h uma função tal que $h|_{[-10, -5]}$ é um homeomorfismo crescente entre $[-10, -5]$ e $[-10, g(-10)]$ e $h|_{(5, 10]}$ é um homeomorfismo crescente entre $[5, 10]$ e $[g(10), 10]$.

Seja $x \in \mathbb{R} - \{0\}$. Como $L^{n_x}(x) \in J$, temos que $h \circ L^{n_x}(x)$ está bem definido. Sendo g um homeomorfismo, $g^{-n_x} \circ h \circ L^{n_x}(x)$ também está bem definido. Defina $h(x) = g^{-n_x} \circ h \circ L^{n_x}(x)$ para todo $x \in \mathbb{R} - \{0\}$. Observe que se $x \in J$, então $n_x = 0$, portanto, está bem definida em J . Por fim, defina $h(0)$ como sendo o ponto fixo de g . Resta mostrar que $h \circ L(x) = g \circ h(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Se $x \neq 0$, então $h(x) = g^{-n_x} \circ h \circ L^{n_x}(x)$. Se $y = L(x)$, então $y \neq 0$ e $L^{n_x-1}(y) = L^{n_x-1}(L(x)) = L^{n_x}(x) \in J$, ou seja, $n_y = n_x - 1$. Desse modo,

$$h \circ L(x) = h(y) = g^{-n_y} \circ h \circ L^{n_y}(y) = g \circ g^{-n_x} \circ h \circ L^{n_x}(x) = g \circ h(x)$$

e $g(h(0)) = h(0) = h(L(0))$.

Assim, $h \circ L = g \circ h$ e h é um homeomorfismo pois é composição de homeomorfismos. Desse modo, L e g são topologicamente conjugadas e L é \mathcal{C}^1 -estável.

Teorema 1.4. Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então F_μ é \mathcal{C}^2 -estável.

Demonstração. Vamos mostrar que existe $\varepsilon > 0$ tal que $d_2(F_\mu, g) < \varepsilon$ implica que F_μ e g são topologicamente conjugadas.

Seja $\varepsilon_1 > 0$ tal que $d_2(F_\mu, g) < \varepsilon_1$ implica que $g'' < 0$ e, portanto, a concavidade de g é para baixo. Existe ε_1 com essa propriedade pois $F_\mu'' = -2\mu$.

Seja $0 < \varepsilon_2 < \varepsilon_1$ tal que $d_2(F_\mu, g) < \varepsilon_2$ implica que g possui dois pontos fixos $\alpha < \beta$ com $g'(\alpha) > 1$ e $g'(\beta) < -1$. Existe ε_2 com essa propriedade pois F_μ possui os pontos fixos 0 e 1 com $F_\mu'(0) > 1$ e $F_\mu'(1) < -1$.

Pelo Teorema do Valor Médio, temos que g possui um ponto crítico $c \in (\alpha, \beta)$. Sendo $g'' < 0$, o ponto crítico de g é único. Além disso, g é estritamente crescente em $(-\infty, c)$ e estritamente decrescente em (c, ∞) . Desse modo, existem α' e β' tais que $g(\alpha') = \alpha$ e $g(\beta') = \beta$.

Por fim, seja $0 < \varepsilon < \varepsilon_2$ tal que $d_2(F_\mu, g) < \varepsilon$ implica que $g^{-1}(\alpha')$ possui dois elementos a_0 e a_1 e que $|g'(x)| > 1$ para todo $x \in [\alpha, a_0] \cup [a_1, \beta]$.

Desse modo, se $d_2(F_\mu, g) < \varepsilon$, então g possui as mesmas propriedades de F_μ . Em particular, utilizando as imagens inversas de (a_0, a_1) por g , é possível provar que g e a função shift são topologicamente conjugadas. Portanto, F_μ e g são topologicamente conjugadas por transitividade. \square

Teorema 1.5 (Hartman). *Seja p um ponto fixo hiperbólico de f e suponha que $f'(p) = \lambda \neq 0$. Então existem vizinhanças U de p e V de 0 e um homeomorfismo $h : U \rightarrow V$ que conjugua as funções $f|_U$ e $L(x) = \lambda x$, $x \in V$.*