

Uma Introdução aos Sistemas Dinâmicos Caóticos

Agenor Gonçalves Neto

São Paulo, 2020

Sumário

1	Conceitos Elementares	1
2	Família Quadrática	2
2.1	Estudo Inicial	2
2.2	Conjuntos de Cantor	3
2.3	Caos	4
2.4	Conjugação Topológica	5
2.5	Dinâmica Simbólica	6
3	Teorema de Sharkovsky	8
4	Teorema de Singer	10
5	Matriz de Transição	12

1 Conceitos Elementares

Seja $f : X \rightarrow X$ uma função, onde X é um espaço métrico. Dado $x \in X$ e denotando por f^n a n -ésima composição de f com ela mesma, queremos estudar as propriedades da sequência $(x, f(x), f^2(x), \dots)$.

Definição 1.1.

- Se $x \in X$, então $\mathcal{O}(x) = \{x, f(x), f^2(x), \dots\}$ é a órbita de x .
- Se $p \in X$ e $f^n(p) = p$ para algum $n > 0$, então p é um ponto periódico de período n . Em particular, se $n = 1$, então p é um ponto fixo. Denotaremos por $\text{Per}(f)$ o conjunto de todos os pontos periódicos.
- Se p é um ponto periódico de período n e $f^k(p) \neq p$ para todo $0 < k < n$, então n é o período principal de p . Denotaremos por $\text{Per}_n(f)$ o conjunto de todos os pontos periódicos de período principal n .
- Se p um ponto periódico de período n , então $\mathcal{B}(p) = \{x \in X : \lim_{k \rightarrow \infty} f^{kn}(x) = p\}$ é a bacia de atração de p . Além disso, $\mathcal{B}(\infty) = \{x \in X : \lim_{k \rightarrow \infty} |f^k(x)| = \infty\}$ é a bacia de atração do ∞ .

Proposição 1.2. *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Se $f([a, b]) \subset [a, b]$ ou $f([a, b]) \supset [a, b]$, então f possui ponto fixo.*

Demonstração. Suponha que $f([a, b]) \subset [a, b]$. Considere a função $g(x) = f(x) - x$ definida em $[a, b]$. Observando que $g(a) \geq 0$ e $g(b) \leq 0$ e utilizando o TVI, existe $p \in [a, b]$ tal que $g(p) = 0$.

Suponha que $f([a, b]) \supset [a, b]$ e sejam $c, d \in [a, b]$ tais que $f(c) = a$ e $f(d) = b$. Considere a função $g(x) = f(x) - x$ definida em $[a, b]$. Observando que $g(c) \leq 0$ e $g(d) \geq 0$ e utilizando o TVI, existe $p \in [a, b]$ tal que $g(p) = 0$. \square

Definição 1.3. Sejam $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ uma função de classe \mathcal{C}^1 e $p \in \text{Per}_n(f)$.

- Se $|\partial f^n(p)| \neq 1$, então p é um ponto hiperbólico.
- Se $|\partial f^n(p)| < 1$, então p é um ponto atrator.
- Se $|\partial f^n(p)| > 1$, então p é um ponto repulsor.

Teorema 1.4. *Sejam $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ uma função de classe \mathcal{C}^1 e $p \in \text{Per}_n(f)$.*

- Se p é um ponto atrator, então existe uma vizinhança de p contida em $\mathcal{B}(p)$.*
- Se p é um ponto repulsor, então existe uma vizinhança V de p com a seguinte propriedade: se $x \in V$ e $x \neq p$, então $f^{kn}(x) \notin V$ para algum $k \geq 1$.*

Demonstração.

- Sendo ∂f contínua, existe $\varepsilon > 0$ tal que $|\partial f^n(x)| \leq \lambda < 1$ para todo $x \in (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$. Pelo TVM, se $x \in (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$, então $|f^n(x) - p| \leq \lambda |x - p|$. Por indução, $|f^{kn}(x) - p| \leq \lambda^k |x - p|$ para todo $k \geq 1$. Desse modo, $\lim_{k \rightarrow \infty} f^{kn}(x) = p$.
- Demonstração análoga. \square

2 Família Quadrática

2.1 Estudo Inicial

Proposição 2.1. *Se $\mu > 1$, então*

- $F(1) = F(0) = 0$.
- $F(\frac{1}{\mu}) = F(p_\mu) = p_\mu$, onde $p_\mu = \frac{\mu-1}{\mu}$.
- $0 < p_\mu < 1$.

Proposição 2.2. *Se $\mu > 1$, então $(-\infty, 0) \cup (1, \infty) \subset \mathcal{B}(\infty)$.*

Demonstração. Inicialmente, se $x \in (1, \infty)$, então $F(x) \in (-\infty, 0)$. Por fim, observamos que a sequência $(x, F(x), F^2(x), \dots)$ é estritamente decrescente e ilimitada quando $x \in (-\infty, 0)$. \square

Proposição 2.3. *Se $1 < \mu < 3$, então*

- 0 é um ponto repulsor e p_μ é um ponto atrator.
- $(0, 1) \subset \mathcal{B}(p_\mu)$.

2.2 Conjuntos de Cantor

Se $\mu > 4$, então $F(\frac{1}{2}) = \frac{\mu}{4} > 1$, ou seja, existem pontos em $[0, 1]$ que não permanecem em $[0, 1]$ após uma iteração de F . Em vista da Proposição 2.2, tais pontos pertencem ao conjunto $\mathcal{B}(\infty)$. De modo mais geral, se um ponto de $[0, 1]$ não permanece em $[0, 1]$ após um número finito de iterações, então ele pertence ao conjunto $\mathcal{B}(\infty)$.

Desse modo, considere o conjunto $\Lambda_n = \{x \in [0, 1] : F^n(x) \in [0, 1]\}$ formado pelos pontos que permanecem em $[0, 1]$ após n iterações de F e o conjunto $\Lambda = \{x \in [0, 1] : F^n(x) \in [0, 1] \text{ para todo } n \geq 1\}$ formado pelos pontos de $[0, 1]$ que sempre permanecem em $[0, 1]$ por iterações de F .

Podemos verificar que $\Lambda_1 = [0, x_1] \cup [x_2, 1]$, onde $x_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{\mu^2 - 4\mu}}{2\mu}$ e $x_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\mu^2 - 4\mu}}{2\mu}$. De modo mais geral, temos o resultado a seguir.

Proposição 2.4. *Se $\mu > 4$, então Λ_n é a união de 2^n intervalos fechados disjuntos e $F^n : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $[a, b]$ é um desses intervalos.*

Demonstração. Suponha que Λ_{k-1} é a união de 2^{k-1} intervalos fechados disjuntos e que $F^{k-1} : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $[a, b]$ é um desses intervalos. Suponha que F^{k-1} é estritamente crescente em $[a, b]$; se F^{k-1} é estritamente decrescente em $[a, b]$, a demonstração é análoga.

Inicialmente, observamos que existem $x'_1 < x'_2$ tais que $F^{k-1}([a, x'_1]) = [0, x_1]$, $F^{k-1}((x'_1, x'_2)) = (x_1, x_2)$ e $F^{k-1}([x'_2, 1]) = [x_2, 1]$. Desse modo, os intervalos $[a, x'_1]$ e $[x'_2, 1]$ são disjuntos. Além disso, temos que $F^k([a, x'_1]) = [0, 1]$, $F^k((x'_1, x'_2)) > 1$ e $F^k([x'_2, 1]) = [0, 1]$. Pela Regra da Cadeia, temos também que $(F^k)'([a, x'_1]) = F'([0, x_1])(F^{k-1})'([a, x'_1]) > 0$ e $(F^k)'([x'_2, 1]) = F'([x_2, 1])(F^{k-1})'([x'_2, 1]) < 0$.

Portanto, é imediato concluir que Λ_k é a união de 2^k intervalos fechados disjuntos e que $F^k : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $[a, b]$ é um desses intervalos. \square

Definição 2.5. Seja $\Gamma \subset \mathbb{R}$ um conjunto não vazio. Dizemos que Γ é um conjunto de Cantor se as seguintes condições são válidas:

- i. Γ é compacto.
- ii. Γ não possui intervalos.
- iii. Todo ponto de Γ é um ponto de acumulação de Γ .

Lema 2.6. *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então*

- 1. *existe $\lambda > 1$ tal que $|F'(\Lambda_1)| > \lambda$.*
- 2. *$b - a < \frac{1}{\lambda^n}$, onde $[a, b]$ é um dos intervalos que formam Λ_n .*

Demonstração.

- 1. Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então $F'(x_1) = \sqrt{\mu^2 - 4\mu} > 1$ e $F'(x_2) = -\sqrt{\mu^2 - 4\mu} < -1$. Desse modo, podemos concluir que existe $\lambda > 1$ tal que $|F'(\Lambda_1)| > \lambda$.

2. Se $x \in [a, b]$, então $F^k(x) \in \Lambda_1$ para todo $0 \leq k < n$. Desse modo, $(F^n)'(x) = \prod_{k=0}^{n-1} F'(F^k(x)) > \lambda^n$ e, pelo TVM, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$1 = |F^n(b) - F^n(a)| = |(F^n)'(c)| |b - a| > \lambda^n |b - a|.$$

□

Sejam $x \in \Lambda$ e $\varepsilon > 0$. Pelo Lema anterior, existe um intervalo $[a, b] \subset \Lambda_n$ para algum $n \geq 1$ tal que $x \in [a, b]$, $b - a < \varepsilon$ e $F^n : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora.

Teorema 2.7. *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então Λ é um conjunto de Cantor.*

Demonstração. Obviamente, Λ é não vazio e compacto.

Se Λ contém algum intervalo, então existem $x < y$ tais que $[x, y] \subset \Lambda$. Seja k tal que $\frac{1}{\lambda^k} < |x - y|$. Em particular, $[x, y] \subset \Lambda_k$, o que é um absurdo pois os intervalos de Λ_k possuem tamanho menor que $\frac{1}{\lambda^k}$.

Sejam $x \in \Lambda$ e $\varepsilon > 0$. Como $\frac{1}{\lambda^k} < \varepsilon$ para algum $k \geq 0$, os intervalos que formam Λ_k possuem tamanho menor que ε . Se $x \in [a, b]$, onde $[a, b]$ é um desses intervalos, então $a \in \Lambda$ e $|x - a| < \varepsilon$. □

2.3 Caos

Proposição 2.8. *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então $\text{Per}(F|_\Lambda)$ é denso em Λ .*

Demonstração. Sejam $x \in \Lambda$, $\varepsilon > 0$ e $k \geq 1$ tal que $\frac{1}{\lambda^k} < \varepsilon$. Temos que $F^k : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $x \in [a, b]$ e $[a, b]$ é um dos intervalos que formam Λ_k . Como $F^k([a, b]) \supset [a, b]$, existe $y \in [a, b]$ tal que $F^k(y) = y$. Observando que $y \in \Lambda$ e $|x - y| < \varepsilon$, concluímos que $\text{Per}(F|_\Lambda)$ é denso em Λ . □

Definição 2.9. Seja $f : X \rightarrow X$ uma função. Dizemos que f é topologicamente transitiva se dados $x, y \in X$ e $\varepsilon > 0$, existem $z \in X$ e $k \geq 1$ tais que $|x - z| < \varepsilon$ e $|y - f^k(z)| < \varepsilon$.

Proposição 2.10. *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então $F|_\Lambda$ é topologicamente transitiva.*

Demonstração. Sejam $x, y \in \Lambda$, $\varepsilon > 0$ e $k \geq 1$ tal que $\frac{1}{\lambda^k} < \varepsilon$. Temos que $F^k : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $x \in [a, b]$ e $[a, b]$ é um dos intervalos que formam Λ_k . Pelo TVI, existe $z \in [a, b]$ tal que $F^k(z) = y$. Observando que $z \in \Lambda$, concluímos que $F|_\Lambda$ é topologicamente transitiva. □

Definição 2.11. Seja $f : X \rightarrow X$ uma função. Dizemos que f depende sensivelmente das condições iniciais se existe $\delta > 0$ com a seguinte propriedade: dados $x \in X$ e $\varepsilon > 0$, existem $y \in X$ e $k \geq 1$ tais que $|x - y| < \varepsilon$ e $|f^k(x) - f^k(y)| > \delta$.

Proposição 2.12. *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então $F|_\Lambda$ depende sensivelmente das condições iniciais.*

Demonstração. Sejam $x \in \Lambda$, $\varepsilon > 0$ e $k \geq 1$ tal que $\frac{1}{\lambda^k} < \varepsilon$. Temos que $F^k : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $x \in [a, b]$ e $[a, b]$ é um dos intervalos que formam Λ_k . Suponha que $F^k(a) = 0$ e $F^k(b) = 1$; se $F^k(a) = 1$ e $F^k(b) = 0$, a demonstração é análoga.

Como $F(\frac{1}{2}) > 1$ e $x \in \Lambda$, temos que $F^k(x) \in [0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$. Se $F^k(x) \in [0, \frac{1}{2})$, então $|F^k(x) - F^k(b)| = |F^k(x) - 1| > \frac{1}{2}$ e se $F^k(x) \in (\frac{1}{2}, 1]$, então $|F^k(x) - F^k(a)| = |F^k(x)| > \frac{1}{2}$.

Observando que $|x - a| < \varepsilon$ e $|x - b| < \varepsilon$, concluímos que $F|_\Lambda$ depende sensivelmente das condições iniciais. \square

Definição 2.13. Seja $f : X \rightarrow X$ uma função. Dizemos que f é caótica se as seguintes condições são válidas:

- i. $\text{Per}(f)$ é denso em X .
- ii. f é topologicamente transitiva.
- iii. f depende sensivelmente das condições iniciais.

Teorema 2.14. Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então $F|_\Lambda$ é caótica.

Teorema 2.15. Seja $f : X \rightarrow X$ é uma função, onde $X \subset \mathbb{R}$ é um conjunto infinito. Se $\text{Per}(f)$ é denso em X e f é topologicamente transitiva, então f é caótica.

2.4 Conjugação Topológica

Definição 2.16. Sejam $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ e $\tau : X \rightarrow Y$ funções. Dizemos que f e g são topologicamente conjugadas por τ se as seguintes condições são válidas:

- i. τ é um homeomorfismo.
- ii. $\tau \circ f = g \circ \tau$.

Proposição 2.17. Sejam $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ e $\tau : X \rightarrow Y$ funções. Se f e g são topologicamente conjugadas por τ , então

- 1. $\text{Per}(f)$ é denso em X se, e somente se, $\text{Per}(g)$ é denso em Y .
- 2. f é topologicamente transitiva se, e somente se, g é topologicamente transitiva.

Demonstração.

- 1. Se $\text{Per}(f)$ denso em X , então $\tau(\text{Per}(f))$ é denso em Y pois τ é contínua. Observando que $\tau(\text{Per}(f)) = \text{Per}(g)$, concluímos que $\text{Per}(g)$ é denso em Y . A outra implicação é demonstrada de maneira análoga.
- 2. Sendo τ contínua, dados $\varepsilon > 0$ e $k \geq 1$, existe $\delta > 0$ tal que se $z \in X$, $|x - z| < \delta$ e $|y - f^k(z)| < \delta$, então $|\tau(x) - \tau(z)| < \varepsilon$ e $|\tau(y) - \tau(f^k(z))| < \varepsilon$.

Se $x', y' \in Y$, existem $x, y \in X$ tais que $\tau(x) = x'$ e $\tau(y) = y'$. Sendo f topologicamente transitiva, existem $z \in X$ e $k \geq 1$ tais que $|x - z| < \delta$ e $|y - f^k(z)| < \delta$. Desse modo, $|\tau(x) - \tau(z)| < \varepsilon$ e $|\tau(y) - \tau(f^k(z))| < \varepsilon$. Se $\tau(z) = z'$, então $|x' - z'| < \varepsilon$ e $|y' - g^k(z')| < \varepsilon$. A outra implicação é demonstrada de maneira análoga. \square

Lema 2.18. A função $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ 2 - 2x, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

é caótica.

Demonstração. Inicialmente, é possível provar por indução que $T^n : [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}] \rightarrow [0, 1]$ é uma função bijetora afim para todo $0 \leq k < 2^n$ e para todo $n \geq 1$. Desse modo, dados $x \in [0, 1]$ e $\varepsilon > 0$, seja $n \geq 1$ tal que $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$, $x \in J$ e $T^n : J \rightarrow [0, 1]$ é bijetora, onde $J = [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}]$.

a) $\text{Per}(T)$ é denso em $[0, 1]$.

Como $T(J) \supset J$, existe $p \in J$ tal que $T^n(p) = p$. Observando que $|x - p| \leq \frac{1}{2^n} < \varepsilon$, concluímos que $\text{Per}(T)$ é denso em $[0, 1]$.

b) T é topologicamente transitiva.

Sendo $T^n : J \rightarrow [0, 1]$ bijetora, se $y \in [0, 1]$, então existe $z \in J$ tal que $T^n(z) = y$. Observando que $|x - z| \leq \frac{1}{2^n}$ e $|y - T^n(z)| = 0$, concluímos que T é topologicamente transitiva.

c) T depende sensivelmente das condições iniciais.

Sendo $T^n : J \rightarrow [0, 1]$ bijetora, existem $a, b \in J$ tais que $T^n(a) = 0$ e $T^n(b) = 1$. Se $T^n(x) \in [0, \frac{1}{2}]$, então $|T^n(x) - T^n(b)| = |T^n(x) - 1| \geq \frac{1}{2}$ e se $T^n(x) \in [\frac{1}{2}, 1]$, então $|T^n(x) - T^n(a)| = |T^n(x)| \geq \frac{1}{2}$. Observando que $|x - a| \leq \frac{1}{2^n}$ e $|x - b| \leq \frac{1}{2^n}$, concluímos que T depende sensivelmente das condições iniciais.

□

Teorema 2.19. Se $\mu = 4$, então F é caótica.

Demonstração. Basta observar que $F \circ \tau = \tau \circ T$, onde $\tau : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é o homeomorfismo dado por $\tau(x) = \sin^2(\frac{\pi x}{2})$. □

2.5 Dinâmica Simbólica

Dado $N \geq 2$, seja Σ_N o conjunto das sequências de números naturais limitados entre 1 e N , isto é, $\Sigma_N = \{(x_0 x_1 x_2 \dots) : 1 \leq x_n \leq N \text{ para todo } n \geq 0\}$. Seja também $d_N : \Sigma_N \times \Sigma_N \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por

$$d_N(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|x_k - y_k|}{N^k},$$

onde $x = (x_0 x_1 x_2 \dots)$ e $y = (y_0 y_1 y_2 \dots)$. Observe que (Σ_N, d_N) é um espaço métrico. Por fim, seja $\sigma : \Sigma_N \rightarrow \Sigma_N$ a função dada por $\sigma(x_0 x_1 x_2 \dots) = (x_1 x_2 x_3 \dots)$.

Proposição 2.20. Sejam $x = (x_0 x_1 x_2 \dots)$ e $y = (y_0 y_1 y_2 \dots)$ elementos de Σ_N .

1. Se $x_k = y_k$ para todo $0 \leq k \leq n$, então $d_N(x, y) \leq \frac{1}{N^n}$.
2. Se $d_N(x, y) < \frac{1}{N^n}$, então $x_k = y_k$ para todo $0 \leq k \leq n$.

Proposição 2.21. σ é contínua.

Demonstração. Sejam $x = (x_0 x_1 x_2 \dots) \in \Sigma_N$, $\varepsilon > 0$ e $n \geq 1$ tal que $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$. Se $d(x, y) < \frac{1}{2^{n+1}}$, onde $y = (y_0 y_1 y_2 \dots) \in \Sigma_N$, então $x_k = y_k$ para todo $0 \leq k \leq n+1$. Como $\sigma(x) = (x_1 x_2 x_3 \dots)$ e $\sigma(y) = (y_1 y_2 y_3 \dots)$, temos que as primeiras $n+1$ entradas de $\sigma(x)$ e $\sigma(y)$ são iguais. Desse modo, $d(\sigma(x), \sigma(y)) \leq \frac{1}{2^n} < \varepsilon$ e, portanto, σ é contínua. \square

Para a demonstração do próximo resultado, vamos considerar $N = 2$. Se $\Lambda_1 = [0, x_1] \cup [x_2, 1]$, sejam $I_1 = [0, x_1]$ e $I_2 = [x_2, 1]$. Como $\Lambda \subset I_1 \cup I_2$, podemos definir a função $S : \Lambda \rightarrow \Sigma_2$ dada por $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$, onde $x_k = 1$ se $F^k(x) \in I_1$ e $x_k = 2$ se $F^k(x) \in I_2$ para todo $k \geq 0$.

Proposição 2.22. *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então $F|_\Lambda$ e σ são topologicamente conjugadas por S .*

Demonstração.

a) S é injetora.

Sejam $x, y \in \Lambda$, $x < y$. Se $S(x) = S(y)$, então $F^k(x)$ e $F^k(y)$ está no mesmo lado em relação ao ponto crítico para todo $k \geq 0$ e, portanto, F é monótona em cada intervalo J_k cujos extremos são $F^k(x)$ e $F^k(y)$. Desse modo, se $z \in [x, y]$, então $F^k(z) \in J_k \subset I_1 \cup I_2$ para todo $k \geq 0$ e, portanto, $z \in \Lambda$, o que é um absurdo pois Λ não contém intervalos.

b) S é sobrejetora.

Seja $(x_0 x_1 x_2 \dots) \in \Sigma_A$. Inicialmente, para cada $n \geq 0$, considere

$$I_{x_0 \dots x_n} = \{x \in [0, 1] : x \in I_{x_0}, \dots, F^n(x) \in I_{x_n}\}.$$

Observe $I_{x_0 \dots x_n} = I_{x_0} \cap F^{-1}(I_{x_1 \dots x_n})$ e, portanto, é possível concluir por indução que $I_{x_0 \dots x_n}$ é um intervalo fechado não vazio. Além disso, $I_{x_0 \dots x_n} = I_{x_0 \dots x_{n-1}} \cap F^{-n}(I_{x_n}) \subset I_{x_0 \dots x_{n-1}}$.

Desse modo, $(I_{x_0 \dots x_n})_{n=0}^\infty$ é uma sequência de intervalos encaixantes fechados e não vazios e, portanto, existe $x \in \bigcap_{n=0}^\infty I_{x_0 \dots x_n}$. Como $F^k(x) \in I_{x_k}$ para todo $k \geq 0$, concluímos que $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$. Observe que x é único, pois S é injetora.

c) S é contínua.

Sejam $x \in \Lambda$, $\varepsilon > 0$ e $k \geq 0$ tal que $\frac{1}{N^k} < \varepsilon$. Se $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$, então $x \in I_{x_0 \dots x_k}$. Sendo $I_{x_0 \dots x_k}$ um intervalo fechado, existe $\delta > 0$ tal que se $y \in \Lambda$ e $|x - y| < \delta$, então $y \in I_{x_0 \dots x_k}$. Desse modo, $S(x)$ e $S(y)$ são iguais nas primeiras $k+1$ entradas e, portanto, $d_N(S(x), S(y)) \leq \frac{1}{N^k} < \varepsilon$.

d) $S \circ F|_\Lambda = \sigma_A \circ S$.

Se $x \in \Lambda$ e $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$, então $\bigcap_{n=0}^\infty I_{x_0 \dots x_n} = \{x\}$. Desse modo, é imediato que

$$S \circ F|_\Lambda(x) = S(F(\bigcap_{n=0}^\infty I_{x_0 \dots x_n})) = S(\bigcap_{n=1}^\infty I_{x_1 \dots x_n}) = (x_1 x_2 x_3 \dots) = \sigma_A \circ S(x).$$

\square

3 Teorema de Sharkovsky

Ao longo dessa seção, consideraremos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Além disso, escreveremos $J_0 \longrightarrow J_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow J_n$ quando J_0, J_1, \dots, J_n são intervalos fechados e $f(J_k) \supset J_{k+1}$ para todo $0 \leq k < n$.

Lema 3.1. *Se $J_0 \longrightarrow J_1$, então existe um intervalo fechado $J'_0 \subset J_0$ tal que $f(J'_0) = J_1$.*

Demonstração. Sejam $p, q \in [a, b]$ tais que $f(p) = c$ e $f(q) = d$, onde $J_0 = [a, b]$ e $J_1 = [c, d]$. Se $p \leq q$, definimos $b' = \inf\{x \in [p, q] : f(x) = d\}$ e $a' = \sup\{x \in [p, b'] : f(x) = c\}$ e, pela continuidade de f , podemos concluir que $f(J'_0) = J_1$, onde $J'_0 = [a', b']$. Se $q \leq p$, a demonstração é análoga. \square

Lema 3.2. *Se $J_0 \longrightarrow J_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow J_{n-1} \longrightarrow J_0$, então existe $p \in J_0$ tal que as seguintes condições são válidas:*

1. $f^k(p) \in J_k$ para todo $1 \leq k < n$.
2. $f^n(p) = p$.

Demonstração. Pelo Lema anterior, podemos construir uma sequência de intervalos fechados $J'_0, J'_1, \dots, J'_{n-1}$ com as seguintes propriedades:

- a. $J_0 \supset J'_0 \supset J'_1 \supset \cdots \supset J'_{n-1}$.
- b. $f^k(J'_{k-1}) = J_k$ para todo $1 \leq k < n$.
- c. $f^n(J'_{n-1}) = J_0$.

Desse modo, existe $p \in J'_{n-1}$ tal que $f^n(p) = p$. Em particular, $p \in J_0$ e $f^k(p) \in J_k$ para todo $1 \leq k < n$. \square

Teorema 3.3. *Se $\text{Per}_3(f) \neq \emptyset$ e $n \geq 1$, então $\text{Per}_n(f) \neq \emptyset$.*

Demonstração. Sejam $p_1 < p_2 < p_3$ os pontos da órbita de um elemento de $\text{Per}_3(f)$ e suponha que $f(p_1) = p_2$ e $f(p_2) = p_3$. Se $f(p_1) = p_3$ e $f(p_3) = p_2$, a demonstração é análoga. Definindo $J_0 = [p_1, p_2]$ e $J_1 = [p_2, p_3]$, temos que $J_0 \longrightarrow J_1$, $J_1 \longrightarrow J_0$ e $J_1 \longrightarrow J_1$. Com isso, podemos demonstrar as seguintes afirmações:

- a) $\text{Per}_1(f) \neq \emptyset$.

De fato, $J_1 \longrightarrow J_1$ implica que existe $p \in J_1$ tal que $f(p) = p$.

- b) $\text{Per}_2(f) \neq \emptyset$.

De fato, $J_0 \longrightarrow J_1 \longrightarrow J_0$ implica que existe $p \in J_0$ tal que $f(p) \in J_1$ e $f^2(p) = p$. Se $f(p) = p$, então $p \in J_0 \cap J_1$, o que é um absurdo pois $J_0 \cap J_1 = \{p_2\}$ e $p_2 \in \text{Per}_3(f)$.

- c) $\text{Per}_4(f) \neq \emptyset$.

De fato, $J_1 \longrightarrow J_1 \longrightarrow J_1 \longrightarrow J_0 \longrightarrow J_1$ implica que existe $p \in J_1$ tal que $f^k(p) \in J_1$ para todo $1 \leq k < 3$, $f^3(p) \in J_0$ e $f^4(p) = p$. Se $f^3(p) = p$, então $p \in J_0 \cap J_1$, o que é

um absurdo pois $J_0 \cap J_1 = \{p_2\}$ e $f^2(p_2) = p_1 \notin J_1$. Se $f^k(p) = p$ para algum $1 \leq k < 3$, então $f^k(p) \in J_1$ para todo $k \geq 1$. Em particular, $f^3(p) \in J_0 \cap J_1 = \{p_2\}$ e, portanto, $f^4(p) = p = p_3$, o que é um absurdo pois $f(p_3) = p_1 \notin J_1$.

Por fim, podemos demonstrar de maneira análoga à última afirmação que $\text{Per}_n(f) \neq \emptyset$ para todo $n \geq 4$. \square

Definição 3.4 (Ordenação de Sharkovsky).

$$3 \triangleright 5 \triangleright \dots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright \dots \triangleright 2^2 \cdot 3 \triangleright 2^2 \cdot 5 \triangleright \dots \triangleright 2^k \cdot 3 \triangleright 2^k \cdot 5 \triangleright \dots \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1.$$

Teorema 3.5 (Sharkovsky). *Se $\text{Per}_n(f) \neq \emptyset$ e $n \triangleright m$, então $\text{Per}_m(f) \neq \emptyset$.*

Teorema 3.6. *Se $n \geq 1$, então existe uma função f com as seguintes propriedades:*

1. $\text{Per}_n f \neq \emptyset$.
2. $\text{Per}_m f = \emptyset$ para todo $m \triangleright n$.

Demonstração. Seja $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ a função dada por

$$T(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2 - 2x & \text{se } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

e considere a família de funções $T_h(x) = \min\{h, T(x)\}$ definidas em $[0, 1]$, onde o parâmetro h varia em $[0, 1]$.

Inicialmente, observe que $T(x) \leq 1$ para todo $x \in [0, 1]$ implica que $T_1 = T$. Além disso, é possível provar por indução que T_1 possui 2^k pontos periódicos de período k para todo $k \geq 1$. Desse modo, podemos definir

$$h(k) = \min\{\max\{\mathcal{O} : \mathcal{O} \text{ é uma órbita de tamanho } k \text{ de } T_1\}\}$$

para todo $k \geq 1$. A ideia principal da prova consiste no fato de que $h(k)$ desempenha os papéis de parâmetro, máximo e ponto de uma órbita de $T_{h(k)}$. As seguintes afirmações tornarão preciso esse fato:

- a) Se $\mathcal{O} \subset [0, h)$ é uma órbita de T_h , então \mathcal{O} é uma órbita de T_1 .
Se $p \in \mathcal{O}$, então $T_h(p) \in [0, h)$. Desse modo, $T_h(p) = \min\{h, T(p)\} = T(p) = T_1(p)$. Assim, T_h e T_1 coincidem em \mathcal{O} e, portanto, \mathcal{O} é uma órbita de T_1 .
- b) Se $\mathcal{O} \subset [0, h]$ é uma órbita de T_1 , então \mathcal{O} é uma órbita de T_h .
Se $p \in \mathcal{O}$, então $T_1(p) \in [0, h]$. Desse modo, $T_h(p) = \min\{h, T_1(p)\} = T_1(p)$. Assim, T_h e T_1 coincidem em \mathcal{O} e, portanto, \mathcal{O} é uma órbita de T_h .
- c) $T_{h(k)}$ possui uma órbita $\mathcal{O} \subset [0, h(k))$ de tamanho j se, e somente, se $h(k) > h(j)$.
Se $T_{h(k)}$ possui uma órbita $\mathcal{O} \subset [0, h(k))$ de tamanho j , então \mathcal{O} é uma órbita de T_1 e, pela definição de $h(j)$, concluímos que $h(k) > h(j)$. Por outro lado, se $h(k) > h(j)$, então T_1

possui uma órbita $\mathcal{O} \subset [0, h(j)] \subset [0, h(k)]$ de tamanho j e, desse modo, \mathcal{O} é uma órbita de $T_{h(k)}$.

- d) A órbita de T_1 que contém $h(k)$ é uma órbita de tamanho k de $T_{h(k)}$. Além disso, todas as outras órbitas de $T_{h(k)}$ estão em $[0, h(k))$.

Pela definição de $h(k)$, T_1 possui uma órbita $\mathcal{O} \subset [0, h(k)]$ de tamanho k e, portanto, \mathcal{O} é uma órbita de $T_{h(k)}$.

Na segunda parte, basta observar que $h(k)$ é o valor máximo de $T_{h(k)}$ e, desse modo, toda órbita de $T_{h(k)}$ está contida em $[0, h(k)]$. Em particular, se a órbita não contém $h(k)$, então ela está contida em $[0, h(k))$.

- e) $k \triangleright j$ se, e somente se, $h(k) > h(j)$.

Suponha que $k \triangleright j$. Sabemos que $T_{h(k)}$ possui uma órbita de tamanho k e, pelo Teorema de Sharkovsky, $T_{h(k)}$ admite uma órbita de tamanho j . Em particular, essa órbita está contida em $[0, h(k))$ e, portanto, $h(k) > h(j)$.

Suponha que $h(k) > h(j)$. Se $j \triangleright k$, então $h(k) < h(j)$ pela demonstração no parágrafo anterior e, portanto, $k \triangleright j$.

Desse modo, $T_{h(n)}$ possui órbita de tamanho n para cada $n \geq 1$. Além disso, se $m \triangleright n$ então $h(m) > h(n)$ e, portanto, $T_{h(n)}$ não possui órbita de tamanho m . \square

4 Teorema de Singer

Definição 4.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe \mathcal{C}^3 . A derivada de Schwarz de f é função $\mathcal{S}f$ dada por

$$(\mathcal{S}f)(x) = \frac{D^3 f(x)}{Df(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{D^2 f(x)}{Df(x)} \right)^2$$

para todo x tal que $\partial f(x) \neq 0$.

Proposição 4.2. Se $\mathcal{S}f < 0$, então $\mathcal{S}f^n < 0$ para todo $n \geq 1$.

Demonstração. Pela Regra da Cadeia, podemos concluir que

$$(\mathcal{S}f^2)(x) = (\mathcal{S}f)(f(x))[\partial f(x)]^2 + (\mathcal{S}f)(x) < 0$$

para todo x tal que $\partial f^2(x) \neq 0$. Desse modo, $\mathcal{S}f^n < 0$ para todo $n \geq 1$ por indução. \square

Lema 4.3. Se $\mathcal{S}f < 0$ e x_0 é um ponto de mínimo local de ∂f , então $\partial f(x_0) \leq 0$.

Demonstração. Se $\partial f(x_0) \neq 0$, então

$$(\mathcal{S}f)(x_0) = \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial f(x_0)} - \frac{3}{2} \left(\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial f(x_0)} \right)^2 < 0.$$

Sendo x_0 ponto de mínimo local de ∂f , temos que $\partial^2 f(x_0) = 0$ e $\partial^3 f(x_0) \geq 0$ e, portanto, $\partial f(x_0) < 0$. \square

Lema 4.4. *Se $\mathcal{S}f < 0$ e $a < b < c$ são pontos fixos de f com $\partial f(b) \leq 1$, então f possui ponto crítico em (a, c) .*

Demonstração. Pelo TVM, existem $r \in (a, b)$ e $s \in (b, c)$ tais que $\partial f(r) = \partial f(s) = 1$. Sendo ∂f contínua, ∂f restrita ao intervalo $[r, s]$ possui mínimo global. Como $b \in (r, s)$ e $\partial f(b) \leq 1$, temos que ∂f possui mínimo local em (r, s) . Utilizando Lema anterior e o TVI, a demonstração está concluída. \square

Lema 4.5. *Se $\mathcal{S}f < 0$ e $a < b < c < d$ são pontos fixos de f , então f possui ponto crítico em (a, d) .*

Demonstração. Se $\partial f(b) \leq 1$ ou $\partial f(c) \leq 1$, o resultado é verdadeiro pelo Lema anterior. Se $\partial f(b) > 1$ e $\partial f(c) > 1$, existem $r, t \in (b, c)$ tais que $r < t$, $f(r) > r$ e $f(t) < t$. Pelo TVM, existe $s \in (r, t)$ tal que $\partial f(s) < 1$. Portanto, ∂f possui mínimo local em (b, c) . Utilizando Lema 4.3 e o TVI, a demonstração está concluída. \square

Lema 4.6. *Se f possui finitos pontos críticos, então f^n possui finitos pontos críticos para todo $n \geq 1$.*

Demonstração. Pelo TVM, se $c \in \mathbb{R}$, então f possui ponto crítico entre dois elementos de $f^{-1}(c)$ e, portanto, $f^{-1}(c)$ é finito. De modo mais geral, é possível provar por indução que $f^{-n}(c)$ é finito para todo $n \geq 1$.

Se $n \geq 1$, então $\partial f^n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} \partial f(f^k(x)) = 0$ se, e somente se, $f^k(x)$ é ponto crítico de f para algum $1 \leq k < n$. Portanto, o conjunto de pontos críticos de f^n é finito. \square

Lema 4.7. *Se $\mathcal{S}f < 0$ e f possui finitos pontos críticos, então f^n possui finitos pontos fixos para todo $n \geq 1$.*

Demonstração. Pelo Lema 4.5, se f^n possui infinitos pontos fixos para algum $n \geq 1$, então f^n possui infinitos pontos críticos, o que é um absurdo pelo Lema anterior. \square

Teorema 4.8 (Singer). *Se $\mathcal{S}f < 0$ e f possui n pontos críticos, então f possui no máximo $n+2$ órbitas periódicas não repulsoras.*

Demonstração. Seja p um ponto periódico não repulsor de f de período m . Se $g = f^m$, então $g(p) = p$ e $|\partial g(p)| \leq 1$. Seja K a componente conexa de $\mathcal{B}(p) = \{x : \lim_{k \rightarrow \infty} g^k(x) = p\}$ que contém p . Inicialmente, suponha que K é limitado.

Se $|\partial g(p)| < 1$, então é possível mostrar que K é aberto, $g(K) \subset K$ e g preserva os pontos extremos de K .

Escrevendo $K = (a, b)$, se $g(a) = a$ e $g(b) = b$, então g possui ponto crítico em K pelo Lema 4.4; se $g(a) = b$ e $g(b) = a$, então g^2 possui ponto crítico em K pelo Lema 4.4; se $g(a) = g(b)$, então g possui ponto crítico em K pelo TVM.

Se $|\partial g(p)| = 1$, então os pontos fixos de g são isolados pelo Lema anterior e, portanto, existe uma vizinhança de p que não contém outros pontos fixos de g .

Suponha que $\partial g(p) = 1$. Se $\partial g(p) = -1$, a demonstração é análoga considerando g^2 . Se p possui o comportamento de um ponto repulsor, então, para x numa vizinhança de p , $g(x) > x$ quando $x > p$ e $g(x) < x$ quando $x < p$. Desse modo, 1 é um mínimo local de ∂g , o que é um

absurdo pelo Lema 4.3 e, portanto, p é atrator em pelo menos um dos lados. Desse modo, K é um intervalo, $g(K) \subset K$ e g preserva os pontos extremos de K . Assim, é possível concluir de maneira análoga que g possui ponto crítico em K .

Assim, cada intervalo K limitado está associado à algum ponto crítico de f e, portanto, existem no máximo n desses intervalos. Não é possível obter a mesma conclusão se K não é limitado, mas observando que existem no máximo dois intervalos desse tipo, a demonstração está concluída. \square

Corolário 4.9. *Se $\mu > 0$, então $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ possui no máximo 1 órbita periódica não repulsora.*

5 Matriz de Transição

Dizemos que A é uma matriz de transição, se $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ uma matriz quadrada de ordem N tal que $a_{ij} \in \{0, 1\}$ para todo $1 \leq i, j \leq N$. Se A é uma matriz de transição, definimos o conjunto Σ_A por

$$\Sigma_A = \{(x_0 x_1 x_2 \dots) \in \Sigma_N : a_{x_k x_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k \geq 0\}.$$

Observe que se $x \in \Sigma_A$, então $\sigma(x) \in \Sigma_A$. Desse modo, podemos definir a função $\sigma_A : \Sigma_A \rightarrow \Sigma_A$ como sendo a restrição de σ em Σ_A .

Proposição 5.1. *Σ_A é um subconjunto fechado de Σ_N .*

Demonstração. Seja $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ uma sequência de elementos em Σ_A convergente para $x \in \Sigma_N$. Vamos mostrar que $x \in \Sigma_A$.

Se $x = (\xi_0 \xi_1 \xi_2 \dots)$ e $x \notin \Sigma_A$, então existe $k \geq 0$ tal que $a_{\xi_k \xi_{k+1}} = 0$. Por outro lado, pela definição de convergência, existe $n_0 \geq 0$ tal que $d(x_{n_0}, x) < \frac{1}{N^{k+1}}$ e, portanto, as $k+2$ primeiras entradas de x e x_{n_0} são iguais. Escrevendo $x_{n_0} = (\eta_0 \eta_1 \eta_2 \dots)$, concluímos que $a_{\eta_k \eta_{k+1}} = a_{\xi_k \xi_{k+1}} = 0$, o que é um absurdo pois $x_{n_0} \in \Sigma_A$. \square

No restante dessa seção vamos estudar a dinâmica da função quadrática $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$, onde o parâmetro $\mu = 3.839$ está fixado. Será omitido μ na notação da função e escreveremos apenas F .

Se $a = 0.149888$, $\varepsilon = 10^{-3}$ e $I = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, então é possível mostrar que $F^3(I) \subset I$ e $|(F^3)'(I)| < 1$ e, portanto, o intervalo I possui um ponto periódico atrator de F de período principal 3. Se a_1 , a_2 e a_3 são os elementos dessa órbita em ordem crescente, então

$$a_1 \simeq 0.149888, \quad a_2 \simeq 0.489149 \quad \text{e} \quad a_3 \simeq 0.959299.$$

Pelo Teorema de Sharkovsky, F possui infinitos pontos periódicos. Além disso, pelo Teorema de Singer, essa é a única órbita atratora de F .

De modo análogo, concluímos que F possui outra órbita de tamanho 3. Se b_1 , b_2 e b_3 são os elementos dessa órbita em ordem crescente, então

$$b_1 \simeq 0.169040, \quad b_2 \simeq 0.539247 \quad \text{e} \quad b_3 \simeq 0.953837.$$

Observando o gráfico de F^3 , concluímos que para cada b_i , existe b'_i no lado oposto de b_i em relação ao ponto a_i tal que $F^3(b'_i) = b_i$. Defina $A_1 = (b'_1, b_1)$, $A_2 = (b'_2, b_2)$ e $A_3 = (b_3, b'_3)$. Cada A_i é exatamente o intervalo maximal contendo a_i utilizado na demonstração do Teorema de Singer.

Figura: Gráfico de F^3 com os pontos a_1 , a_2 e a_3 assinalados.

Sendo F^3 simétrica em relação ao ponto $\frac{1}{2}$, temos que $F(b'_2) = F(b_2) = b_3$. Além disso, podemos observar que $F(b'_1) = b'_2$ e $F(b'_3) = b'_1$ e, portanto, F mapeia de forma monótona A_1 em A_2 e A_3 em A_1 . Observando que o máximo de F em A_2 é $F(\frac{1}{2}) = 0.95975 < b'_3$, concluímos que $F(A_2) \subset A_3$.

Sabemos que se $x \notin [0, 1]$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(x) = -\infty$. Além disso, o único ponto periódico em A_i é a_i e todos os pontos em A_i tendem para a órbita de a_i . Desse modo, todos os outros pontos periódicos de F residem no complemento de $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ em $[0, 1]$, que é formado por quatro intervalos fechados. Sejam $I_0 = [0, b'_1]$, $I_1 = [b_1, b'_2]$, $I_2 = [b_2, b_3]$ e $I_3 = [b'_3, 1]$ tais intervalos. A Proposição a seguir nos permite dizer mais.

Proposição 5.2. *Se $x \notin \{0, a_1, a_2, a_3\}$ é um ponto periódico de F , então $x \in I_1 \cup I_2$.*

Demonstração. Observando que F é monótona em cada I_k , temos que $F(I_0) = I_0 \cup A_1 \cup I_1$, $F(I_1) = I_2$, $F(I_2) = I_1 \cup A_2 \cup I_2$ e $F(I_3) = I_0$. Desse modo, se $x \in I_1 \cup I_2$ é periódico, então órbita de x permanece em $I_1 \cup I_2$.

Por outro lado, se $x \in I_0 - \{0\}$, existe um menor $n \geq 1$ tal que $F^n(x) \notin I_0$. Se $F^n(x) \in A_1$, então x não pode ser periódico, pois o único ponto periódico de A_1 é a_1 . Se $F^n(x) \in I_1$, então x não pode ser periódico, pois caso contrário a órbita de x estaria contida em $I_1 \cup I_2$ e nunca retornaria para I_0 . Finalmente, se $x \in I_3$, então $F(x) \in I_0$ e a análise segue de maneira análoga. \square

Seja Λ o conjunto dado por

$$\Lambda = \{x \in I_1 \cup I_2 : F^n(x) \in I_1 \cup I_2 \text{ para todo } n \geq 1\}.$$

Pela Proposição anterior, todos os pontos periódicos de F estão em Λ , com exceção dos pontos 0 , a_1 , a_2 e a_3 .

Lema 5.3. *Existe $n_0 \geq 1$ tal que $|(F^n)'(\Lambda)| > 1$ para todo $n \geq n_0$.*

Demonstração. Inicialmente, podemos observar graficamente que $|F'(I_1 \cup I_2)| \geq \nu$ para algum $\nu \in (0, 1)$. Podemos observar também que o subconjunto de $I_1 \cup I_2$ no qual $|(F^3)'|$ é menor que ou igual à 1 é formado por três intervalos fechados e que cada um desses intervalos possui intersecção vazia com Λ e, portanto, $|(F^3)'(\Lambda)| \geq \lambda$ para algum $\lambda > 1$.

Por fim, sejam $x \in \Lambda$ e $K \geq 1$ tal que $\nu^2 \lambda^K > 1$. Se $n_0 = 3K$ e $n \geq n_0$, podemos escrever $n = 3L + \alpha$, onde $L \geq K$ e $0 \leq \alpha \leq 2$. Desse modo, se $\alpha = 0$, então $|(F^n)'(x)| = |(F^{3L})'(x)| \geq \lambda^L > 1$; se $\alpha = 1$, então $|(F^n)'(x)| = |F'(F^{3L}(x))| |(F^{3L})'(x)| \geq \nu \lambda^L > 1$; e se $\alpha = 2$, então $|(F^n)'(x)| = |F'(F^{3L+1}(x))| |F'(F^{3L}(x))| |(F^{3L})'(x)| \geq \nu^2 \lambda^L > 1$. \square

Lema 5.4. *Λ não contém intervalos.*

Demonstração. Suponha que exista $[a, b] \subset \Lambda$. Utilizando notação do Lema anterior, seja $n \geq n_0$ tal que $\nu^{n_0} \lambda^{n-n_0} (b-a) > 1$. Pelo TVM, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$\begin{aligned} |F^n(b) - F^n(a)| &= |(F^n)'(c)|(b-a) \\ &= \prod_{k=0}^{n_0-1} |F'(F^k(c))| \prod_{k=n_0}^{n-1} |F'(F^k(c))|(b-a) \\ &\geq \nu^{n_0} \lambda^{n-n_0} (b-a) > 1 \end{aligned}$$

e, portanto, $F^n(a)$ ou $F^n(b)$ não é elemento de $[0, 1]$, o que é um absurdo. \square

Para as demonstrações dos próximos resultados, vamos considerar a matriz de transição

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Seja $S : \Lambda \rightarrow \Sigma_A$ a função dada por $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$, onde $x_k = 1$ se $F^k(x) \in I_1$ e $x_k = 2$ se $F^k(x) \in I_2$ para todo $k \geq 0$. Observe que S está bem definida, pois $F(I_1) = I_2$ e $F(I_2) \subset I_1 \cup I_2$ e, portanto, $a_{x_k x_{k+1}} = 1$ para todo $k \geq 0$.

Proposição 5.5. $F|_\Lambda$ e σ_A são topologicamente conjugadas por S .

Demonstração.

a) S é injetora.

Sejam $x, y \in \Lambda$, $x < y$, e suponha que $S(x) = S(y)$. Desse modo, $F^n(x)$ e $F^n(y)$ está no mesmo lado em relação ao ponto crítico para todo $n \geq 0$ e, portanto, F é monótona em cada intervalo J_n cujos extremos são $F^n(x)$ e $F^n(y)$. Desse modo, se $z \in [x, y]$, então $F^n(z) \in J_n \subset I_1 \cup I_2$ para todo $n \geq 0$ e, portanto, $z \in \Lambda$, o que é um absurdo pois Λ não contém intervalos.

b) S é sobrejetora.

Seja $(x_0 x_1 x_2 \dots) \in \Sigma_A$. Inicialmente, para cada $n \geq 0$, considere

$$I_{x_0 \dots x_n} = \{x \in [0, 1] : x \in I_{x_0}, \dots, F^n(x) \in I_{x_n}\}.$$

Observe $I_{x_0 \dots x_n} = I_{x_0} \cap F^{-1}(I_{x_1 \dots x_n})$ e, portanto, é possível concluir por indução que $I_{x_0 \dots x_n}$ é um intervalo fechado não vazio. Além disso, $I_{x_0 \dots x_n} = I_{x_0 \dots x_{n-1}} \cap F^{-n}(I_{x_n}) \subset I_{x_0 \dots x_{n-1}}$.

Desse modo, $(I_{x_0 \dots x_n})_{n=0}^\infty$ é uma sequência de intervalos encaixantes fechados e não vazios e, portanto, existe $x \in \bigcap_{n=0}^\infty I_{x_0 \dots x_n}$. Como $F^k(x) \in I_{x_k}$ para todo $k \geq 0$, concluímos que $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$. Observe que x é único, pois S é injetora.

c) S é contínua.

Sejam $x \in \Lambda$, $\varepsilon > 0$ e $k \geq 0$ tal que $\frac{1}{N^k} < \varepsilon$. Se $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$, então $x \in I_{x_0 \dots x_k}$. Sendo $I_{x_0 \dots x_k}$ um intervalo fechado, existe $\delta > 0$ tal que se $y \in \Lambda$ e $|x - y| < \delta$, então $y \in I_{x_0 \dots x_k}$. Desse modo, $S(x)$ e $S(y)$ são iguais nas primeiras $k + 1$ entradas e, portanto, $d_N(S(x), S(y)) \leq \frac{1}{N^k} < \varepsilon$.

d) $S \circ F|_\Lambda = \sigma_A \circ S$.

Se $x \in \Lambda$ e $S(x) = (x_0 x_1 x_2 \dots)$, então $\cap_{n=0}^\infty I_{x_0 \dots x_n} = \{x\}$. Desse modo, é imediato que

$$S \circ F|_\Lambda(x) = S(F(\cap_{n=0}^\infty I_{x_0 \dots x_n})) = S(\cap_{n=1}^\infty I_{x_1 \dots x_n}) = (x_1 x_2 x_3 \dots) = \sigma_A \circ S(x).$$

□