

# 1 Definições elementares

Ao longo dessa seção  $I$  e  $J$  representarão intervalos fechados de  $\mathbb{R}$ .

**Definição 1.1** (Ponto periódico). *Sejam  $f : I \rightarrow J$  uma função,  $p \in I$  e  $n \geq 1$ . Dizemos que  $p$  é um ponto periódico de  $f$ , com período  $n$ , se  $f^n(p) = p$ . Se  $f^k(p) \neq p$  para todo  $1 \leq k < n$ , então  $n$  é chamado de período principal. Em particular, se  $n = 1$ , dizemos que  $p$  é um ponto fixo de  $f$ .*

**Definição 1.2** (Ponto eventualmente periódico). *Sejam  $f : I \rightarrow J$  uma função,  $p \in I$  e  $n \geq 1$ . Dizemos que  $p$  é um ponto eventualmente periódico de  $f$ , com período  $n$ , se existe  $m > 1$  tal que  $f^k(p) = f^{k+n}(p)$  para todo  $k \geq m$ . Em particular, se  $n = 1$ , dizemos que  $p$  é um ponto eventualmente fixo de  $f$ .*

**Teorema 1.3.** *Seja  $f : I \rightarrow I$  uma função contínua. Então  $f$  possui ponto fixo.*

*Demonstração.* Seja  $I = [a, b]$  e considere a função contínua  $g(x) = f(x) - x$  definida em  $I$ . Como  $f(a), f(b) \in I$ , temos que  $g(a) = f(a) - a \geq 0$  e  $g(b) = f(b) - b \leq 0$ . Pelo Teorema do Valor Intermediário, existe  $p \in I$  tal que  $g(p) = f(p) - p = 0$ . Desse modo,  $p$  é ponto fixo de  $f$ .  $\square$

**Teorema 1.4.** *Seja  $f : I \rightarrow I$  uma função  $C^1$ . Suponha que  $|f'(x)| < 1$  para todo  $x \in I$ . Então  $|f(x) - f(y)| < |x - y|$  para todo  $x, y \in I$ ,  $x \neq y$ . Além disso,  $f$  admite um único ponto fixo.*

*Demonstração.* Sejam  $x, y \in I$ ,  $x < y$ . Pelo Teorema do Valor Médio, existe  $c \in [x, y]$  tal que  $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$ . Portanto,  $|f(x) - f(y)| = |f'(c)||x - y| < |x - y|$ .

Pelo teorema anterior,  $f$  admite um ponto fixo  $p$ . Suponha que exista um ponto fixo  $q$  diferente de  $p$ . Então, pela primeira parte da demonstração,  $|p - q| = |f(p) - f(q)| < |p - q|$ . Absurdo.  $\square$

**Definição 1.5.** *Sejam  $f : I \rightarrow J$  uma função e  $x \in I$ . A órbita de  $x$  é o conjunto  $O(x) = \{x, f(x), f^2(x), \dots\}$ .*

**Definição 1.6.** *Sejam  $f : I \rightarrow J$  uma função,  $p$  um ponto periódico de período  $n$  e  $x \in I$ . Dizemos que  $x$  tende assintoticamente para  $p$  se a sequência  $(x, f^n(x), f^{2n}(x), \dots)$  tende para  $p$ . O conjunto  $W^s(p)$  dos pontos que tendem assintoticamente para  $p$  é chamado de conjunto estável de  $p$ .*

**Proposição 1.7.** *Os conjuntos estáveis de dois pontos periódicos distintos possuem intersecção vazia.*

*Demonstração.* Suponha que existam pontos periódicos distintos  $p$  e  $q$  de uma função  $f$ , de períodos  $m$  e  $n$  respectivamente, tais que  $W^s(p) \cap W^s(q) \neq \emptyset$ . Seja  $x \in W^s(p) \cap W^s(q)$ . Temos que  $|f^{km}(x) - p| \rightarrow 0$  e  $|f^{kn}(x) - q| \rightarrow 0$  quando  $k \rightarrow \infty$ .

Desse modo, dado  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $|f^{km}(x) - p| < \frac{\varepsilon}{2}$  e  $|f^{kn}(x) - q| < \frac{\varepsilon}{2}$  para todo  $k > N$ . Portanto,  $|p - q| = |p - f^{kmn}(x) + f^{kmn}(x) - q| \leq |f^{(kn)m}(x) - p| + |f^{(km)n}(x) - q| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ . Temos então que  $p = q$ , pois  $\varepsilon$  é arbitrário. Absurdo.  $\square$

O objetivo do estudo de Sistemas Dinâmicos é entender a natureza das órbitas, identificando os pontos que são periódicos, eventualmente periódicos, os que tendem assintoticamente, etc.