

乾眼處理

近視雷射手術前的乾眼治療方式



熱敷

可用攝氏約40度熱毛巾敷在眼睛上
10-20分鐘



人工淚液

緩解乾眼的不適



眼藥膏或凝膠

可於睡前使用



淚管栓塞

醫師會先使用暫時性、可溶解的栓塞



強脈衝光治療

(Intense Pulsed Light, IPL)

利用脈衝光導致熱能效應
幫助打通堵塞的瞼板
令油脂分泌回復正常
減少淚水蒸發



熱脈動治療

(LipiFlow)

消除瞼板腺的堵塞
為眼瞼提供溫和的熱量
同時進行溫和的按摩



保護型隱形眼鏡


減少外界摩擦與刺激，並達到維持濕潤環境、促進傷口癒合、暫時緩解疼痛




人工淚液

緩解乾眼的不適


近視雷射手術恢復三階段



近視雷射手術第二階段 穩定恢復期



近視雷射手術第二階段 不穩定恢復期



手術注意事項

術前一個月

術前一個月：
**停止配戴
隱形眼鏡**

讓角膜
回復原狀

軟式

停 2 週

硬式

..... 停 4 週以上

角膜塑型片

..... 停 4 週以上

確切術前準備，請依各院所醫師建議為主。

術前準備



請主動告知並使，若有服用高血壓、糖尿病等藥物，應照常服務



術前一晚需充足睡眠及放鬆心情



手術當天可採正常、清淡飲食



術前一天可洗頭，術後當天避免洗頭，以免水進入眼部



手術當天不可化妝，眼部不塗抹保養品，不使用任何香水經由、古龍水，衣著建議以寬鬆舒適為主，並不佩戴首飾



手術當日由一位家屬陪同協助辦理手續，並攜帶身分證與健保卡



可能會有稍微流淚、異物感、畏光、視力仍呈現模糊狀態等症狀，約4-6小時後會逐漸消失



須配戴護目鏡盡快回家休息



如有劇烈疼痛或任何異常現象，請儘速回診檢查

