

近視雷射手術第二階段

穩定恢復期

模糊感

夜間光暈

組織水腫夜間勢力產生光暈
光暈範圍隨時間縮小

術後七日回診

快

中等

緩慢


第二階段

a. 穩定恢復期

術後一日

術後一個月

近視雷射手術第二階段 不穩定恢復期



近視雷射手術恢復三個月後

PROVEN BY





術後一日

術後三個月

第二階段

a.穩定 / b.不穩定恢復期

第一階段


迅速恢復期

第三階段

乾眼恢復期

手術當日

術後一個月



近視雷射手術第二階段

穩定恢復期

模糊感

夜間光暈

組織水腫夜間勢力產生光暈
光暈範圍隨時間縮小

術後七日回診

快

中等

緩慢

第二階段

a.穩定恢復期

術後一日

術後一個月

POWERED BY MEDIFY

近視雷射手術第二階段

穩定恢復期

模糊感

夜間光暈

組織水腫夜間勢力產生光暈
光暈範圍隨時間縮小

術後七日回診

快

中等

緩慢

第二階段


a. 穩定恢復期

術後一日


術後一個月

POWERED BY MEDIFY


近視雷射手術第二階段 不穩定恢復期




近視雷射手術第二階段 不穩定恢復期




近視雷射手術恢復三階段



近視雷射手術第二階段 穩定恢復期



近視雷射手術第二階段 不穩定恢復期



乾眼處理

近視雷射手術前的乾眼治療方式



熱敷

可用攝氏約40度熱毛巾敷在眼睛上
10-20分鐘



人工淚液

緩解乾眼的不適



眼藥膏或凝膠

可於睡前使用



淚管栓塞

醫師會先使用暫時性、可溶解的栓塞



強脈衝光治療

(Intense Pulsed Light, IPL)

利用脈衝光導致熱能效應
幫助打通堵塞的瞼板
令油脂分泌回復正常
減少淚水蒸發



熱脈動治療

(LipiFlow)

消除瞼板腺的堵塞
為眼瞼提供溫和的熱量
同時進行溫和的按摩



保護型隱形眼鏡

減少外界摩擦與刺激，並
達到維持濕潤環境、促進
傷口癒合、暫時緩解疼痛



人工淚液

緩解乾眼的不適

