

眼袋手術衛教教材

眼袋不是
只有脂肪多

眼袋手術
術前評估
看什麼？

不同族群
手術設計不同


只取脂
vs
脂肪轉移
差在哪？

眼袋手術
恢復時間軸




眼袋不是只有脂肪多

下眼瞼周圍常見問題



脂肪的總量並未增加，
而是**重新分布**！


手術不只是移除脂肪
而是調整脂肪的位置



- ⚙️ 釋放向前突出的脂肪
- ⚙️ 鬆開相關韌帶
- ⚙️ 將脂肪重新分配至眶緣下方凹陷區

只取脂 vs 脂肪轉移 差在哪？

眼袋**移除**手術



只把眼袋凸出的脂肪拿掉

處理重點

移除凸出的
眼袋脂肪


重分配
眼袋脂肪

常見適合情況

下眼凹陷不
明顯、結構
支撐尚可





眼袋
合併淚溝
或眼下凹陷

眼袋**轉移**手術



將眼袋脂肪分離出來 回填至淚溝處

不同族群，手術設計不同

類型	年輕族群		中年族群		老年族群		合併中臉下垂	
術前／術後	手術前	手術後	手術前	手術後	手術前	手術後	手術前	手術後
								
								
常見設計方向	內開		內開 ＋ 皮膚調整		外開		外開 ＋ 中臉拉提	
評估重點	脂肪脫垂 程度		皮膚鬆弛 程度		外拉 與 回彈測試		中臉支撐 狀況	

眼袋手術恢復時間軸

第一階段

術後 0-3 天

- 腫脹最明顯
- 冰敷 4-6 次
- 少量滲血屬正常



第二階段

術後 1 週內


- 規律用藥
- 傷口清潔
- 觀察紅腫與分泌物



第三階段

術後 1 週 - 1 個月

- 可開始溫敷
- 局部硬塊可觀察
- 輕微不對稱可觀察



第四階段

術後 3 - 6 個月

- 結果穩定期
- 組織完全修復



眼袋手術，術前評估看什麼？




下眼瞼外拉測試與回彈測試

評估下眼瞼的彈性與支撐力，是否需術中預防術後外翻。



外眼角

眶緣




下眼瞼

眼中膈

眼袋脂肪

中臉支撐

評估蘋果肌、骨架支撐度，決定是否需合併補脂或中臉拉提。



提拉方向

眼輪匝肌
下脂肪

顴骨脂肪墊



皮膚鬆弛程度

決定手術切口位置（內開或外開）及是否需修皮。

潛在疾病

確認血壓控制、凝血功能及是否有相關藥物過敏。

