

# 方差分析

---

## 单因素试验的方差分析

背景

为什么是方差分析？

为什么不直接比较均值？

为什么不用 t 检验？

前提假设

原假设

平方和的分解

自由度

分布与期望

拒绝域

## 双因素试验的方差分析

双因素等重复试验的方差分析—有相互作用

前提

参数与记号

假设

双因素试验的方差分析表

拒绝域

双因素无重复试验的方差分析—无相互作用

前提

参数与记号

假设

双因素试验的方差分析表

拒绝域

## 单因素试验的方差分析

## 背景

首先来说说我们为什么要用单因素方差分析 (one-way ANOVA)。在做一些实验时，我们通常会把样本分成不同的组，给予不同的对待。例如，我们想研究某种药物在不同剂量下对人们的作用。我们可能会将病人随机分为同等大小的三组，A 组每天吃一片，B 组每天吃两片，C 组每天吃三片。因为我们只研究这个药品计量对病人的影响，所以是单因素分析，如果想要加入别的因素，例如，年龄，就需要用到多因素分析了。在上述实验中，我们给了三种不同的计量，所以这个药物计量因素下有三个水平 (level)。实验结束以后，你老板问你，这三组病人的表现有显著的区别吗？这个时候，你就可以使用 ANOVA 来回答你老板的问题啦。

虽然 ANOVA 叫做方差分析，但是他的目的是**检验每个组的平均数是否相同**（敲黑板！）。也就是说，ANOVA 的零假设 (null hypothesis) 是  $H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C$ 。现在，我们换一个角度考虑这个问题，如果这三组病人的表现并没有显著的区别，那他们其实是同一个总体的三次随机抽样。反过来说，我们想要分析，是不是有一组病人他们的表现非常与众不同，让这组病人不是来自同一个总体。

## 为什么是方差分析？

### 为什么不直接比较均值？

举个例子， $A_1$  组：29, 30, 31； $A_2$  组：3, 31, 41。 $A_1$  组均值为 30， $A_2$  组均值 25，看起来  $A_1$  组大一些，但实际上  $A_2$  组有两个值都大于  $A_1$  组。

这是因为，不同组极端值可能会影响到均值，从而给判断造成误导。

### 为什么不用 t 检验？

我们有一个样本后进行一次 t 检验，在这里，每一组就相当于一个样本，那么比如有三组， $C_3^1$  就要做 3 次独立的 t 检验。但是 t 检验是每次给定一个显著性水平，比如我们给定  $\alpha = 0.05$ ，也就是每次犯错的概率为 0.05，那么每次不犯错的概率是 0.95，三次不犯错的概率为  $0.95^3 = 0.857375$ ，那么我们犯错的概率就高达 0.142625。

而方差分析是一次检验，犯错的概率就小很多，但方差分析也有局限性，它只能检验各组之间的均值是否有差异，并不能给出谁大谁小，所以，适当时候有必要方差分析后，再进行  $t$  检验。

## 前提假设

在具体说如何理解 ANOVA 之前，我们先来说 ANOVA 有哪些假设。如果你的实验不能满足 ANOVA 的假设，那你需要考虑别的分析方法或者改变实验设计。ANOVA 主要有以下 3 个假设：

1. **方差的同质性 (homogeneity of variance)**。可以理解为每组样本背后的总体（也叫族群）都有相同的方差；
2. **族群遵循正态分布**；
3. **每一次抽样都是独立的**。在我们的例子中，每一个病人只能提供一个数据。对于一些实验一个样本需要提供多个数据，有其他相应的 ANOVA 分析方法。


## 原假设

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_s$$


$$H_1 : \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s \text{ 不全相等}$$

## 平方和的分解

假设我们得到的抽样结果是这样的：



知乎 @养了两只小短腿



知乎 @养了两只小短腿

现在，我们终于可以来看方差分析。首先我们来看单因素试验方差分析表：

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素 A	$S_A$	$s-1$	$\bar{S}_A = \frac{S_A}{s-1}$	$F = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
误差	$S_E$	$n-s$	$\bar{S}_E = \frac{S_E}{n-s}$	
总和	$A_T$	$n-1$ (即总样本方差自由度)		

总偏差平方和：
$$S_T = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X})^2$$

我们可以将其分解：

$$\begin{aligned} S_T &= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} [(X_{ij} - \bar{X}_{\bullet j}) + (\bar{X}_{\bullet j} - \bar{X})]^2 \\ &= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\bullet j})^2 + \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{X}_{\bullet j} - \bar{X})^2 \\ &= S_E + S_A \end{aligned}$$

$S_E$ ：误差平方和

$S_A$ ：效应平方和

## 自由度

$S_E$ ：比较简单的理解方法是，每组（即每个  $j$ ）是  $n_j - 1$ ,  $s$  个组一共  $n-s$ ；

$S_A$ ：比较简单的理解方法是，将每组数据的均值看成一个数据，共  $s$  个，求这  $s$  个数据的方差，方差自由度为  $s-1$ （实际需要严谨的证明）；

## 分布与期望

$S_E$

由于  $\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_{ij} - \bar{X}_{\bullet j})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_j - 1)$ ，且各  $X_{ij}$  相互独立，由卡方分布可加性知  $\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - s)$ ，这也再次说明误差平方和的自由度为  $n-s$ 。

故  $E(S_E) = (n - s)\sigma^2$

$S_A$

可以推出（过程略）  $E(S_A) = (s-1)\sigma^2 + \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2$ ，其中  $\{\delta_j\} = \{\mu_j - \mu\}$ 。

进一步还有：

1.  $S_A$  与  $S_E$  独立；
2. 当  $H_0$  为真时， $\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(s-1)$ 。

## 拒绝域

从上一小节分布和期望，我们可以总结以下几点：

1.  $S_A$  与  $S_E$  独立；
2.  $\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-s)$ ，因此无论  $H_0$  是否为真， $E(S_E) = (n-s)\sigma^2$ ；
3. 只有当  $H_0$  为真时， $\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(s-1)$ ， $E(S_A) = (s-1)\sigma^2$ ；而当  $H_1$  为真时，

$$E(S_A) = (s-1)\sigma^2 + \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 > (s-1)\sigma^2 ;$$

而两个独立方差一般用F检验，所以我们考虑统计量：

$$F = \frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)} = \frac{S_A/\sigma^2}{s-1} / \frac{S_E/\sigma^2}{n-s}$$

也就是说，当  $H_0$  不真  $H_1$  为真时，分子的取值有偏大的趋势，于是拒绝域形式：

$$F = \frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)} \geq k$$

而由  $S_A$  与  $S_E$  独立，当  $H_0$  为真时，统计量所满足的分布：

$$F \sim F(s-1, n-s)$$

于是，我们加上弃真概率  $\alpha$ ，可以得到拒绝域：

$$F = \frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)} \geq F(s-1, n-s)$$

其实，这里的分子和分母就是其他常见解释中的 MSB 和 MSE：

平方和	表达式	均方	方差	简称	表达式	缩写
$S_A$	$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\bullet j})^2$	$\frac{S_A}{s-1}$	MSB	组间方差	$\frac{\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\bullet j})^2}{n-s}$	Square Between
$S_E$	$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_j} (\bar{X}_{\bullet j} - \bar{\bar{X}})^2$	$\frac{S_E}{s-1}$	MSE	组内方差	$\frac{\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_j} (\bar{X}_{\bullet j} - \bar{\bar{X}})^2}{s-1}$	Square Error

## 双因素试验的方差分析

### 双因素等重复试验的方差分析—有相互作用

#### 前提

- 1.  $A, B$  两因素作用与试验的指标；
- 2.  $A$  有  $r$  个水平；
- 3.  $B$  有  $s$  个水平；
- 4. 对  $A, B$  的水平的每对组合都做  $t(t \geq 2)$  次试验（称为等重复试验）。
- 5.  $A, B$  之间可能有相互作用。

#### 参数与记号

$$X_{ijk} \sim N(\mu_{ij}, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s; k = 1, 2, \dots, t$$

$\mu_{ij}, \sigma^2$  均为未知参数

$$\text{总平均 } \mu = \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \mu_{ij}$$

$$\mu_{i\bullet} = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, i = 1, 2, \dots, r$$

$$\mu_{\bullet j} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \mu_{ij}, j = 1, 2, \dots, s$$

水平  $A_i$  的效应  $\alpha_i = \mu_{i\bullet} - \mu, i = 1, 2, \dots, r$

水平  $B_j$  的效应  $\beta_j = \mu_{\bullet j} - \mu, j = 1, 2, \dots, s$

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\mu_{ij} - \mu_{i\bullet} - \mu_{\bullet j} + \mu) = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij}$$

$$\sum_{i=1}^r a_i = 0$$

$$\sum_{j=1}^s \beta_j = 0$$

$$\sum_{i=1}^r \gamma_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, s$$

$$\sum_{j=1}^s \gamma_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, r$$

总结：

$$X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

$\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$ , 各  $\varepsilon_{ij}$  独立

$i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s; k = 1, 2, \dots, t$

$$\sum_{i=1}^r a_i = 0, \sum_{j=1}^s \beta_j = 0, \sum_{i=1}^r \gamma_{ij} = 0, \sum_{j=1}^s \gamma_{ij} = 0$$

假设



$$H_{01} : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0$$

$$H_{11} : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \text{不全为} 0$$

$$H_{02} : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_s = 0$$

$$H_{12} : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \text{不全为} 0$$

$$H_{03} : \gamma_{11} = \gamma_{12} = \dots = \gamma_{rs} = 0$$

$$H_{13} : \gamma_{11}, \gamma_{12}, \dots, \gamma_{rs} \text{不全为} 0$$

## 双因素试验的方差分析表

与单因素情况类似，对这些问题的检验方法也是建立在平方和的分解上的，思路是一样的，但由于较复杂，我们直接给出方差分析表：

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	$S_A$	$r-1$	$\bar{S}_A = \frac{S_A}{r-1}$	$F_A = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素B	$S_B$	$s-1$	$\bar{S}_B = \frac{S_B}{s-1}$	$F_B = \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
交互作用	$S_{A \times B}$	$(r-1)(s-1)$	$\bar{S}_{A \times B} = \frac{S_{A \times B}}{(r-1)(s-1)}$	$F_{A \times B} = \frac{\bar{S}_{A \times B}}{\bar{S}_E}$
误差	$S_E$	$rs(t-1)$	$\bar{S}_E = \frac{S_E}{rs(t-1)}$	
总和	$S_T$	$rst-1$		

## 拒绝域

同单因素方差分析类似，这里只做总结：

$$1. \text{ 当 } H_{01} \text{ 为真时, 可以证明 } F_A = \frac{S_A/(r-1)}{S_E/(rs(t-1))} \sim F(r-1, rs(t-1))$$

$$\text{取显著性水平为 } \alpha, \text{ 得到假设 } H_{01} \text{ 的拒绝域为: } F_A = \frac{S_A/(r-1)}{S_E/(rs(t-1))} \geq F(r-1, rs(t-1))$$

2. 当  $H_{02}$  为真时, 可以证明  $F_B = \frac{S_B/(s-1)}{S_E/(rs(t-1))} \sim F(s-1, rs(t-1))$

取显著性水平为  $\alpha$ , 得到假设  $H_{02}$  的拒绝域为:  $F_B = \frac{S_B/(s-1)}{S_E/(rs(t-1))} \geq F(s-1, rs(t-1))$

3. 当  $H_{03}$  为真时, 可以证明  $F_{A \times B} = \frac{S_{A \times B}/((r-1)(s-1))}{S_E/(rs(t-1))} \sim F((r-1)(s-1), rs(t-1))$

取显著性水平为  $\alpha$ , 得到假设  $H_{03}$  的拒绝域为:

$$F_{A \times B} = \frac{S_{A \times B}/((r-1)(s-1))}{S_E/(rs(t-1))} \geq F((r-1)(s-1), rs(t-1))$$

## 双因素无重复试验的方差分析—无相互作用

### 前提

1. A, B两因素作用与试验的指标;
2. A有r个水平;
3. B有s个水平;
4. 对A, B的水平每对组合都做1次试验。
5. A, B之间不存在相互作用或很小可以忽略。

### 参数与记号

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

$$\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2), \text{ 各 } \varepsilon_{ijk} \text{ 独立}$$

$$i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$$

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \sum_{j=1}^s \beta_j = 0$$

### 假设

$$H_{01} : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0$$

$$H_{11} : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \text{不全为} 0$$

$$H_{02} : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_s = 0$$

$$H_{12} : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \text{不全为} 0$$

## 双因素试验的方差分析表

与单因素情况类似，对这些问题的检验方法也是建立在平方和的分解上的，思路是一样的，但由于较复杂，我们直接给出方差分析表：

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	$S_A$	$r-1$	$\bar{S}_A = \frac{S_A}{r-1}$	$F_A = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素B	$S_B$	$s-1$	$\bar{S}_B = \frac{S_B}{s-1}$	$F_B = \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
误差	$S_E$	$(r-1)(s-1)$	$\bar{S}_E = \frac{S_E}{(r-1)(s-1)}$	
总和	$S_T$	$rs-1$		

## 拒绝域

同单因素方差分析类似，这里只做总结：

$$1. \text{ 当 } H_{01} \text{ 为真时, 可以证明 } F_A = \frac{S_A/(r-1)}{S_E/((r-1)(s-1))} \sim F(r-1, (r-1)(s-1))$$

$$\text{取显著性水平为 } \alpha, \text{ 得到假设 } H_{01} \text{ 的拒绝域为: } F_A = \frac{S_A/(r-1)}{S_E/((r-1)(s-1))} \geq F(r-1, (r-1)(s-1))$$

$$2. \text{ 当 } H_{02} \text{ 为真时, 可以证明 } F_B = \frac{S_B/(s-1)}{S_E/((r-1)(s-1))} \sim F(s-1, (r-1)(s-1))$$

$$\text{取显著性水平为 } \alpha, \text{ 得到假设 } H_{02} \text{ 的拒绝域为: } F_B = \frac{S_B/(s-1)}{S_E/((r-1)(s-1))} \geq F(s-1, (r-1)(s-1))$$