

## Tam Diferansiyel


Bir  $f$  fonksiyonunun tam diferansiyeli (total differential) o fonksiyonun lineerlestirilmesi anlamına gelir. İki degiskenli bir fonksiyon için şöyle temsil edilir:

$$df = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy$$

Bu formu nasıl turetiriz? Bize lazım olan lineerlestirme formulasyonu. Tek degiskenli bir fonksiyonu lineerlestirmenin tekniği şudur:

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Burada  $L(x)$  gerçek fonksiyonu yaklaşıksal (approximate) olarak temsil eden lineer fonksiyondur.



Bu fonksiyonu genişleterek iki degiskenli hale getirelim (sadece  $y$  ekleyeceğiz)

$$L(x, y) = f(x_0, y) + f_x(x_0, y)\Delta x$$

Bu fonksiyon da bir önceki kadar “geçerli”. Sonuçta fonksiyonlar noktasal değerlere göre sonuç verirler, bu sebeple bir lineerlestirme işlemi 2 boyutlu ortamda herhangi bir  $x$  noktasında yapılabildiği gibi, herhangi bir  $x, y$  noktasında da yapılabilir.

Şimdi üstteki denklemin sağ tarafında yer alan  $f(x_0, y)$ ’yi lineerlestirelim.

$$L(x, y) = L(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)\Delta y + f_x(x_0, y_0)\Delta x$$

Artık  $L(x_0, y_0)$ ’yi sol tarafa taşıyabiliriz:

$$\Delta L = L(x, y) - L(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0)\Delta y + f_x(x_0, y_0)\Delta x$$

$\Delta L$  yani  $df$  istediğimiz tam diferensiyel sonucudur,  $\Delta x$  yerine  $dx$ ,  $\Delta y$  yerine  $dy$  kullanabiliriz, o zaman bastaki formun aynısını elde etmiş oluruz.

Turetirirken kullandığımız numarayı üç, dört, vs. gibi istediğimiz kadar degisken taşıyan  $f$  fonksiyonları için yapabiliriz, ve sonuç üstteki forma benzer olurdu. Her degiskenin kısmi turevi o degiskenin sonsuz ufaklıktaki “degisimi” ile carpilip, o carpimlar toplanınca elimize tam diferansiyel geciyor.

Kaynaklar

