

### MIT OCW Çok Degiskenli Calculus - Ders 3


Capraz carpimlar hakkında bilinmesi gereken bazi sasirtici gelebilecek kurallar var. Bunlardan bir tanesi  $\vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$ . Niye boyle? Bunu gormenin yollarından bir tanesi geometrik olarak dusunmek. Sag el kuralini dusunursek, yonun niye farkli olabilecegini anlariz. Isaretler tam terstir, yani  $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$

Determinant acilimini da dusunursek, ikinci terim eksi isareti tasir, ama carpim sirasi degisince eksi isaretinin yeri degisir.


Peki  $\vec{A} \times \vec{A}$  nedir? Capraz carpim alan hesabinda onemli olduguna gore ve  $\vec{A} \times \vec{A}$ 'in bir parallelogram yaratmayacagina gore (ya da sifir alanli bir parallelogram yaratacagina gore) cevap sifir, daha dogrusu sifir “vektoru” (o vektorun buyuklugu de tabii ki sifir).

#### Uygulamalar

Diyelim ki bize uzayda 3 nokta verildi, ve bu noktaları içeren bir düzlemin formülünü bulmamız gerekiyor. 3 nokta 3 boyutlu uzayda bir düzlem yaratmak için yeterli, bunu biliyoruz. Bunun için bir dördüncü nokta  $P$  hayal edelim ki bu noktanın ogeler  $x, y, z$  olsun.



Simdi düzlemi tanımlayalım. Su sekilde 3 tane vektor yaratalim




Bu vektorlerin ayni düzlem üzerinde olması, ayni zamanda bu vektorlerin tanımladigi paraleliple'nin hacimsiz olması demektir. Yani birisi üzerinden bastirip onu dümdüz etmistir sanki, sadece alanı kalmistir.

Bunu formüsel olarak soylemenin yolu sudur:

$$\det(\vec{P_1P}, \vec{P_2P}, \vec{P_3P}) = 0$$

Gerçek uygulama bağlamında problem bize  $P_1, P_2, P_3$  sayılarını vermiş olacaktı bu sayıları üstteki formüle yerleştirdik, tanımsız olan sadece  $x, y, z$  kalırdı, ve bu  $x, y, z$ 'ler ile beraber elde edilecek formül bu noktaların tanımladığı alan olurdu.

Bu hesabi daha da hızlı yapmanın bir yolu var. Alttaki resmi düşünelim.



Resme bakalım. Düzlem üzerindeki iki vektöre dik bir  $\vec{N}$ 'i nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz (çarpaz çarpım ile). Devam edelim,  $x, y, z$  değişkenlerini içeren üçüncü bir vektör  $\vec{P_1P}$ 'in aynı düzlemde olması demek, bu  $\vec{N}$  vektörüne dik olması demektir ( $\vec{N}$  “normal vektör” olarak isimlendirilir). Bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? Dikliğin formülse karşılığını biliyoruz, noktasal çarpım sıfır olmalı.

$$\vec{P_1P} \cdot \vec{N} = 0$$

$\vec{N}$  hesabi için

$$\vec{N} = \vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_3}$$

Bu kadar.

Ek not, eğer çarpaz çarpımın sırasını değiştirmiş olsaydım, o zaman üstteki hesabın ters yönünde bir başka dik vektör elde ederdim, düzlem yine aynı olurdu, sadece başka bir normal vektör olurdu. Bu problem değil, herhangi bir düzlemin sonsuz sayıda normal vektörü olabilir. Elde ettiğimiz bir normal vektörü herhangi bir sabit ile çarpınca yeni bir normal vektör elde etmiş olurum çünkü.

$$\vec{P_1P} \cdot \vec{N} = \vec{P_1P} \cdot (\vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_3})$$

Esitliğin sağındaki çarpıma uclu çarpım (triple product) deniyor.

Son formülü takip edersek determinant sıfırlığı üzerinden tanımlanan diğer

formul ile ayni sonucu getirdigini gorurduk.