PDE - Ders 2

Denklem soyle idi

$$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y + c(x,y)u = f(x,y)$$

Bu denklem homojen degil, cunku denklemin sol tarafi $f \neq 0$, homojenlik icin nihai test tabii ki u=0 koyunca 0=0 cikip cikmayacagi.

Cozum icin kullandigimiz fikir neydi? Kordinat sistemini transform etmek, ki

$$(x,y) \to (\xi(x,y),\eta(x,y))$$

olsun. Bu degisimi yaparken oyle bir degisim ariyoruz ki boylece transform edilmis PDE'miz cozulmesi kolay bir hale gelsin.

Amac

Denklemi sadece tek bir bagimsiz degiskene gore turevi icerecek sekilde yazmak

$$w_{\xi} + h(\xi, \eta)w = R(\xi, \eta)$$

$$w \equiv u \left(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta) \right)$$

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x \neq 0$$

Turev Transformasyonu

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \partial_{\xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \partial_{\eta}$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial \xi}{\partial y} \partial_{\xi} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \partial_{\eta}$$

Bunu yapinca PDE su hale gelecek

$$a\left[a\xi_x + b\xi_y\right]w_{\xi} + a\left[a\eta_x + b\eta_y\right]w_{\eta} + cw = f$$

Simdi η kordinatini oyle bir sekilde secmek istiyoruz ki ustteki sag koseli parantez icindeki terimler yokolsun. Boylece PDE'yi ξ bir ODE'ye indirgemis

oluruz. Bunu elde edince entegrasyon kolaylca yapilabilir.

$$a\eta_x + b\eta_y = 0$$

$$= > \frac{\eta_x}{\eta_y} = -\frac{b(x, y)}{a(x, y)}$$

Yani ikinci kordinat sistemi her ne ise, onun ortaya cikardigi kismi turevlerinin birbirine orani katsayi fonksiyonlarinin oraninin negativine esit.