Polinom Bolmek

Dogal sayilari bolmek icin kullandigimiz bolme yonteminin (long division) benzerini polinomlar icin de kullanabiliriz. Dogal sayilar icin bir ornek mesela 146 / 4 diyelim, once bolumde 3 olacagini tahmin ederiz, $3 \times 4 = 12$, bolunende 14 var, 14-12=2. Sonra bu 2'yi alip bolumde kalan 6 ile birlestiririz, 26 yapariz, daha dogrusu 2*10 + 6 deriz. Devam ederiz.

Polinom bolerken benzer bir durum var, mesela $6x^3 - 16x^2 + 17x - 6$ polinomunu 3x - 2 ile bolelim. Bu bolme islemi su sekilde gosterilir, bolunen yukarida degil asagida. Notasyon biraz degisik ama onemli degil.

$$3x-2$$
) $6x^3-16x^2+17x-6$

Once $6x^3$ 'u 3x ile boluyoruz. Sonuc $2x^2$. Onu alip cizgi isaretinin ustune yaziyoruz.

$$3x-2) \overline{6x^3 - 16x^2 + 17x - 6}$$

Sonra ilginc bir hareket, $2x^2$ 'i alip hem 3x ile, hem de -2 ile carpiyoruz, sonucu bolunen polinomun altina yaziyoruz,

$$\begin{array}{r}
2x^2 \\
3x-2) \overline{\left(6x^3 - 16x^2 + 17x - 6\right)} \\
-6x^3 + 4x^2
\end{array}$$

ve cikartma islemi yapiyoruz.

Ve islem bu sekilde devam ediyor.

$$\begin{array}{r}
2x^2 - 4x + 3 \\
3x - 2) \overline{)6x^3 - 16x^2 + 17x - 6} \\
\underline{-6x^3 + 4x^2} \\
-12x^2 + 17x \\
\underline{-12x^2 - 8x} \\
9x - 6 \\
\underline{-9x + 6} \\
0
\end{array}$$

Bolme islemi tamamen sifira gitmeyebilir. Mesela $3x^3 - 2x^2 + 4x - 3$ ile $x^2 + 3x + 3$ bolunurse

$$\begin{array}{r}
3x - 11 \\
x^2 + 3x + 3) \overline{)3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \\
-3x^3 - 9x^2 - 9x \\
-11x^2 - 5x - 3 \\
\underline{)11x^2 + 33x + 33} \\
28x + 30
\end{array}$$

Geriye 28x + 30 kalacaktir. Geri kalan oldugu zaman da bu aslinda ise yarayan bir sonuctur, artik eski polinomu su sekilde ifade edebiliriz

$$= (3x - 11) + \frac{28x + 30}{x^2 + 3x + 3}$$

Bu polinomda bolum 1. derece, bolen 2. derecedir, fakat orijinal polinom 3. dereceden idi. Yani derece sayisinda bir dusus yasandi, yani bir basitlestirme elde edildi.