## Polinom Bolmek

Dogal sayilari bolmek icin kullandigimiz bolme yonteminin (long division) benzerini polinomlar icin de kullanabiliriz. Dogal sayilar icin bir ornek mesela 146 / 4 diyelim, once bolumde 3 olacagini tahmin ederiz,  $3 \times 4 = 12$ , bolunende 14 var, 14-12=2. Sonra bu 2'yi alip bolumde kalan 6 ile birlestiririz, 26 yapariz, daha dogrusu 2\*10 + 6 deriz. Devam ederiz.

Polinom bolerken benzer bir durum var, mesela  $6x^3 - 16x^2 + 17x - 6$  polinomunu 3x - 2 ile bolelim. Bu bolme islemi su sekilde gosterilir, bolunen yukarida degil asagida. Notasyon biraz degisik ama onemli degil.

$$3x-2)$$
  $6x^3-16x^2+17x-6$ 

Once  $6x^3$ 'u 3x ile boluyoruz. Sonuc  $2x^2$ . Onu alip cizgi isaretinin ustune yaziyoruz.

$$3x - 2) \overline{6x^3 - 16x^2 + 17x - 6}$$

Sonra ilginc bir hareket,  $2x^2$ 'i alip hem 3x ile, hem de -2 ile carpiyoruz, sonucu bolunen polinomun altina yaziyoruz,

$$3x - 2) \overline{ 6x^3 - 16x^2 + 17x - 6 \atop -6x^3 + 4x^2}$$

ve cikartma islemi yapiyoruz.

$$\begin{array}{r}
2x^2 \\
3x - 2) \overline{)6x^3 - 16x^2 + 17x - 6} \\
\underline{-6x^3 + 4x^2} \\
-12x^2 + 17x
\end{array}$$

Ve islem bu sekilde devam ediyor.

$$\begin{array}{r}
2x^2 - 4x + 3 \\
3x - 2) \overline{)6x^3 - 16x^2 + 17x - 6} \\
\underline{-6x^3 + 4x^2} \\
-12x^2 + 17x \\
\underline{-12x^2 - 8x} \\
9x - 6 \\
\underline{-9x + 6} \\
0
\end{array}$$

Bolme islemi tamamen sifira gitmeyebilir. Mesela  $3x^3 - 2x^2 + 4x - 3$  ile  $x^2 + 3x + 3$  bolunurse

$$\begin{array}{r}
3x - 11 \\
x^2 + 3x + 3) \overline{\smash)3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \\
- 3x^3 - 9x^2 - 9x \\
\hline
- 11x^2 - 5x - 3 \\
\underline{11x^2 + 33x + 33} \\
28x + 30
\end{array}$$

Geriye 28x + 30 kalacaktir. Geri kalan oldugu zaman da bu aslinda ise yarayan bir sonuctur, artik eski polinomu su sekilde ifade edebiliriz

$$= (3x - 11) + \frac{28x + 30}{x^2 + 3x + 3}$$

Bu polinomda bolum 1. derece, bolen 2. derecedir, fakat orijinal polinom 3. dereceden idi. Yani derece sayisinda bir dusus yasandi, yani bir basitlestirme elde edildi.