PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION · AIDE-MÉMOIRE

Calendrier de vaccination de la femme (Td)

Femmes en âge de procréer et femmes enceintes · Vaccin antitétanique et antidiphtérique

1 Schéma Td : femme non vaccinée ou statut inconnu



DOSE	QUAND L'ADMINISTRER	DURÉE DE PROTECTION
Td1	Au premier contact, ou dès que possible pendant la grossesse	Aucune
Td2	Au moins 4 semaines après Td1 (au plus tard 2 semaines avant l'accouchement)	3 ans
Td3	Au moins 6 mois après Td2, ou pendant la grossesse suivante	Au moins 5 ans
Td4	Au moins 1 an après Td3, ou pendant la grossesse suivante	Au moins 10 ans
Td5	Au moins 1 an après Td4, ou pendant la grossesse suivante	Toute la période de procréation

2 Femme partiellement vaccinée dans l'enfance (selon le carnet)

DOSES REÇUES DANS L'ENFANCE	PENDANT LA GROSSESSE ACTUELLE	PLUS TARD (AU MOINS 1 AN APRÈS)
3 doses (primovaccination)	2 doses de Td à 4 semaines d'intervalle	1 dose de Td
4 doses	1 dose de Td	1 dose de Td
5 doses	1 dose de Td	Aucune
6 doses	Aucune	Aucune

0,5 ml	IM	Deltoïde gauche	+2 °C à +8 °C
Dose	Voie intramusculaire	Site d'injection	Conservation, ne pas congeler

Source : Guide PNI « Vaccination antitétanique : passage du VAT au Td », Ministère de la Santé, octobre 2020. Le calendrier national en vigueur reste la référence.