ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

المملكة المغربية

وزارة الصحة

Stratégie Nationale de Nutrition

Programme de Prévention et de la Lutte Contre les Carences en Micronutriments



Calendrier National de supplémentation

unicef

وزارة الصحة
Ministère de la Santé
Direction de la Population



Le nouveau calendrier de supplémentation établi par le Ministère de la Santé est comme suit :

I- Supplémentation préventive chez les enfants de moins de 2 ans en Vitamines A et D

Supplément	Tranches d'âge				Observations
	A la naissance	A 6 mois	A 12 mois	A 18 mois	
Vitamine D	200 000 UI	200 000 UI			- Donner une ampoule de 200 000 UI ou le 1/3 de l'ampoule de 600 000 UI.
Vitamine A		100 000 UI	200 000 UI	200 000 UI	

II- Supplémentation curative chez les enfants de moins de 5 ans en Zinc et Vitamine A

Supplémentation en Zinc		
Pathologie	Tranche d'âge	
	Enfants de moins de 6 mois	Enfants de plus de 6 mois
Diarrhée	10 mg/j Durée de traitement : 10 à 14 jours	20 mg /j Durée de traitement : 10 à 14 jours
L'utilisation combinée de Zinc et des SRO basse osmolarité réduit le volume et la fréquence des épisodes diarrhéiques chez l'enfant de 2 mois à 5 ans et prévient l'apparition de nouveaux épisodes pour une durée allant jusqu'à 3 mois		

Supplémentation en Vitamine A		
Pathologie	Tranches d'âge	
	Enfants de 6 à 11 mois révolus	Enfants de 12 mois et plus
Rougeole	Une dose de 100 000 UI à J1,J2, J30	Une dose de 200 000 UI à J1, J2, J30
Malnutrition sévère	Une dose de 100 000 UI	Une dose de 200 000 UI
Insuffisance pondérale	Une dose de 100 000 UI si l'enfant n'a pas reçu de capsules depuis 1 mois	Une dose de 200 000 UI si l'enfant n'a pas reçu de capsules depuis 1 mois
Anémie sévère	Une dose de 100 000 UI accompagnant la supplémentation en fer/acide folique	Une dose de 200 000 UI accompagnant la supplémentation en fer/acide folique
Diarrhée persistante	Une dose de 100 000 UI	Une dose de 200 000 UI

III- Supplémentation des femmes en âge de procréer en Fer, Vitamine D et Acide folique

Supplément	Dosage	Observation
Fer et acide folique à titre préventif pour les femmes enceintes.	120 mg de fer élément / semaine pendant 30 semaines Chaque dose de fer contient : • 120 mg du fer élément ou 600 mg de sulfate ferreux heptahydraté ou 360 de fumarate ferreux • Acide folique : 0.50 mg	- Le nombre de comprimés prescrit devra être adapté selon le type de fer disponible dans les ESSB afin de répondre à la dose préconisée ou nécessaire.
Vitamine D2 pour les femmes enceintes.	200 000 UI de Vitamine D2 au troisième trimestre de la grossesse	- Donner une ampoule de 200 000 UI ou le 1/3 de l'ampoule de 600 000 UI.
Acide folique pour les femmes à risque ayant déjà donné naissance à des enfants avec des malformations du tube neural.	5mg/j de la Vitamine B9 (acide folique), deux mois avant la conception, puis pendant les 3 premiers mois de la grossesse	