ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé
et de la Protection Sociale

Le Ministre

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الإجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
الوزير
ⴰⵎⴰⵡⵔⴰⵙ

11 OCT 2022

Circulaire DP-19/2022N°: 87 / 19 St N° 2276

- 6 OCT. 2022

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé et de la Protection Sociale

Objet : Introduction du vaccin contre le Papillomavirus Humains (HPV) dans le Calendrier National de Vaccination.

Dans le cadre du Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer 2020-2029 et du Programme Gouvernemental 2021-2026, particulièrement les mesures relatives à la concrétisation de l'engagement de notre pays dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus (CCU), le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a décidé d'introduire le vaccin contre le Papillomavirus Humains (HPV) dans le Calendrier National de Vaccination à partir de 12 octobre 2022.

Cette introduction s'aligne avec les objectifs de la stratégie de vaccination de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l'élimination du CCU en tant que problème de santé publique et des recommandations du Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination émises en 2010 et confirmées en 2022 approuvant la pertinence de la vaccination contre le HPV.

L'objectif de la vaccination contre le HPV est de réduire la survenue de lésions précancéreuses génitales et à terme des cancers du col de l'utérus avec un objectif progressif qui vise à atteindre en 2025 un taux de couverture vaccinale dépassant 90% de la population ciblée.

La vaccination contre le HPV concerne les filles âgées de 11 ans, selon un schéma vaccinal de 2 doses; à 6 mois d'intervalle. Le vaccin utilisé est un quadrivalent, en présentation mono dose et qui doit être conservé entre + 2 et + 8 °C et dont une fiche technique ci jointe à la présente directive explique les modalités d'emploi.

Cette vaccination aura lieu sous forme de campagne de vaccination en deux passages espacées de 6 mois au niveau de tous les Etablissements de Soins de Santé Primaire (ESSP) en mode fixe et mobile.

En vue de garantir l'introduction de ce vaccin avec succès, un plan national d'introduction du vaccin et un guide pratique ont été élaborés. Des sessions de formation des formateurs sur les différents aspects techniques et programmatiques ont été organisées au profit des professionnels de santé impliquées dans cette vaccination.

.../...

Aussi, l'encadrement et le suivi étroit de toutes les étapes d'introduction s'avèrent un impératif à tous les niveaux décisionnels. Dans ce cadre, les Directeurs Régionaux de la Santé et les Délégués du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale aux Préfectures et Provinces sont appelés à veiller spécifiquement à ce qui suit :

- Etablir une planification et une programmation locale de l'opération de vaccination et ce en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires.
- Veiller à la formation des professionnels de santé impliqués dans cette vaccination sur les aspects techniques et organisationnels de la campagne de vaccination selon les directives nationales.
- Assurer une coordination optimale avec les services du Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports pour permettre aux filles scolarisées l'accès à la vaccination dans des conditions favorables.
- Accompagner et superviser les équipes en charge de la vaccination.
- Mettre en place une organisation optimale et fluide au niveau des ESSP tout en veillant à l'application des mesures d'hygiène et de distanciation physique ;
- Assurer au niveau des ESSP, la disponibilité des trousses d'urgence et l'aménagement d'un espace d'observation après la vaccination.
- Veiller au renseignement quotidien des données sur les réalisations des séances de vaccination selon le système d'information mis en place.
- Assurer la déclaration des évènements indésirables suite à la vaccination (selon la procédure en vigueur), au Centre AntiPoison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM).

Eu égard à ce qui précède, je vous demande de veiller à l'exécution des termes de cette circulaire et d'en assurer une large diffusion.

diffusion

Le Directeur Régional
Par interim

SSR

Mr Bounadi ... apha
Chef du service de ... de soin
Direction Régionale
Béni Mellal - Kenifra

Ministre de la Santé
et de la Protection Sociale

Khalid AIT TALEB

Ampliations :

- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère la Santé et de la Protection Sociale.
- Monsieur l'Inspecteur Général du Ministère la Santé et de la Protection Sociale.
- Madame et Messieurs les Directeurs de l'Administration Centrale.
- Madame et Messieurs les Directeurs des Centres, Instituts et Ecole relavant du Ministère la Santé et de la Protection Sociale.

ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé
et de la Protection Sociale

المملكــة المغربيــة
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

Programme National d'Immunisation

Introduction du vaccin contre le HPV dans le calendrier national d'Immunisation

Fiche technique du Vaccin GARDASIL ®

Dénomination	**GARDASIL®** [Vaccin recombinant quadrivalent contre le virus du papillome humain HPV (types 6, 11, 16, 18)]
Forme pharmaceutique et Présentation	- Boîte de dix flacons mono- doses de 0,5 mL - Vaccin avec pastille de control de la température (PCV). - Liquide prêt à l'emploi
Description	- Suspension préparée à partir des particules pseudo-virales (VLP) hautement purifiées de la capside majeure recombinante (L1) protéine des HPV de types 6, 11, 16 et 18 - Préparation stérile pour administration intramusculaire.
Composition	Chaque dose de 0,5 ml contient environ : - 20 mcg de protéine L1 HPV 6, 40 mcg de protéine L1 HPV 11, 40 mcg de protéine L1HPV 16, et 20 mcg de protéine L1HPV 18. - 225 mcg d'aluminium (sous forme d'aluminium amorphe adjuvant sulfate d'hydroxyphosphate), - 9,56 mg de chlorure de sodium, 0,78 mg de L-histidine, 50 mcg de polysorbate 80, 35 mcg de borate de sodium et eau pour injection. - Le produit ne contient pas de conservateur ou antibiotiques.
Mode de conservation et de transport	- Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C - Ne pas congeler. - Protéger à l'abri la lumière.
Principales Indication	- Prévention des lésions génitales précancéreuses du col de l'utérus et du cancer du col de l'utérus dus à certains types oncogènes du Papulomavirus (HPV). **Actuellement le vaccination concerne les filles âgées de 11 ans**
Schéma de vaccination	- 2 doses de 0,5 mL à 6 mois d'intervalle au minimum
Préparation	- Vérifier la date d'utilisation et la PCV de chaque flacon avant utilisation.

	- Inspecter visuellement la solution à la recherche des particules et sa décoloration avant l'administration. **Ne pas utiliser le produit** si des particules sont présentes ou s'il semble décoloré. - En cas de congélation appliquer le test d'agitation. - Le vaccin doit être utilisé tel que fourni ; aucune dilution ou reconstitution n'est nécessaire. - Bien agiter avant de servir : Une agitation **vigoureuse** juste avant l'administration est nécessaire pour maintenir la suspension du vaccin, après une bonne agitation, GARDASIL est un liquide blanc trouble. - Retirer la dose de 0,5 ml de vaccin du flacon mono dose à l'aide d'une aiguille et d'une seringue stériles exemptes de conservateurs, antiseptiques et détergents. Une fois le flacon mono-dose est entamé, le vaccin retiré doit être utilisé rapidement et le flacon doit être jeté.
Administration	- Par voie intramusculaire dans la région deltoïde (partie supérieure du bras) ou dans la zone antérolatérale supérieure de la cuisse. - GARDASIL ne doit pas être injecté par voie intra vasculaire, sous-cutanée et intradermique
Contre-indications	- Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients du vaccin. - Les filles qui ont développé des symptômes indiquant une hypersensibilité après avoir reçu une dose de GARDASIL ne devraient pas recevoir les deuxièmes doses de GARDASIL. - La vaccination chez les filles présentant une maladie fébrile aigue (température corporelle supérieur à 38.5 °c) doit être reporter jusqu'à ce que les filles soient apyrétiques.
Effets indésirables post vaccinaux (EIPV) **Les plus fréquents**	- Au niveau du site d'injection : • Douleur • Gonflement • Érythème • Ecchymoses • Prurit - Systémiques : • Fièvre
Précaution d'emploi	- Par mesure de précaution, une période d'observation de 15min doit être assurée après la vaccination. - Veiller à la disponibilité du traitement médicale approprié en cas de réaction allergique.