Vaccination de rattrapage

- L’action de vacciner un individu qui, pour une raison quelconque (Maladie, négligence, accès au service, réticence, rupture de stock…) n’a pas reçu/a manqué les doses de vaccins auxquelles il peut prétendre, conformément au calendrier national de vaccination.
- Une vaccination de rattrapage doit être établie quelques soit les raisons du retard
- Impact majeur sur la réduction des disparités en matière de vaccination et sur la morbidité et la mortalité.

Calendrier des vaccinations

- **Vaccinations recommandées à chacun et à tous (dans la population générale) en fonction de son âge.**
- c'est un compromis entre le **risque en fonction de l'âge** et le **potentiel immunitaire** de la personne (maturation, persistance)
  - infection à pneumocoque: risque chez le nourrisson,
  - coqueluche chez le nourrisson : nécessité d'une immunisation la plus rapide possible
- Il tient compte des **caractéristiques du vaccin** (dossier d'AMM).

Principes de la vaccination de rattrapage

- **Chaque enfant devrait bénéficier pleinement de la vaccination en recevant les vaccins recommandés dans le calendrier national de vaccination.**
- **Il est préférable de vacciner en retard que de ne pas vacciner du tout.**
- **L'administration simultanée de plusieurs doses de vaccin peut se faire en toute sécurité.**
- **Les retards entre les doses d'une série vaccinale (p. ex., Penta1, 2, 3) ne nécessitent pas la reprise de la série**

Les 6 règles de rattrapage vaccinal

Règle 1 : Il est préférable de considérer qu'une personne n'est pas vaccinée plutôt que de la croire erronément protégée.

Règle 2 : Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni de recommencer toute la série de vaccins ni d'y ajouter des doses supplémentaires.

Règle 3 : La présence d'une infection mineure ou d'une fièvre de faible intensité (ne dépasse pas 38 °c) ne doit pas retarder le rattrapage vaccinal.

Les 6 règles de rattrapage vaccinal

Règle 4: Tous les vaccins peuvent être administrés le même jour

Règle 5: Utiliser des sites différents lors d'injections multiples, espacés d'au moins 2,5cm, en privilégiant les deltoïdes chez les grands enfants et la face antérolatérale de la cuisse chez les nourrissons.

Règle 6: Pour chaque enfant, on doit vérifier son statut vaccinal pour définir les doses manquantes.

Doses manquantes =

Doses recommandées (selon l'âge) - Doses reçues

C'est la bilan Vaccinal

Principe général

« Lorsque un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en réalisant le nombre d'inoculations requis en fonction de l'âge. »

Chaque cas de rattrapage doit être étudié selon le cas

Évaluation du statut vaccinal et détermination de l'admissibilité

UTILISATION DE LA DOCUMENTATION ÉCRITE (LE CARNET DE SANTÉ OU LE REGISTRE DE VACCINATION…)

SI LA PREUVE D'UNE VACCINATION ANTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE ÉTABLIE, IL CONVIENT DE SUPPOSER QUE L'INDIVIDU N'A PAS BÉNÉFICIER DU/DES VACCIN(S) ET DE LUI PROPOSER LA VACCINATION SANS AUCUN RISQUE.

Rattrapage vaccinal = donner les doses manquantes pour recaler sur le calendrier de base

POUR CHAQUE ANTIGENE :

1. Déterminer l'âge au moment du rattrapage
2. Déterminer le nombre de doses reçues
3. Déterminer le nombre de doses nécessaires que l'enfant devrait avoir reçues si la vaccination n'avait pas été interrompue (en fonction de l'âge à la primovaccination)
4. **Calculer les doses manquantes = doses nécessaires -doses reçues.**
5. Vérifier que cela ne dépasse pas le nombre de doses d'un enfant encore jamais vacciné !
6. Choisir les intervalles / les combinaisons vaccinales appropriées.

Recommandations (calendriers) pour la vaccination interrompue ou retardée

Important

- **Si l’enfant n’est jamais vacciné : appliquez un calendrier de rattrapage selon son l'âge et complétez suivant le calendrier national.**
- **Si l’enfant est incomplètement vacciné ,poursuivre la vaccination suivant le calendrier correspondant à son âge et suivant les règles établies .**
- **Le rattrapage doit être établi suivant les vaccins**

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge ≤ à 12 mois

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	6ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	15 jours après la 4ème visite	Minimum 2 mois après la 5ème visite	
BCG	1 dose						
Penta	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• Administrer 2 doses de rappel par le DTC à 18 mois et à 5 ans
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• 2 doses du VPO à 18 mois et à 5 ans
VPI	1 dose						
RR	1ère dose						• Ne pas administrer le RR qu'à partir de 9 mois • 2ème dose à 18 mois
Pneumo		1ère dose			2ème dose	3ème dose	• Âge < 7 mois: 4 doses de PCV 13 • Entre 7 mois et 11 mois: 3 doses avec un intervalle minimum de 2 mois entre les doses • Décaler de 15 jours par rapport au Penta
Rotavirus	1ère dose		2ème dose	3ème dose			

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge > à 1 an et ≤ à 3 ans

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	6ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	2 mois après la 2ème visite	6 mois après la 3ème visite	
BCG	1 dose						• Rechercher la cicatrice • 0,1 ml en intradermique
Penta/ DTC	1ère dose Penta		2ème dose DTC				• 1er rappel: 6 mois après la 3ème visite • 2ème rappel: 4 ans après le 1er rappel
Hépatite B			1 dose			1 dose	• 1 dose du HB monovalent au moins 1 mois après la dose incluse dans le Penta • Une 2ème dose du HB monovalent au moins 6 mois après • Toujours comptabiliser les prises incluses dans le Penta, si l'enfant a déjà reçu des doses
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• 2 doses du VPO avec les rappels du DTC
VPI	1 dose						
RR	1ère dose		2ème dose				• 2ème dose à partir de 18 mois • Si l'enfant est âgé de plus de 18 mois et jamais vacciné: administrer 2 doses à 1 mois d'intervalle
Pneumo		1ère dose*			2ème dose		• Entre 12 mois et 23 mois: 2 doses avec un intervalle minimum de 2 mois • * Entre 2 ans et 5 ans: 1 dose • Décaler de 15 jours par rapport au Penta
Rotavirus	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• Si le vaccin utilisé est ROTASIL l'âge limite est 24 mois

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge > à 3 ans et ≤ à 6 ans

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	6 mois après la 3ème visite	
BCG	1 dose					• Rechercher la cicatrice • 0,1 ml en intradermique
DTC	1ère dose		2ème dose		3ème dose	• Si l'enfant est âgé de 3 à 5 ans: administrer une dose rappel du DTC ou Td (selon l'âge) après 4 ans • Pas de Penta après 3 ans
Hépatite B	1ère dose		2ème dose		3ème dose	• Toujours comptabiliser les prises incluses dans le Penta, si l'enfant a déjà reçu des doses
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose	4ème dose	• Administrer une dose du VPO avec le rappel du DTC/Td
VPI	1 dose					
RR	1ère dose		2ème dose			
Pneumo		1 dose				• Une seule dose si âge inférieur à 5 ans

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Interchangeabilité de formulations de vaccins ou de produits de fabricants différents

doivent être utilisés pour toutes les doses d'une série vaccinale. Toutefois, si une série ne peut pas être complétée avec le même vaccin, le produit de remplacement disponible devrait être utilisé.

- La reprise d'une série n'est pas recommandée, même en ce qui concerne les séries primaires.
- Les diluants de vaccins ne sont pas interchangeables entre les fabricants ni entre les formulations. Seul le diluant attribué par le fabricant pour le vaccin et la

Exemples : 2 situations

Une maman ramène son enfant âgé de 3 ans pour rattrapage vaccinal. Elle déclare que son fils est correctement vacciné selon le calendrier vaccinal officiel jusqu'à l'âgé de 7 mois.

- Proposez un calendrier de rattrapage pour cet enfant

Réponse

Il faut faire le bilan vaccinal

POUR CHAQUE ANTIGENE : (RR)

1. Déterminer l'âge au moment du rattrapage : **3 ans**
2. Déterminer le nombre de doses reçues : 0
3. Déterminer le nombre de doses nécessaires que l'enfant devrait avoir reçues si la vaccination n'avait pas été interrompue (en fonction de l'âge à la primovaccination) : 2
4. **Calculer les doses manquantes = doses nécessaires -doses reçues. (2-0 =2)**
5. Vérifier que cela ne dépasse pas le nombre de doses d'un enfant encore jamais vacciné !
6. Choisir les intervalles / les combinaisons vaccinales appropriées. (vaccin RR min 4 semaines)

Réponse :

Il faut compléter selon le calendrier national. Doses manquantes= (doses recommandées- doses reçues), de ce qui lui manque à son âge :

- 2 doses RR
- 1 dose pneumocoque
- 2 doses VPO
- 1 dose DTC

Après , Utilisez le calendrier de rattrapage correspondant à son âge

- 1ère visite : 3 ans → 1 dose de DTC (Rappel) + 1 dose RR (première dose) + VPO
- 2 -ème visite : 15 jours après :1 dose du PCV 13 (WEUPHORIA)
- 3 -ème visite : 3 ans et 1 mois→ 2 -ème dose RR
- 4 -ème visite : 7 ans : 2 -ème dose Td (rappel) + une dose de VPO

Rattrapage vaccinal
Au total !

- ✓ **Variable : du simple au complexe**
- ✓ **A des règles**
- ✓ **Nécessite une réflexion**
- ✓ **Cas par cas**
- ✓ **Faisable**

