Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge > à 1 an et ≤ à 3 ans

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	6ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	2 mois après la 2ème visite	6 mois après la 3ème visite	
BCG	1 dose						• Rechercher la cicatrice • 0,1 ml en intradermique
Penta/ DTC	1ère dose Penta		2ème dose DTC				• 1er rappel: 6 mois après la 3ème visite • 2ème rappel: 4 ans après le 1er rappel
Hépatite B			1 dose			1 dose	• 1 dose du HB monovalent au moins 1 mois après la dose incluse dans le Penta • Une 2ème dose du HB monovalent au moins 6 mois après • Toujours comptabiliser les prises incluses dans le Penta, si l'enfant a déjà reçu des doses
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• 2 doses du VPO avec les rappels du DTC
VPI	1 dose						
RR	1ère dose		2ème dose				• 2ème dose à partir de 18 mois • Si l'enfant est âgé de plus de 18 mois et jamais vacciné: administrer 2 doses à 1 mois d'intervalle
Pneumo		1ère dose*			2ème dose		• Entre 12 mois et 23 mois: 2 doses avec un intervalle minimum de 2 mois • * Entre 2 ans et 5 ans: 1 dose • Décaler de 15 jours par rapport au Penta
Rotavirus	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• Si le vaccin utilisé est ROTASIL l'âge limite est 24 mois

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge ≤ à 12 mois

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	6ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	15 jours après la 4ème visite	Minimum 2 mois après la 5ème visite	
BCG	1 dose						
Penta	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• Administrer 2 doses de rappel par le DTC à 18 mois et à 5 ans
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• 2 doses du VPO à 18 mois et à 5 ans
VPI	1 dose						
RR	1ère dose						• Ne pas administrer le RR qu'à partir de 9 mois • 2ème dose à 18 mois
Pneumo		1ère dose			2ème dose	3ème dose	• Âge < 7 mois: 4 doses de PCV 13 • Entre 7 mois et 11 mois: 3 doses avec un intervalle minimum de 2 mois entre les doses • Décaler de 15 jours par rapport au Penta
Rotavirus	1ère dose		2ème dose	3ème dose			

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge > à 3 ans et ≤ à 6 ans

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	6 mois après la 3ème visite	
BCG	1 dose					• Rechercher la cicatrice • 0,1 ml en intradermique
DTC	1ère dose		2ème dose		3ème dose	• Si l'enfant est âgé de 3 à 5 ans: administrer une dose rappel du DTC ou Td (selon l'âge) après 4 ans • Pas de Penta après 3 ans
Hépatite B	1ère dose		2ème dose		3ème dose	• Toujours comptabiliser les prises incluses dans le Penta, si l'enfant a déjà reçu des doses
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose	4ème dose	• Administrer une dose du VPO avec le rappel du DTC/Td
VPI	1 dose					
RR	1ère dose		2ème dose			
Pneumo		1 dose				• Une seule dose si âge inférieur à 5 ans

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.