ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

المملكة المغربية

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

D/2025/DP/ 552

26 AOUT 2025

A

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé et de la Protection Sociale

Objet : Recommandations de bonnes pratiques pour l'administration orale des substances liquides aux nouveau-nés et aux nourrissons.

Réf : Lettre destinée aux Directeurs Régionaux pour l'application des recommandations relatives à l'administration orale des substances liquides aux nouveau-nés et aux nourrissons, N° D/2025/DP/DSMI/PNN, datant du 26 Mars 2025.

Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a élaboré des recommandations nationales de bonnes pratiques pour l'administration de la spécialité de Vitamine D3.

Ces recommandations, validées par le Comité Scientifique, Technique Consultatif de Nutrition, visent à standardiser les pratiques d'administration orale chez les nouveau-nés et nourrissons afin de prévenir tout risque de fausse route, de détresse respiratoire ou de décès.

A cet effet, et afin d'assurer la sécurité des nouveau-nés, je vous demande de relayer les instructions suivantes :

1. **Assurer une large diffusion** des recommandations de bonnes pratiques (ci-jointes) à l'ensemble des structures de santé relevant de votre région, y compris les maternités, centres de santé, CHU, ainsi que les praticiens au secteur privé.
2. **Veiller à leur application effective** par tous les prestataires de soins impliqués dans l'administration de médicaments ou compléments oraux liquides aux nouveau-nés et nourrissons.
3. **Organiser des sessions de sensibilisation et de formation** à l'attention des professionnels de santé, en intégrant ces recommandations dans les programmes de formation continue.
4. **Diffuser la version vulgarisée en langue arabe** auprès des parents, notamment lors des séances de sensibilisation (classes des mères, classes des parents, autres…).

335, Avenue Mohammed V Rabat – Tél : +212 537 76 11 21-Fax : +212 537 76 38 95 - http : //www.sante.gov.ma

5. **Mettre en place un dispositif de suivi et de remontée d'information** sur les pratiques d'administration et les éventuels incidents observés.

6. **Collaborer avec les équipes de pharmacovigilance régionales** pour assurer une surveillance continue et réactive.

Je vous prie de bien vouloir accorder la plus grande attention à la mise en œuvre de ces recommandations, dans l'intérêt de la sécurité des nouveau-nés et nourrissons.

Pour Le Ministre et par Délégation

Le Secrétaire Général

Dr Abdelkrim Meziane Bellefquih


P.J : recommandations de bonnes pratiques pour l'administration orale des substances aux nouveau-nés et aux nourrissons en langues arabe et française.

Recommandations de bonnes pratiques pour l'administration orale des substances aux nouveau-nés et aux nourrissons

(Destiné aux professionnels de la santé)

❖ Positionnement du Nouveau-né

- Installer le bébé en position semi-assise (inclinaison à 30-45°).
- Maintenir la tête en légère flexion pour éviter l'extension cervicale qui favorise
- l'ouverture des voies respiratoires.
- Ne jamais administrer en décubitus dorsal strict (**Ne jamais donner ce produit de santé pendant que le bébé est complètement allongé sur le dos**).




❖ Technique d'Administration

- Utiliser une seringue orale graduée (précise, sans aiguille) plutôt qu'une cuillère, surtout chez les prématurés ou les nouveau-nés de faible poids.
- Introduire lentement le produit sur la face interne de la joue (sillon gingivo-jugal),
- pas au centre de la bouche.
- Administrer de petites quantités fractionnées (par exemple 0,2 à 0,5 ml à la fois).
- Laisser le temps au nouveau-né de déglutir entre chaque portion



❖ Surveillance Pendant et Après l'Administration

- Observer la réaction du bébé : succion, déglutition, respiration.
- Arrêter immédiatement si :
  - Toux
  - Cyanose
  - Apnée ou ralentissement respiratoire
- Stimuler la déglutition par un léger massage sous le menton si besoin.
- En cas de toux ou suspicion de fausse route, placer en décubitus latéral de sécurité.



❖ Préférer les Galéniques Adaptées

- Privilégier les formes liquides spécifiquement adaptées au nourrisson.
- Vérifier que les préparations sont non visqueuses et faciles à avaler.
- Éviter les comprimés ou les poudres à diluer sans validation de la galénique par une pharmacie hospitalière.

⚠ Cas Particuliers

- En cas de troubles de la succion-déglutition (prématurité, hypotonie, anomalies neurologiques) :
  → Réaliser une évaluation de la déglutition par une équipe spécialisée (orthophoniste, kinésithérapeute respiratoire, ORL).
- Chez les enfants à haut risque de fausse route :
  → Envisager si besoin une autre voie d'administration (gastrostomie, sonde nasogastrique).

⚠ Très important :


- Ne pas forcer l'enfant à avaler.
- Reconnaître les signes de fausse route.
- Respecter les consignes de positionnement

التوصيات الخاصة بالممارسات الجيدة لإعطاء المواد عن طريق الفم لدى حديثي الولادة والرضع

(موجهة لمهنيي الصحة)

❖ وضعية حديث الولادة

- وضع المولود في وضعية نصف جلوس (بزاوية ميلان بين 30 إلى 45 درجة).
- الحفاظ على الرأس في **وضع انحناء خفيف نحو الأمام**، لتجنب تمدد الرقبة الذي يسهل فتح المسالك التنفسية ومرور الدواء منها.
- تجنب إعطاء المادة في وضعية الاستلقاء الكامل على الظهر.



❖ تقنية الإعطاء


- استخدام حقنة مدرجة (دقيقة، بدون إبرة) بدلاً من الملعقة، خاصةً عند الخدّج أو المواليد منخفضي الوزن.
- إعطاء المادة ببطء على الجهة الداخلية للخد، وليس في وسط الفم أو فوق اللسان مباشرة.
- إعطاء كميات صغيرة مجزأة على دفعات (مثلاً من 0.2 إلى 0.5 مل في كل مرة).
- ترك وقت كافي للطفل ليبتلع بين كل دفعة.



❖ المراقبة أثناء وبعد الإعطاء

- ملاحظة **استجابة الطفل** بعد إعطائه المادة: المص، البلع، التنفس.
- إيقاف إعطاء المادة فورًا في حال ملاحظة:
  - ✓ الكحة
  - ✓ الزرقة (تغير لون الطفل إلى الأزرق)
  - ✓ انقطاع التنفس أو تباطؤ التنفس
- تحفيز البلع بواسطة تدليك خفيف تحت الذقن عند الحاجة.

- في حال ملاحظة الكحة أو الاشتباه في الاختناق، وضع الطفل فورا في وضعية الاستلقاء الجانبي الآمن .



❖ **تفضيل الأشكال الصيدلانية المناسبة للأطفال**

- اختيار الأشكال السائلة المخصصة للرضع.
- تفضيل المنتجات غير لزجة وسهلة البلع.
- تجنب الأقراص أو المساحيق التي يجب إذابتها دون التحقق من الشكل الصيدلاني من قبل صيدلية.

⚠ **حالات خاصة**

- في حال وجود اضطرابات في المص أو البلع، يجب إجراء تقييم للبلع من قبل فريق متخصص من مهنيي الصحة (أخصائي نطق، أخصائي الترويض التنفسي، طبيب أنف أذن وحنجرة).
- عند الأطفال المعرضين لخطر عالي للاختناق: يُمكن استخدام طرق اخرى للإعطاء المادة حسب التوجيهات الطبية.

⚠ **هام جدا**


- عدم إجبار الطفل على البلع.
- التعرف على علامات الإختناق.
- احترام تعليمات الوضعية الصحيحة وتقنية إعطاء المادة.

التوصيات الخاصة بالممارسات الجيدة لإعطاء المواد عن طريق الفم لدى حديثي الولادة والرضع.

(موجهة للآباء والأمهات وأولياء الأمور)

❖ الوضعية ديال المولود الجديد

- خاصنا نحطو الرضيع فواحد الوضعية نص جلوس، يعني مائل بزاوية بين 30 حتى لـ 45 درجة.
- نخليو الراس مايل شوية لقدّام باش ما يتمددش العنق بزاف، حيت إلا تمدد تقدر المادة تدخل للرئة.
- ما خاصناش نعطيوه المادة وهو ممدد على ظهره.



❖ طريقة الإعطاء

- استعملو حقنة مدرجة (بدون إبرة) ، وتجنبو المعلقة، خصوصاً عند الخدّج و لي تزادو بوزن ناقص
- دخلو المادة في الجهة الداخلية للحنك و متعطيوهاش وسط الفم أو فوق اللسان.
- عطيو كميات صغار على دفعات متفرقة (مثلاً بين 0.2 حتى لـ 0.5 مل فكل دفعة).
- عطيوه الوقت الكافي باش يبلع بين كل مرة ومرة.




❖ المراقبة أثناء وبعد الإعطاء للمادة

- مني نعطيوه المادة دائما نراقبو واش كيمص المادة، كيتنفس، وكيبلع.
- نوقفوإعطاء المادة في الحال إلا لاحظنا :
  - الكحة
  - الزروقية (تغير لون الطفل إلى الأزرق)

- انقطاع التنفس أو تباطؤ التنفس

- ممكن نحفزو البلع بالتدليك خفيف تحت الذقن عن الحاجة.
- في حال الكحة أو الشك في شرقة، نوضعوالطفل على جنبو بحال هاد الصورة.



❖ **اختارو الشكل الصيدلاني المناسب للمادة**

- نفضلو الأشكال السائلة ومخصصة للرضع.
- نفضلو المنتجات تكون غير لزجة وسهلة البلع.
- تجنب الأقراص أو المساحيق التي يجب إذابتها دون التحقق من الشكل الصيدلاني من قبل صيدلية.

⚠ **حالات خاصة**

- في حال وجود مشاكل في المص أو البلع ، خاص تقييم للبلع من قبل فريق متخصص من مهنيي الصحة (أخصائي نطق،أخصائي الترويض التنفسي، طبيب أنف أذن وحنجرة).
- إلى كان الطفل معرض لخطر كبير للشرقة ، الطبيب يمكن يقترح طريقة أخرى لإعطاء المادة.

⚠ **تذكير مهم**

- ما نجبروش الطفل على البلع
- خاصنا نعرفو مزيان علامات الشرقة.
- التزمو بالطريقة الوضعية الصحيحة عند اعطاء الدواء وتقنية إعطاء الدواء.