ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
ⴰ ⵙⵏⵎⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

المملكة المغربية
وزارة الصحة
والحماية الاجتماعية

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Le Ministre ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ الوزير

Circulaire n°.....DP/19

Messieurs les Directeurs Généraux des Groupements Sanitaires Territoriaux
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux
de la Santé et de la Protection Sociale

Objet : Introduction d'une nouvelle présentation du vaccin anti-rotavirus.

Dans le cadre des efforts soutenus du **Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS)** visant à réduire la morbidité et la mortalité infantiles liées aux diarrhées aiguës, notamment par l'atteinte de taux élevés de couverture vaccinale contre le rotavirus à l'échelle nationale, le MSPS veille à assurer la disponibilité continue du vaccin antirotavirus.

Afin de consolider ces acquis et d'optimiser la gestion logistique du vaccin, une nouvelle présentation sera mise à la disposition des Établissements de Soins de Santé Primaires (ESSP).

Ainsi, le vaccin antirotavirus sera désormais disponible sous la forme de **ROTASIIL-Liquid®**, une présentation liquide prête à l'emploi, conditionnée en **flacon multidose contenant 2 doses de 2 ml**, en remplacement de l'ancienne présentation ROTASIIL® lyophilisée.

Bien que cette nouvelle forme simplifie l'acte vaccinal en supprimant l'étape de reconstitution, ce changement de présentation nécessite une adaptation des pratiques de gestion, de manipulation et d'utilisation du vaccin par les équipes chargées de la vaccination.

À cet effet, une attention particulière devra être accordée aux aspects suivants :

- **La précision de l'administration :** Les équipes de vaccination doivent être sensibilisées au fait que chaque flacon contient désormais **deux doses**. Une

335, Av. Mohammed V, Rabat - Tél: +212 537 76 10 25 / 14 03 / 36 62 - Fax: +212 537 76 38 95
Email: contact@sante.gov.ma - Site: www.sante.gov.ma

vigilance particulière doit être accordée à l'administration de la dose exacte prévue, soit **2 ml par enfant ;**

- **L'optimisation de la gestion des flacons :** L'ouverture des flacons multidoses doit être planifiée et gérée de manière rationnelle afin de limiter les pertes vaccinales, sans jamais constituer un motif de report ou de refus de la vaccination d'un enfant éligible ;
- **La sécurité vaccinale et chaîne du froid :** Les règles relatives à la sécurité de la vaccination, à la manipulation et à la conservation du vaccin dans les conditions requises de la chaîne du froid doivent être strictement respectées ;
- **Le rattrapage vaccinal :** Il est primordial de veiller à rattraper les enfants incomplètement vaccinés conformément au protocole établi.

Les détails techniques, les caractéristiques du vaccin, les modalités d'administration, ainsi que les règles de conservation et de gestion des flacons sont précisés dans la fiche technique jointe à la présente lettre. Ces éléments feront également l'objet d'une formation spécifique des équipes concernées.

La présente lettre doit faire l'objet d'une large diffusion auprès de l'ensemble des structures de santé relevant de votre ressort. La mise en œuvre de ces dispositions doit être assurée à tous les niveaux, avec une attention particulière à leur appropriation et à leur stricte application par les équipes chargées de la vaccination.

Pour Le Ministre et par Délégation
Le Secrétaire Général

Dr Abdelkrim Meziane Bellefquih

PJ : Fiche technique relative à la nouvelle présentation du vaccin anti-rotavirus.

335, Av. Mohammed V, Rabat - Tél: +212 537 76 10 25 / 14 03 / 36 62 - Fax: +212 537 76 38 95
Email: contact@sante.gov.ma - Site: www.sante.gov.ma

Programme National d'Immunisation

Vaccin antirotavirus: ROTASIIL-Liquid®




FICHE TECHNIQUE

Dénomination	ROTASIIL-Liquid®
Forme pharmaceutique	- Vaccin Anti-Rotavirus Vivant Atténué (Oral) Liquide ; - Solution buvable prête à l'emploi ; - Liquide jaunâtre et translucide, avec possible présence de légers agrégats inhérents au produit.
Présentation	- **Flacon de 4 ml contenant 2 doses ;** - **Chaque dose orale** a un volume de **2 ml.**
Composition	- Chaque dose de 2 ml contient les sérotypes de rotavirus bovin-humain réassortis : G1, G2, G3, G4 et G9 (≥ 105,6 FFU par sérotype).
Mode de conservation et de transport	- Vaccin à conserver en permanence au réfrigérateur, entre **+2 °C et +8 °C** ; - Maintenir le flacon à l'**abri de la lumière** dans son emballage **d'origine** ; - **NE PAS CONGELER** : Tout vaccin ayant été congelé doit être éliminé ; - **Vérifier systématiquement** la Pastille de Contrôle du Vaccin **(PCV / VVM)** sur le **bouchon du flacon** de vaccin ; - Respecter les règles de lecture de la PCV ;  - **Conservation après ouverture** : Une fois ouvert, le vaccin doit être utilisé immédiatement. S'il n'est pas utilisé tout de suite, il peut être conservé pendant au maximum 6 heures entre 2 °C et 8 °C, à condition d'utiliser une nouvelle seringue pour boucher l'orifice de l'adaptateur.

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale PNI

Indications	- Le ROTASIIL-Liquid® est indiqué pour l'immunisation active des nourrissons afin de prévenir les gastro-entérites sévères dues au rotavirus.
Population cible	- Le vaccin est recommandé chez les nourrissons en bonne santé.
Contre-indications	• **Absolues :** Interdisent toute administration ou poursuite du schéma vaccinal : - Antécédent d'invagination intestinale aiguë. - Malformation congénitale du tube digestif (ex. : diverticule de Meckel). - Déficit Immunitaire Combiné Sévère. - Hypersensibilité grave à un composant ou réaction lors d'une dose précédente. • **Temporaires :** La vaccination doit être différée si l'enfant présente : - Fièvre aiguë sévère. - Troubles digestifs en cours (gastro-entérite aiguë) : attendre la guérison.
Précautions d'emploi	- **Affections aiguës** : Une infection aiguë ou une maladie fébrile justifie de différer l'administration. - **Immunodépression et VIH** : Les données de sécurité et d'efficacité manquent chez les nourrissons immunodéprimés ou infectés par le VIH (à évaluer cas par cas). - **Invagination intestinale** : Les professionnels doivent évaluer attentivement tout cas présentant des symptômes évocateurs d'une invagination (risque connu associé aux vaccins antirotavirus).

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale * PNI

Administration	**VOIE ORALE UNIQUEMENT. NE PAS INJECTER.** - **Avant toute administration du vaccin, appliquer systématiquement le principe des « 7 bons » :** le bon patient, le bon vaccin, la bonne dose, la bonne voie d'administration, le bon moment, le bon site d'administration et la bonne traçabilité. - **Préparation :** Retirez le capuchon du flacon. Vérifiez la Pastille de Contrôle du Vaccin (PCV) et l'aspect du liquide.  - **Montage :** Enfoncez fermement l'adaptateur de flacon sur le flacon jusqu'à entendre un « clic ». Connectez une seringue orale sans aiguille à l'adaptateur.  - **Prélèvement :** Inversez le flacon. Tirez sur le piston pour prélever exactement la dose complète de **2 ml**.  - **Retirez la seringue.**  - **Administration :** Installez le nourrisson en position inclinée. Placez l'embout de la seringue vers l'intérieur de la joue, puis pressez doucement pour **administrer les 2 ml**. 

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
PMI

Administration	- **NB :** • **Flacon multidose :** Laissez l'adaptateur de flacon sur le flacon vaccinal. Utilisez une nouvelle seringue pour la deuxième dose après avoir retiré et administré la première dose. • **Cas particuliers :** Si le nourrisson régurgite ou recrache **la majeure partie du vaccin**, une dose de remplacement peut être administrée lors de la même visite, selon l'évaluation clinique. • **Précautions d'administration :** ‣ **Co-administration :** Le **ROTASIIL-Liquid®** peut être administré le même jour que les autres vaccins du Calendrier National de Vaccination, **qu'ils** soient oraux ou injectables ; ‣ **Alimentation :** Aucune restriction alimentaire n'est requise. L'enfant peut être allaité immédiatement avant ou après la vaccination. ‣ **Hygiène :** Informer les parents ou le tuteur de l'importance du lavage des mains après chaque change pendant les **14 jours** suivant la vaccination, le vaccin contenant un virus vivant atténué susceptible d'être excrété dans les selles. ‣ **Élimination des déchets :** Après administration, le tube et son bouchon doivent être éliminés dans un collecteur destiné aux **déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI)**, conformément aux procédures en vigueur.
Schéma vaccinal	Dans le cadre du Programme National d'Immunisation, le schéma vaccinal du ROTASIIL-Liquid® comprend **trois doses** administrées selon le calendrier suivant : ‣ **1re dose :** à l'âge de **8 semaines ;** ‣ **2e dose :** à l'âge de **12 semaines ;** ‣ **3e dose :** à l'âge de **16 semaines.** • ***NB :*** - L'intervalle entre deux doses doit être d'**au moins 4 semaines** ; - Il est préférable que les 3 doses soient administrées entre 20 et 22 semaines.

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
PNI

Rattrapage vaccinal	• **Règles à respecter:** ‣ **Intervalle minimal entre deux doses :** respecter impérativement un délai d'au moins **4 semaines** (1 mois) entre deux doses ; ‣ La série vaccinale ne doit **jamais être recommencée** (on ne recommence pas à zéro). ‣ **Limite d'âge :** La série vaccinale de **3 doses** doit être **achevée avant l'âge de 24 mois.** • **Situation de rattrapages :** ‣ **Nourrisson non vacciné :** Un schéma complet de 3 doses à administrer, conformément aux règles. ‣ **Nourrisson incomplètement vacciné :** Chez un nourrisson ayant déjà reçu une ou deux doses du vaccin antirotavirus, les doses administrées restent valables. La vaccination doit simplement être complétée afin d'atteindre un total de 3 doses : ◆ 1 dose déjà reçue : Administrer 2 doses supplémentaires ; ◆ 2 doses déjà reçues : Administrer 1 dose supplémentaire.
Événements Indésirables Post-Vaccinaux (EIPV)	- Le profil de sécurité actuel du vaccin ROTASIIL-Liquid® est bon ; les événements indésirables enregistrés sont similaires à ceux des autres vaccins. - **Effets indésirables :** ✓ **Troubles généraux :** • Très fréquents : fièvre, irritabilité, diminution du niveau d'activité. ✓ **Troubles gastro-intestinaux :** • Très fréquents : Diminution de l'appétit, vomissements et diarrhée ; • Fréquents : Gastro-entérite, douleurs abdominales, constipation et flatulences ; • Peu fréquents : malaise abdominal. ✓ **Infections et infestations :** • Fréquents : bronchiolites et infections des voies respiratoires. - **Moyens de notification des EIPV au Centre National des Vigilances Sanitaires et Gestion des Risques relevant de l'Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé (AMMPS) :** ✓ **Lien de notification électronique :** • Cliquer sur le lien ci-dessous, remplir le formulaire et exporter le PDF pour garder une copie de la notification ; • Le cas sera automatiquement transmis à la base de données nationale de pharmacovigilance ; • Lien eReporting: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ma/vaccin ✓ **Fiche de notification format papier** : • À télécharger (sur le site de l'AMMPS : https://ammps.sante.gov.ma/) , à imprimer, à remplir et à envoyer à l'adresse électronique indiquée sur la fiche (vaccinovigilance@ammps.gov.ma)

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
PNI