Le rattrapage vaccinal

Principes, méthode du bilan vaccinal, tableaux par âge et règles vaccin par vaccin.

Guide élaboré à partir des documents du **Programme National d'Immunisation** publiés par le **Ministère de la Santé et de la Protection Sociale**.

Visite	Quand ?	Vaccins
V1	Jour 0	BCG · Penta (dose 1) · VPO 1 · VPI · RR 1 · Rota 1
V2	V1 + 15 jours	PCV 1
V3	V1 + 1 mois	DTC (dose 2) · HB monovalent · VPO 2 · RR 2 · Rota 2
V4	V3 + 1 mois	VPO 3 · Rota 3
V5	V2 + 2 mois	PCV 2
V6	V3 + 6 mois	HB monovalent

1 Ce qu'il faut retenir

Les principes du rattrapage

Mieux vaut vacciner en retard que ne pas vacciner du tout.

1. **Ne jamais recommencer une série.** On reprend là où elle s'est arrêtée, quel que soit le retard, sans doses en plus.

2. **Seules les doses manquantes.** Une fois l'enfant à jour, on reprend le Calendrier National de Vaccination.

3. **Fièvre ≤ 38 °C ou infection mineure :** on vaccine. Elles ne retardent pas le rattrapage.

4. **Plusieurs vaccins le même jour,** sur des sites distants d'au moins 2,5 cm : cuisse chez le nourrisson, deltoïde chez le grand enfant.

5. **Le PCV toujours seul** dans sa séance. S'il tombe le même jour qu'un autre vaccin, on le décale de 15 jours.

6. **Vaccins interchangeables :** si le même produit manque, on complète avec l'équivalent, sans recommencer. Les solvants ne sont pas interchangeables.

2 La méthode

Le bilan vaccinal

Pour chaque vaccin : comparer ce que l'enfant a reçu à ce qu'il aurait dû recevoir.

1. Calculer l'**âge** de l'enfant le jour de la séance.
2. Compter les **doses reçues** (carnet de santé ou autre document).
3. Déterminer les **doses requises** pour son âge.
4. Calculer les **doses manquantes**, sans jamais dépasser celles d'un enfant du même âge jamais vacciné.
5. Choisir les **intervalles et associations** à l'aide des tableaux par âge.

Doses manquantes = doses requises pour l'âge − doses reçues

Statut vaccinal inconnu (aucun document) : l'enfant est considéré comme non vacciné. Revacciner un enfant déjà vacciné ne présente aucun danger.

Quel tableau utiliser ?

Le choix se fait selon l'âge de l'enfant le jour de la séance.

≤ 12 mois

Tableau A

Penta, VPO, Rota, PCV selon l'âge. RR à partir de 9 mois.

1 à 3 ans

Tableau B

Un seul Penta, puis DTC et HB monovalent.

3 à 6 ans

Tableau C

Plus de Penta : DTC et HB séparés.

Plus de 6 ans

Règles par vaccin

RR, DTC/Td et VPO selon les doses reçues.

À savoir : les tableaux montrent le plan d'un enfant **jamais vacciné**. Pour un enfant partiellement vacciné, on ne donne que les doses manquantes, avec les mêmes intervalles.

Les doses d'HB reçues dans le Penta comptent toujours. On ne les refait pas.

4 Tableau A

Enfant de 12 mois ou moins

Plan de rattrapage d'un enfant jamais vacciné.

Visite	Quand ?	Vaccins
V1	Jour 0	BCG · Penta 1 · VPO 1 · VPI · Rota 1 · RR 1 RR seulement à partir de 9 mois
V2	V1 + 15 jours	PCV 1
V3	V1 + 1 mois	Penta 2 · VPO 2 · Rota 2
V4	V3 + 1 mois	Penta 3 · VPO 3 · Rota 3
V5	V4 + 15 jours	PCV 2
V6	V5 + 2 mois au moins	PCV 3

À retenir

- **Rappels :** DTC et VPO à 18 mois et à 5 ans.
- **RR :** jamais avant 9 mois. La 2e dose à 18 mois.
- **PCV :** avant 7 mois, 4 doses. De 7 à 11 mois, 3 doses espacées d'au moins 2 mois. Toujours 15 jours après le Penta.

5 Tableau B

Enfant de plus de 12 mois à 3 ans

Plan de rattrapage d'un enfant jamais vacciné.

Visite	Quand ?	Vaccins
V1	Jour 0	BCG · Penta (dose 1) · VPO 1 · VPI · RR 1 · Rota 1
V2	V1 + 15 jours	PCV 1
V3	V1 + 1 mois	DTC (dose 2) · HB monovalent · VPO 2 · RR 2 · Rota 2
V4	V3 + 1 mois	VPO 3 · Rota 3
V5	V2 + 2 mois	PCV 2
V6	V3 + 6 mois	HB monovalent

À retenir

- **BCG :** chercher la cicatrice avant. 0,1 ml en intradermique.
- **DTC :** 1er rappel 6 mois après V3, 2e rappel 4 ans après le 1er.
- **HB monovalent :** une dose au moins 1 mois après la dose du Penta, puis une autre au moins 6 mois après.
- **RR :** 2e dose à partir de 18 mois. Jamais vacciné après 18 mois : 2 doses à 1 mois d'intervalle.
- **PCV :** de 12 à 23 mois, 2 doses à 2 mois d'intervalle au moins. De 2 à 5 ans, une seule dose.
- **Rota :** la série doit être terminée avant 24 mois.

6 Tableau C

Enfant de plus de 3 ans à 6 ans

Plan de rattrapage d'un enfant jamais vacciné.

Visite	Quand ?	Vaccins
V1	Jour 0	BCG · DTC 1 · HB 1 · VPO 1 · VPI · RR 1
V2	V1 + 15 jours	PCV — une seule dose, avant 5 ans
V3	V1 + 1 mois	DTC 2 · HB 2 · VPO 2 · RR 2
V4	V3 + 1 mois	VPO 3
V5	V3 + 6 mois	DTC 3 · HB 3 · VPO 4

À retenir

- **Pas de Penta après 3 ans.**
- **Rappel :** DTC ou Td (selon l'âge) 4 ans plus tard, avec une dose de VPO.
- **HB :** les doses reçues dans le Penta comptent.

Le PCV toujours seul : il se donne seul dans sa séance. S'il tombe le même jour qu'un autre vaccin, on le décale de 15 jours.

7 Règles par vaccin

RR et poliomyélite

À utiliser avec un document de vaccination, et après 6 ans.

RR · doses reçues (VAR, RR ou RRO)	Que faire ?
2 doses	Rien : l'enfant est à jour.
1 dose	Donner la 2e dose de RR.
Aucune	RR 1, puis RR 2 un mois plus tard.

RR : au moins 4 semaines entre deux doses.

VPO et VPI

- **VPO, 12 mois ou moins :** 4 doses, dont la dose zéro. **Plus de 12 mois :** au moins 5 doses, dont la dose zéro.
- **Dose zéro non donnée avant 2 mois :** elle n'est plus due. On passe au VPO 1 sans considérer l'enfant en retard.
- **Sans information sur les antécédents :** 4 doses de VPO, avec une dose de VPI lors de la première dose si l'enfant a moins de 9 ans.
- **VPI :** 2 doses dans la première année (4 et 9 mois). Après 12 mois, sans aucune dose : **une seule dose** (jusqu'à 9 ans).
- Au moins **4 semaines** entre deux doses de VPO.

8 Règles par vaccin

DTC avant 7 ans

Selon le nombre de doses déjà reçues (Penta compris) et l'âge.

Reçues	Que faire, selon l'âge ?
5	Rien : 3 doses + 2 rappels, l'enfant est à jour.
4	Après 5 ans : 2e rappel DTC.
3	**18 mois à 3 ans :** une dose de DTC, puis le calendrier national. **Après 3 ans :** une dose de DTC.
2	**Avant 18 mois :** Penta, puis le calendrier national. **18 mois à 3 ans :** Penta, puis DTC 6 mois après, puis 2e rappel 4 ans après. **3 à 7 ans :** 2 DTC à 6 mois d'intervalle.
1	**Avant 18 mois :** 2 Penta à 1 mois d'intervalle, puis le calendrier national. **18 mois à 3 ans :** Penta, puis DTC 1 mois après. Rappels 6 mois puis 4 ans après. **3 à 7 ans :** 2 DTC à 1 mois d'intervalle, puis 1er rappel 6 mois après.
0	**Avant 12 mois :** 3 Penta à 1 mois d'intervalle au moins. Rappels 6 mois puis 4 ans après. **12 mois à 3 ans :** 2 Penta puis 1 DTC, à 1 mois d'intervalle. Rappels 6 mois puis 4 ans après.

Intervalles minimum : 4 semaines entre les 3 premières doses, 6 mois avant le 1er rappel, 4 ans entre les 2 rappels.

9 Règles par vaccin

Td après 7 ans et Rota

Td pour compléter les 5 doses. Rota avant 24 mois.

DTC / Td : enfant de 7 ans et plus

- Il faut **5 doses** contenant la valence DTC ou Td (le Penta compte).
- Les doses manquantes se rattrapent avec le **Td**.


Entre les doses	Intervalle minimum
1 et 2	4 semaines
2 et 3	4 semaines
3 et 4	6 mois
4 et 5	1 an

Rota (ROTASIIL-Liquid®)

- **Schéma :** 8, 12 et 16 semaines, au moins 4 semaines entre deux doses.
- **Limite :** les 3 doses doivent être terminées **avant 24 mois**.
- **Aucune dose :** 3 doses. **1 reçue :** 2 doses. **2 reçues :** 1 dose. Ne jamais recommencer.
- Si l'enfant vomit la plus grande partie de la dose : une dose de remplacement à la même visite.

Le plan de rattrapage en quelques secondes

Date de naissance, doses reçues : l'application calcule les visites.



1 Date de naissance, date de la séance et doses reçues



2 Le plan visite par visite, avec les dates



3 Statut inconnu : plan complet d'un enfant non vacciné

Rubrique **Rattrapage** de **Vaccin'Assist**, sur **assist-apps.ma**. Aucune donnée n'est enregistrée ni envoyée. Plan indicatif, à vérifier par l'infirmier avant administration.

+ Pour aller plus loin

Pour plus d'informations, visitez notre site

Retrouvez Vaccin'Assist et nos outils pour les professionnels de santé.

ASSIST APPS

assist-apps.ma

Scannez pour ouvrir le site

1 **Vaccin'Assist en ligne**
Le guide complet du PNI, sur téléphone ou ordinateur.

2 **Gratuit, sans inscription**
Aucune donnée enregistrée ni envoyée.

3 **Rattrapage calculé**
Le plan visite par visite, selon l'âge et les doses reçues.

4 **D'autres outils bientôt**
De nouvelles applications pour les soignants.