# LINHA PECUÁRIA

COMPROMISSO com a pecuária. Hoje e sempre.



MSD Saúde Animal









## Ciência Para Animais Mais Saudáveis™

Neste instante, em nossos centros de pesquisa espalhados pelo mundo, buscamos inovações que ajudarão a melhorar a saúde dos animais.

A MSD Saúde Animal é uma empresa do Grupo Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, uma instituição com mais de 125 anos de história e um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mercado mundial.

No Brasil, uma equipe de mais de 200 profissionais de campo, altamente capacitados, está lado a lado com os veterinários e produtores de todo o país, oferecendo plataformas de produtos e serviços diferenciadas, buscando tornar-se o principal parceiro em soluções para saúde animal.

A MSD tem grande vocação científica e, por meio da ciência, busca animais mais saudáveis. Mais alimentos e de melhor qualidade para melhorar a vida das pessoas.

# ÍNDICE


ANTI-INFLAMATÓRIOS ..... PÁG. 06

ANTIMICROBIANOS ..... PÁG. 11

ESPECIALIDADES TERAPÊUTICAS ..... PÁG. 21

ANTIPARASITÁRIOS ..... PÁG. 24

BIOLÓGICOS ..... PÁG. 39

SUPLEMENTOS ..... PÁG. 44

SAÚDE DO ÚBERE ..... PÁG. 48

REPRODUÇÃO ..... PÁG. 53

# ANTI-INFLAMATÓRIOS






**AZIUM**® SOLUÇÃO
**BANAMINE**® INJETÁVEL
**BANAMINE**® TRANSDERMAL

# AZIUM® SOLUÇÃO

*ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE DEXAMETASONA*

## FÓRMULA:

**Cada mL contém:**
Dexametasona - 2,00 mg
Veículo q.s.p. - 1,00 mL

## INDICAÇÕES:

**Azium® Solução** é indicado para aquelas situações ou condições em que se faz necessária uma resposta hormonal imediata. Por conseguinte, é indicado por via intravenosa nos estados de choque, toxemia e crises circulatórias.
**Pequenos animais** – **Azium® Solução** é indicado para as inflamações que envolvam as articulações e estruturas acessórias, naturalmente nos casos em que não houverem alterações estruturais como anquilose ou ruturas de bainha ou ligamentos. É indicado também nas dermatites inespecíficas e como medicação de suporte nos acidentes cirúrgicos.
**Grandes Animais** – É indicado para a cetose, como medicação auxiliar nas mastites agudas, metrites, pneumonias graves, febre dos transportes e vitular em bovinos. Nos eqüinos, **Azium® Solução** é indicado nos casos de bursites, carpites, miosites, luxações e como medicação auxiliar na fadiga, influenza e exaustão devido ao calor. **Azium® Solução** é indicado como medicamento auxiliar nos acidentes por mordedura de cobras, assim como em todas as doenças reumáticas, alérgicas, dermatológicas e outras sabidamente sensíveis aos corticóides.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

No tratamento com **Azium® Solução**, , como com qualquer outro corticosteróide, a terapêutica deve ser estabelecida levando-se em conta a severidade da afecção, a duração do tratamento e o limite de tolerância do paciente para o esteróide. Deve-se empregar a menor dose efetiva possível. Sempre que se precisar usar altas doses o animal deve ficar sob observação para se identificar o aparecimento de efeitos colaterais se, por acaso, ocorrerem. Durante o tratamento com outros corticosteróides podemos substituí-los pelo Azium® Solução, respeitando-se a adequada redução e ajuste da dose.
**Bovinos** – Usar 5 a 20 mg de dexametasona por via intramuscular ou intravenosa de acordo com a severidade do caso. Deve-se repetir a dose quando necessário.
**Eqüinos** – Usar 2,5 a 5,0 mg de dexametasona por via intramuscular ou intravenosa.
O produto deve estar aproximadamente à temperatura corporal ao ser injetado. Deve-se respeitar as recomendações gerais para o uso de produtos por via parenteral como as de assepsia, desinfecção e velocidade de administração na via intravenosa.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 11 dias
**LEITE:** 5 dias.

## APRESENTAÇÃO:

**Caixa com 24 frascos de 10 mL. Estojo com 1 frasco de 10 mL.**



# **BANAMINE®** INJETÁVEL

*FLUNIXINA MEGLUMINA AGENTE ANALGÉSICO, ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTITÉRMICO*

## FÓRMULA:

**Cada mL contém:**
Flunixina meglumina equivalente a 50 mg de Flunixina
Veículo q.s.p. - 1,00 mL

## INDICAÇÕES:

**Banamine® Injetável** é um potente analgésico, não-narcótico, não-esteroidal, com atividade anti-inflamatória e antipirética. **Banamine® Injetável** é recomendado para equinos e bovinos. Em todos os casos de dor, febre e/ou inflamação.

**Uso em EQUINOS:**
No alívio da dor, associada com desordens músculo esqueléticas e para a dor visceral com cólicas. A flunixina é usada para alívio da dor nas inflamações ou envolvendo alguma forma de claudicação. Por outro lado, a dor visceral ou cólica em equinos é o sinal de um agudo ou sub-agudo embaraço abdominal, muitas vezes de natureza grave, exigindo medidas de efeito rápido, já que o alívio da dor é de extrema importância para evitar auto-lesões.

**BOVINOS:**

- Tratamento auxiliar em infecções agudas (particularmente no Complexo Respiratório Bovino) para reduzir a febre e estimular o apetite.
- Diarreia dos bezerros recém-nascidos.
- Inflamações agudas e crônicas do aparelho locomotor.
- Tratamento da dor aguda causada por cirurgia e feridas.
- Vacas caídas (paresia pós-parto). Elevado grau de eficácia.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

**EQUINOS:** Administrar em equinos por via intramuscular ou intravenosa. Nas desordens músculo esqueléticas, injetar 1 mL de **Banamine® Injetável** para cada 45 quilos de peso vivo (1,1 mg/kg) por dia. O tratamento pode ser repetido durante 5 dias seguidos. O início da ação se faz dentro de 1 hora, com pico entre 12 e 16 horas e a duração da atividade entre 24 e 36 horas. Para o alívio da dor associada com cólicas no cavalo, aplicar 1 mL para cada 45 quilos de peso vivo (1,1 mg/kg). Nestes casos a via intravenosa é recomendada para pronta ação, o que pode ocorrer dentro de 15 minutos ou menos. O tratamento pode ser repetido se reaparecerem os sinais de cólicas. A causa da cólica deve ser determinada e tratada concomitantemente com a terapêutica indicada.

**BOVINOS:**
**Diarreia dos recém-nascidos:** Administrar por via intramuscular ou intravenosa, 2 a 3 mL por bezerro (geralmente uma única aplicação).
**Outras indicações:** 2,2 mg/kg por dia (2 mL para cada 45 quilos de peso vivo). ser determinada e tratada concomitantemente com a terapêutica indicada.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 4 dias.
**LEITE:** 36 horas.
**EQUINOS:** Abate: Este produto não deve ser aplicado em equinos produtores de carne para o consumo humano.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.
Conservar em local fresco e seco, ao abrigo dos raios solares, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Não deve ser usado em fêmeas prenhes.




## APRESENTAÇÕES:

**Frascos-ampola de 10, 50 e 100 mL.**

# **BANAMINE**® TRANSDERMAL

*SOLUÇÃO POUR-ON À BASE DE FLUNIXINA MEGLUMINA*

## FÓRMULA:

**Cada mL contém:**
Flunixina meglumina (equivalente a 50 mg de Flunixina base) - 83,00 mg
Veículo q.s.p. - 1,00 mL

## INDICAÇÕES:

**Banamine® Transdermal** é indicado para a redução da febre e para o alívio dos sinais clínicos de inflamação associados com a Doença Respiratória Bovina (DRB). É também indicado na redução da febre e no alívio de sinais clínicos de inflamação, como a dor, o inchaço e a rigidez associados com mastites.

**Banamine® Transdermal** um potente anti-inflamatório não esteroidal (AINE), analgésico não-narcótico, com atividade anti-inflamatória e antipirética.

## FARMACODINÂMICA:

A Flunixina é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) da classe dos fenamatos, que possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas.

O mecanismo de ação da flunixina meglumina se dá pela inibição da ciclo-oxigenase (COX), que catalisa a conversão do ácido araquidônico para endoperóxidos cíclicos instáveis, que são convertidos em prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano.

Alguns destes prostanóides, tais como as prostaglandinas são mediadores de inflamação, dor e febre. A inibição da síntese de tais componentes é responsável pelos efeitos terapêuticos da flunixina meglumina.

## FARMACOCINÉTICA:

A flunixina meglumina é normalmente bem absorvida dos locais da injeção após administração IM e a biodisponibilidade é normalmente alta (>75%).

Em bovinos (exceto para bezerros), os volumes de distribuição são geralmente baixos devido ao alto grau (aproximadamente 99%) de ligação às proteínas plasmáticas. Isto limita a passagem do plasma para líquidos intersticiais e transcelulares, mas melhora a passagem para os exsudatos inflamatórios, o que explica, em parte, porque a flunixina é eficaz por um período mais longo de tempo do que poderia ser previsto do perfil plasmático tempo-concentração com depuração rápida e valores curtos de meia-vida.

Após a aplicação tópica (transdérmica), a flunixina é moderadamente absorvida através da pele dos bovinos (biodisponibilidade de aproximadamente 44%).

A absorção da flunixina é mais rápida em climas mais quentes (T=13°C-30°C – Tmax ≈ 2 horas), quando comparada ao frio (T= -3°C-7°C – Tmax ≈ 6 horas). A meia-vida de eliminação plasmática aparente após a administração tópica é de aproximadamente 7,8h.

O metabolismo da flunixina é bastante limitado, a maior parte do fármaco corresponde ao composto original inalterado e os metabólitos restantes são derivados de hidroxilação. Em bovinos, a eliminação ocorre principalmente através de excreção biliar.

## MODO DE ADMINISTRAÇÃO, DOSAGEM E MODO DE USAR:

Uso pour-on.

Administrar o produto **Banamine® Transdermal** na dose de 1 mL do produto para cada 15 Kg de peso corporal (equivalente a 3,3 mg de Flunixina por Kg de peso corporal), em dose única. A câmara de dosagem do frasco é graduada em Kg de peso corporal.

Administrar o produto despejando o volume da dose por toda a linha média dorsal do animal, desde a cernelha até o início da cauda.



# **BANAMINE**® TRANSDERMAL (cont.)

## PRECAUÇÕES:

- Administrar o produto sobre a pele seca e evitar exposição dos animais à chuva durante as primeiras 6 (seis) horas após o tratamento;
- A causa da inflamação deve ser determinada e tratada com terapia adjacente;
- Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são conhecidos por apresentarem potencial em retardar o parto através de um efeito tocolítico pela inibição das prostaglandinas, que são importantes sinalizadores do início do parto;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais;
- O produto foi avaliado em animais a partir de 6 meses de idade.

**Precauções especiais a serem tomadas pela pessoa que manuseia o produto ou que administra o produto nos animais:**

- Utilizar equipamento de proteção individual (luvas impermeáveis, vestuário de proteção e óculos de segurança) durante a administração do produto;
- Evitar o contato com a área tratada sem o uso de luvas de proteção, até que a área tratada esteja seca;
- Não fumar, comer ou beber durante o manuseio do produto. Lavar as mãos após o uso. Em caso de ingestão acidental ou contato com a boca, lavar imediatamente a boca com água em abundância e procurar orientação médica;
- Pessoas com hipersensibilidade conhecida à anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) devem evitar o contato com o produto;
- Evitar contato do produto com os olhos, tomando cuidado inclusive ao levar a mão que manipulou o produto em contato com os olhos. O produto demonstrou causar danos oculares severos e irreversíveis em animais de laboratório. Em caso de contato com os olhos, lavar os olhos imediatamente com grande quantidade de água limpa e procurar orientação médica;
- Evitar contato com a pele. O produto demonstrou causar irritação da pele. No caso de contato com a pele, lavar com água e sabão.

**Gestação:**

- O produto pode ser utilizado durante a gestação (exceto nas 48 horas que antecedem o parto) e também pode ser utilizado durante a lactação;
- O produto somente deve ser administrado dentro das primeiras 36 horas após o parto, com base em uma avaliação de risco/benefício realizada pelo Médico-veterinário responsável, e os animais tratados devem ser monitorados quanto à retenção de placenta.

**Interação com outros medicamentos:**

- O produto não deve ser administrado concomitantemente com outro anti-inflamatório não esteroidal (AINE).

**Superdosagens:**

- Reações inflamatórias dérmicas localizadas e necrose foram reportadas com doses de 5 mg/Kg;
- Lesões abomasais erosivas e ulcerativas foram observadas em animais que receberam 3 (três) vezes a dose recomendada de tratamento;
- Sangue oculto nas fezes foi observado em alguns animais em que foi administrada 5 (cinco) vezes a dose recomendada de tratamento.

**Contraindicações:**

- Não utilizar em caso de hipersensibilidade conhecida à flunixina meglumina ou qualquer outro componente da fórmula;
- Não utilizar em animais que sofrem de doenças cardíacas, hepáticas ou renais; ou ainda em casos onde há evidência de lesões gastrointestinais ulcerogênicas;
- Evitar utilizar em animais severamente desidratados ou hipovolêmicos, uma vez que há risco potencial de aumento de toxicidade renal;
- Não utilizar o produto dentro das 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o parto.
- O produto não foi avaliado em machos reprodutores.

**Reações Adversas:**

Sinais transitórios como: inchaço, eritema, seborreia, queda e fraqueza dos pelos, alopecia ou espessamento da pele podem ser observados no local da aplicação.

Geralmente nenhum tratamento específico é necessário.

Alguns animais podem apresentar sinais temporários de irritação, agitação ou desconforto após a administração do produto.

Em casos muito raros, reações anafiláticas podem ocorrer e devem ser tratadas sintomaticamente. Caso reações mais sérias ou outras reações não descritas nesta bula forem observadas, o Médico-veterinário deverá ser consultado.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 7 dias.
**LEITE:** 36 horas.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto o frasco, utilizar o produto no prazo máximo de 6 meses.




## APRESENTAÇÕES:

**Frascos de 250 mL e 1L.**

# ANTIMICROBIANOS




**BIOXELL**®
**BORGAL**®
**COBACTAN**®
**METRICURE**®
**NUFLOR**®

**OXITRAT**® LA PLUS
**PENCIVET**® PPU PLUS
**RESFLOR**®
**ZUPREVO**®

# BIOXELL®

*ANTIMICROBIANO INJETÁVEL DE AMPLO ESPECTRO.*

## FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Ceftiofur (Cloridrato) 5 g
Veículo q.s.p. 100 mL

## INDICAÇÕES:

**Bioxell®** é indicado no tratamento de infecções dos bovinos e suínos causadas por bactérias Gram-negativo e Gram-positivo.

**Bovinos:** pneumonias e infeccções respiratórias, enterites (diarreias), pododermatite – podridão de casco, difteria, infecções genitourinárias e feridas infecciosas.

**Suínos:** pneumonias e infeccções respiratórias, enterites (diarreias), enterotoxemia, artrite infecciosa, feridas infecciosas, infecções genitourinárias e meningoencefalite.

## DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

**Bovinos:** Via Intramuscular. A dosagem recomendada é de 1,0 mL / 50 kg de peso corporal, o que corresponde a 1 mg de ceftiofur / kg de peso corporal.
**Suínos:** Via Intramuscular. A dosagem recomendada é de 0,6 mL / 10 kg e 1,0 mL / 10 kg de peso corporal, o que corresponde a 3 mg e 5 mg de ceftiofur / kg de peso corporal.

## CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilizar o produto em animais com histórico de sensibilidade e suspender a medicação quando for detectado algum tipo de reação;
Não utilizar em porcas prenhes.

## CARÊNCIA:

**BOVINOS:** abate: o abate dos animais tratados somente deve ser realizado 1 dia após a última aplicação

**LEITE:** carência zero.

**SUÍNOS:** abate: carência zero




## APRESENTAÇÕES:

**Frascos contendo 50 mL e 100 mL.**

# BORGAL®

*ANTIBIÓTICO À BASE DE SULFADOXINA E TRIMETOPRIMA*

Para a terapêutica de infecções por agentes Gram-positivos e Gram-negativos, sensíveis à Sulfadoxina e Trimetoprima.

**BORGAL®** é um quimioterápico composto de duas substâncias ativas, que interferem, com ação bloqueadora, em dois pontos distintos na biossíntese das bactérias e potenciam reciprocamente seu efeito até o bactericida.

## FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Sulfadoxina - 20,00 g
Trimetoprima - 4,00 g
Veículo q.s.p. - 100,00 mL

## INDICAÇÕES:

Tratamento de doenças infecciosas bacterianas em bovinos e equinos causadas por microrganismos sensíveis à Sulfadoxina e Trimetoprima:

**BOVINOS:** Via Intramuscular (IM) e Via Intravenosa (IV): ***Staphylococcus aureus***, ***Streptococcus pyogenes***, ***Pasteurella multocida***, ***Escherichia coli***, ***Salmonella enterica***, ***Listeria monocytogenes***, ***Corynebacterium bovis***, ***Klebsiella pneumoniae***, ***Staphylococcus epidermidis***, ***Fusobacterium necrophorum*** e ***Mannheimia haemolytica***.

**Equinos:** Via Intramuscular (IM) e Via Intravenosa (IV): ***Streptococcus equi***, ***Escherichia coli*** e ***Listeria monocytogenes***.

## FARMACOCINÉTICA:

**BOVINOS:**

A sulfadoxina administrada por via intravenosa em bovinos, resultou na Cmáx 28.806,25 µg/L dentro de 0,5 hora (Tmáx), com meia vida em média entre 4 e 6 horas. A trimetoprima resultou na Cmáx 1.490,00 µg/L dentro de 0,5 hora (Tmáx), com meia vida em média entre 1 e 2 horas.

A sulfadoxina administrada por via intramuscular em bovinos, resultou na Cmáx 20.975,00 µg/L dentro de 2,0 horas (Tmáx), com meia vida em média entre 6 e 8 horas.

A trimetoprima resultou na Cmáx 544,31 µg/L dentro de 2,0 horas (Tmáx), com meia vida em média entre 4 e 6 horas.

**EQUINOS:**

A sulfadoxina administrada por via intravenosa em equinos, resultou na Cmáx 62.350,00 µg/L dentro de 0,5 hora (Tmáx), com meia vida em média entre 4 e 6 horas.

A trimetoprima resultou na Cmáx 1.155,00 µg/L dentro de 0,5 hora (Tmáx), com meia vida em média entre 2 e 3 horas. A sulfadoxina administrada por via intramuscular em equinos, resultou na Cmáx 30.912,50 µg/L dentro de 4,0 horas (Tmáx), com meia vida em média entre 12 e 16 horas.

A trimetoprima resultou na Cmáx 418,00 µg/L dentro de 3,0 horas (Tmáx), com meia vida em média entre 8 e 12 horas.

## FARMACODINÂMICA:

A sulfadoxina tem um processo de ação competitivo com os receptores para o ácido p-aminobenzóico. Muitas bactérias empregam o ácido p-aminobenzóico para a biossíntese do ácido fólico e este por sua vez, para a produção dos ácidos nucleicos, o que quer dizer que a sulfadoxina interfere com a síntese do ácido fólico na célula bacteriana por competição, inibindo a incorporação do ácido p-aminobenzóico na molécula do ácido fólico.

A trimetoprima tem um efeito inibitório sobre a enzima diidrofolato redutase, que é responsável pela transformação do ácido diidrofólico em ácido tetraidrofólico.

Com a combinação das propriedades de ação e de efeitos, se incrementam as atividades bacterianas e bacteriostáticas de cada um dos componentes, de forma que se pode obter também um efeito bactericida em concentrações ótimas.

A associação da sulfadoxina e trimetoprima aumenta a eficiência no combate a bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.

## ADVERTÊNCIAS:

- Evitar administrar mais do que 10 mL no mesmo local de aplicação, quando utilizado pela via intramuscular;
- Após administração intramuscular, pode ocorrer a formação de um nódulo transitório;
- Não aplicar em animais que apresentem glomerulonefrite ou insuficiência renal aguda;
- Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade às Sulfonamidas;
- Em casos esporádicos, a solução do produto conservada a baixas temperaturas pode apresentar pequenos cristais, facilmente eliminéveis mediante ligeiro aquecimento em banho-maria.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A dose de referência para todos os animais é de 3 mL do produto Borgal® para cada 50 kg de peso, equivalente a 12,0 mg de sulfadoxina/kg de peso vivo e 2,4 mg de trimetoprima/kg de peso vivo, em dose única, tanto pela via intravenosa quanto pela via intramuscular.

## APLICAÇÃO:

**Bovinos** – vias endovenosa e intramuscular.

**Equinos** – de preferência por via endovenosa, podendo ser usada também a via intramuscular.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 4 dias.

**LEITE:** 48 horas.

**EQUINOS:** Abate – este produto não deve ser aplicado em equinos produtores de carne para o consumo humano.




## APRESENTAÇÃO:

**Frasco-ampola de vidro com 5, 10 e 50 mL.**

# COBACTAN®

*ANTIBIÓTICO INJETÁVEL À BASE DE CEFQUINOMA*

Antibiótico injetável à base de Cefquinoma do grupo das Cefalosporinas, com alta eficiência no combate aos germes Gram-positivos e Gram-negativos, relacionados com as principais doenças que acometem os bovinos e suínos. Sua atuação é pela inibição da síntese da parede celular bacteriana. Possui ainda uma alta estabilidade contra as Penicilinases e β lactamases.

## INDICAÇÕES:

O produto **Cobactan®** é indicado no tratamento de infecções bacterianas em bovinos e suínos, como doença respiratória, dermatite digital, necrose bulbar infecciosa, necrobacilose interdigital aguda, mastite aguda, septicemia, síndrome de mastite-metrite-agalactia (MMA), meningite, artrite e epidermite, causadas por microorganismos Gram-positivos e Gram-negativos, sensíveis à cefquinoma, tais como: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *E. coli*, *Fusobacterium necrophorum*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*, *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus hyicus*.

## DOSAGEM E MODO DE USAR:

O **Cobactan®** é indicado no tratamento de infecções bacterianas em bovinos e suínos, via intramuscular, conforme tabela abaixo:

| Espécie | Indicação | Dosagem | Frequência |
|---|---|---|---|
| Bovinos | Doença respiratória causada por *Pasteurella multocida* e *Mannheimia haemolytica* | 1 mg cefquinoma/ Kg pc (2 mL/50 Kg pc) | Diariamente por 3-5 dias consecutivos |
| | Dermatite digital, necrose bulbar infecciosa e necrobacilose interdigital aguda | 1 mg cefquinoma/ Kg pc (2 mL/50 Kg pc) | Diariamente por 3-5 dias consecutivos |
| | Mastite aguda por *E. coli* com sinais de envolvimento sistêmico | 1 mg cefquinoma/ Kg pc (2mL/50 Kg pc) | Diariamente por 2 dias consecutivos |
| Bezerros | Septicemia por *E. coli* | 2 mg cefquinoma/ Kg pc (4mL/50 Kg pc) | Diariamente por 3-5 dias consecutivos |
| Suínos | Doença respiratória | 2 mg cefquinoma/ Kg pc (2mL/25 Kg pc) | Diariamente por 3 dias consecutivos |
| | MMA | 2 mg cefquinoma/ Kg pc (2mL/25 Kg pc) | Diariamente por 2 dias consecutivos |
| Leitões | Meningite | 2 mg cefquinoma/ Kg pc (2mL/25 Kg pc) | Diariamente por 5 dias consecutivos |
| | Artrite | 2 mg cefquinoma/ Kg pc (2mL/25 Kg pc) | Diariamente por 5 dias consecutivos |
| | Epidermite | 2 mg cefquinoma/ Kg pc (2mL/25 Kg pc) | Diariamente por 5 dias consecutivos |

## CONTRAINDICAÇÕES:

A hipersensibilidade às Cefalosporinas é rara, mas o Cefquinoma não poderá ser administrado em animais que demonstrem hipersensibilidade aos antibióticos β lactâmicos.

## PRECAUÇÕES GERAIS:

O transporte do produto pode ser realizado em temperatura ambiente (15°C a 30°C) por até 20 dias.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar sob refrigeração (2°C a 8°C), ao abrigo de luz solar. Não congelar.

Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico-veterinário.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 4 dias.
**LEITE:** carência zero.
**SUÍNOS:** 3 dias.




## APRESENTAÇÕES:

**Frasco-ampola de 50 e 100 mL.**

# METRICURE®

*CEFAPIRINA BENZATÍNICA PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRITES*

## FÓRMULA:

**Cada seringa de 19 g contém:**
Cefapirina base - 500 mg
Excipiente q.s.p. - 19 g

## PROPRIEDADES:

A Cefapirina, uma cefalosporina de primeira geração, é um antibiótico de amplo espectro com ação bactericida contra bactérias gram-positivas e gram-negativas.

A Cefapirina é resistente à ação da penicilinase e é ativa em ambientes anaeróbios, assim como o encontrado em úteros infectados. Após um único tratamento de Metricure, as concentrações da cefapirina no tecido endometrial são mantidas por, pelo menos, 24 horas acima dos níveis MIC para bactérias sensíveis.

A suspensão é bem tolerada, permite boa difusão da Cefapirina no endométrio e é facilmente aplicada.

## INDICAÇÕES:

**Metricure®** é indicado para o tratamento da endometrite subaguda e crônica em vacas (mínimo de 14 dias após o parto), causada por bactérias sensíveis à Cefapirina. Patógenos importantes causadores da endometrite incluem o *Actinomyces (Corynebacterium) pyogenes* e algumas bactérias anaeróbias como a *Fusobacterium necrophorum* e os anaeróbios gram negativos com pigmentação negra.

O **Metricure®** também pode ser usado no tratamento de vacas que apresentam retorno de estro (mais de 3 inseminações artificiais sem sucesso), caso haja suspeita de que o problema de infertilidade seja causado por infecções bacterianas.

## DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO:

O conteúdo de uma seringa de **Metricure®** deve ser introduzido no lúmen uterino com o auxílio do cateter que acompanha o produto.

- Prender a seringa ao cateter.
- Vestir a luva, inserir a mão no reto do animal e segurar o cérvix do útero com a mão.
- Passe o cateter pelo cérvix, com movimento oscilatórios gentis, até que este chegue ao lúmen uterino.
- Injetar o **Metricure®**.

Um tratamento com **Metricure®**, normalmente, é suficiente para a cura completa. Animais que foram inseminados podem ser tratados com **Metricure®** um dia após a inseminação artificial. Em casos de piometra, recomenda-se o pré-tratamento do animal com prostaglandinas, para que haja a indução da luteólise e a remoção do material contaminado da cavidade uterina antes do uso do **Metricure®**.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

O **Metricure®** não deve ser usado em animais com conhecida alergia às cefalosporinas. Conservar entre 15 a 25°C

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 2 dias.

**LEITE:** O produto não requer período de carência para o consumo do leite dos bovinos tratados.

## APRESENTAÇÃO:



**Caixa com 10 seringas de 19 g cada, 10 catéteres e 10 luvas.**

# NUFLOR® SOLUÇÃO INJETÁVEL

*ANTIBIÓTICO DE AMPLO ESPECTRO À BASE DE FLORFENICOL*

## INDICAÇÕES:

Em bovinos, **Nuflor® Solução Injetável**, é indicado no tratamento curativo de doenças causadas por bactérias sensíveis ao florfenicol, tais como:

1. Infecções respiratórias – Doença Respiratória Bovina (Febre do transporte), causadas por *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Haemophilus somnus*.
2. Infecções gastrintestinais (diarréias) – causadas por *Escherichia coli*.
3. Pododermatites – causadas por *Bacteroides nodosus*, *Bacteroides melaninogenicus* e *Fusobacterium necrophorum*.
4. Oftalmológicas – Ceratoconjuntivite infecciosa causada por *Moraxella bovis*.

**Nuflor® Solução Injetável** é também indicado para o tratamento metafilático visando reduzir a incidência das doenças respiratórias dos bovinos e retardar a manifestação dos sinais clínicos nas seguintes condições:

- Animais pertencentes a rebanhos onde ocorra incidência superior a 10% de casos clínicos de doença respiratória dos bovinos causada por *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Haemophilus somnus*;
- Animais submetidos a condições estressantes ou mantidos em instalações onde a incidência da doença tenha sido observada com freqüência, durante sua estada ou logo após o embarque para outro local.

Em suínos **Nuflor® Solução Injetável** é indicado no tratamento das doenças respiratórias causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *M. hyorhinus*, *Salmonella cholerasuis* e *Streptococcus suis* tipo II.

**Suínos:**

**Nuflor®** é indicado para o tratamento da Doença Respiratória Suína causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis* e *Streptococcus suis Tipo II*.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 38 dias.
**LEITE:** Esse produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.
**SUÍNOS:** 9 dias

## POSOLOGIA E MODO DE USAR:

**Bovinos:**

Recomenda-se 1 dose única por via subcutânea de 2 mL de **Nuflor® Solução Injetável**/15 kg de massa corporal (40 mg de florfenicol/kg) ou 2 doses de 1 mL de **Nuflor® Solução Injetável**/15 kg de massa corporal (20 mg de florfenicol/kg) por via intramuscular (na musculatura do pescoço), com intervalo de 48 horas entre uma e outra aplicação.

**Suínos:** Recomendam-se 2 doses de 1 mL de **Nuflor® Solução Injetável**/ 20 kg de massa corporal (15 mg de florfenicol/ kg), por via intramuscular, administradas com intervalo de 48 horas entre aplicações.

## PRECAUÇÕES DE USO:

- Limpar a tampa do frasco antes de aspirar cada dose.
- Usar seringa e agulhas estéreis e secas.
- O efeito do florfenicol sobre a performance reprodutiva e a gestação não foi estudado. Observar as contra-indicações.
- Uma vez retirada a 1ª dose do frasco, utilizar o produto dentro de 28 dias. Desprezar os restos de produto não utilizados dentro desse prazo.

## RESTRIÇÕES DE USO:

- Não utilizar o produto em touros na fase de reprodução, em vacas durante a gestação bem como, em suínos (reprodutores e matrizes) durante a fase de reprodução.
- Não administrar em vacas leiteiras lactantes e em bezerros recém-nascidos e nas hepatopatias.




## APRESENTAÇÕES:

**Frasco-ampola de vidro com 20, 30, 50, 100 e 250 mL.**

# OXITRAT LA® PLUS

*ANTIBIÓTICO INJETÁVEL, DE AÇÃO PROLONGADA, AMPLO ESPECTRO, ASSOCIADO A UM ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO HORMONAL.*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Oxitetraciclina (cloridrato) - 20,0 g
Diclofenaco de sódico - 1,0 g
Veículo q.s.p. - 100 mL

INDICAÇÕES:

**Oxitrat LA® Plus** é indicado no combate às infecções provocadas por bactérias Gram-positivo e Gram-negativo, suscetíveis à Oxitetraciclina, bem como no tratamento de Anaplasmose em bovinos.

DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

**Via intramuscular**: A dosagem recomendada é de 1,0 mL/10 kg de peso corporal, o que corresponde a 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso e 1,0 mg de diclofenaco de sódio/kg de peso para bovinos.
**Via intravenosa:** A dosagem recomendada é de 1,0 mL/20 kg de peso corporal, o que corresponde a 10 mg de oxitetraciclina/kg de peso e 0,5 mg de diclofenaco de sódio/kg de peso para bovinos.

**Intervalo entre as doses:**

**Via Intramuscular:** normalmente uma dose é suficiente para um tratamento eficaz, entretanto em infecções graves, deve-se administrar uma segunda dose 3 dias após a primeira aplicação.
**Via Intravenosa:** administrar uma segunda dose 24 horas após a primeira aplicação e repetir no máximo por 4 dias consecutivos.

Volume máximo recomendado por ponto de aplicação é: 10 mL.

Doses superiores às indicadas acima, administradas via intramuscular, devem ser subdivididas em dois ou mais pontos de aplicação.

As subdosagens podem facilitar o desenvolvimento da resistência e interferir na eficácia do tratamento.

CONTRAINDICAÇÕES:

É contraindicado para uso em equídeos, cães e gatos;
Apesar do antibiótico ser bem tolerado, ocasionalmente podem ser observadas pequenas reações locais (leve edema) de natureza transitória.

CARÊNCIA:

**CARNE:** Abate - O abate dos animais tratados pela via intravenosa ou intramuscular somente deve ser realizado 39 dias após a última aplicação.

**LEITE:** O leite dos animais tratados pela via intravenosa não deve ser destinado ao consumo humano até 7 dias após a última aplicação deste produto.

O leite dos animais tratados pela via intramuscular não deve ser destinado ao consumo humano até 19 dias após a última aplicação deste produto.

APRESENTAÇÕES:

**Frasco-ampola contendo 50 mL e 100 mL.**



# PENCIVET® PLUS PPU

*ANTIBACTERIANO DE USO INJETÁVEL, PRONTO PARA USO, À BASE DE BENZILPENICILINA G, PROCAÍNA, BENZILPENICILINA G BENZATINA E DIHIDROESTREPTOMICINA, ASSOCIADO À UM ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-HORMONAL, O PIROXICAM.*

Antibacteriano de uso injetável, pronto para uso, à base de Benzilpenicilina G, Procaína, Benzilpenicilina G Benzatina e Dihidroestreptomicina, associado à um anti-inflamatório não-hormonal, o Piroxicam.

## INDICAÇÕES:

**Bovinos**

Tratamento de doenças infecciosas primárias e secundárias dos bovinos, causadas par bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, sensíveis às Benzilpenicilinas e Dihidroestreptomicina, tais como *Carynebacterium bovis*, *Streptococcus pneumoniae, Shigela flexneri* e *Clostridium perfringens*, acompanhados de processos inflamatórios agudos e crônicos.

**Suínos**

Tratamento de doenças infecciosas dos suínos causadas por bactérias sensíveis aos princípios ativos do produto com o *Glaesserella parasuis* e *Streptococcus suis*, acompanhadas de processos inflamatórios.

## POSOLOGIA:

**Bovinos:** a dose recomendada é de 1 ml para cada 25 Kg de peso vivo. A dosagem é única e poderá ser alterada de acordo com a orientação do Médico-veterinário.

**Suínos:** A dose única recomendada é de 1 ml para cada 10Kg de peso vivo.

## MODO DE USAR:

**Bovinos:** Via intramuscular profunda, utilizando agulhas com diâmetro não inferior a 1 mm e comprimento de 25 a 30 mm. Recomendamos não injetar num mesmo local doses superiores a 20 ml.

**Suínos:** Administrar pela via intramuscular.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 28 dias.
**LEITE:** 7 dias.
**SUÍNOS:** 26 dias.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Não aplicar **PENCIVET ® Plus PPU** por outra via, a não ser a indicada;
- Não utilizar outros anti-inflamatórios durante o tratamento com **PENCIVET® Plus PPU**;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- O transporte do produto pode ser realizado em temperatura ambiente (15°C a 30°C) por até 20 dias;
- Usar seringas e agulhas estéreis;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais;
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade aos princípios ativos do produto;
- Os antibióticos aminoglicosídios podem causar ototoxidade e nefrotoxidade sendo que alguns diuréticos podem potencializar esses efeitos;
- Em suínos o produto pode ser utilizado em fêmeas prenhes e leitões a partir de 2 dias de idade.

## ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

- Conversar sob refrigeração (2°C a 8°C), ao abrigo da luz. Não congelar;
- Após aberto o frasco, utilizar o conteúdo imediatamente;
- O transporte do produto pode ser realizado em temperatura ambiente (15°C a 30°C) por até 20 dias.




## APRESENTAÇÕES:

**Frasco-ampola contendo 30 e 50 ml.**

# RESFLOR® GOLD

*SOLUÇÃO INJETÁVEL À BASE DE FLORFENICOL E FLUNIXINO MEGLUMINA.*

Solução injetável à base de florfenicol e flunixino meglumina.

## INDICAÇÕES:

**Resflor® Gold** é indicado para o tratamento da Doença Respiratória Bovina (DRB) associada com *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni* e controle da pirexia associada à doença respiratória em bovinos de corte e vacas leiteiras cujo leite não seja destinado ao consumo humano.

## DOSAGEM, MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:



Administrar em dose única de 2 mL do produto para cada 15 Kg de peso corpóreo (40 mg/Kg de florfenicol e 2,2 mg/Kg de flunixino).

Quando o volume de aplicação exceder a 10 mL dividir a aplicação em dois ou mais pontos.

O produto vem pronto para o uso e deve ser injetado somente por via subcutânea, na tábua do pescoço conforme desenho ao lado.

Após aberto o frasco, utilizar todo o conteúdo no prazo máximo de 28 dias.

## PRECAUÇÕES:

- Não administrar mais que 10 mL em cada local de aplicação.
- Usar seringas e agulhas estéreis.
- O produto deve ser aplicado somente na tábua do pescoço. Outros locais de injeção não foram avaliados.
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais.

**Precauções especiais para uso, inclusive aquelas a serem tomada pela pessoa que administra o produto nos animais:**

- O produto contém materiais que podem ser irritantes para pele e olhos.
- Evitar contato direto com pele, olhos e roupas. Caso uma exposição acidental ocorra procure auxílio médico.
- Injeção acidental deste produto pode causar irritação. Consultar um médico imediatamente.

## CONTRAINDICAÇÕES:

- Não usar em animais com conhecida hipersensibilidade ao florfenicol ou ao fluniximo meglumina.
- Os efeitos do florfenicol sobre a performance reprodutiva, gestação e lactação em bovinos não foram estudados. Estudos de toxicidade em cães, ratos e camundongos associaram o uso do florfenicol com degeneração e atrofia testicular.
- A classe das drogas anti-inflamatórias não esteroidais pode estar associada com toxicidade gastrintestinal, renal e hepática, sendo que os efeitos variam de forma individual. Pacientes com alto risco de toxicidade são aqueles que apresentam desidratação, em terapia diurética concomitante ou aqueles com disfunção renal, cardiovascular e/ou hepática pré-existente. A administração de drogas nefrotóxicas concomitantemente devem ser cuidadosamente monitoradas. Como muitas drogas antiinflamatórias não esteroidais possuem o potencial para induzir ulceração gastrintestinal, o uso concomitante do produto com outras drogas antiinflamatórias, como drogas antiinflamatórias não esteroidais e corticosteróides, deve ser evitado ou acompanhado pelo Médico Veterinário. Drogas antiinflamatórias não esteroidais podem ter efeitos no ciclo estral e na gestação, não devendo ser usadas em animais destinados à reprodução.

## EFEITOS COLATERAIS:

Em estudo de segurança de até 5 vezes a dose recomendada por um período de 3 vezes a duração do tratamento recomendado foi observada inapetência transitória, decréscimo no consumo de água, e reação no local de injeção. Além disso, reações anafiláticas podem ocorrer.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 38 dias.
**LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.




## APRESENTAÇÃO:

**Frasco de 100 mL.**

# ZUPREVO®

*SOLUÇÃO INJETÁVEL À BASE DE TILDIPIROSINA*

**ZUPREVO®** é indicado para o tratamento e prevenção da Doença Respiratória Bovina (DRB) associada com *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni* sensíveis à tildipirosina.

A presença da doença no rebanho deve ser confirmada antes do tratamento preventivo.

## DOSAGEM, MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

**Uso subcutâneo.**

Administrar 4 mg de tildipirosina/kg de peso corporal (equivalente a 1 mL/45 kg de peso corporal), em dose única.

Para tratamento de bovinos com mais de 450 kg de peso corporal, dividir a dose de maneira que não mais do que 10 mL sejam aplicados em um mesmo local.

Para garantir a dosagem correta e evitar subdosagem, o peso corporal deve ser determinado com a maior precisão possível.

É recomendado tratar os animais nas fases iniciais da doença e avaliar a resposta ao tratamento dentro de 2 a 3 dias após a aplicação. Se os sinais clínicos da doença respiratória persistirem ou aumentarem, o tratamento deve ser alterado, utilizando outro antibiótico, e continuado até que os sinais clínicos tenham desaparecido.

Após aberto o frasco, utilizar todo o conteúdo no prazo máximo de 28 dias.

## PRECAUÇÕES:

- Não administrar mais que 10 mL em cada local de aplicação;
- Usar seringas e agulhas estéreis;
- Sempre que possível, o produto somente deve ser utilizado após teste de suscetibilidade;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais.

**Precauções especiais para uso, inclusive aquelas a serem tomada pela pessoa que administra o produto nos animais:**

- A tildipirosina pode causar sensibilização por contato na pele. Se ocorrer exposição acidental na pele, lavá-la imediatamente com água e sabão. Se ocorrer exposição acidental nos olhos, lavá-los imediatamente com água limpa;
- Lavar as mãos após o uso;
- Deve-se ter cuidado especial para evitar auto-injeção acidental. Em caso de auto-injeção acidental, consultar imediatamente um médico e mostrar a bula ou rótulo ao médico;
- Não utilizar em seringas automáticas que não tenham algum sistema de proteção adicional.

## PERÍODOS DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:**

Abate- O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 47 dias após a última aplicação.

**LEITE-** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.




## APRESENTAÇÕES:

**Cartucho contendo 1 frasco de 20, 50, 100 ou 250 mL.**

# ESPECIALIDADES TERAPÊUTICAS




**CALMINEX®**
**HEPATOXAN®** VALLÉE
**NAQUASONE®** INJETÁVEL
**VAMPIRICID®** TÓPICO VALLÉE

# CALMINEX®

*POMADA ANTI-INFLAMATÓRIA*

MODO DE USAR:

Aplicar uma camada não muito espessa sobre a parte afetada. Repetir a aplicação em intervalos de 12 horas até a cura.

Conservar em local fresco e seco (entre 15°C e 30°C), ao abrigo dos raios solares, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Depois de aberto o produto deve ser utilizado em um período máximo de 90 (noventa) dias.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**EQUINOS:** Abate – este produto não deve ser aplicado em equinos produtores de carne para o consumo humano.




APRESENTAÇÃO:

**Bisnagas de 30, 100g.**

# HEPATOXAN® VALLÉE

*ANTITÓXICO-ESTIMULANTE-RECONSTITUINTE*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Acetilmetionina - 10,00g
Cloridrato de Piridoxina (Vit. B6) - 0,25 g
Nicotidamida - 1,50 g
Cafeína (Anidra) - 1,00 g
Cloreto de Colina - 2,00 g
Dextrose (Anidra) - 5,00 g
Água para injetáveis q.s.p. - 100,0 ml

INDICAÇÕES:

O **Hepatoxan® Vallée** é indicado para bovinos, equinos e suínos, e possui ação comprovada como um potente reconstituinte das funções orgânicas hepática e renal, promovendo o eficiente restabelecimento das espécies-alvo frente a estados tóxicos ou tóxico-infecciosos.
Possui agentes lipotrópicos que estimulam a remoção do excesso de gordura do fígado, evitando, assim, a esteatose hepática. Facilita a eliminação de diferentes substâncias químicas do organismo, tais como medicamentos e agentes tóxicos. Auxilia no tratamento da uremia, no pré e pós-operatório, estados de insuficiência hepática, e como coadjuvante no tratamento das hepatopatias infecciosas.

DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Aplicar o produto por 5 dias consecutivos com intervalo de 24 horas. Doses diárias:

| Espécie | Via de Administração* | Dose |
|---|---|---|
| Bovinos | IV ou SC | 80 – 100 mL |
| Equinos | IV | 80 – 100 mL |
| Suínos | SC | 40 – 50 mL |

**IV – Intravenosa / SC – Subcutânea.*

PRECAUÇÕES:

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido;
Após a abertura do frasco, o produto deve ser utilizado em até 10 dias e eventuais sobras deverão ser descartadas;
Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula e suspender a medicação quando for detectado qualquer tipo de reação adversa.




PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS, EQUINOS E SUÍNOS:** abate: carência zero.
**BOVINOS: LEITE:** carência zero.

APRESENTAÇÃO:

**Frascos plásticos contendo 100 mL.**

# NAQUASONE® INJETÁVEL

*ASSOCIAÇÃO DE DIURÉTICO COM ANTI-INFLAMATÓRIO*

INDICAÇÕES:

Para o tratamento de edema das glândulas mamárias durante o período pré e pós-parto em vacas leiteiras.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Injetar 10 a 20 mL, por via intramuscular, conforme a severidade do edema, podendo a dosagem acima ser repetida, conforme orientação do médico-veterinário. A resposta ao tratamento é geralmente obtida 24-48 horas após o início do tratamento. Na maioria dos casos o resultado aparece em 3-4 dias. Se a resposta não se evidenciar em 3 dias, recomenda-se reexaminar o animal.

CONTRAINDICAÇÕES:

Uso prolongado, uso indiscriminado ou alta dosagem de dexametasona poderá produzir efeitos colaterais tais como: mascaramento dos sinais de infecção (supressão da inflamação, redução da febre), retardamento da convalescença, redução do número de linfócitos circulantes, possível diminuição da resistência à infecção bacteriana e por fungos.

O uso inadequado e dosagens altas de triclorometiazida por um período longo de tempo pode produzir depleção eletrolítica. Em animais com severa disfunção renal, está contraindicada a administração de diuréticos, como a triclorometiazida. É recomendável que o veterinário determine se há infecção associada ao edema: se houver, uma terapia antimicrobiana efetiva deve ser usada.

CARÊNCIA:

**LEITE:** 3 dias.
Não usar no último trimestre da gestação (pode ser usado nos últimos cinco dias).

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo dos raios solares, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

**Frasco de 10 mL.**



# VAMPIRICID® TÓPICO VALLÉE

*PRODUTO A BASE DE WARFARINA, PARA CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS*

FÓRMULA:

**Cada 100 g contém:**
Warfarina técnica - 2 g
Excipiente q.s.p. - 100 g

INDICAÇÕES:

Indicado para controle de morcegos hematófagos, com aplicação tópica nas feridas de equinos, asininos e muares.

MODO DE USAR:

Aplicar a pasta com o bico da bisnaga, ao redor das mordeduras recentes produzidas por morcegos hematófagos, procurando fazer um círculo de 3 cm de diâmetro em torno do ferimento. A aplicação deve ser feita ao entardecer. Repetir o tratamento quantas vezes se fizer necessário.

PRECAUÇÕES:

- Limpar o bico-aplicador da bisnaga diretamente no pelo do animal antes de fechá-lo;
- Manter a bisnaga bem fechada;
- Inutilizar a bisnaga ao término do produto;
- Não guardar junto de alimentos, bebidas e produtos domésticos;
- Se o produto for ingerido por pessoas, provoque vômitos e procure imediatamente um médico e no caso de animais procure um médico veterinário;
- Evite contato com a pele, olhos e roupas. Caso ocorra, lave a região com água e sabão;
- Não provoca efeito tóxico nos animais quando usado como recomendado.

ADVERTÊNCIA:

o produto possui contraindicação para espécies produtoras de alimentos.

ANTÍDOTO:

Vitamina K.

A aplicação deste produto deverá ser realizada sob a supervisão de médico-veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**EQUINOS, ASININOS E MUARES**
ABATE: Este produto não deve ser utilizado em equinos, asininos e muares destinados ao abate para consumo humano.



APRESENTAÇÃO:

**Bisnagas de 50 g, acondicionadas em embalagens coletivas contendo 05 unidades.**

# ANTIPARASITÁRIOS




**BOVGUARD**®
**BUTOX**® P CE 25
**EXCELLER**®
**EXPERT**® BRINCO
**EXZOLT**®
**HALOCUR**®
**IMIZOL**®
**NEOCIDOL**® P CE 25
**PANACOXX**®

**PANACUR**® 10%
**POTENTY**®
**RANGER**® LA 3,5%
**SOLUTION**® 3,5%
**SUPRAMEC**® GEL
**SUPRAMEC**® POUR-ON
**TICK GARD**®
**TRIATOX**®
**TRYPAMIZOL**®

# BOVGUARD®

*CARRAPATICIDA, BERNICIDA, MOSQUICIDA E MATA-BICHEIRAS DE APLICAÇÃO DORSAL (POUR ON) PARA BOVINOS A BASE DE FIPRONIL A 1%*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Fipronil - 1,00 g
Veículo q.s.p. - 100 mL.

INDICAÇÕES:

O **BovGuard®** é um ectoparasiticida pour on à base de Fipronil (1%), indicado para o tratamento e prevenção dos principais ectoparasitas de bovinos jovens e adultos. Um produto altamente eficaz para o controle de carrapato, berne, mosca-dos-chifres e miíase/bicheiras dos bovinos.

DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Realizar a aplicação tópica (Pour-On) de 1 mL/ 10 kg de peso vivo, equivalente a 1 mg de Fipronil por kg de peso vivo. A dose recomendada deve ser administrada ao longo da linha mediana dorsal do animal, do pescoço até a inserção da cauda, utilizando-se a embalagem autodosadora do produto ou pistola dosadora. O produto deve ser aplicado em dose única.

**Intoxicação e superdosagem nos animais**: O Fipronil apresenta ação seletiva para artrópodes, desta forma, não é considerado um produto tóxico para os animais. No entanto, as intoxicações são observadas a partir de derivados do próprio Fipronil, que, em contato com água de pH alcalino e irradiação solar, dá origem a três outros compostos de maior toxicidade sobre artrópodes e animais domésticos (sulfone, sulfide e desulfinil). Estes, por sua vez, possuem grande espectro de ação e podem levar rapidamente os animais a óbito.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** Abate - O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 93 dias após a última aplicação. **LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

APRESENTAÇÕES:

**Frascos plásticos contendo 1 L e 5 L.**




# EXCELLER®

*ENDECTOCIDA INJETÁVEL A BASE DE DORAMECTINA 1% PARA BOVINOS E SUÍNOS*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Doramectina 1,0 g e veículo q.s.p. 100 mL.

INDICAÇÕES:

**Exceller®** é indicado para o tratamento e controle dos parasitas gastrintestinais e pulmonares, carrapatos, miíases (bicheiras), bernes, piolhos, ácaros da sarna.

**Suínos: Exceller®**é indicado para o tratamento e controle dos parasitas gastrintestinais, pulmonares e renais, piolhos e ácaros da sarna.

DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

**Bovinos:**
Administrar **Exceller®** por via subcutânea ou intramuscular, na dose de 1,0 mL para cada 50 kg de peso corporal (200 mcg de doramectina por kg de peso corporal).
**Suínos:**
Administrar **Exceller®** pela via intramuscular, na dose de 1 mL para cada 33 kg de peso corporal (300 mcg de doramectina por kg de peso corporal).

PRECAUÇÕES:

- Volumes acima de 5 mL devem, de preferência, ser fracionados em mais de um local de aplicação;
- Não utilizar em bezerros destinados à vitela;
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, produtos de higiene e produtos domésticos; Ajustar a dose de acordo com o peso para cada animal.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 28 dias.
**LEITE:** 10 dias.
**SUÍNOS:** 28 dias.




APRESENTAÇÕES:

**Frascos de vidro de 50 mL e 500 mL.**

# BUTOX® P CE 25

*CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E SARNICIDA À BASE DE DELTAMETRINA*

DOSAGEM:

Uso externo, em banhos de pulverização, aspersão e imersão (ovinos). Carrapatos dos bovinos: 10 mL do produto para 10 litros de água. Carrapato do corpo do cavalo: 10 mL do produto para 5 litros de água, em intervalos de 7 dias.

**Instruções para uso:**

A diluição deve ser preparada próximo ou no momento do uso sob agitação constante, até obter uma suspensão homogênea.

**Preparação da Suspensão**

Medir a quantidade recomendada de **Butox® P CE 25** e fazer uma pré-mistura em um balde com 2 a 4 litros de água. Agitar até formar uma mistura homogênea.

Colocar esta emulsão no pulverizador e, agitando sempre, completar o volume com o restante da água necessária para a pulverização dos bovinos a serem tratados.

**Método de Aplicação**

Qualquer tipo de pulverizador, manual ou mecânico, poderá ser utilizado, tomando cuidado para que o jato tenha pressão adequada para penetrar por baixo dos pelos onde estão agarrados os carrapatos.

Para pulverizar um bovino adulto e um equino adulto, o consumo de líquido não deve ser inferior a 5 litros.

Molhar toda a pelagem, não se esquecendo das partes mais comumente infectadas, que são: entrepernas, patas, tábua do pescoço, cabeça, pavilhão auricular interno, região do períneo e base da cauda.

CUIDADOS E INSTRUÇÕES:

**Butox® P CE 25** apresenta grande segurança, porém devem ser observados os cuidados básicos recomendados no uso de carrapaticidas:

- Manusear o produto e fazer as diluições em locais arejados, não aplicar contra o vento, evitando as partículas pulverizadas.
- Evitar o contato do produto com a pele e mucosa do corpo humano. Caso isto acidentalmente venha a ocorrer, lavar várias vezes com água e sabão as partes atingidas.
- Não é recomendado aplicar nos bovinos na hora de calor intenso ou nos dias chuvosos.
- Manter longe do alcance de crianças e animais.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Não reutilizar a embalagem. Para o descarte de restos do produto ou sua embalagem observar a legislação ambiental local.
- Não jogar o produto ou resto de diluição em açudes, fontes, rios e tanques de água.
- Se acontecer intoxicação humana, chamar imediatamente o médicos e durante este tempo, caso tenha ocorrido ingestão acidental, provocar vômito introduzindo o dedo na garganta ou, por via oral, copo de água morna ou xarope de Ipecacuanha. Repetir até que o vômito seja um líquido claro. Administrar a seguir, também por via oral, suspensão aquosa de terra Füller ou argila de alta capacidade de adsorção. NÃO DAR NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. Se o produto atingir os olhos,lavar imediatamente com água corrente abundante durante 10 minutos, no mínimo.

**Para o Médico** – Sintomas de alarme – os sintomas de alarme (intoxicação aguda) incluem: Salivação excessiva, depressão, respiração rápida e difícil. Deverá ser feito um tratamento sintomático do colapso.

**Para o Veterinário** – Empregar terapêutica semelhante.

APRESENTAÇÕES:

**Frasco de 20mL.**



# EXPERT®

*BRINCO INSETICIDA PARA BOVINOS*

INDICAÇÕES:

Para uso em bovinos.

Brinco inseticida de ação prolongada, indicado para o controle da mosca-dos-chifres, a *Haematobia irritans*, mosca-dos-estábulos, a *Stomoxys calcitrans*, mosca-doméstica, a *Musca domestica*, mutuca, a *Tabannus spp*. O brinco também é indicado como auxiliar no controle da mosca-do-berne,, a *Dermatobia hominis* e a mosca da bicheira, a *Cochliomyia hominivorax*.

DOSAGEM:

**Controle da mosca-dos-chifres**

Um brinco por animal, para um controle de até 5 meses.

Este período poderá ser alterado em função do grau de infestação, condições climáticas e de sensibilidade do parasita aos princípios ativos.

**Controle da mosca do estábulo, mosca doméstica e mutuca**

Dois brincos por animal, um em cada orelha.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Usar luvas adequadas para aplicar o brinco.
- Evitar o contato com a pele e olhos. Se acontecer, imediatamente lavar abundantemente os locais atingidos.
- Guardar longe de utensílios de cozinha, alimentos, produtos de higiene, etc.
- Recomendamos não colocar os brincos em animais com menos de 3 meses de idade.
- Recomendamos trocar os brincos cada 4-5 meses, como também retirar os mesmos ao final da estação das moscas (final de outono e início de inverno), para redução da possibilidade do aparecimento da resistência aos inseticidas (subdosagens).
- Remover o brinco antes do abate.
- Após o uso, antes de comer, beber ou fumar, lave as mãos e o rosto com água em abundância e sabão.
- Inutilizar as embalagens vazias com segurança.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** Abate-O produto não requer período de carência para o abate de bovinos tratados.

**LEITE:** O produto não requer período de carência para o consumo de leite dos bovinos tratados.

APRESENTAÇÃO:

**Sachê com 10 e 20 brincos de 15 gramas cada.**




# EXZOLT® 5%

*SOLUÇÃO POUR-ON À BASE DE FLURALANER PARA BOVINOS*

INDICAÇÕES:

**EXZOLT® 5%** é indicado para bovinos no tratamento de infestações causadas por carrapatos multi-hospedeiros *A. sculptum*, por carrapatos mono-hospedeiros *R. microplus* e por moscas *H. irritans* (mosca-dos-chifres) e por larvas de *D. hominis* (berne). O produto é também indicado para bovinos no tratamento de infestações causadas por larvas de *C. hominivorax* (miíase) e pode ser usado para a prevenção de tais infestações após processos cirúrgicos, como a castração.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSAGEM E MODO DE USAR:

É recomendada a administração do produto EXZOLT® 5% em bovinos, em dose única de 2,5 mg de fluralaner por kg de peso corporal (PC), equivalente à 1 mL de produto por 20 kg de peso corporal (PC). Administrar o produto pela via tópica (pour-on), ao longo da linha média dorsal da cernelha até a base da cauda. Para garantir a administração de uma dose correta, o peso corporal deve ser determinado com a maior precisão possível e a precisão do dispositivo de dosagem deve ser verificada antes da administração.

PRECAUÇÕES:

- Administrar o produto apenas para as espécies, doses e via de administração recomendadas;
- O produto não deve entrar em contato com cursos de água, pois isso pode ser perigoso para os animais invertebrados aquáticos;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado do mesmo, deve ser descartado de acordo com as exigências locais;
- Não use em vacas em lactação produzindo leite para consumo humano.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 42 dias.

**LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.




APRESENTAÇÕES:

**Frascos de plástico com 250mL, 1 L e 5 L.**

# HALOCUR®

*SOLUÇÃO ORAL À BASE DE HALOFUGINONA*

Recomendado para a prevenção e controle da diarreia devido ao Cryptosporidium parvum em bezerros.

## INDICAÇÕES:

**Halocur®** é recomendado para a prevenção e controle da diarreia devido ao *Cryptosporidium parvum* em bezerros conforme abaixo:

- Nas fazendas com histórico de criptosporidiose, o produto pode ser utilizado na prevenção de diarreia diagnosticada devido ao *Cryptosporidium parvum*. A administração deve começar nas primeiras 24 a 48 horas de idade.
- Para a redução de diarreia diagnosticada devido ao *Cryptosporidium parvum*, a administração deve começar dentro de 24 horas após o início da diarreia.

Em ambos os casos foi demonstrada a redução da excreção de oocistos.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

Para uso oral em bezerros após a alimentação.

A dosagem é de 100 µg de halofuginona base/kg de peso corporal/uma vez ao dia, durante 7 dias consecutivos, ou seja,
2 mL de **Halocur®**/10 kg peso corporal/uma vez ao dia, durante 7 dias consecutivos.

Com a finalidade de tornar o tratamento com **Halocur®** mais fácil, é proposto um esquema de dosagem simplificada:

- 35 kg < bezerros ≤ 45 kg: 8 ml de **Halocur®** uma vez ao dia, durante 7 dias consecutivos;
- 45 kg < bezerros < 60 kg: 12 ml de **Halocur®** uma vez ao dia, durante 7 dias consecutivos.

Para os animais mais leves e os mais pesados, deve ser realizado um cálculo preciso (2 mL/10 Kg). Para assegurar a dose correta é necessário o uso de uma seringa ou qualquer outro dispositivo apropriado para administração oral.

O tratamento consecutivo deve ser feito no mesmo horário, a cada dia.

Uma vez que um primeiro bezerro tenha sido tratado, todos os próximos bezerros recém-nascidos devem ser sistematicamente tratados enquanto persistir o risco de diarreia devido ao *Cryptosporidium parvum*.

Após aberto o frasco, administrar todo o conteúdo no período de até 12 meses.

## REAÇÕES ADVERSAS:

Foram relatados, muito raramente (0,01%), casos de aumento dos níveis de diarreia em animais tratados.

Como podem ocorrer sintomas de toxicidade com duas vezes a dose terapêutica, é necessário aplicar estritamente a posologia recomendada.

Os sintomas de toxicidade incluem diarreia, sangue visível nas fezes, diminuição no consumo de leite, desidratação, apatia e prostração.

Em caso de sinais clínicos de superdosagem o tratamento deve ser interrompido imediatamente e o animal deve ser alimentado com leite ou substituto do leite não medicado. Pode ser necessário reidratação.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 13 dias.
**LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.



## APRESENTAÇÃO:

**Frasco contendo 490 ou 980 mL.**

# IMIZOL®

*PROFILAXIA E TRATAMENTO DA BABESIOSE E ANAPLASMOSE*

INDICAÇÕES:

**Imizol®** é indicado no tratamento profilático e curativo da babesiose (piroplasmose) em bovinos e eqüinos e anaplasmose em bovinos, as quais são transmitidas por diferentes espécies de carrapatos e insetos ou operações mecânicas (vacinações, descornas, castrações, etc.)

**Imizol®** pode também ser usado para controlar reações clínicas excessivas desencadeadas pelas vacinas sanguíneas de Babesia/Anaplasma. Nesses casos, devido ao seu mais curto período de incubação, os sintomas da babesiose aparecerão nos primeiros dias após o início da premonição e poderão ser controlados com a administração de 1,0 mL de Imizol® para cada 100 kg de peso corporal.

Esta aplicação de**Imizol®** retardará o período de incubação da anaplasmose, que poderá manifestar-se algumas semanas mais tarde. Caso esta manifestação apresente um quadro clínico excessivo, a dose a ser administrada deverá ser de 2,5 mL para cada 100 kg de peso corporal.

POSOLOGIA:

**Bovinos:**

- Anaplasmose e infecções mistas: 1 mL para cada 40 kg de peso corporal.
- No caso de Babesiose confirmada: 1 mL para cada 100 kg de peso corporal.
- Em ambos os casos não repetir o tratamento antes de transcorrido o prazo de 7 dias.

ADMINISTRAÇÃO:

Via subcutânea.

Eqüinos: 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, via intramuscular.

O tratamento de Nuttalia equi poderá requerer duas doses com intervalo de 24 horas.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 241 dias.
**LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

QUIMIOPROFILAXIA:

São as seguintes situações práticas em que o uso quimioprofilático de Imizol® é recomendado:

1. Quando animais suscetíveis são introduzidos em áreas de conhecida incidência de babesiose, **Imizol®** deve ser administrado, no momento da introdução ou no espaço máximo de 5 dias, na dosagem de 2,5 mL para cada 100 kg de peso corporal. 2. Quando animais suscetíveis são introduzidos em áreas de conhecida incidência de anaplasmose, Imizol® deve ser administrado, aos primeiros sinais de sintomas clínicos da doença, na dosagem de 2,5 mL para cada 100 kg de peso corporal.

Devido ao prolongado período de incubação da anaplasmose, a administração de "Imizol" antes do aparecimento da doença poderá ser prematura, impossibilitando o desenvolvimento da proteção após a agressão pelos carrapatos.

2. Em situações de infecções mistas ou de agente causal desconhecido, o esquema quimioprofilático descrito no item 1 poderá também ser seguido. Tal esquema propiciará uma eficiente proteção contra a babesiose, mas não necessariamente contra a anaplasmose, que poderá exigir uma segunda aplicação, a ser feita quando do aparecimento de sinais clínicos da doença.

**Imizol®** não é uma vacina, portanto, nas condições de uso quimioprofilático descritas previamente, o estabelecimento da imunidade contra a babesiose e a anaplasmose dependerá da exposição dos animais aos agentes causais de ambas as doenças.

Por ser o carrapato o principal vetor, não se recomenda o uso de carrapaticidas nos animais tratados com **Imizol®** até que uma alta infestação de carrapatos seja conseguida.

APRESENTAÇÃO:

**Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 1, 2, 4, 5, 15, 50, 100, 200 e 500 mL.**



# NEOCIDOL® B40

*INSETICIDA PRONTO PARA USO, DESTINADO AO CONTROLE DA MOSCA-DOS-CHIFRES (HAEMATOBIA IRRITANS), INCLUSIVE AS CEPAS RESISTENTES AOS INSETICIDAS PIRETROIDES*

## FÓRMULA:

**Cada brinco de 15g contém:**
Diazinon - 6,0 g
Excipiente q.s.p. - 15,0 g

## INDICAÇÕES:

O brinco **Neocidol® B 40** está indicado no controle das infestações por Haematobia irritans (mosca-dos-chifres) em bovinos, incluindo aquelas cepas resistentes ao tratamento com inseticidas piretroides.

Aplicado conforme a recomendação da bula, confere um período de proteção de 5 meses contra infestações de mosca-dos-chifres.

## DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Aplicar um brinco em uma das orelhas, utilizando o alicate apropriado de aplicação. O Diazinon transmigra paulatinamente da matriz de poliuretano e vai, aos poucos, se acumulando sobre o pêlo do animal, onde forma uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre o animal.
A aplicação deve ser feita conforme o esquema abaixo:




**FIGURA 1**

Desinfete o alicate antes do uso. Com o dedo polegar, pressione a alavanca de pressão do alicate e introduza o brinco. O 'colarinho' do brinco deve ser colocado voltado para baixo.




**FIGURA 2**

Introduza o pino do brinco na ponteira do alicate até o ponto em que parte dela se projete para fora. Alinhe a ponta do macho com o furo da fêmea do brinco. O brinco e o contrapino estão prontos para aplicação.



**FIGURA 3**

Posicione o brinco na superfície plana e no centro da face posterior da orelha. Evite que o contrapino atinja cartilagem ou vasos sanguíneos para evitar danos à orelha.



**FIGURA 4**

Esta é a posição correta do brinco.

## IMPORTANTE:

Os brincos **Neocidol® B 40** devem ser retirados cinco meses após a aplicação, cortando-se o pino fixador (macho) com uma tesoura ou alicate. Nesse momento, havendo ainda condições propícias a novas infestações, um novo brinco deve ser colocado, aproveitando-se a perfuração já existente na orelha.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 1 dia.
**LEITE:** 1 dia.

## PRAZO DE VALIDADE:

24 meses.




## APRESENTAÇÃO:

**Sachê aluminizado contendo 10 brincos, acondicionados em caixa com 2 sachês.**

# PANACOXX®

*ANTICOCCIDIANO DE USO ORAL À BASE DE TOLTRAZURIL E FEMBENDAZOL.*

## FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Toltrazuril - 7,5 g
Fembendazol - 2,5 g
Veículo q.s.p. - 100,0 ml

## INDICAÇÕES:

**PANACOXX®** é indicado para o tratamento e controle da eimeriose em bovinos, causada pelas principais espécies de eimeria. Uso preventivo e metafilático em bovinos expostos a infecção por *Eimeria spp.* Altamente eficaz no tratamento e controle dos principais nematódeos gastrointestinais. Redução da eliminação de oocistos de *Eimeria spp.* e ovos de estrongilídeos nas fezes de bovinos, diminuindo a contaminação ambiental, que é a principal fonte de infecção tanto para a eimeriose quanto para as helmintoses.

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSAGEM E MODO DE USAR:

**Bovinos:**
**PANACOXX®** deve ser administrado pela via oral, na dose de 2 mL para cada 10 kg de peso corporal (PC), em administração única, equivalente a 15 mg de toltrazutil e 5 mg de fembendazol por kg de peso corporal.

## PRECAUÇÕES:

- Administrar o produto apenas pela via recomendada;
- Não reutilizar embalagem vazia;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais;
- O produto não deve entrar em contato com cursos de água, pois pode ser tóxico para peixes e outros organismos aquáticos;
- Os estudos foram conduzidos com animais abaixo de 12 meses de idade, deste modo, não recomendamos o uso do produto em bovinos com idade superior a esta;
- A segurança do produto não foi testada em fêmeas gestantes ou lactantes;
- Depois de aberto, o produto deve ser utilizado em um período máximo de 90 (noventa) dias.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 78 dias.
**LEITE:** este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em sua embalagem original, em local fresco e seco, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.




## APRESENTAÇÕES

**Frascos plásticos com 250 mL e 1 L.**

# PANACUR® 10%

*ANTI-HELMÍNTICO DE LARGO ESPECTRO PARA BOVINOS E CÃES, EM SUSPENSÃO ORAL, INDICADO NO COMBATE AOS PRINCIPAIS VERMES*

Anti-helmíntico de largo espectro em suspensão, para uso oral, no combate dos principais nematódeos gastrintestinais dos bovinos e dos principais helmintos parasitos dos cães e da giardíase.

AGITE ANTES DE USAR

## FÓRMULA:

**Cada 1 mL contém:**
Fenbendazol - 100,00 mg
Veículo q.s.p. - 1 mL

## INDICAÇÕES:

**Panacur® 10%** é indicado:

**Cães:** No tratamento e controle dos principais helmintos parasitos de cães, tais como: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* e *Toxocara canis* e da giardíase.

**Bovinos:** No tratamento e controle dos principais nematódeos gastrintestinais dos bovinos, tais como: *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata* e *Oesophagostomun radiatum*.

## DOSAGEM E MODO DE USAR:

Uso oral

**Cães:** 100 mg de Fembendazol/Kg de peso em DOSE ÚNICA ou 50 mg de Fembendazol/Kg de peso, por dia, durante 3 dias consecutivos.

**Bovinos:** 5 mg de Fembendazol/Kg de peso em DOSE ÚNICA.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico-veterinário.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 11 dias.
**LEITE:** 5 dias.




## APRESENTAÇÃO:

**Frascos de 20 mL e de 1 L.**

*Após aberto o frasco, usar imediatamente todo o conteúdo.*

# POTENTY®

*SOLUÇÃO CONCENTRADA EMULSIONÁVEL À BASE DE ALFACIPERMETRINA, CLORPIRIFÓS E ETHION*

O produto **Potenty®** é indicado para uso em bovinos, no tratamento e controle das infestações por *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (carrapato dos bovinos), no tratamento e controle das larvas de *Dermatobia hominis* (berne) e no tratamento e controle de *Haematobia irritans* (mosca-dos-chifres).

## DOSAGEM, MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

No tratamento e controle das infestações por *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (carrapato dos bovinos):

**Via pulverização (uso tópico):**

O produto **Potenty®** deve ser administrado na diluição de 50 mL do produto para cada 20 L de água, aplicado via tópica (pulverização), em todo o corpo do animal, no sentido contrário ao crescimento dos pelos, garantindo o contato com a pele, na dose de 5 litros de calda por animal (quantidade suficiente para molhar todo o corpo do animal), correspondendo a 2 g de ethion, 1,0625 g de clorpirifós e 0,6250 g de alfacipermetrina, em aplicação única.

Após diluído em água, o produto **Potenty®** preparado deve ser imediatamente utilizado. Sobras do produto diluído deverão ser descartadas.

Após aberto o frasco, utilizar todo o conteúdo no prazo máximo de 100 dias, desde que não tenha sido diluído e que seja mantido em sua embalagem original.

## CONTRAINDICAÇÕES:

- Não utilizar em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula
- Não utilizar em animais com idade inferior aos 6 meses;
- Não utilizar o produto pela via imersão em banheiro.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 3 dias.
**LEITE:** 144 horas (6 dias)



## PRECAUÇÕES:

- Administrar o produto apenas pela via recomendada;
- Tratar apenas animais saudáveis. Não utilizar em animais desnutridos, debilitados ou doentes;
- Não deixar os animais aglomerados após o tratamento para evitar a inalação do produto, após a aplicação do produto levar os animais para um local aberto, arejado e ao abrigo do sol.
- Não tratar os animais durante as horas mais quentes do dia ou de calor intenso. Manter animais ao abrigo do sol e em local arejado nas horas subsequentes ao tratamento;
- O produto é tóxico para invertebrados aquáticos, peixes e abelhas. Não contaminar rios, lagos e mananciais;
- Após o uso, lavar bem o material utilizado na aplicação;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais.

**Precauções a serem tomadas pela pessoa que administra o produto aos animais:**

- Manuseie o produto com muito cuidado para evitar exposição, tomando todas as precauções recomendadas;
- Manter o produto fora do alcance das crianças e de animais domésticos;
- Conservar o produto em lugar seco e fresco, ao abrigo da luz solar;
- Não comer, beber, nem fumar durante a aplicação;
- Lavar as mãos com água e sabão após o manuseio do produto. Usar equipamento adequado de proteção: botas, avental, máscara, óculos, etc;
- Evitar o contato com a pele e os olhos. Se ocorrer exposição acidental na pele lavar a região afetada com água corrente e sabão. Se ocorrer exposição acidental nos olhos, lavá-los imediatamente com água limpa;
- Não pulverizar em local fechado, sem ventilação e nem contra o vento;
- Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado;
- Em caso de desenvolvimento de sintomas de intoxicação devido à exposição, procurar orientação médica imediatamente mostrando o rótulo-bula do produto;
- Em caso de ingestão acidental, lavar a boca com água em abundância. Não induzir o vômito e procurar cuidados médicos imediatamente.

## APRESENTAÇÕES

**Frascos plásticos com 300 mL, 1 L e 5 L.**

# SOLUTION® 3,5%

*ENDECTOCIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DOS PARASITOS INTERNOS E EXTERNOS DOS BOVINOS*

## FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Ivermectina - 2,25 g
Abamectina - 1,25 g
Veículo q.s.p. - 100 mL

## INDICAÇÕES:

**Solution® 3,5%,** associação de Ivermectina + Abamectina, é um endectocida para bovinos, que combate os nematódeos gastrintestinais, tais como: *Haemonchus placei*, Cooperia punctata, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*, tem ação bernicida (Larvas de *Dermatobia hominis*) e auxilia no controle do carrapato dos bovinos, *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

## MODO DE USAR, DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Aplicar somente pela via subcutânea, na dosagem de 1mL para cada 50Kg de peso corpóreo (450 mcg de Ivermectina/Kg, 250 mcg de Abamectina/Kg), conforme tabela ao lado:

Intervalo entre as doses:
DOSE ÚNICA.

| Peso (Kg) | Volume (mL) |
|---|---|
| 50 | 1 |
| 100 | 2 |
| 150 | 3 |
| 200 | 4 |
| 300 | 6 |
| 400 | 8 |
| 500 | 10 |
| 600 | 12 |

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Usar doses corretas recomendadas para o produto.
- Aplicar somente pela via subcutânea.
- Não destinar ao consumo humano o leite de animais tratados.
- Não administrar em bezerros com menos de 6 meses de idade.
- A segurança do produto não foi estabelecida em fêmeas lactantes, gestantes e machos em idade reprodutiva.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamento, semiconfinamento e em regime extensivo na fase de terminação.

## CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco, à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e animais domésticos.

## CARÊNCIA:

- **CARNE:** 92 dias.
- **LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.




## APRESENTAÇÕES

**Frasco contendo 50 mL, 500 mL e 1 litro.**

# SUPRAMEC® GEL

*TRATAMENTO E CONTROLE DE PARASITAS DOS EQUINOS À BASE DE IVERMECTINA*

INDICAÇÕES:

**Supramec® Gel** é indicado para o tratamento dos parasitos gastrintestinais que acometem equinos: *Strongyloides westeri*, *Parascaris equorum* (adulto) *Oxyuris equi* e os ciatostomíneos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

**Supramec® Gel** deve ser administrado em equinos, muares e asininos, através da via oral, na dose de 200 µg/Kg de peso corporal em dose única. Cada graduação no êmbolo da seringa representa a quantidade suficiente de produto para tratar 100 Kg de peso corporal. Antes da administração do medicamento é importante ter certeza de que o animal não apresenta nenhum alimento na boca, ajustar o anel graduador da seringa de acordo com o peso do animal a ser tratado. Introduza a seringa na boca do animal e pressione o êmbolo, depositando o medicamento na superfície da língua. Imediatamente após este procedimento, levante a cabeça do animal e mantenha-a nesta posição por alguns segundos.

PRECAUÇÕES:

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. Lavar as mãos após o manuseio. Armazenar em locais frescos e secos (entre 15ºC e 30ºC), ao abrigo de luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

SEGURANÇA AMBIENTAL:

A ivermectina ao entrar em contato como solo, fixa-se firmemente as partículas do mesmo e toma-se inativa após algum tempo. Restos do produto ou embalagens vazias devem ser descartados de forma adequada, de acordo com as exigências locais, uma vez que a ivermectina livre pode afetar adversamente peixes e alguns organismos aquáticos. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico-veterinário.

CARÊNCIA:

**EQUINOS:** abate-Este produto não deve ser aplicado em equinos produtores de carne para consumo humano.

APRESENTAÇÃO:

**Seringa plásticas graduada descartável contendo 6,42 g de gel, acondicionada em envelope plástico.**




# RANGER® LA 3,5%

*ENDECTOCIDA INJETÁVEL EM FORMULAÇÃO GEL TIXOTRÓPICO DE AÇÃO PROLONGADA COMPOSTO POR IVERMECTINA 3,5% PARA BOVINOS.*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Ivermectina 3,5 g e veículo q.s.p. 100,0 mL.

INDICAÇÕES:

**Ranger® LA 3,5%** é indicado no tratamento e controle de vermes gastrintestinais e pulmonares, carrapatos, bernes, piolhos e ácaros da sarna em bovinos. Auxilia no controle preventivo de Miíases (bicheiras) e em feridas de castração.

DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

AGITAR ANTES DE USAR.

**Ranger® LA 3,5%** deve ser administrado exclusivamente por via subcutânea, sob pele solta, na frente ou atrás da escápula, na dose de 1mL/50 kg de peso corporal.

**Observação:** proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamento, semi-confinamento e em regime extensivo na fase de terminação.

PRECAUÇÕES:

Não aplicar o produto por via endovenosa ou intramuscular, aplicar apenas por via subcutânea;

Ajuste a dose de acordo com o peso para cada animal para que se evitem doses excessivas;

Volumes acima de 5 mL devem ser fracionados e aplicados em mais de um local.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 128 dias.
**LEITE**: 19 dias.

APRESENTAÇÕES:

**Frascos de 50 mL e 500 mL.**

# SUPRAMEC® POUR-ON

*ANTIPARASITÁRIO À BASE DE IVERMECTINA*

**Supramec® Pour-On** é indicado para o tratamento e controle em bovinos de parasitas internos, sensíveis à ivermectina, tais como: *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia spatulata* e *Cooperia punctata*, e externos, sensíveis a ivermectina, tais como o carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

## FÓRMULA:

**Cada 1 mL contém:**
Ivermectina - 5 mg
Excipiente q.s.p. - 1 mL

## INDICAÇÕES:

**Supramec® Pour-On** é indicado para o tratamento e controle em bovinos de parasitas internos, sensíveis à ivermectina, tais como: *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia spatulata* e *Cooperia punctata*, e externos, sensíveis a ivermectina, tais como o carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

Aplicar **Supramec® Pour-On** ao longo da linha dorsal do animal sistema Pour-On),derramando o produto sobre a pele desde a região final do pescoço até a inserção da cauda. A dose é de 1 mL de produto (equivalente a 5 mg de ivermectina) para cada 10 kg de peso vivo.

Os animais mais pesados, como touros adultos, devem receber um volume adicional de 5 mL para cada 50 kg que exceder os 650 kg.

Ajustar a dosagem de acordo com o animal mais pesado de cada grupo (vacas, touros, novilhos, etc).

Quando ocorrer uma variação considerável de tamanho dentro do grupo, dividir em 2 ou mais subgrupos, baseado no peso corporal, para evitar subdosagens.

**Intervalo entre doses:**

- O intervalo entre as doses dependerá da parasitose e da interação entre agente parasitário – meio ambiente – hospedeiro, a critério do Médico-veterinário.
- O tratamento não deverá ser repetido, em menos de 42 dias.

## PRECAUÇÕES DE USO:

- Administrar o produto externamente pelo sistema pour-on, conforme recomendado. O produto não deve ser administrado pelas vias oral ou parenteral.
- Os estudos foram conduzidos com animais acima de 4 meses de idade, deste modo, não recomendamos o uso do produto em bovinos com idade inferior a esta.
- O produto é indicado para bovinos. Não administrar em outras espécies animais.
- O gado não deve ser tratado quando o pelo ou a pele estiverem úmidos, visto que poderá ocorrer redução da eficácia.
- Não é recomendado aplicar o produto em bovinos em dias chuvosos.
- A atividade anti-helmíntica da ivermectina será afetada se o produto for aplicado em áreas de pele apresentando feridas ou lesões por sarna, dermatoses, ou ainda qualquer material aderido como lama ou esterco endurecido.
- Ao manusear o produto, não fumar ou comer. Utilizar os equipamentos de proteção individual como luvas, botas, óculos, etc.
- Lavar as mãos após o uso.
- Não incinerar as embalagens vazias ou com produto. O produto e seus vapores são altamente inflamáveis.

## CARÊNCIA:

- **CARNE:** 28 dias.
- **LEITE:** Zero.




## APRESENTAÇÃO:

**Frascos plásticos contendo 1L e 5L.**

# TICK GARD®

*SOLUÇÃO DE USO TÓPICO (POUR-ON) PARA BOVINOS À BASE DE FLUAZURON E FIPRONIL*

## FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Fluazuron - 2,50 g
Fipronil - 1,25 g
Veículo q.s.p. - 100,00 mL

## INDICAÇÕES:

O produto **Tick Gard®** é indicado para bovinos, no tratamento e controle das infestações por *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (carrapato dos bovinos), na prevenção e como auxiliar no controle de larvas de *Cochliomyia hominivorax* (bicheiras), no tratamento e prevenção das larvas de *Dermatobia hominis* (berne) e no tratamento e prevenção de *Haematobia irritans* (mosca-dos-chifres).

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

O produto **Tick Gard®** deve ser administrado na dose única de 1 mL de produto para cada 10 kg de peso vivo (PV) do animal, correspondente a 2,5 mg/ kg de Fluazuron e 1,25 mg/kg de Fipronil.

## PRECAUÇÕES:

- Tratar apenas animais saudáveis;
- Administrar o produto apenas pela via recomendada;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais;
- Depois de aberto o produto deve ser utilizado em um período máximo de 90 (noventa) dias.

## CARÊNCIA:

**CARNE:** 148 dias.
**LEITE:** Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.




## APRESENTAÇÕES:

**Frascos de plástico com 1 L e 5 L.**

# TRIATOX®

*CARRAPATICIDA PARA BOVINOS*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Amitraz - 12,5 g
Veículo q.s.p. - 100,0 mL

INDICAÇÕES:

**Triatox®** é um carrapaticida para bovinos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Diluir 1 parte do produto **Triatox®** em 500 partes de água, ou 40 mL do produto **Triatox®** em 20 litros de água. Usar pulverizador manual ou motorizado, cuidando para que o jato tenha bastante pressão para penetrar debaixo dos pelos. A quantidade de calda para molhar 1 bovino adulto não deve ser inferior a 5 litros.

**Método de aplicação:**

Usar pulverizador manual ou motorizado, cuidando para que o jato tenha bastante pressão para penetrar debaixo dos pelos. A quantidade de calda para molhar 1 bovino adulto não deve ser inferior a 5 litros.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Não usar em equinos.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 3 dias.
**LEITE:** 3 dias.

APRESENTAÇÕES

**Frasco de vidro âmbar contendo 40 mL ou frascos plásticos contendo 200 mL ou 1 L.**




# TRYPAMIZOL®

*QUIMIOTERÁPICO INJETÁVEL PARA BOVINOS À BASE DE CLORETO DE ISOMETAMIDIUM 4%*

FÓRMULA:

**Apresentação de 100ml contém:**
Cloreto de isometamidium (Cloridrato) - 12,50 g
Água para injetáveis - 100,00 mL

INDICAÇÕES:

**TRYPAMIZOL®** é indicado para a prevenção (profilaxia) e o tratamento de infecções causadas por *Trypanosoma vivax* em bovinos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Após romper o lacre metálico, utilizar seringa e agulha estéreis para retirar totalmente o volume do frasco com diluente e injetá-lo dentro do frasco com pó. AGITAR VIGOROSAMENTE ANTES DE CADA ADMINISTRAÇÃO. **TRYPAMIZOL®** deve ser aplicado pela via intramuscular, de acordo com a estratégia terapêutica.TRATAMENTO CURATIVO: 1ml para cada 80kg de peso corporal em dose única. PROFILAXIA: Em regiões endêmicas, a critério do médico-veterinário, utilizar a dose de 1ml para cada 40kg de peso corporal (equivalente a 1mg/kg), em dose única. O efeito profilático de **TRYPAMIZOL®** tem duração de, no mínimo, 90 dias. Para controlar as recidivas no rebanho, no caso em que a doença tenha se instalado, recomenda-se a administração de TRYPAMIZOL® em intervalos de 3 meses ou a critério do médico-veterinário.

PRECAUÇÕES:

Após reconstituição, o produto deve ser conservado em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e utilizado em um período máximo de 21 (vinte e um) dias.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 53 dia.
**LEITE:** Carência zero.

APRESENTAÇÕES:

**Frascos contendo 2g, 4g e 8g de pó e respectivos diluentes contendo 50mL, 100mL e 200mL.**



# BIOLÓGICOS




**BOVILIS® POLI-STAR®+**Te
**BOVILIS®** RB-51®
**BOVILIS® VISTA®** ONCE SQ
**BOVILIS® VISTA®** 5 L5 CFP
**FERTIGUARD®** SELENIUM MAX
**POLIGUARD®**
**RAIVACEL®** MULTI
**ROTAVEC®** CORONA

# BOVILIS® POLI-STAR® + Te

*VACINA INDICADA NA PREVENÇÃO DAS CLOSTRIDIOSES*

FÓRMULA:

Contém toxoides de *Clostridium septicum, Clostridium novyi* tipo B, *Clostridium sordellii, Clostridium perfringens* tipo C e D, *Clostridium botulinum* Tipo C, subunidades recombinantes de *Clostridium tetani* e *Clostridium botulinum* Tipo D, e anacultura de *Clostridium chauvoei*.

INDICAÇÕES:

Vacina para a prevenção de doenças causadas por *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium botulinum* tipos C e D, *Clostridium novyi* tipo B, *Clostridium sordellii*, *Clostridium perfringens* tipos C e D e *Clostridium tetani*.
É indicada para bovinos e ovinos para a imunização ativa das seguintes doenças clostridiais: Carbúnculo sintomático (manqueira), Edema maligno (Gangrenas gasosas), Hemoglobinúria bacilar (enterite hemorrágica), Disenteria dos cordeiros, Hepatite infecciosa necrosante, Gastrite hemorrágica por *C. septicum* (Braxy), Síndrome da morte súbita, Doença do rim polposo, Enterotoxemia, Tétano e Botulismo.

MODO DE USAR, DOSAGEM E ESQUEMA DE VACINAÇÃO:

Aplicar por via subcutânea, na seguinte dosagem:
**Espécie: Bovinos – dose: 5 mL, Ovinos - dose: 3 mL**
Em animais que nunca foram vacinados, aplicar duas doses, separadas por um intervalo de 4 semanas. Revacinar anualmente, ou a critério do médico-veterinário. Pode-se vacinar animais a partir de 2 meses de idade, para os quais recomenda-se uma terceira dose aos 6 meses de idade e anualmente ou a critério do médico-veterinário. O programa vacinal é variável em função do manejo do rebanho e do risco de exposição ao agente no ambiente, assim deve ser estabelecido conforme orientação do médico-veterinário.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Agitar bem o frasco antes de usar. Reações alérgicas do tipo hipersensibilidade podem ser observadas em animais vacinados e dependem da sensibilidade individual. Geralmente nenhuma reação significativa é observada após a vacinação, embora possa ocorrer inchaço temporário no local da aplicação e alguns animais possam apresentar um aumento leve da temperatura por alguns dias. Não vacinar animais doentes ou estressados. Utilizar agulhas e seringas esterilizadas.

APRESENTAÇÕES:

**APRESENTAÇÃO:**
**Frascos de 50 mL (10 doses bovinas), 100 mL (20 doses bovinas) e 250 mL (50 doses bovinas).**



# BOVILIS® RB-51

*VACINA VIVA ATENUADA CONTRA BRUCELOSE BOVINA, CEPA RB-51*

**Bovilis® RB-51** é uma vacina viva atenuada, liofilizada, contendo cultivo vivo de Brucella abortus, cepa RB-51. Esta é uma cepa mutante natural atenuada, de baixa patogenicidade e baixo efeito abortivo, proporcionando uma vacina segura e eficaz. Os soros de animais vacinados com a cepa RB-51 não demonstram reação positiva nas provas diagnósticas convencionais para brucelose, evitando assim os falsos positivos.

INDICAÇÕES:

A vacinação de fêmeas bovinas utilizando a vacina **Bovilis® RB-51** é recomendada em qualquer idade a partir dos 3 meses de vida.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Reconstituir, utilizando somente o diluente do produto, que é constituído de uma solução tamponada preparada especificamente para esta vacina. Agitar bem antes de usar, mantendo a vacina em constante agitação durante o uso, para assegurar a suspensão do material antigênico. Após a reconstituição da vacina, utilizar todo o conteúdo do frasco dentro de 60 minutos. Administrar na dose de 2 mL por via subcutânea.

ADVERTÊNCIA:

- É proibida a utilização da vacina Bovilis® RB-51 em bovinos machos de qualquer idade.
- Em caso de inoculação acidental no aplicador, o mesmo deverá procurar imediatamente um médico, levando esta bula.

CARÊNCIA:

Não abater os animais vacinados para consumo humano antes de decorridas 3 semanas da aplicação do produto.




APRESENTAÇÕES:

**Frasco-ampola contendo 5, 25 doses, acompanhado de diluente 10, 50 mL.**

# BOVILIS® VISTA® ONCE SQ

*VACINA CONTENDO CULTURA VIVAS MODIFICADAS DO VÍRUS DA RINÓTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR); DO VÍRUS DA DIARREIA BOVINA (BVDV) TIPOS 1 E 2; DO VÍRUS DA PARAINFLUENZA 3 (PI3); DO VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL BOVINO (BRSV) E DAS CULTURAS VIVAS AVIRULENTAS DE MANNHEIMIA HAEMOLYTICA E DE PASTEURELLA MULTOCIDA.*

FÓRMULA:

Contém o Vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Vírus da Diarreia Bovina (BVDV) Tipo 1, Vírus da Diarreia Bovina (BVDV) Tipo 2, Vírus da Parainfluenza 3 (PI3), Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV), *Mannheimia haemolytica* e *Pasteurella multocida*. Água purificada estéril (como diluente).

INDICAÇÕES:

O produto é indicado para a vacinação de bovinos saudáveis, a partir de 3 meses de idade, como auxiliar na prevenção da doença respiratória causada pelo vírus respiratório sincicial bovino (BRSV) e vírus da Parainfluenza 3 (PI3) em bezerros e pelo vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e vírus da diarreia bovina tipo 2 (BVDV2), e como auxiliar no controle da doença causada pelo vírus da diarreia bovina tipo 1 (BVDV1), por *Mannheimia haemolytica* e por ***Pasteurella multocida***. A proteção foi demonstrada para *Mannheimia haemolytica* em animais vacinados a partir de 5 meses e para os demais antígenos da vacina em animais com 3 meses de idade. **BOVILIS® VISTA® ONCE SQ** também se destina a vacinação de vacas e novilhas saudáveis antes da reprodução como auxiliar na prevenção da infecção fetal, incluindo-se bezerros persistentemente infectados por BVDV (tipos 1 e 2); e como auxiliar na redução do aborto devido à IBR.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM:

Dose de 2 mL por via subcutânea. Esquema de vacinação: Vacinação única a partir de 3 meses de idade. A revacinação anual é recomendada. Uma dose de revacinação pode ser administrada em intervalos mais frequentes, com base na análise de risco de doença no local ou em qualquer ocasião em que existam ou sejam registradas condições epidêmicas. Consulte o médico-veterinário.

APRESENTAÇÕES:

**Frascos de vidro contendo 5, 10, 50 ou 100 doses, acompanhados de frascos de diluente estéril contendo, respectivamente, 10, 20, 100 ou 200 mL.**




# FERTIGUARD® SELENIUM MAX

*VACINA CONTRA RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR), DIARRÉIA VIRAL BOVINA (BVD), PARAINFLUENZA BOVINA TIPO 3 (PI3), VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO BOVINO (BRSV), LEPTOSPIROSE E CAMPILOBACTERIOSE (VIBRIOSE) DOS BOVINOS.*

COMPOSIÇÃO:

**Cada dose contém:**
Suspensão inativada de antígenos da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD), Parainfluenza Bovina tipo 3 (PI3), Vírus Sincicial Respiratório Bovino (BRSV) e bacterinas de *Leptospira pomona*, *L. wolfii*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* e *L. grippotyphosa*; *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, adsorvidos em hidróxido de alumínio. Contém Selenato de sódio 4,8 mg /mL e timerosal.

INDICAÇÕES:

Para vacinação de bovinos sadios como auxiliar na prevenção da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD), Parainfluenza Bovina tipo 3 (PI3), Vírus Sincicial Respiratório Bovino (BRSV), Leptospirose e Campilobacteriose (Vibriose) dos bovinos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Aplicar 5 mL por via subcutânea. Agitar bem antes de usar.
- Animais não vacinados (primovacinação) devem receber duas doses com intervalo de 21 a 30 dias.
- Recomenda-se a aplicação de dose de reforço de 5 mL a cada 12 meses.
- Bezerros filhos de mães vacinadas devem receber a primeira dose após os 4 meses de idade. Vacas prenhes podem ser vacinadas.

APRESENTAÇÕES:

**Para frascos de 100 mL e 250 mL**



# POLIGUARD®

*VACINA CONTRA RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR), DIARREIA VIRAL BOVINA (BVD) E LEPTOSPIROSE BOVINA.*

COMPOSIÇÃO:

Cada dose contém: Suspensão inativada de antígenos da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD) e bacterinas de *Leptospira pomona*, *L. wolfii*, L. hardjo, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* e *L. grippotyphosa* adsorvidos em Hidróxido de Alumínio. Contém Selenato de Sódio 4,8 mg/mL e Timerosal.

INDICAÇÕES:

**Poliguard®** é indicada para vacinação de bovinos sadios como auxiliar na prevenção da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD) e Leptospirose Bovina.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Aplicar 5 mL por via subcutânea.
- Agitar bem antes de usar.
- Animais não vacinados (primovacinação) devem receber duas doses com intervalo de 21 a 30 dias.
- Recomenda-se a aplicação de dose de reforço de 5 ml a cada 12 meses. Bezerros filhos de mães vacinadas devem receber a primeira dose após 4 meses de idade. Vacas prenhes podem ser vacinadas.




APRESENTAÇÕES:

**Para frascos de 100 mL e 250 mL.**

# BOVILIS® VISTA® 5 L5 CFP

*VACINA CONTENDO CULTURAS VIVAS MODIFICADAS DO VÍRUS DA RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR); DO VÍRUS DA DIARREIA VIRAL BOVINA (BVDV) TIPOS 1 E 2; DO VÍRUS DA PARAINFLUENZA TIPO 3 (PI3), DO VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL BOVINO (BRSV) E DAS CULTURAS INATIVADAS DE LEPTOSPIRA CANICOLA, L. GRIPPOTYPHOSA, L. HARDJO, L. ICTEROHAEMORRHAGIAE E L. POMONA*

FÓRMULA:

Contém culturas vivas modificadas do Vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR 103,6 DICT50/dose), Vírus da Diarreia Viral Bovina Tipo 1 (BVDV1 103,8 DICT50/dose), Vírus da Diarreia Viral Bovina Tipo 2 (BVDV2 103,5 DICT50/dose), Vírus da Parainfluenza tipo 3 (PI3) (PI3 105,1 DICT50/dose), Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV 103,8 DICT50/dose), culturas inativadas (bacterinas) de *Leptospira Canicola* (1,2 PR/dose), *L. Grippotyphosa* ( 1,2 PR/dose), *L. Hardjo* ( 1,1 PR/dose), *L. Icterohaemorrhagiae* ( 1,3 PR/dose) e *L. Pomona* (1,0 PR/dose), com adjuvante.

INDICAÇÕES:

Este produto demonstrou ser eficaz para a vacinação de animais saudáveis a partir de 6 meses de idade contra a doença respiratória e o aborto causados pelo vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), doença respiratória e infecção fetal, incluindo a infecção persistente em bezerros causadas pelo vírus da Diarreia Viral Bovina Tipos 1 (BVDV1) e 2 (BVDV2) e o vírus da Parainfluenza tipo 3 (PI3) e contra a Leptospirose causada por *Leptospira Canicola, L. Grippotyphosa, L. Hardjo* (incluindo *L. borgpetersenii sorovar Hardjo bovis*), *L. Icterohaemorrhagiae* e *L. Pomona*; e na prevenção de excreção urinária de *L. Hardjo*.
A vacina é segura para uso em fêmeas prenhes ou que estão amamentando, desde que as fêmeas do rebanho tenham sido vacinadas antes da reprodução e desde que a vacinação tenha sido feita no intervalo de 12 meses antes da data da prenhez, com qualquer vacina viva modificada desta linha de produtos que contenha IBR e BVDV.

DOSAGEM E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Dose de 2 mL por via subcutânea.
Esquema de vacinação: Vacinação única a partir de 6 meses de idade.
Revacinação: a critério do Médico Veterinário e na dependência do desafio. O conteúdo liofilizado do frasco da vacina **BOVILIS® VISTA® 5 L5 CFP** deve ser reconstituído com o frasco da fração líquida incluído. Homogeneizar bem antes da administração.
Reconstituir o conteúdo do frasco liofilizado da vacina **BOVILIS® VISTA® 5 L5 CFP** com o conteúdo do frasco da fração líquida usando agulha de transferência (veja figura para instruções ilustradas). Homogeneizar bem e transferir a vacina reconstituída para o frasco da fração líquida usando a agulha de transferência. Remover a agulha de transferência do frasco e misturar bem o frasco reconstituído. Tirar o rótulo da fração liofilizada do frasco da **BOVILIS® VISTA® 5 L5 CFP** e colocar no frasco da fração líquida que contém toda a vacina reconstituída.




APRESENTAÇÕES:

**1 frasco com 50 doses da fração liofilizada e 1 frasco de 100 mL da fração líquida**

# BOVILIS® ROTAVEC® CORONA

*VACINA COMBINADA INATIVADA DE ROTAVÍRUS BOVINO, CORONAVÍRUS BOVINO E E. COLI F5 (K99)*

FÓRMULA:

**Cada 2 mL contém:**
Rotavírus bovino, cepa UK-Compton, sorotipo G6 P5 (inativado) - 1/4 da dose da vacina estimula um título de anticorpos neutralizantes de vírus: ≥ 7,7 log2/mL (cobaios)
Coronavírus bovino, cepa Mebus (inativado) - 1/20 da dose de vacina estimula um título de anticorpos ELISA: ≥ 3,41 log10/mL (cobaios)
*E. coli* (K99) adesina F5 - 1/20 da dose da vacina estimula um título de anticorpos ELISA . > 0,64 (cobaios)
Contém adjuvante oleoso e timerosal como conservante.

INDICAÇÕES:

Imunização ativa de vacas e novilhas em gestação para aumentar o nível de anticorpos contra a cepa de *E. coli* F5 (K99), o rotavírus e o coronavírus. Enquanto os bezerros são alimentados com colostro de vacas vacinadas, durante as primeiras duas a quatro semanas de vida, estes anticorpos demonstraram:

- Reduzir a intensidade de diarreias provocadas por *E. coli* F5 (K99).
- Reduzir a incidência de diarreias provocadas por rotavírus.
- Reduzir a disseminação de vírus pelos bezerros infectados com rotavírus ou coronavírus.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Dose: 2 mL
- Administração: Através da via intramuscular na tábua do pescoço.
- Agitar vigorosamente o frasco antes do uso.
- Administrar uma única dose (2 mL) para cada gestação, entre a 12ª e 3ª semana que antecedem a data prevista para o parto.
- Esterilizar seringas e agulhas antes do uso, e a aplicação deverá ser feita em área de pele limpa e seca, tomando cuidados adequados para evitar contaminação.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Não há.

APRESENTAÇÕES:

**Frascos de 10 mL (5 doses) e 40 mL (20 doses).**




# RAIVACEL® MULTI

*VACINA CONTRA A RAIVA*

FÓRMULA:

Vírus fixo Pasteur inativado pelo BEI e produzido em cultivo celular.

INDICAÇÕES:

**Raivacel® Multi** é indicada na profilaxia da raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e equinos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Dose: 2 mL
- Animais primovacinados deverão ser revacinados 30 dias após a 1ª vacinação. Profilático: vacinar os animais anualmente. Preventivo: a critério do médico-veterinário.
- Via de administração: intramuscular ou subcutânea.
- Para vacinação de equinos, recomenda-se a aplicação por via intramuscular profunda utilizando agulha 40 mm x 8.




APRESENTAÇÃO:

**Para frascos de 40 mL, 50 mL e 100 mL.**

# SUPLEMENTOS




**BIOXAN®** COMPOSTO VALLÉE
**VALLÉECÁLCIO®**
**MOV®**
**PHAGEIN®**

# BIOXAN® COMPOSTO VALLÉE

*POLIVITAMÍNICO, HIDRATANTE,, RECONSTITUINTE, ANTITÓXICO E ENERGÉTICO*

FÓRMULA:

- **Cada 100 mL contém:**
- Cloreto de Cálcio dihidratado (Equivalente a 10,85mg de cálcio) - 39,8mg
- Cloreto de Magnésio hexahidratado (Equivalente a 4,09mg de Magnésio) - 34,2mg
- Cloreto de Potássio (Equivalente a 26,22mg de Potássio) - 50,0mg
- Cloreto de Sódio (Equivalente a 157,35 mg de Sódio) - 400,0mg
- Cloreto de Colina - 300,0mg
- Dextrose anidra - 6.000,0mg
- Metionina DL - 600,0mg
- Nicotinamida - 240,0mg
- Cianocobalamina (Vit. B12) - 2.000mcg
- Riboflavina (Vit.B2)(Equivalente a 27,33 mg de Vit. B2 5 Fosfato Sódica) - 20,0mg
- Piridoxina (Vit.B6) (Cloridrato de piridoxina) - 3,0mg
- Veículo q.s.p.- 100mL

INDICAÇÕES:

É indicado como auxiliar no tratamento de doenças, desidratação e esgotamento por esforço físico ou excesso de produção.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Aplicar o produto por 3 dias consecutivos com intervalo de 24 horas por via intravenosa, administrando-se lentamente.
Doses diárias:
**Bovinos e equinos adultos -** 1.000 a 2.000 mL
**Bezerros e potros -** 500 mL

PRECAUÇÕES:

- Limpar e desinfetar o local de aplicação a fim de se evitar inflamações locais e suas complicações por contaminação microbiana;
- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido;
- Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Suspender a medicação quando for detectado qualquer tipo de reação adversa;
- As eventuais sobras do produto e embalagens utilizadas devem ser descartadas;
- Não reutilizar as embalagens vazias.

CARÊNCIA:

**BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.

APRESENTAÇÃO:

**Frasco plástico de 500mL acondicionado em cartucho com uma ou duas unidades acompanhado de equipo para aplicação.**



# MOV® MODIFICADOR ORGÂNICO VALLÉE

*SUPLEMENTO DE VITAMINAS, AMINOÁCIDOS E SAIS MINERAIS ESTIMULADOR DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS REVIGORANTE, RECONSTITUINTE E REVIGORANTE ORGÂNICO PARA BOVINOS E SUÍNOS EM DIFERENTES FASES DO DESENVOLVIMENTO*

COMPOSIÇÃO:

**Cada 100 mL contém:**

- Ferro Dextrano (1 0%pN de Ferro) - 11 , 11111 mL
- Cloreto de Cobre Dihidratado - 0,00444 g
- Glutamato de Sódio Monobásico Monohidratado (L) - 1,03333 g
- Cloridrato de Arginina (L) - 0,56667 g
- Cloridrato de Usina (L) - 1, 11111 g
- Treonina (L) - 0,55556 g
- Valina (L) - 0,46667 g
- Nicotinamida (Vitamina B3) - 1,66667 g
- Cloreto de Colina (Vitamina B8) - 2,222229
- Veículo q.s.p - 100mL.

INDICAÇÕES:

Indicado como Suplemento de Vitaminas, Aminoácidos e Sais Minerais nas deficiências nutricionais, coadjuvante no tratamento de animais debilitados, reconstituinte e revigorante orgânico para bovinos e suínos em diferentes fases de desenvolvimento.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

**Bovinos:**

- Bezerros: Administrar 5 mL pela via subcutânea.
- Adultos: Administrar 10 mL pela via subcutânea.

**Suínos:**

- Leitões: Administrar 2 mL pelas vias subcutânea ou intramuscular.
- Adultos: Administrar 5 mL pela via intramuscular.

Nota: Fêmeas prenhes, machos reprodutores e animais jovens podem ser tratados normalmente. Alterações na posologia e modo de usar a critério do médico-veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.
**SUÍNOS** carência zero.

APRESENTAÇÕES:

**Frascos plásticos contendo 100 mL e 500 mL.**




# VALLÉECÁLCIO®

*FORMULAÇÃO EXCLUSIVA QUE CONJUGA TRÊS FONTES DE CÁLCIO, HIPOFOSFITO DE MAGNÉSIO HEXAIDRATADO E DEXTROSE ANIDRA*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém*:**

- Gluconato de Cálcio Monoidratado - 22,83 g,
- D-sacarato de Cálcio Tetraidratado - 0,0387 g
- Lactato de Cálcio Pentaidratado - 3,03 g
- Hipofosfito de Magnésio Hexaidratado - 2,00 g
- Dextrose Anidra 5,00 g e veículo q.s.p. - 100 mL

**Equivalentes a 2,44 g de cálcio total, 0,472 g de fósforo e 0,185 g de magnésio.*

INDICAÇÕES:

**ValléeCálcio®** é indicado para bovinos, equinos e caprinos que estiverem apresentando sintomatologia clínica de: deficiências de cálcio, fósforo e magnésio, Hipocalcemia pós-parto (Paresia da Parturiente, Febre Vitular ou Febre do Leite), Síndrome da Vaca Caída e Tetania das Pastagens (Hipomagnesemia).

MODO DE USAR E DOSAGENS:

A dosagem indicada para bovinos, equinos e caprinos é de 1 mL/kg de peso. As vias de administração recomendadas por espécie animal são:

- **Bovinos e caprinos:** via endovenosa ou subcutânea;
- **Equinos:** via endovenosa.

Em caso de administração subcutânea, o volume máximo por local de aplicação é de 20 mL para bovinos e 5 mL para caprinos. Interrompa a aplicação do produto assim que houver reversão no quadro de Hipocalcemia e/ou decúbito do animal. Alterações na dosagem e modo de usar ficam a critério do médico-veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS, CAPRINOS E EQUINOS:**
carência zero.
**BOVINOS E CAPRINOS: LEITE:**
carência zero.




APRESENTAÇÕES:

**Frasco plástico contendo 250 mL ou 500 mL, acondicionado em cartucho. A apresentação de 500 mL é acompanhada de equipo e agulha estéreis.**

# PHAGEIN®

*ADITIVO ZOOTÉCNICO.*

INDICAÇÃO:

Aditivo zootécnico de uso exclusivo em bezerros (Bos taurus) para redução de bactérias enteropatogênicas (*E. coli e Salmonella spp.*) contribuindo para a melhora da saúde intestinal.

DOSAGEM, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

**PHAGEIN®** é indicado na dose de 1 g de produto por animal, diluído no volume apropriado de substituto lácteo ou leite pronto para consumo, uma vez por dia. Seu uso é recomendado desde o primeiro dia de vida, durante 30 a 70 dias.

Preparo do produto:

1. Adicione 1 g de **PHAGEIN®** em parte do leite ou substituto lácteo que o bezerro consumirá durante o dia (à temperatura ambiente).
2. Misture vigorosamente.
3. Administre por via oral logo após o preparo.

NOTA: A colher dosadora incluída na embalagem mede 5 g. Desta forma, deve ser utilizada para a preparação simultânea de 5 doses.

PRECAUÇÕES:

Não usar com água clorada. Em casos de hipersensibilidade no animal, um médico veterinário deve ser consultado. Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual para manipular o produto. Evitar contato direto com a pele e os olhos. Manter fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem do produto.

PRAZO DE CONSUMO:

Após aberto, o produto deve ser utilizado por um período de até 3 meses.

CONSERVAÇÃO:

Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C. Manter o produto em sua embalagem original, sempre fechada.




APRESENTAÇÕES:

**Sachê de 500 g.**

# SAÚDE DO ÚBERE




**CEPRAVIN®**
**COBACTAN®** VL
**LACTOTROPIN®**
**MASTI-SEAL®**
**MASTIJET®** FORTE
**MASTIJET®** VACA SECA
**MASTIPLAN®** LC

# CEPRAVIN®

*ANTIMASTÍTICO PARA VACAS SECAS*

FÓRMULA:

**Cada seringa de 3 g contém:**
Cefalônio Anidro - 0,25 g
Excipiente q.s.p. - 3,00 g

INDICAÇÕES:

Tratamento de mastite em vacas secas causadas por *Corynebacterium bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Escherichia co/i, Klebsiella spp. e Arcanobacterium pyogenes.*
*Obs.: A critério do médico-veterinário, o produto poderá ser administrado para prevenção de mastite em vacas secas.*

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Usar 1 seringa para cada quarto após a última ordenha da lactação. Ordenhar o animal, limpar e desinfetar o orifício do teto. Segurar a seringa firmemente em uma das mãos, torcer e puxar a capa protetora do bico sem entortá-lo ou contaminá-lo. Inserir totalmente o bico da seringa no canal do teto e pressionar o êmbolo da seringa até a liberação completa do produto. Massagear levemente o teto, desde a sua extremidade inferior até a base e no próprio quarto mamário tratado, para facilitar a dispersão do produto no quarto afetado.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Evitar a exposição ao produto e lavar as mãos após o seu uso.
- As cefalosporinas podem causar reações de hipersensibilidade após o contato;
- Caso ocorram reações de hipersensibilidade (erupções cutâneas, edema de face, edema dos lábios, edema dos olhos e/ou dificuldade respiratória) um médico deve ser consultado imediatamente;
- Quaisquer restos da embalagem do produto deverão ser descartados de acordo com as exigências locais;
- Não utilizar em vacas em lactação;
- Não administrar em animais que são conhecidamente hipersensíveis aos antibióticos a base de cefalosporina e a outros antibióticos β-lactâmicos.

CARÊNCIA:

**CARNE:** carência zero.
**LEITE:** 4 dias após o parto, se o intervalo entre a administração e o parto for de pelo menos 54 dias.




APRESENTAÇÃO:

**Caixa contendo 10 e 20 seringas de 3 g cada.**

# COBACTAN® VL

*PARA TRATAMENTO DE MASTITES DAS VACAS EM LACTAÇÃO, À BASE DE CEFQUINOMA*

Antibiótico do grupo das Cefalosporinas de 4ª geração, cujo modo de ação é a inibição da síntese da parede bacteriana e penetração rápida no interior da bactéria, com aumento da sua eficácia frente a um amplo espectro de agentes patogênicos causadores de Mastites.
Possui ainda uma alta estabilidade contra penicilinases e outras beta-lactamases.

## INDICAÇÕES:

**Cobactan® VL** é indicado no tratamento de mastite clínica em vacas em lactação, causada pelos seguintes organismos sensíveis a cefquinoma: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e outras *Enterobacteriaceae.*

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

Devido à sua extrema rapidez de penetração na célula bacteriana, o tratamento indicado é de uma seringa de 8 g contendo 75 mg de Cefquinoma base, por quarto infectado, após cada ordenha, num total de 3 infusões intramamárias. Antes de efetuar a infusão intramamária, esgotar todo o leite residual do quarto. Após, lavar o teto com água e sabão e enxugar, procurando mantê-lo limpo e livre de sujeiras externas. Proceder então à infusão, massageando com cuidado o quarto infectado de baixo para cima, até que o produto alcance os locais mais altos onde possa estar localizado o foco infeccioso. Em mastites crônicas, cuja sintomatologia é mais grave, pode-se fazer aplicações com intervalos mais curtos, de acordo com a prescrição do médico-veterinário.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

O produto deve ser conservado entre 2 a 8ºC

## CARÊNCIA:

Bovinos: **Abate** - 2 dias | **Leite:** 4,5 dias (108 horas)




## APRESENTAÇÃO:

**Caixa contendo 15 seringas plásticas de 8 g.**

# LACTOTROPIN® INJETÁVEL

*SOMATOTROPINA BOVINA*

## FÓRMULA:

Cada seringa contém:
Sometribove zinco - 500,0 mg
Veículo q.s.p. - 1,4 mL

## INDICAÇÕES:

**Lactotropin® Injetável** é indicado para suplementar os níveis plasmáticos de Somatotropina, com a finalidade de promover o aumento da produção de leite em vacas adequadamente nutridas e sadias, a partir da 9a. semana pós-parto. **Lactotropin® Injetável** deve ser aplicado por via subcutânea , a cada 14 dias, seguindo-se os procedimentos de desinfecção normalmente indicados para essa via de aplicação. Para facilitar a injeção, recomenda-se deixar que as seringas atinjam a temperatura ambiente antes da aplicação.

## DOSAGEM:

Uma dose de 1,4mL ( uma seringa) a cada 14 dias.

## ADMINISTRAÇÃO:

**Lactotropin® Injetável** deve ser aplicado por via subcutânea , a cada 14 dias, seguindo-se os procedimentos de desinfecção normalmente indicados para essa via de aplicação. Para facilitar a injeção, recomenda-se deixar que as seringas atinjam a temperatura ambiente antes da aplicação.

## PRECAUÇÕES:

Somente animais saudáveis e em boas condições corporais devem ser tratados. É importante assegurar manejo e alimentação adequados aos animais para que a resposta ao tratamento seja maximizada. Este produto requer 14 dias de periodo de carência.




## APRESENTAÇÃO:

**Seringa plástica descartável contendo 1,4mL ( 1 dose) acondicionada em caixa com 25 seringas e 25 agulhas.**

# MASTI-SEAL®

*SELANTE INTRAMAMÁRIO PARA VACAS SECAS*

COMPOSIÇÃO:

Subnitrato de Bismuto, Óxido de Zinco, Álcool Benzílico, Butilhidroxitolueno, Estearato de Alumínio e Vaselina Líquida.

INDICAÇÕES:

**Masti-Seal®** é um selante intramamário para uso durante a secagem de vacas leiteiras ou ainda em novilhas de primeira lactação, no período pré-parto. Devido a sua composição inerte (sem antibióticos e quimioterápicos), ele não possui propriedades terapêuticas, atua somente como barreira mecânica no canal do teto que impede a entrada de microrganismos, produzindo proteção imediata que pode perdurar durante todo o período seco do animal.

MODO DE USAR:

Após a última ordenha e assepsia do úbere, administrar via intramamária todo o conteúdo de uma seringa de 4g de Masti-Seal® em cada quarto mamário, imediatamente após a aplicação de um antibiótico intramamário indicado para vacas secas.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Não massagear o teto após a aplicação do produto. Como o produto funciona apenas como barreira mecânica, ele deve ficar no local da aplicação.
A remoção do produto será feita pela mamada inicial do bezerro, sem qualquer risco para o mesmo, ou por ordenha manual. Neste caso, recomenda-se a ordenha manual por até 96 horas (o mesmo período do colostro) para a retirada do selante. A retirada do produto por ordenha mecânica não gera a presença de grumos no leite, desde que haja filtros adequados na linha de ordenha. Caso o produto seja aplicado acidentalmente em vacas em lactação, a remoção deve ser feita esgotando-se manualmente o teto.

CARÊNCIA:

Este produto não possui período de carência para carne e leite dos animais tratados.




APRESENTAÇÃO:

**Balde plástico com 100 seringas plásticas com 4g cada.**

# MASTIJET® FORTE

*SUSPENSÃO INTRAMAMÁRIA PARA VACAS EM LACTAÇÃO INDICADO PARA TRATAMENTO DE MASTITES.*

INDICAÇÕES:

**Mastijet® Forte** é o tratamento de eleição para mastites clínicas (agudas e crônicas) em vacas em lactação. É efetivo contra os microrganismos causadores das infecções mamárias em vacas, tais como: *Staphylococcus aureus* e os *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* e *Streptococcus uberis* e *Escherichia coli*.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Faça uma infusão do conteúdo inteiro de uma seringa em cada um dos tetos infectados.
**Instruções para uso:**

- Retire todo o leite do teto.
- Limpe o teto por completo.
- Remova a tampa da ponta da seringa, insira a cânula no canal do teto e injete o conteúdo todo da seringa.
- Remova a seringa, segure com firmeza a ponta do teto e promova massagem para cima, em todo o quarto mamário.
- Em casos de secreções muito abundantes ou de inflamações agudas com ou sem febre deve-se combinar um tratamento parenteral com antibióticos e anti-inflamatórios.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Em casos de secreções muito abundantes ou de inflamações agudas com ou sem febre deve-se combinar um tratamento parenteral com antibióticos e anti-inflamatórios.Conservação de 2 a 8 °C.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 10 dias | **LEITE:** 9 dias.



APRESENTAÇÃO:

**Cartucho contendo 20 seringas com 8g cada, acondicionadas em sachet. Acompanha lenços desinfetantes, para limpeza do teto antes da administração do produto.**

# MASTIJET® VACA SECA

*INFUSÃO INTRAMAMÁRIA PARA VACAS SECAS*

COMPOSIÇÃO:

**Cada seringa de 9 g contém:**
- Benzilpenicilina G Procaína - 1,000 g (1.000.000 UI) (Equivalente a 566 mg de Benzilpenicilina G)
- Benzilpenicilina G Potássica - 0,314 g (500.000 UI) (Equivalente a 281 mg de Benzilpenicilina G)
- Sulfato de Neomicina - 0,735 g (Equivalente a 500 mg de Neomicina base)
- Excipiente q.s.p.- 9,000 g

INDICAÇÕES:

Indicado para vacas leiteiras não lactantes, para o tratamento de mastite subclínica durante o período de secagem, causados por bactérias Gram positivas e Gram negativas, tais como: *Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativos.*

MODO DE USAR E DOSAGENS:

O conteúdo de uma seringa deve ser infundido lentamente para tratar cada quarto imediatamente após a última ordenha e secagem. Antes da infusão, deve ser retirado todo o leite do úbere, a teta e o orifício da teta devem ser cuidadosamente limpos e deve-se tomar o cuidado de evitar a contaminação do bico injetor. Insira cuidadosamente parte ou total do bico e faça a infusão do conteúdo de uma seringa em cada quarto. Disperse o produto com uma leve massagem na teta e no úbere.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Não utilize o produto em vacas em lactação. Utilizar somente em vacas no mínimo 35 dias antes do parto. Não utilize o produto em animais com hipersensibilidade conhecida à Penicilina e Aminoglicosídeos. Conservção 15 a 30 °C.

CARÊNCIA:

**CARNE:** 36 dias | **LEITE:** 60 horas ( 5 ordenhas) para vacas com período seco de pelo menos 35 dias (5 semanas).

APRESENTAÇÃO:

**Seringas de 9g acondicionadas em caixa com 4 ou 20 seringas.**




# MASTIPLAN® LC

*SUSPENSÃO INTRAMAMÁRIA PARA VACAS EM LACTAÇÃO INDICADO NO TRATAMENTO DA MASTITE*

INDICAÇÕES:

**Mastiplan® LC** é indicado no tratamento da mastite clínica em vacas leiteiras causada por *Staphylococcus aureus*, *Estafilococos coagulase negativa*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis* e *Escherichia coli* sensíveis a cefapirina.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

O conteúdo de uma seringa deve ser infundido em cada um dos quartos afetados através do canal do teto imediatamente após a ordenha, em intervalos de 12 horas por quatro ordenhas consecutivas. Antes da infusão, deve ser retirado todo o leite do úbere. O teto e seu orifício devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados com o lenço de limpeza fornecido. É preciso tomar cuidado para evitar a contaminação do bico da seringa. Quebre a tampa superior e cuidadosamente insira cerca de 5 mm ou quebre a tampa toda e insira o bico todo da seringa no canal do teto. Faça a infusão de todo o conteúdo da seringa no quarto. Espalhe o produto massageando levemente o teto e o úbere afetado da vaca.

PRECAUÇÕES:

Não utilize os lenços de limpeza em tetos que apresentem ferimentos abertos.
O uso do produto deve ser baseado em testes de susceptibilidade e considerando-se as políticas oficiais e locais para o uso de antimicrobianos.
A seringa deve ser utilizada apenas uma vez para um teto.
Qualquer produto veterinário não utilizado ou material residual derivado de tal produto deve ser descartado de acordo com as exigências locais.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 3 dias. | **LEITE:** 5 dias.

APRESENTAÇÃO:

**Caixa contendo 20 seringas de 8 g cada.**



# REPRODUÇÃO




**CHORULON®** 5000 UI
**CIOSIN®**
**FERTAGYL®**
**FERTILCARE®** SINCRONIZAÇÃO
**FERTILCARE®** IMPLANTE 600
**FERTILCARE®** OVULAÇÃO
**FOLLIGON®** 5000 UI

# CHORULON® 5000 UI

*GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (hCG)*

O composto ativo é Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG), uma glicoproteína complexa. hCG é uma gonadotrofina com atividades de Hormônio Luteinizante (LH).

Na fêmea, hCG pode ser utilizado para estimular o desenvolvimento dos folículos para a maturação, para induzir a ovulação, para ocasionar a luteinização das células granulosas, para manter a vida funcional do corpo lúteo e para aumentar a secreção de progesterona a partir das células luteinizadas. hCG também aumenta a ação de FSH no crescimento do ovário.

## INDICAÇÕES:

**Chorulon® 5000 UI** pode ser usado para o tratamento de problemas de fertilidade:

- Melhoria da taxa de concepção em vacas.
- Indução da ovulação em éguas.
- Ovários císticos com ciclo irregular de estro, ninfomania ou ausência de cio em vacas.
- Ausência de estro em éguas.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

O produto deve ser reconstituído com o diluente (5 mL), injetando-se o mesmo no frasco que contém o liofilizado e administrado por via intramuscular ou intravenosa.

**BOVINOS E OVINOS:** Melhoria da taxa de concepção: 1500 U.I. I.M. ou I.V. na Inseminação Artificial ou monta natural; Doença cística do ovário (ausência de estro, estro prolongado, ninfomania): 3000 U.I. I.V.

**EQUINOS:** Ausência de cio (folículos > 2 cm em diâmetro): 1500 - 3000 U.I. I.M. ou I.V. repetir se necessário após dois dias; Indução da ovulação (folículos ≥ 3,5 cm em diâmetro): 1500 U.I. - 3000 U.I. I.M. ou I.V. 24 horas antes da Inseminação Artificial ou do acasalamento.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.
**EQUINOS:** carência zero.



## APRESENTAÇÃO:

**Caixas contendo 5 frascos com 5.000 UI de hCG e 5 frascos contendo 5 ml de diluente.**

# CIOSIN®

*PROSTAGLANDINA SINTÉTICA (CLOPROSTENOL)*

**Ciosin®** é um potente agente luteolítico que causa uma regressão funcional e morfológica do corpo lúteo (luteólise) em bovinos e equinos, seguida de um retorno ao cio e ovulação normal.

## INDICAÇÕES:

**Indicações para bovinos:**
Sub-estro (cio não visível)
Cistos lúteos ovarianos
**Indicações para equinos:**
Indução da luteólise
Eliminação de diestro persistente
Estabelecimento de ciclo estral em éguas inférteis e/ou virgens

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

**BOVINOS:** A dosagem de **Ciosin®**, tanto para criação planejada (sincronização de cio), indução de partos e uso terapêutico, é de 2 mL por via intramuscular, no entanto, para uso terapêutico, esta dose poderá ser repetida 10-14 dias após, conforme a necessidade do caso clínico. No pós-parto de vacas leiteiras, aplicar duas doses com intervalo de 3 dias, sendo que a primeira dose deve ser aplicada entre o 1º e o 4º dia após o parto.

**EQUINOS:** 1 mL por via intramuscular.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

O derramamento acidental de Ciosin® deve ser lavado imediatamente com água, pois pode ser absorvido através da pele e ser prejudicial para mulheres em idade reprodutiva, gestantes e asmáticos.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**CARNE:** 1 dia.
**LEITE:** carência zero.
**EQUINOS:** 1 dia.




## APRESENTAÇÕES:

**Caixa coletiva contendo 20 frascos-ampola de 2 mL cada e cartucho com frasco de 10 mL ou 20 mL cada.**

# FERTAGYL®

*SOLUÇÃO DE GONADORELINA, INDICADO PARA A INDUÇÃO DA OVULAÇÃO*

FÓRMULA:

**Fertagyl®** é uma solução estéril de 0,10 mg por mL de Gonadorelina (hormônio sintético liberador de gonadotrofina).

INDICAÇÕES:

Indicado para o tratamento de infertilidade em vacas leiteiras, através de suas propriedades indutoras da ovulação. É indicado também para o tratamento da síndrome do ovário cístico em vacas.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Administrado através da via intramuscular.

**BOVINOS:**
- Ovários císticos - 5,00 mL
- Indução de ovulação - 2,5 mL

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Usar procedimentos assépticos para aplicação do produto.
- Cuidado quando usar o produto para evitar auto-injeção.
- Em caso de auto-injeção acidental, procurar auxílio médico imediatamente e mostrar a bula do produto.
- Em caso de contato acidental com a pele, lavar imediatamente com água.
- Conservar na temperatura entre 2° C a 8° C.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS E COELHOS:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.

APRESENTAÇÕES:

**Frasco-ampola de vidro contendo 5 mL, acondicionado em caixa individual ou caixa com 10 unidades e frasco-ampola de vidro contendo 50 mL.**




# FERTILCARE® SINCRONIZAÇÃO

*SINCRONIZADOR DE DESENVOLVIMENTO FOLICULAR E INDUTOR DE OVULAÇÃO PARA BOVINOS*

COMPOSIÇÃO:

**Cada 100 mL contém:**
Benzoato de Estradiol - 100,00 mg
Excipiente q.s.p. - 100,00 mL

INDICAÇÕES:

**FertilCare® Sincronização** é indicado para a sincronização de crescimento folicular e também indução da ovulação em programas de reprodução em bovinos, de acordo com os exemplos abaixo:

- Inseminação artificial convencional (IA).
- Inseminação artificial em tempo fixo (IATF).
- Preparação de doadoras de embriões (TE).
- Para receptoras, em programas de transferência de embriões em tempo fixo (TETF).

MODO DE USAR E DOSAGENS:

No dia da inserção de implantes de progesterona: aplicar 2,0 mL via intramuscular para provocar atresia dos folículos e uma nova onda de crescimento folicular. Após 1 a 2 dias da retirada do implante, aplicar 1,0 ou 2,0 mL, via intramuscular para estimular indiretamente a ovulação.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Não aplicar em animais jovens, sexualmente imaturos e não aplicar em fêmeas prenhes.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.

APRESENTAÇÃO:

**Frascos contendo 100 mL.**



# FERTILCARE® IMPLANTE 600

*IMPLANTE INTRAVAGINAL DE PROGESTERONA PARA BOVINOS*

## INDICAÇÕES:

**FertilCare® Implante 600** é indicado para o controle do ciclo estral em novilhas e vacas, e protocolos de inseminação artificial em cio detectado ou em tempo fixo (IATF). Um **FertilCare® Implante 600** é capaz de liberar concentrações ideais de progesterona durante seu período de utilização.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

Utilizar um implante intravaginal por animal durante cada tratamento ou protocolo.

Utilizar um implante intravaginal por animal durante cada tratamento ou protocolo. Um Fertilcare Implante 600 é capaz de liberar concentrações ideais de progesterona durante seu período de utilização.

1. Lavar o aplicador com solução antisséptica, não irritante, antes da utilização em cada animal;
2. Encaixar o implante no aplicador por completo;
3. Levantar a cauda do animal e fazer a higienização da vulva do animal com papel toalha;
4. Com a cauda do animal levantada, introduzir o aplicador com o implante na vulva progredindo para a vagina sem forçar;
5. Pressionar o aplicador para expelir o implante;
6. Deixar a cauda plástica do produto para fora da vulva, de preferência voltada para baixo, para identificação e sua posterior remoção;
7. Na remoção puxar o implante pela cauda plástica externa à vulva, tomando cuidado para não mover o implante para as laterais ou para cima ou para baixo, evitando ferimento na vagina.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Recomenda-se uso de luva para a manipulação do implante;
- Manter as boas práticas de higiene tanto dos materiais utilizados como do operador;
- Não utilizar em animais com enfermidades genitais;
- Ocasionalmente, podem-se perceber sinais de vaginite leve que desaparecem espontaneamente em pouco tempo após a retirada do produto, não comprometendo a eficácia do tratamento nem a saúde animal;
- Conservar à temperatura ambiente de 15° a 30°C, ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.




## APRESENTAÇÃO:

**Bolsa contendo 10 implantes.**

# FERTILCARE® OVULAÇÃO

*SINCRONIZADOR DE DESENVOLVIMENTO FOLICULAR E INDUTOR DE OVULAÇÃO PARA BOVINOS*

FÓRMULA:

**Cada 100 mL contém:**
Cipionato de Estradiol - 50 mg
Excipiente q.s.p. - 100,00 mL

INDICAÇÕES:

**FertilCare® Ovulação** é indicado para a indução da ovulação e também sincronização de crescimento folicular em programas de reprodução em bovinos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Protocolos reprodutivos: No dia da inserção do implante: Aplicar 1 mL via intramuscular para provocar atresia dos folículos e uma nova onda de crescimento folicular.

No dia da retirada do implante: Aplicar 1 mL via intramuscular para estimular a ovulação.

Administrar via intramuscular.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto;
- Utilizar agulhas e seringas esterelizadas, mantendo as boas práticas de higiene e assepsia para injeção de medicamentos;
- Após a abertura do frasco, o produto deve ser utilizado em até 10 dias e eventuais sobras devem ser descartadas;
- Não aplicar em animais jovens, sexualmente imaturos;
- Não aplicar em fêmeas prenhes.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** carência zero.
**LEITE:** carência zero.




APRESENTAÇÃO:

**Frascos contendo 100 mL.**

# FOLLIGON® 5000 UI

*GONADOTROFINA SÉRICA EQUINA (eCG)*

## INDICAÇÕES:

**Folligon® 5000 UI** é um complexo glicoproteico. O estudo farmacodinâmico deste produto mostra que ele tem uma ação dupla, essencialmente de FSH, mas também de LH. A ação FSH da gonadotrofina sérica estimula o crescimento das células intersticiais do ovário, assim como a maturação dos folículos.

Quanto à atividade LH, traduz-se pela indução da ovulação (posta em evidência por numerosos estudos de superovulação).

No caso do macho, a gonadotrofina sérica favorece o desenvolvimento do tecido intersticial da rete testis e das glândulas sexuais acessórias.

Estas propriedades permitem a indicação de **Folligon® 5000 UI** no tratamento de certos casos de infertilidade nas espécies pecuárias. Permitem, em particular, induzir a superovulação na vaca, etapa essencial para os processos de transferência de embriões nesta espécie.

## MODO DE USAR E DOSAGENS:

**Bovinos:** Superovulação: 1500 a 3000 U.I. de **Folligon® 5000 UI** intramuscular entre o 8º e o 13º dia do ciclo, seguido 48 horas depois de PGF2α;

Anestro*: 500 a 1000 U.I. de **Folligon® 5000 UI** intramuscular;

Aumento de fertilidade do rebanho após tratamento com progestágenos: 500 a 1000 U.I. de **Folligon® 5000 UI** intramuscular.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

A injeção de qualquer tipo de substância protéica pode desencadear reações do tipo anafilático, alguns minutos após a administração. A injeção de uma solução de adrenalina de 1/1000 por via intravenosa ou intramuscular é o tratamento usual. A administração de corticosteróide também pode ser indicada.

Conservar o produto entre 2ºC a 8ºC ao abrigo de luz, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Após abrir e reconstituir o produto, todo o conteúdo deve ser utilizado.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

**BOVINOS:** carência zero.

**LEITE:** carência zero.




## APRESENTAÇÕES

**Caixa com 1 frasco-ampola de 5000 UI e uma ampola de 25 mL com diluente.**



COMPROMISSO com a pecuária. Hoje e sempre.

MSD Saúde Animal




*Consulte sempre um médico-veterinário*

# Ciência Para Animais Mais Saudáveis™

*MATERIAL DE CIRCULAÇÃO E USO EXCLUSIVO DOS MÉDICOS-VETERINÁRIOS*