

---

# LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

A. GROTHENDIECK

---

Ce texte a été transcrit et édité par Mateo Carmona. La transcription est aussi fidèle que possible au typescript. Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus.

<https://agrothendieck.github.io/>

## SOMMAIRE

<b>Première Partie</b> . . . . .	5
1. Topos multigaloisiens . . . . .	6
2. Application aux revêtements des topos . . . . .	10
3. Variantes pro-multigaloisiennes . . . . .	12
4. Compléments, remords . . . . .	13
5. Introduction du contexte arithmétique; “conjecture anabélienne fondamentale”	15
6. Analyse locale de $(X, S)$ en un $s \in S$ . . . . .	19
7. Reformulation “bordélique” de la conjecture (le purgatoire nécessaire...) . . . . .	21
8. Réflexions taxonomiques . . . . .	37
9. Structure tangentielle en les $s \in S$ . . . . .	45
10. Ajustement des hypothèses (remords) . . . . .	49
11. Conditions sur les systèmes de groupoïdes obtenus à partir de situations géométriques	51
12. L’analogie topologique . . . . .	55
13. Retour au cas arithmétique; formulation “galoisienne” . . . . .	65
13 bis. Retour sur la notion de groupe à lacets . . . . .	68
14. Digression cohomologique (sur le “bouchage de trous”) . . . . .	70
14 bis. Où on revient sur les morphismes mixtes . . . . .	75
15. Retour sur le cas topologique: orbites critiques des scindages d’extensions; . . .	78
16. Bouchage et forage de trous: préliminaires topologiques généraux . . . . .	79
17. Complément au §15; sous-groupes de groupes à lacets . . . . .	80
18. Forage de trous; applications aux sous-groupes finis de $\text{Autext}_{\text{lac}}(\pi)$ . . . . .	81
19. Tour de Teichmüller . . . . .	82
20. Digression: description 2-isotopique de la catégorie des isomorphismes topologiques	83
21. Les espaces de Teichmüller . . . . .	84
23. Retour sur les surfaces à groupes (finis) d’opérateurs (“mise en équations” du problème)	85

24. Essai de détermination de $\mathcal{A}^{0\Gamma}$ ; lien avec les relations $\pi_{g,(\nu,\nu+n-1)}^\Gamma = \{1\}$ , programme de travail	86
25. Groupes de Teichmüller “spéciaux”	87
25 bis. “Cas des deux groupes” d’opérateurs; retour sur les notations	89
26. Groupes de Teichmüller profinis. Discrétification et prédiscrétification. Lien avec topos modulaire	
27. Changement de type $(g, \nu)$ : a) Bouchage de trous (et diagrammes remarquables p.174)	105
28. Changement de type $(g, \nu)$ (suite): b) passage à un revêtement fini (la conjecture hâtive grince...)	112
29. Critique de l’approche précédente (on rajuste les notions et les conjectures)	120
30. Propriétés des $\mathcal{N}_{g,\nu}, \Pi_{g,\nu}$ : a) Propriétés liées aux sous-groupes finis de Teichmüller	127
31. Digression sur les relèvements d’une action extérieure d’un groupe fini sur un groupe profini à lacer	
32. Retour sur les aspects arithmétiques du bouchage de trous: relations entre $\Pi_{g,\nu}$ et $\Pi_{g,\nu-1}$	134
33. Digression topologique	152
33bis. Etude des revêtements finis - relation entre les $\mathcal{N}_{g,\nu}, \Gamma_{g,\nu}$ pour $g$ variable	169
34. Description heuristique profinie de la catégorie des courbes algébriques définies sur des sous-extensions	
35. L’injectivité de $\Pi_Q \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{0,3})$	178
36. L’isomorphisme $\Pi_Q \xrightarrow{\sim} \Pi_{1,1}$ et l’injectivité de $\Pi_Q \longrightarrow \text{Autext}(\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+) \simeq \text{Autext}(SL(2, \mathbb{Z})^\wedge)$	184
37. Théorie des modules des courbes elliptiques via Legendre	198
<b>Notes</b>	220
Structure à l’infini des $M_{g,\nu}$	221
Notes Anabéliennes	227

## PREMIÈRE PARTIE

## § 1. — TOPOS MULTIGALOISIENS

---

Proposition (1.1). — Soit  $E$  une catégorie. Conditions équivalentes :

- a)  $E$  est un topos, et tout objet de  $E$  est localement constant.
- b)  $E$  est équivalent à une catégorie  $\widehat{C}$ , où  $C$  est un groupoïde (N.B. On verra plus loin que l'on peut choisir  $C$  canoniquement).
- b') Il existe une famille  $(G_i)_{i \in I}$  de groupes et une équivalence de catégories

$$E \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Ens}(G_i)$$

- c) Conditions d'exactitudes ad-hoc, du type de celles données dans SGA 1...

Démonstration.  $b) \Rightarrow b') \Rightarrow a)$  immédiat. Pour  $a) \Rightarrow b)$  je suis moins sûr, peut être faut-il supposer que  $E$  est localement connexe, et qu'il a suffisamment de foncteurs fibres i.e. suffisamment de points.

Définition (1.2). — Si les conditions équivalentes b), b') ci-dessus sont satisfaites, on dit que  $C$  est un topos multigaloisien (ou une catégorie multigaloisienne).

Proposition (1.3). —

- a) Si  $E$  est multigaloisien tout topos induit  $C/S$  aussi.

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

*b) Toute somme de topos multigaloisiens (i.e. tout produit de catégories multigaloisiennes) est un topos multigaloisien.*

**Proposition (1.4).** — *Soient  $E$  un topos,  $C$  la catégorie des points de  $E$ , (opposée à la catégorie des foncteurs fibres sur  $E$ ). Le foncteur canonique  $E \times C^\circ \longrightarrow \text{Ens}$  induit un foncteur canonique*

$$E \longrightarrow \text{Hom}(E^\circ, \text{Ens}) \stackrel{\text{def}}{=} \widehat{C}$$

*Ceci posé [ $E$  étant multigaloisien]*

- a)  $C$  est un groupoïde (appelé groupoïde fondamental du topos multigaloisien  $E$  et souvent noté  $\Pi_1(E)$ ).*
- b)  $E \longrightarrow \widehat{C}$  est une équivalence de catégories.*

Un objet  $S$  d'un topos  $E$  est dit 0-connexe s'il est  $\neq \emptyset_E$  (i.e. n'est pas objet initial) et s'il est connexe (i.e.  $S \simeq S' \amalg S''$  implique  $S' \simeq \emptyset_E$  ou  $S'' \simeq \emptyset_E$ ) - cela signifie aussi que le topos induit  $E/S$  est 0-connexe i.e. n'est pas le topos initial ("topos vide", équivalent à la catégorie finale) et qu'il est connexe, i.e. ...

On dit que  $S$  est 1-connexe (ou simplement connexe) s'il est 0-connexe et si tout objet  $S'$  de  $E/S$  localement constant est constant - ce qui ne dépend encore que du topos induit  $E/S$ , qui sera dit alors 1-connexe.

**Proposition (1.5).** — *Soit  $E$  un topos multigaloisien, et soit  $S$  un objet de  $E$ . Conditions équivalentes :*

- a)  $S$  est 1-connexe*
- b)  $S$  est 0-connexe et projectif*
- c) Le foncteur covariant représenté par  $S$*

$$T \mapsto \text{Hom}_E(S, T)$$

*est un foncteur fibre, ou encore (comme il est déjà exact à gauche) il commute aux  $\varinjlim$  inductives quelconques (N.B. il suffit qu'il commute aux sommes et aux passages aux quotients ...)*

## A. GROTHENDIECK

d)  $E/S$  est équivalent au topos ponctuel

e) (Si  $E = \widehat{C}$ ,  $C$  un groupoïde) le foncteur  $S$  sur  $C$  est représentable.

Définition (1.6). — On dit alors, parfois que  $S$  (ou mieux, le topos  $E/S$ ) est un revêtement universel du topos multigaloisien  $E$ .

Proposition (1.7). — Soit  $E_\circ$  la sous-catégorie pleine de  $E$  formée des objets 1-connexes (de la catégorie multigaloisienne  $E$ ), et  $\Pi_1(E)$  le groupoïde fondamental de  $E$ . On a par (1.5). un foncteur canonique

$$E_\circ \longrightarrow \Pi_1(C)$$

(associant à tout  $S \in Ob(E_\circ)$  le foncteur fibre qu'il représente, ou plutôt le "point" correspondant de  $C$ ), qui est (non seulement pleinement fidèle mais même) une équivalence de catégorie : tout foncteur fibre sur  $E$  est représentable (par un objet (1-connexe) essentiellement unique comme de juste ...)

Corollaire (1.8). — Soit  $P$  un "point" de  $E$  (associé à un foncteur fibre  $F_P$ ). Il existe un objet 1-connexe  $S$  de  $E$  et un relèvement

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\alpha} & E/S \\ & \searrow & \swarrow \\ & E & \end{array}$$

(i.e.  $\alpha \in F(S)$ ) et cela détermine  $(S, \alpha)$  à isomorphisme près.

En fait,  $S$  est l'unique objet de  $E$  qui représente  $F_P$  ...

Définition (1.9). — On dit que  $S$  (ou  $E/S$ ) est le revêtement universel ponctué au dessus de  $P$  déterminé par le point  $P$ .

Scholie (1.10). — Se donner un "point" du topos multigaloisien  $E$ , ou se donner un revêtement universel, revient essentiellement au même : chacun détermine l'autre ...

Proposition (1.11). — Soient  $E, E'$  deux topos multigaloisiens,  $\Pi_1(E), \Pi_1(E')$  leur



# LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

*groupoïdes fondamentaux. Le foncteur évident*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{top}(E, E') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\Pi_1(E), \Pi_1(E'))$$

*est une équivalence de catégories ; posant  $C = \Pi_1(E)$ ,  $C' = \Pi_1(E')$  on trouve une équivalence quasi-inverse en composant*

$$\begin{array}{c} \underline{\mathrm{Hom}}(C, C') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{top}(\widehat{C}, \widehat{C'}) \xrightarrow{\approx} \underline{\mathrm{Hom}}_{top}(E, E') \\ \cap \\ \underline{\mathrm{Hom}}(\widehat{C'}, \widehat{C}) \end{array}$$

**(1.12). Explicitation du cas où  $E, E'$  sont 0-connexes et ponctués, donc donnés comme  $E \simeq \mathrm{Ens}(G), E' \simeq \mathrm{Ens}(G') \dots$**

## § 2. — APPLICATIONS AUX REVÊTEMENTS DES TOPOS

---

**Théorème (2.1).** — *soit  $E$  un topos localement connexe (i.e. dont tout objet est somme d'objets connexes) et localement simplement connexe (i.e. admettant un système de générateurs qui sont 1-connexes)<sup>1</sup>. Alors la catégorie  $E_{lc}$  des objets localement constants de  $E$  est un topos multigaloisien, et l'inclusion*

$$(2.1.1.) \quad E_{lc} \hookrightarrow E$$

*commute aux  $\varprojlim$  finies (N. B. en fait sans hypothèses sur le topos  $E$ ,  $E_{lc}$  est stable par  $\varprojlim$  finies) et aux  $\varinjlim$  quelconques.*

**Définition (2.2).** — *On dénote ce topos par  $E_{[1]}$ , on l'appelle l'enveloppe multigaloisienne de  $E$  et le morphisme de topos transposé de l'inclusion (2.1.1.) :*

$$E \longrightarrow E_{[1]}$$

*prend le nom de morphisme canonique.*

N. B. C'est l'équivalent en théorie des topos de l'opération de "tuage des  $\pi_i$  pour  $i \leq 2$ ". On peut définir aussi  $E_{[0]}$  et une suite

$$E \longrightarrow E_{[1]} \longrightarrow E_{[0]}$$

( $E_{[0]}$  est le topos *discret* défini par  $\pi_0(E)$ , qui a un sens satisfaisant dès que  $E$  localement connexe ...).

---

<sup>1</sup>N.B. peut-être faut-il supposé que  $E$  ait "assez de points" i.e. assez de foncteurs libres...

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Moyennant des hypothèses convenables sur  $E$  (du type “locale contractibilité”), on doit pouvoir définir les  $E_{[i]}$  pour tout  $i \in \mathbb{N}$ , et des morphismes canoniques

$$E \longrightarrow \dots E_{[i]} \longrightarrow E_{[i-1]} \longrightarrow \dots E_{[1]} \longrightarrow E_{[0]}$$

**2.3.** Le *groupoïde fondamental* de  $E$  se définit comme ayant pour objets les points de  $E$  (qui induisent des points de  $E_{[1]}$  grâce à  $E_{[1]} \longrightarrow E$ ), et comme morphismes les morphismes *de points* de  $E_{[1]}$ . On a donc des foncteurs canoniques

$$\underline{\mathrm{Pt}}(E) \xrightarrow{\alpha} \Pi_1(E) \xrightarrow[\approx]{\beta} \underline{\mathrm{Pt}}(E_{[1]}) \stackrel{\mathrm{def}}{=} \Pi_1(E_{[1]})$$

où  $\beta$  est une équivalence (mais pas surjectif sur les objets), et où bien sur  $\alpha$  n’est pas nécessairement une équivalence ni même pleinement fidèle, ou seulement fidèle.

Par exemple si  $E$  est 1-connexe (i.e.  $\Pi_1(E)$  équivalent à la catégorie ponctuelle, il ne s’ensuit pas nécessairement que les Hom dans  $\underline{\mathrm{Pt}}(E)$  soient tous de cardinal  $\leq 1$ !)

Comme un point  $P$  de  $E$  définit un point (noté encore  $P$  par abus) de  $E_{[1]}$ , on peut donc définir le *revêtement universel* de  $E$  basé en ce point, comme un objet  $S$  1-connexe de  $E_{[1]}$  - il est caractérisé dans  $E$  par le fait d’être localement constant, 1-connexe, et muni d’un relèvement

$$P \longrightarrow E/S$$

Mais comme  $\alpha$  n’est pas une équivalence de catégorie (bien qu’il soit essentiellement surjectif si on suppose que  $E$  a suffisamment de points ...) on *ne peut pas* dire que tout revêtement universel de  $E$  soit défini à isomorphisme unique près ....

### § 3. — VARIANTES “PRO-MULTIGALOISIENNES”, RESPECTIVEMENT PROFINIES



(en se bornant, pour simplifier, au cas des topos localement connexes ...)

## § 4. — COMPLÉMENT-REMORD SUR LES CATÉGORIES MULTIGALOISIENNES,

---

qui précise l'intention que pour un topos  $E$ , la donnée d'un objet  $S \in E$  définit un topos induit  $E/S \longrightarrow E$ , et que  $S$  se reconstitue à isomorphisme près par la connaissance du topos induit en tant que topos *au dessus* de  $E$ . Ici,  $E$  étant multigaloisien,  $E/S$  aussi - et il se pose la question quand un morphisme de topos multigaloisien  $E' \longrightarrow E$  peut être considéré comme un morphisme d'induction. Si  $C = \Pi_1(E)$ ,  $C' = \Pi_1(E')$ , la donnée de  $E' \longrightarrow E$  équivaut à la donnée d'un foncteur  $C' \longrightarrow C$ .

On trouve que  $E' \longrightarrow E$  est un morphisme d'induction si et seulement si  $C' \longrightarrow C$  est *fidèle*. Ainsi, on trouve une équivalence entre la catégorie  $E$  (des objets  $S$  de la catégorie multigaloisienne  $E \simeq \widehat{C}$ , où  $C$  est un groupoïde quelconque si on y tient <sup>(2)</sup>) et la catégorie dont les objets sont les "groupoïdes  $C'$  au dessus de  $C$ ", avec un foncteur structural  $C' \longrightarrow C$  *fidèle*, les morphismes de  $C'_1$  dans  $C'_2$  étant les *classes d'isomorphie* <sup>(3)</sup> de couples  $(f, \alpha)$  d'un foncteur  $f : C'_1 \longrightarrow C'_2$  et d'un isomorphisme de foncteurs  $\alpha : p_1 \xrightarrow{\sim} p_2 \circ f$

$$\begin{array}{ccc}
 C'_1 & \xrightarrow{f} & C'_2 \\
 & \searrow p_1 \quad \xrightarrow{\alpha} \quad \swarrow p_2 & \\
 & C &
 \end{array}$$

Dans le cas où par exemple  $C$  est la catégorie réduite à un seul objet, avec groupe d'automorphisme  $G$ , cette description de la catégorie  $E = \text{Ens}(G)$  est évidemment un peu

---

<sup>2</sup>un peu vif !

<sup>3</sup>préciser les isomorphismes entre couples  $(f, \alpha)$  et  $(g, \beta)$  ...

## A. GROTHENDIECK

lourde, mais elle s'insère bien dans certains contextes plus bas.

Ainsi, si  $k$  est un corps de base, la catégorie  $E$  des schémas étales sur  $k$  se décrit, en terme d'une clôture séparable  $k_s$  de  $k$  et du groupe profini  $\Gamma = \text{Gal}(k_s/k)$ , comme les groupoïdes profinis au dessus du groupoïde profini  $(pt, \Gamma) \dots$  Nous voulons insérer cette description dans une “description” “galoisienne” de [certains] schémas [lisses quasi-projectifs de dimension  $\leq 1$ ] sur  $k$ , du moins si  $k$  corps de type fini sur  $Q$ .

## § 5. — INTRODUCTION DU CONTEXTE ARITHMÉTIQUE; “CONJECTURE ANABÉLIENNE FONDAMENTALE”

---

Soit  $K$  une extension de type fini de  $\mathbb{Q}$ , et choisissons une clôture algébrique  $\bar{K}$  de  $K$ . On pose  $\Gamma = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ .

5.1. Nous considérons des couples  $(X, S)$ , où :

- a)  $X$  est un schéma projectif et lisse sur  $K$ , de dimension  $\leq 1$  ;
- b)  $S$  est sous schéma fini réduit de  $X$  (donc fini étale sur  $K$ ) contenu dans la réunion des composantes irréductibles de dimension 1 de  $X$ .

Les morphismes  $(X', S') \longrightarrow (X, S)$  seront par définition les morphismes de schémas

$$f : X' \longrightarrow X$$

tels que

$$S' = f^{-1}(S)_{\text{red}}$$

i.e. tels que  $\text{supp} S' = f^{-1}(\text{supp} S)$ .

Nous cherchons une “description galoisienne” de cette catégorie, ou tout au moins d’une sous-catégorie pleine  $V_K$  que nous allons définir maintenant.

**Lemme (5.2).** — *Soit  $\Omega$  un corps algébriquement clos,  $X$  une courbe projective lisse connexe sur  $\Omega$ ,  $S$  une partie finie de  $X(\Omega)$ ,  $U = X \setminus S$ ,  $g$  le genre de  $X$  et  $n = \text{card } S$ . Conditions équivalentes :*

## A. GROTHENDIECK

- a)  $\pi_1(U)$  non abélien,
- b)  $\text{Aut}(U)$  fini,
- c) pour tout schéma connexe réduit  $X$  de type fini sur  $\Omega$ , l'ensemble des morphismes non constants de  $X$  dans  $U$  est fini,
- d) on est dans l'un des trois cas suivant : 1°)  $g \leq 2$  2°)  $g = 1, n \leq 1$  3°)  $g = 0, n \geq 3$
- e) (si  $\Omega \subset \mathbb{C}$ ) le revêtement universel de  $X(\mathbb{C}) \setminus S(\mathbb{C})$  est isomorphe au demi plan de Poincaré,
- f) (??) (si  $\Omega = \overline{\mathbb{Q}}, S \neq \emptyset$ ) Le revêtement universel de  $X \setminus S = U$  est isomorphe à celui de  $P_\Omega^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ .

Définition (5.3). — On dit alors que  $(X, S)$  est anabélien.

Comme cette condition est (par d) par exemple) invariante par extension du corps de base algébriquement clos, on étend cette définition au cas d'un couple  $(X, S)$ , avec  $(X, S)$  comme dans (5.1) (N.B. On regarde séparément les composantes connexes de  $X_{\overline{K}} \dots$ ). Dorénavant, dans (5.1) nous allons nous borner au cas de couples  $(X, S)$  anabéliens.

(5.4). A un couple  $(X, S)$  (pas nécessairement anabélien) - plus généralement à tout schéma  $X$  localement de type fini sur  $S$  - on associe un objet "de nature galoisienne" [à] savoir le groupoïde fondamental profini  $\Pi(X)$  de  $X$  (fermé (?) si on veut des revêtements universel de  $X$ ), muni d'un foncteur canonique

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X) & \longrightarrow & \Pi_1(K) \\ & & \approx \downarrow \\ & & [\text{Tors}(\Gamma)] \end{array}$$

Un morphisme de  $K$ -schémas

$$X' \xrightarrow{f} X$$

définit un foncteur

$$\Pi_1(X') \xrightarrow{\Pi_1(f)} \Pi_1(X)$$



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

et un isomorphisme de commutation  $\alpha$ :

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X') & \xrightarrow{\Pi_1(f)} & \Pi_1(X) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \xrightarrow{\alpha} & \\ & \Pi_1(K) & \end{array}$$

On trouve ainsi un foncteur, de la catégorie des schémas localement de type fini  $X$  sur  $K$ , dans la “catégorie des groupoïdes profinis sur  $\Pi_1(K)$ ”, définie comme au  $n^\circ 4$ .

Quand on passe à la catégorie des schémas localement de type fini connexes, *munis d'un point géométrique au dessus de  $\bar{K}/K^4$*  (i.e. d'un  $x \in X$ , d'une clôture séparable  $\bar{k}(x)$  de  $k(x)$  et d'un  $K$ -morphisme  $\bar{K} \hookrightarrow \bar{k}(x)$ ), cela correspond à un foncteur des  $K$ -schémas localement de type fini et connexes, ponctués sur  $\bar{K}/K$  (au sens précédent) vers la catégorie des groupes profinis  $\Pi$  munis d'un homomorphisme (de groupes profinis)

$$\Pi \longrightarrow \Gamma$$

(dont l'image sera d'ailleurs nécessairement ouverte donc d'indice fini, pour des objets provenant de  $X$  comme [ci-]dessus).

**Conjecture (5.5)<sup>5</sup>** — *La restriction du foncteur précédent  $X \mapsto (\Pi_1(X) \text{ sur } \Pi_1(K))$  aux schémas projectifs lisses de dimension  $\geq 1$  et anabéliens (i.e. tels que  $(X, S)$  soit anabélien, où  $S$  est la réunion des composantes de dimension 0) est pleinement fidèle.*

Il revient au même de dire ceci:

**Définition (5.5 bis).** — *Le foncteur qui, à tout  $X$  comme dans 5.5. et de plus connexe, (de dimension 0 ou 1), muni d'un point géométrique  $\xi$  au dessus de  $\bar{K}$ , associe le groupe profini  $\pi_1(X, \xi)$  sur  $\Gamma = \pi_1(K, \xi)$ , est un foncteur pleinement fidèle.*

Il faut quand même expliciter les morphismes  $(X, \xi) \longrightarrow (X', \xi')$  dans la catégorie de départ : morphismes de  $K$ -schémas  $X \xrightarrow{f} X'$ , munis d'un morphisme (ou classe de chemins)  $f(\xi) \simeq \xi'$ .

---

<sup>4</sup>il vaut mieux dire : munis d'un revêtement universel...

<sup>5</sup>c'est un peu faux cf  $n^\circ 9$

## A. GROTHENDIECK

Ces conjectures se réduisent à la théorie de Galois, pour des  $X$  de dimension 0. Pour des  $X$  de dimension 1, elles ne concernent que des  $X$  tels que les composantes connexes de  $X_{\bar{K}}$  soient de genre  $\geq 2$  (ou, ce qui revient au même, introduisant l'extension finie  $K' = H^0(X, \underline{O}_X)$  de  $K$ , de sorte que  $X$  soit géométriquement connexe sur  $K'$ , tel que  $X$  comme courbe algébrique sur  $K'$  soit de genre  $\geq 2$ . On voit aisément (prenant  $X' = \text{Spec}(K)$ ,  $X = \mathbb{P}_K^1$  courbe elliptique sur  $K$ ) qu'elles deviennent fausses sinon - c'est pourquoi il a fallu introduire  $S$ , plus l'hypothèse anabélienne sur  $(X, S)$ , pour associer à  $(X, S)$  une structure plus riche que  $\Pi_1(X)$  sur  $\Pi_1(K)$ . On trouvera des conjectures (par exemple) pour  $X$  courbe géométriquement connexe sur  $K$  de genre 1 (resp. 0), *pourvu* que  $S$  soit de degré  $\geq 1$  (resp.  $\geq 3$ ).

## § 6. — ANALYSE LOCALE DE $(X, S)$ EN UN $s \in S$

On s'intéresse au cas où  $\dim_s(X) = 1$ , i.e. où  $s$  n'est pas point isolé dans  $X$ .

Soit  $\underline{O}_s$  le hensélisé (ou le complété, si on y tient) de  $\underline{O}_{X,s}$ ,  $K_s$  son corps de fractions,  $D_s^* = \text{Spec}(K_s)$ , on identifie  $s$  à  $\text{Spec } k(s)$  ( $k(s)$  est le corps résiduel de l'anneau-jauge  $\underline{O}_s$ ). Considérons  $D_s = \text{Spec}(\underline{O}_s)$  ("disque arithmétique relatif à  $k(s)$ "), donc  $D_s^* = D_s \setminus s =$  ("disque épointé")  $\longrightarrow D_s$ , on a :

$$\begin{array}{ccccc} \Pi_1(D_s^*) & \xrightarrow{i_s} & \Pi_1(D_s) & \xrightarrow{q_s} & \Pi_1(K) \\ & \searrow \sigma_s & \uparrow \approx & \nearrow j_s & \\ & & \Pi_1(s) & & \end{array}$$

(6.1)

Pour le choix d'un point géométrique  $\xi_s$  de  $D_s^*$  sur  $\bar{K}/K$  (i.e. d'une clôture algébrique  $\bar{K}_s$  de  $K_s$  et d'une  $K$ -injection  $\bar{K} \hookrightarrow \bar{K}_s$ ), ce diagramme de groupoïdes se reflète en un homomorphisme de groupes <sup>6</sup> de

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(D_s^*, \xi_s) & \xrightarrow{\text{surjectif}} & \pi_1(k(s), \xi_s) & \xleftarrow{\text{injectif}} & \Gamma \\ \uparrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \\ \text{Gal}(\bar{K}_s/K_s) & & \text{Gal}(\bar{k}(s)/k(s)) & & \end{array} \quad (6.2)$$

---

<sup>6</sup>**N.B.** Le choix de  $\bar{K}_s$  implique un choix de  $\bar{k}_s$  - c'est la flèche pointillée (6.1).

## A. GROTHENDIECK

dont le noyau, on le sait par Kummer, est canoniquement isomorphe à  $T(\bar{k}_s) \simeq T(\bar{K}_s)$  [ $\simeq T(\bar{K})$ ].

On veut exprimer la donnée de cet isomorphisme privilégié comme une structure supplémentaire sur (6.1) - i.e. sur le groupoïde  $\Pi_1(D_s^*)$  sur  $\Pi_1(s)$  (ou sur  $\Pi_1(K)$ ) - On peut le dire ainsi : si à tout  $\xi \in \Pi_1(D_s^*)$ , on associe le noyau de

$$\text{Aut}(\xi) \longrightarrow \text{Aut}(i(\xi))$$

(qui est aussi le noyau des composés

$$\text{Aut}(\xi) \longrightarrow \text{Aut}(i(\xi)) \longrightarrow \text{Aut}(p_s(\xi) = q_s(i_s(\xi)))$$

on trouve un groupe *abélien*, qui ne dépend (à isomorphisme près) que de  $i(\xi) = \xi'$  [ceci, et la suite de la phrase, marche chaque fois qu'on a un foncteur de groupoïdes connexes à noyau abélien et surjectif sur les Hom], et pour  $\xi'$  variable forme un système local sur  $\Pi_1(D_s)$ , qu'on peut appeler le  $\pi_1$  *relatif* du groupoïde  $\Pi_1(D_s^*)$  sur le groupoïde  $\Pi_1(D_s)$ .

Ceci dit, on a un isomorphisme de systèmes locaux de groupes

$$\pi_1(\Pi_1(D_s^*) \text{ sur } \Pi_1(D_s)) \simeq q_s^*(T_K)$$

où  $T_K$  est le système local de Tate sur  $K$ .

Posons maintenant

$$D_S = \coprod_{s \in S} D_s \quad (\text{"multidisque arithmétique en } S\text{"})$$

$$D_S^* = \coprod_{s \in S} D_s^* \quad (\text{"multicouronne arithmétique en } S\text{"})$$

On a un homomorphisme de groupoïdes

$$\Pi_1(D_s^*) \xrightarrow{\sigma_s} \Pi_1(S) \quad (\xrightarrow{j_s} \Pi_1(K))$$

et un isomorphisme canonique

$$\Pi_1(D_s^*)/\Pi_1(S) \simeq j_s^*(T(K))$$

Ceci posé, on a aussi un morphisme

$$D_S^* \xrightarrow{\rho_S} X \setminus S$$

induisant

$$\Pi_1(D_S^*) \xrightarrow{\Pi_1(\rho_S)} \Pi(X \setminus S).$$


## § 7. — REFORMULATION “BORDÉLIQUE” DE LA CONJECTURE (LE PURGATOIRE NÉCESSAIRE ...)

---

Ainsi, à  $(X, S)$  comme dans 5.1., on associe :

1°) Trois groupoïdes (profinis)  $\Pi_U, \Pi_D, \Pi_{D^*}$  (en plus de  $\Pi_e = \Pi_1(\text{Spec}(K))(\simeq \text{Tors}(\Gamma))$ );

2°) Quatre foncteurs (de groupoïdes profinis) :



3°) Un isomorphisme de commutation

$$\alpha : \varphi \rho \simeq \psi \sigma$$

(qui est même l’identité dans le cas de système provenant de  $(X, S)$ , mais il vaut mieux oublier qu’il en soit ainsi). Ces données satisfaisant aux conditions préliminaires

- a)  $\sigma$  induit un isomorphisme sur les  $\pi_0$ , et des épimorphismes sur les Hom, et il est à noyau abélien ;
- b)  $\psi$  est fidèle.

## A. GROTHENDIECK

[ c)  $\rho$  est fidèle...

d)  $\varphi$  est épimorphique modulo groupes finis sur les Aut... ]

La condition a) permet déjà de définir le  $\pi_1$  relatif  $\pi_1(\sigma) = \pi_1(\Pi_{D^*}/\Pi_D)$ , qui est un système local de groupes abéliens sur  $\Pi_D$  i.e. un foncteur  $(\Pi_D)^\circ \longrightarrow \text{Ens}$ , et la dernière donnée

4°) Un isomorphisme kummérien

$$\chi : \pi_1(\sigma) \simeq \psi^*(T)$$


Si on a deux systèmes de cette nature  $\Pi = (\Pi_U, \Pi_D, \Pi_{D^*}, \varphi, \psi, \rho, \sigma, \alpha, \chi)$  et  $\Pi' = (\Pi_U, \dots)$ , un *morphisme* de  $\Pi'$  dans  $\Pi$  est un système de trois foncteurs

$$f_U : \Pi'_U \longrightarrow \Pi_U$$

$$f_D : \Pi'_D \longrightarrow \Pi_D$$

$$f_{D^*} : \Pi'_{D^*} \longrightarrow \Pi_{D^*}$$

et de quatre isomorphismes de commutation  $\alpha_{D^*,D}$ ,  $\alpha_{D^*,U}$ ,  $\alpha_{U,e}$ ,  $\alpha_{D,e}$ , pour les quatre faces du prisme




satisfaisant une équation de compatibilité avec  $\alpha$ ,  $\alpha'$  que je n'écris pas - signifiant que les *deux* isomorphismes  $u$ ,  $v$  de foncteurs

$$\Pi'_{D^*} \begin{array}{c} \xrightarrow{\varphi \circ \rho \circ f_{D^*}} \\ \begin{array}{c} u \downarrow \downarrow v \\ \text{id} \circ \varphi' \circ \sigma' \end{array} \downarrow \\ \xrightarrow{\text{id} \circ \varphi' \circ \sigma'} \end{array} \Pi_e$$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

obtenus respectivement,  $u$  en utilisant successivement  $\alpha$ ,  $\alpha_{D^*,D}$ ,  $\alpha_{D,e}$ ,  $v$  en utilisant successivement  $\alpha_{D^*,U}$ ,  $\alpha_{U,e}$ ,  $\alpha'$ , sont égaux. [Cette compatibilité pourrait s'exprimer en interprétant la donnée de  $\Pi$  comme celle d'une catégorie fibrée  $\Pi$  sur la "catégorie carrée"  $Q$  :



(où  $\varphi_0 \rho_0 = \psi_0 \sigma_0$ ) à restriction à  $\{e\}$  imposée, et en prenant des foncteurs cartésiens entre catégories fibrées...].

De plus, on exige autre une compatibilité, savoir que l'homomorphisme de systèmes locaux en groupes abéliens sur  $\Pi'_D$

$$\pi_1(\sigma') \longrightarrow (f_D)^*(\pi_1(\sigma))$$

défini à l'aide de  $f_{D^*}$ ,  $f_D$ ,  $\alpha_{D^*,D}$  rende commutatif le diagramme suivant d'isomorphismes de systèmes locaux sur  $\Pi'_D$ <sup>7</sup> :

$$\begin{array}{ccc}
 (f_{D^*})^*(\pi_1(\sigma)) & \longleftarrow & \pi_1(\sigma') \\
 \uparrow \sim & & \sim \uparrow \\
 (f_{D^*})^*(\psi^*(T)) & & \psi'(T) \\
 \downarrow \sim & \swarrow x & \\
 (\psi f_D)^*(T) & & 
 \end{array}$$

(où  $x$  est déduit de  $\alpha_{D,e} : \psi' \simeq \psi \circ f_D$ )

Pour  $\Pi$ ,  $\Pi^*$  fixés, les systèmes  $(f_\alpha = (f_U, f_D, f_{D^*}, \alpha_{D^*,D}, \alpha_{D^*,U}, \alpha_{U,e}, \alpha_{D,e}))$  précédents forment une catégorie de façon naturelle - en fait un groupoïde - en prenant comme morphismes  $\mu$  de  $(f', \alpha')$  dans  $(f, \alpha)$  les triplets de morphismes (foncteurs profinis)

$$f'_U \xrightarrow{\mu_U} f_U, \quad f'_D \xrightarrow{\mu_D} f_D, \quad f'_{D^*} \xrightarrow{\mu_{D^*}} f_{D^*}$$

---

<sup>7</sup>non cela ne marche que pour le cas de morphismes étales, sinon il faut faire intervenir la multiplication par les "degrés de ramifications"  $d_{i'}$  ( $i' \in \pi_0(\Pi'_{D^*})$ ).

## A. GROTHENDIECK

satisfaisant quatre conditions de compatibilité avec  $\alpha_{D^*,D}$  et  $\alpha'_{D^*,D}$ , avec  $\alpha_{D^*,U}$  et  $\alpha'_{D^*,U}$  avec  $\alpha_{U,e}$  et  $\alpha'_{U,e}$ , avec  $\alpha_{D,e}$  et  $\alpha'_{D,e}$  respectivement (i.e. on travaille avec une sous-catégorie pleine de la catégorie des Hom entre catégories fibrées sur  $Q$ , à fibre en  $e$  fixée...).

J'ai l'impression que le groupoïde  $\underline{\text{Hom}}((f', \alpha'), (f, \alpha))$  est toujours *rigide*, i.e.  $\text{Aut}(f, \alpha)$  est toujours réduit au groupe unité - j'ai la flemme de vérifier - donc que si  $(f', \alpha')$  et  $(f, \alpha)$  son isomorphes, l'isomorphisme en question est unique. Quoi qu'il en soit, on posera

$$\text{Hom}((f', \alpha'), (f, \alpha)) = \pi_0 \underline{\text{Hom}}((f', \alpha'), (f, \alpha))$$

D'où une *catégorie* des systèmes  $\Pi = (\Pi_U, \Pi_D, \Pi_{D^*}, \varphi, \psi, \rho, \sigma, \alpha, \chi)$ .

On a un foncteur des couples  $(X, S)$ <sup>8</sup> (où  $X$  schéma localement de type fini sur  $K$ ,  $S$  sous schéma fermé de  $X$  étale sur  $K$ , tels que  $\forall s \in S$ ,  $X$  soit lisse de dimension relative 1 en  $s$ ) vers cette catégorie bordélique  $B$ .

**Conjecture bordélique (7.1).** — *Quand on se borne aux  $(X, S)$  tels que  $X$  projectif lisse de dimension  $\leq 1$ , et qui de plus sont anabéliens, alors le foncteur précédent est pleinement fidèle<sup>9</sup>.*

Description de la catégorie bordélique en termes de théorie de groupes.

Soit  $I = \pi_0(\Pi_{D^*}) \simeq \pi_0(\pi_D)$ . Choisissons un élément  $D_i^*$  dans chaque composante de  $\Pi_{D^*}$ , et soit  $D_i = \sigma(D_i^*)$ . Pour tout  $i$ , choisissons un isomorphisme

$$\phi(D_i) \xrightarrow[\sim]{\lambda_i} \text{Spec}(\overline{K})$$

Quitte à remplacer l'objet par un "sous-objet" isomorphe on peut supposer que  $\Pi_{D^*}$  est la catégorie somme de catégories  $[E_i]$  définis par les  $E_i = \text{Aut}(D_i^*)$ ,  $\Pi_D$  la catégorie somme des catégories  $[\Gamma_i]$  définies par les  $\Gamma_i = \text{Aut}(D_i)$ , le foncteur  $\sigma$  s'exprimant par un système d'homomorphismes

$$\sigma_i : E_i \longrightarrow \Sigma_i \quad (i \in I)$$

qui sont surjectifs de noyaux abéliens, le foncteur  $\phi$  par un système d'inclusions  $\phi_i : \Gamma_i \hookrightarrow \Gamma$  et la donnée de  $\chi$  équivaut en fait à des isomorphismes

$$\chi_i : \ker \sigma_i \simeq T(\overline{K})$$

<sup>8</sup>[les] morphismes  $(X', S') \longrightarrow (X, S)$  sont les morphismes  $f : X' \longrightarrow X$  tels que  $f^{-1}(S)_{\text{red}} = S'$

<sup>9</sup>**N.B.** La fidélité est facile...



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

compatibles avec les opérations de  $\Gamma_i$  et de  $\Gamma$  sur les deux  $[?]$  respectivement, et les inclusions  $\phi_i$ . On peut dire que la donnée de  $(\sigma, \phi, k)$  est exprimée par la donnée du système  $(E_i)_{i \in I}$ , d'un système de suites exactes

$$\boxed{1 \longrightarrow T(\overline{K}) \xrightarrow{x_i} E_i \xrightarrow{p_i} \Gamma}$$

telles que les  $\Sigma_i = \text{Im } p_i$  soient ouverts, et que  $x_i$  soit compatible avec les opérations de  $\Sigma_i \simeq \text{Coker } x_i$  (ou de  $E_i$  et  $\Gamma$  sur les deux termes respectivement).

N.B. Les extensions des  $\Gamma_i$  par  $T(\overline{K})$  obtenues par des situations géométriques splittent le choix d'une uniformisante en  $s_i$  définit un splittage, et même [seulement ?] le choix d'une base de l'espace tangent en  $s$ ...

Re N.B. Deux bases différents définissent des scindages différents !

Supposant d'autre part (pour simplifier)  $\Pi_U$  connexe, et choisissant un élément  $\tilde{U}$  de  $\Pi_U$  et un isomorphisme

$$\varphi(\tilde{U}) \xrightarrow{\lambda_U} \text{Spec}(\overline{k})$$

donc (quitte à remplacer  $\Pi_U$  par un groupoïde équivalent) on peut supposer  $\Pi_U$  réduit à  $\tilde{U}$ , et  $\Pi_U$  est donné alors par un groupe  $E$ , et  $\varphi$  par un homomorphisme de groupes

$$\boxed{E \xrightarrow{\varphi_{\tilde{U}}, \lambda_U, (\text{ou } p)} \Gamma}$$

dont l'image  $\Sigma \subset \Gamma$  est encore un sous-groupe ouvert de  $\Gamma$ , et le noyau sera noté  $\pi$

$$\boxed{1 \longrightarrow \pi \xrightarrow{x} E \longrightarrow \Sigma \longrightarrow 1}$$

N.B. Dans la situation géométrique cette extension de *noyaux de groupes splitte*, i.e. il existe un sous-groupe ouvert  $\Sigma_o$  dans  $\sigma$ , et un relèvement  $\Sigma_o \longrightarrow E$ ...

Ayant remplacé  $\Pi_U$  initial par une sous-catégorie pleine plus petite, on sera obligé de modifier  $\rho$  à isomorphisme près, pratiquement en choisissant pour chaque  $i \in I$  un isomorphisme

$$\rho(D_i) \xrightarrow{\mu_i} \tilde{U}$$

moyennant quoi  $\rho$  s'explicite simplement par des homomorphismes de groupes

$$\boxed{\rho_i : E_i \longrightarrow E}$$

## A. GROTHENDIECK

Il reste à expliciter l'isomorphisme de commutation

$$\alpha : \varphi \rho \longrightarrow \psi \sigma$$

qui est défini par un système d'éléments

$$\boxed{\gamma_i \in \Gamma \quad (i \in I)}$$

tels que

$$\varphi \circ \rho_i = \text{int}(\gamma_i) \circ \Pi_i$$

ce qui implique d'ailleurs que  $\rho_i$  applique  $\ker p_i$  dans  $\ker \rho$ , i.e... induit un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \longrightarrow & E_i & \longrightarrow & \Gamma_i & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow \rho_i & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \Gamma_0 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

avec un homomorphisme induit  $\Gamma_i \longrightarrow \Gamma_0$  injectif - et ceci posé, la relation de compatibilité devient une relation sur des monomorphismes de groupes  $\Gamma_i \hookrightarrow \Gamma_0 \hookrightarrow \Gamma$ .

Ainsi, on a une description relativement simple des systèmes bordéliques "réduit" (i.e. où dans les groupoïdes  $\Pi_U, \Pi_{D^*}, \Pi_D$ , chaque composante connexe a exactement un objet, et où de plus on force en quelque sorte  $\Pi(K)$  à n'avoir que l'objet  $\text{Spec}(\overline{K})$ ). Mais on est retrouvé en [ne] tournant pas la détermination des *morphismes*

$$G = (I, G_i, p_i, K_i, E, \varphi(\text{ou } p?), \rho_i, \gamma_i) \text{ et } G' = (I', G'_i, \dots),$$

disons dans le sens  $f : G' \longrightarrow G$ . Il faut donc (pour  $f_{D^*}$ ) une application

$$\boxed{\tau = \tau_f : I' \longrightarrow I}$$

et pour tout  $i$  un homomorphisme

$$\boxed{G'_{i'} \xrightarrow{f_{i'}} G_{\tau i'}}$$

induisant (compte tenu de  $f_D$ ) par passage au quotient des homomorphismes

$$\Gamma'_{i'} \xrightarrow{g_i} \Gamma_{\tau i'}$$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

de sous groupes ouverts de  $\Gamma$  et la donnée  $f_{D^*}, f_D, \alpha_{D^*, D}, \alpha_{D, e}$  équivaut donc à la donnée d'éléments  $\alpha_i$  ( $i \in I$ ) de  $\Gamma$ , tels que

$$g_{i'}(\gamma') = \text{Int}_{(\alpha_{i'})}(\gamma') \quad \forall i' \in I', \gamma' \in \Gamma'_{i'}$$

La donnée de  $f_U$  équivaut à la donnée d'un homomorphisme de groupes celle de  $\alpha_{D, e}$  équivaut à la donnée de

$$\boxed{\alpha \in \Gamma}$$

tel que (\*):

$$\varphi f_E = \text{Int}(\alpha)\varphi$$

de sorte que  $f_E$  induit un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi' & \longrightarrow & E'_i & \longrightarrow & \Gamma'_0 & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow f_E & & \downarrow f_{\sigma_0} & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \Gamma_0 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

et moyennant cela, la condition dite  $\alpha$  devient une condition sur des inclusions de sous-groupes de  $\gamma$  :

$$f_{\sigma_0}(\gamma') = \text{int}(\alpha)\gamma' \quad \text{si} \quad \gamma' \in \Gamma'_0.$$

Il faut expliciter encore (en plus de  $f_{D^*}, f_D, f_U, \alpha_{D^*, D}, \alpha_{D, e}, \alpha_{U, e}$  déjà explicités) la donnée de commutation  $\alpha_{D^*, U}$  et écrire les conditions de compatibilités avec  $\alpha, \alpha'$  et  $\kappa, \kappa'$ . La donnée de  $\alpha_{D^*, U}$  équivaut à celle de systèmes d'éléments

$$\boxed{\beta_{i'} \in E'} \quad (i' \in I')$$

tels que l'on ait dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G'_{i'} & \xrightarrow{\rho'_{i'}} & E' \\ f_{i'} \downarrow & & \downarrow f_E \\ G_{\tau i'} & \xrightarrow{\rho_{\tau i'}} & E \end{array}$$

la relation

$$f_E \circ \rho'_{i'} = (\text{int}(\beta_i)\rho_{\tau i'}) \circ f_{i'}$$

## A. GROTHENDIECK

Reste à exprimer les deux compatibilités de  $f_{D^*}, f_{D^1}, F_U, \alpha_{D^*, D}, \alpha_{D, e}, \alpha_{D^*, U}, \alpha_{U, e}$  avec lui même et avec  $\varkappa$  - la deuxième compatibilité est simplement la compatibilité des  $f_{i'}$  avec les  $\varkappa'_{i'}$ ,  $\varkappa_i$ , i.e.

$$f'_{i'} \circ \varkappa'_{i'} = \varkappa_i \quad (i = \tau i')$$

et la première *sauf erreur* s'exprime par la "commutativité"

$$\boxed{\alpha_{i'} = \gamma_i^{-1} p(\beta_{i'}^{-1}) \alpha \gamma'_{i'}} \quad \forall i' \in I'$$

En résumé les homomorphismes, dans un système de diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{\varkappa_i} & E_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \\ & & \downarrow & & \downarrow \rho_i & & \downarrow \text{int}(\gamma_i) \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & E & \xrightarrow{p} & \Gamma \end{array}$$

d'un système analogue, relatif à un ensemble d'indices  $I'$ , est donné par une application

$$\tau : I' \longrightarrow I$$

et pour tout  $i' \in I'$ , posant  $i = \tau(i')$ , d'un système de flèches verticales  $f_{i'} : E'_{i'} \longrightarrow E_i$ , et d'une flèche verticale  $f_E : E' \longrightarrow E$ , enfin d'un système d'éléments  $\beta_{i'} \in E$  et d'un  $\alpha \in \Gamma$ , s'insérant dans le système de diagrammes<sup>10</sup>

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{\varkappa'_{i'}} & E'_{i'} & \xrightarrow{p'_{i'}} & \Gamma \\ & & \downarrow d_{i'} & \searrow \varepsilon'_{i'} & \downarrow f_{i'} & \searrow \rho'_{i'} & \downarrow \text{int}(\gamma'_{i'}) \\ 1 & \longrightarrow & \pi' & \longrightarrow & E' & \xrightarrow{p'} & \Gamma \\ & & \downarrow f_{i'} & & \downarrow f_E & & \downarrow \text{int}(\alpha_{i'}) \\ 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{\varkappa_i} & E_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \\ & & \downarrow \varepsilon_i & \searrow & \downarrow \rho_i & & \downarrow \text{int}(\gamma_i) \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & E & \xrightarrow{p} & \Gamma \end{array}$$

<sup>10</sup>N.B. Comme les  $E_i \longrightarrow E$  sont injectifs,  $f_{i'}$  est connu quand on connaît  $f_E$  et  $\beta_{i'}$ , (l'existence de  $f_{i'}$  est donc une condition sur les couples  $f_E, \beta_{i'}$  savoir que  $\text{int}(\beta_{i'})^{-1} f_E \rho_{i'}$  applique  $E_{i'}$  dans  $p_i(E_i)$ ). On peut supposer les  $\gamma_{i'}, \gamma_i$  égaux à 1 (en choisissant l'isomorphisme de  $\psi(\sigma(D_i^*))$  avec  $\text{Spec}(\overline{K})$  via l'isomorphisme de  $\varphi(\rho(D_i^*)) = \varphi(\tilde{U})$  avec  $\text{Spec} \overline{K}$  [?])

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

où on a posé (\*) :

$$\alpha'_i = \gamma_i^{-1} p(\beta_i^{-1}) \alpha \gamma'_i \quad \text{i.e.} \quad \alpha \gamma'_i = p(\beta_i) \gamma_i \alpha'_i$$

et où la face verticale postérieure des prismes est commutative (deux conditions, sur deux carrés), la face verticale antérieure aussi (c'est *une* condition, sur le carré de droite, l'autre carré commutatif s'en déduit par définition de  $\pi' \longrightarrow \pi$  comme induit par  $f_E \dots$ ), la face verticale gauche du cube de droite étant commutative modulo l'isomorphisme de commutativité  $\text{int}(\beta_{i'})$ , et la face verticale droite étant commutative (non seulement, par la condition précédente, sur  $\sum_{i'} = \text{Im}(E'_{i'} \xrightarrow{p'_{i'}} \Gamma)$ , mais sur  $\Gamma$  tout entier) en vertu de la relation plus précise (\*).

Conjecture bordélique précisée (correspondant aux  $\Pi_U$  connexes). — *Ses objets sont les homomorphismes de groupes profinis*

$$E \xrightarrow{p} \Gamma$$

*donnant naissance à une suite exacte*

$$1 \longrightarrow \pi \xrightarrow{\kappa} E \xrightarrow{p} \Gamma$$

*si un ensemble fini de sous-groupes (indexés par un ensemble  $I$  d'indices)*

$$E_i \xhookrightarrow{\rho_i} E$$

*et d'isomorphismes*

$$E_i \cap \pi \xrightarrow[\sim]{\kappa_i} T(\overline{K})$$

*Un homomorphisme d'un système  $(E', p', (E'_{i'})_{i' \in I'}, (\kappa'_{i'})_{i' \in I'})$  dans un système  $(E, p, (E_i)_{i \in I}, \dots)$  est donné par un homomorphisme*

$$f : E' \longrightarrow E$$

*et des  $\beta_{i'} \in E$  ( $i' \in I'$ )<sup>11</sup>,  $\alpha \in \Gamma$ , tels que l'on ait les conditions :*

$$1^\circ) \quad p \circ f = \text{int}(\alpha) p'$$

---

<sup>11</sup>Les  $\beta_{i'}$  pas uniques (si  $\beta_{i'}$  convient aussi  $\gamma \beta_{i'}$ , avec  $\gamma \in \text{Im} \kappa_i$ ) Mais  $\alpha$  unique ??

## A. GROTHENDIECK

2°)  $\forall i' \in I', \exists i \in I$  (*unique !*) tel que

$$\text{int}(\beta_{i'})^{-1} f(E'_{i'}) = E_i$$

et un entier  $d_{i'} \in \mathbb{N}^{*12}$  tel que

$$\text{int}(\beta_{i'}^{-1}) f x'_{i'} = x_i \circ (d_{i'}, \text{id}_{T(\bar{K})})$$

Je me a'perçois qu'il vaut mieux remplacer les  $\beta_{i'}$  par les  $\beta_{i'}^{-1}$ , i.e. prendre l'isomorphisme de commutation plutôt dans le sens

$$f_\varepsilon \rho'_{i'} \xrightarrow{\beta_{i'}} \rho_i f_{i'}$$

qu'en sens inverse. De plus, conceptuellement le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \Pi_{D^*} & \\ \rho \swarrow & & \searrow \sigma \\ \Pi_U & & \Pi_D \\ \varphi \searrow & \xrightarrow{\alpha} & \swarrow \psi \\ & \Pi_e & \end{array}$$

est trop compliqué, il suffit de se donner

$$\boxed{\Pi_{D^*} \xrightarrow{\rho} \Pi_U \xrightarrow{\varphi} \Pi_e}$$

et de déduire  $\Pi_D$  par factorisation canonique de l'homomorphisme de groupoïdes  $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_e$  en un homomorphisme qui induit un isomorphisme sur  $\pi_0$  et un épimorphisme sur les  $\pi_1$ , suivi d'un homomorphisme qui est [épi. sur  $\pi_0$ , et pour cause, et qui est] *fidèle*. Alors les 1-morphismes de

$$\Pi'_{D^*} \xrightarrow{\rho'} \Pi'_U \xrightarrow{\varphi'} \Pi_e$$

dans

$$\Pi_{D^*} \xrightarrow{\rho} \Pi_U \xrightarrow{\varphi} \Pi_e$$

---

<sup>12</sup>N. B.  $d_{i'}$  est aussi unique...

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

sont les quintuplés de 2 foncteurs et 3 isomorphismes de foncteurs  $(f_{D^*}, f_U, \alpha_{D^*,U}, \alpha_{U,e}, \chi)$  donnant un diagramme avec données de commutation<sup>1314</sup>

$$\begin{array}{ccccc} \Pi'_{D^*} & \xrightarrow{\rho'} & \Pi'_U & \xrightarrow{\varphi'} & \Pi_e \\ f_{D^*} \downarrow & \nearrow \alpha_{D^*,U} & \downarrow f_U & \nearrow \alpha_{U,e} & \downarrow \sim \\ \Pi_{D^*} & \xrightarrow{\rho} & \Pi_U & \xrightarrow{\varphi} & \Pi_e \end{array}$$

et si on a deux tels 1-morphismes  $f = (f_{D^*}, f_U, \alpha_{D^*,U}, \alpha_{U,e})$  et  $g = (g_{D^*}, g_U, \beta_{D^*,U}, \beta_{U,e})$  un 0-morphisme de  $f$  dans  $g$  est formé d'un couple  $(\mu_{D^*}, \mu_U)$  d'isomorphismes de foncteurs

$$\mu_{D^*} : f_{D^*} \xrightarrow{\sim} g_{D^*}, \quad \mu_U : f_U \xrightarrow{\sim} g_U$$

compatibles avec  $\alpha_{D^*,U}, \beta_{D^*,U}$  (deux conditions de compatibilités sur les deux carrés).

Si on se borne à des  $\Pi_U$  connexes, on trouve en choisissant comme plus haut un objet  $\tilde{U}$  de  $\Pi_U$ , et un isomorphisme

$$\varphi(\tilde{U}) \xrightarrow[\sim]{\lambda} \Omega$$

(où  $\Omega = \text{Spec}(\overline{K})$  est l'objet référence de  $\Pi_e \dots$ ), un groupe  $E$  et un homomorphisme

$$E \xrightarrow{\varphi} \Gamma$$

(qui est changé par automorphisme intérieure si on change  $\lambda$ , et  $E$  lui même remplacé par un groupe isomorphe, l'isomorphisme défini modulo isomorphisme intérieur, si on change l'objet de référence  $\tilde{U}$ ). De même, choisissant un  $\tilde{U}_i$  dans chaque composante  $i \in \pi_0(\Pi_{D^*})$ , et un isomorphisme

$$\lambda_i : \rho(\tilde{U}_i) \xrightarrow{\sim} \tilde{U},$$

on trouve des groupes  $E_i$  et des homomorphismes

$$E_i \xrightarrow{\rho_i} E$$

Si on change  $\lambda_i, \rho_i$  est changé par automorphisme intérieur de  $E$ . Si on change  $\tilde{U}_i, E_i$  est remplacé par un groupe isomorphe, l'isomorphisme défini à automorphisme près.

<sup>13</sup>de plus,  $\pi_1(\varphi\rho) = \pi_1(\Pi_{D^*}/\Pi_e)$  peut se définir comme un système local de groupes (commutatifs) sur  $\Pi_{D^*}$ , et on peut alors définir  $\chi : (\varphi\rho)^* T'_K \simeq \pi_1(\varphi\rho)$ .

<sup>14</sup>avec une condition sur le morphisme  $\pi_1(\varphi'\rho') \simeq f_{D^*}(\pi_1(\varphi\rho))$  induit, qui modulo les isomorphismes de Kummer doit être la multiplication par un  $d$  (indice de ramification) qui est un application  $\pi_0(\Pi'_{D^*}) \longrightarrow N^*$ .

## A. GROTHENDIECK

Considérons les composés

$$\begin{array}{ccc} E_i & \longrightarrow & E \\ & \searrow p_i & \downarrow p \\ & & \Gamma \end{array}$$

d'où [un ?] noyau,  $\kappa$  est défini par un système d'isomorphismes

$$T(\overline{K}) \xrightarrow[\sim]{\kappa_i} \text{Ker } p_i \quad i \in I$$

s'insèrent dans une famille de suites exactes

$$1 \longrightarrow T(\overline{K}) \xrightarrow{\kappa_i} E_i \xrightarrow{p_i} \Gamma$$

(N. B. l'image de  $p_i$  est un sous-groupe ouvert)  $\kappa_i$  étant compatible aux actions de  $E_i$ , quand on fait opérer  $E_i$  sur  $T(\overline{K})$  via l'action de  $\Gamma$  sur  $T(\overline{K})$ , et sur lui même par automorphismes intérieures. Introduisant également  $\pi = \text{Ker } p$ , on trouve donc un homomorphisme de suites exactes (D) :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{\kappa_i} & E_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \\ & & \downarrow \varepsilon_i & & \downarrow \rho_i & & \downarrow \sim \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{p} & \Gamma \end{array}$$

On peut dire que  $\Pi_U$  définit un "groupe extérieur"  $[E]$ , et  $\Pi_U \longrightarrow \Pi_e$  un homomorphisme de groupes extérieurs

$$[E] \longrightarrow [\Gamma]$$

de même  $\Pi_{D^*}$  définit un système de "groupes extérieurs"  $[E_i]$ , et  $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U$  un système d'homomorphismes extérieurs

$$[E_i] \longrightarrow [E],$$

mais comment en termes de groupes extérieurs exprimer les données de Kummer  $\kappa_i$  ?

Revenant aux systèmes de diagrammes  $D$  (relatif à un ensemble d'indices  $I$ ) et à un  $D'$  analogue (avec un ensemble d'indices  $I'$ ) D :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{\kappa'_{i'}} & E'_{i'} & \xrightarrow{p_{i'}} & \Gamma \\ & & \downarrow \varepsilon'_{i'} & & \downarrow \rho'_{i'} & & \downarrow \sim \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \xrightarrow{\kappa'} & E' & \xrightarrow{p'} & \Gamma \end{array} \quad i' \in I'$$

un homomorphisme  $f$  de  $D'$  dans  $D$  s'explicite par



# LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

a) Un homomorphisme<sup>15</sup>

$$\boxed{f_E : E' \longrightarrow E}$$

{ s'explique en termes du choix d'un isomorphisme

$$\nu : f(\tilde{U}') \simeq \tilde{U}$$

(un autre choix modifie  $f_E$  par un  $\text{int}(\beta), \beta \in E$ ) }

b) Une application<sup>16</sup>  $\tau : I' \longrightarrow I$ , et pour tout  $i' \in I'$ , posant  $i = \tau(i')$ , un homomorphisme de groupes

$$\boxed{E_i \xrightarrow{f'_{i'}} E_i}$$

[s'explique en terme du choix d'un isomorphisme  $f_{D^*}(\tilde{U}_{i'}) \xrightarrow[\simeq]{\nu_i} \Pi_{U_i}$ , et modifié par des  $\text{int}(\beta_{i'}), \beta_{i'} \in E_i$ , si on change  $\nu_{i'}$ ]

c) Une donnée de commutation<sup>17</sup> pour

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{p'} & \Gamma \\ f_E \downarrow & \nearrow \alpha & \downarrow \sim \\ E & \xrightarrow{p} & \Gamma \end{array} \quad \boxed{\alpha \in \Gamma}$$

i.e.

$$\boxed{p f_E = \text{int}(\alpha) p'}$$

d)  $\forall i' \in I$  une donnée de commutation<sup>18</sup> pour

$$\begin{array}{ccc} E'_{i'} & \xrightarrow{p'_{i'}} & E' \\ f_{i'} \downarrow & \nearrow \alpha_{i'} & \downarrow \sim \\ E_i & \xrightarrow{p_i} & E \end{array} \quad \boxed{\alpha_{i'} \in \Gamma} \quad (i' \in I')$$

i.e.

$$\boxed{p_i f_{i'} = \text{int}(\alpha_{i'}) f_E p'_{i'}}$$

<sup>15</sup>décrit le foncteur  $f_U$

<sup>16</sup>décrit le foncteur  $f_{D^*}$

<sup>17</sup> $\alpha$  décrit  $\alpha_{U,e}$

<sup>18</sup> $\alpha_{i'}$  décrit  $\alpha_{D^*,U}$

## A. GROTHENDIECK

Notons que c), d) ensemble définissent une donnée de commutation

$$\begin{array}{ccc} E'_{i'} & \xrightarrow{p'_{i'}} & \Gamma \\ f_{i'} \downarrow & \searrow \beta_{i'} & \downarrow \sim \\ E_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \end{array} \quad \text{avec } \beta_{i'} = p(\alpha_{i'})\alpha$$

i.e.

$$p_i f_{i'} = \text{int}(\beta_{i'}) p'_{i'}$$

i.e. on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} E'_{i'} & \xrightarrow{p'_{i'}} & \Gamma \\ f_{i'} \downarrow & \searrow \sim \text{int}(\beta_{i'}) & \downarrow \\ E_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \end{array}$$

donc  $f_{i'}$  induit un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{x'_{i'}} & E'_{i'} & \xrightarrow{p'_{i'}} & \Gamma \\ & & \downarrow f_{i'}^\circ & & \downarrow f_{i'} & & \downarrow \text{int}(\beta_{i'}) \\ 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{x_i} & E_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \end{array}$$

et il faut exprimer la fonctorialité de  $f_{i'}^\circ$ , avec l'indice de ramification  $d_{i'} \in N$ , on trouve

$$\boxed{f_{i'}^\circ = d_{i'} \chi(\beta_{i'}) \text{id}_{T(\overline{K})}}$$

où

$$\chi : \Gamma \longrightarrow \widehat{Z}^*$$

est le caractère canonique.

Ceci posé, déterminons, pour un 1-morphisme  $f = (f_E, \tau, (f_{i'}), \alpha, (\alpha_i))$  et un autre  $f' = (f'_E, \tau', (f'_{i'}), \alpha', (\alpha'_i))$ , les 0-morphismes de l'un dans l'autre correspondants à de systèmes d'isomorphismes  $\mu_{D^*} : f_{D^*} \longrightarrow f'_{D^*}$ ,  $\mu_U : f_U \longrightarrow g_U$ . Cela correspond [à la] condition

$$\tau' = \tau, \quad \underbrace{d'_{i'} = d_i}_{\text{ceci résulte des autres conditions}} \quad \forall i' \in I'$$

et à la donnée de

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

a)  $\boxed{\mu \in E}$ <sup>19</sup> définissant un isomorphisme entre  $f_E : E' \longrightarrow E$  et  $f'_E : E' \longrightarrow E$  i.e. tel que

$$\boxed{f'_E = \text{int}(\mu)f_E}$$

b)  $\boxed{\mu_{i'} \in E_i}$ <sup>20</sup> ( $i' \in I', i = \tau(i')$ ) satisfaisant

$$\boxed{f'_{i'} = \text{int}(\mu_{i'})f_{i'}}$$

[ceci implique déjà  $d_{i'} = d'_{i'}$ ] les  $\mu \in E$ ,  $\mu_{i'} \in E_i$  étant liés aux  $\alpha, \alpha' (\in E)$ , aux  $\alpha_{i'}, \alpha'_{i'} (\in \Gamma)$  de la façon suivante

$$\boxed{\alpha' = p(\mu)\alpha}$$

$\forall i' \in I'$

$$\boxed{\alpha'_{i'} = \rho_i(\mu_{i'})\alpha'}$$

ou encore

$$\boxed{p(\mu) = \alpha'\alpha^{-1}, \rho_i(\mu_{i'}) = \alpha'_{i'}\alpha_{i'}^{-1}}$$

Notons que, comme  $\rho_i$  est injectif, les deuxièmes relations, donnant les  $\rho_i(\mu_{i'})$ , déterminent les  $\mu_{i'}$  de façon unique, l'existence de ces  $\mu_{i'}$  équivaux aux relations

$$\boxed{\alpha_{i'}\alpha_{i'}^{-1} \in \rho_i(E_i)} \quad i' \in I'$$

Quant à la relation  $p(\mu) = \alpha'\alpha^{-1}$ , elle détermine  $\mu$  modulo multiplication (à droite disons) par un  $\mu_0 \in \text{Ker } p = \pi$ , mais qui doit être tel que l'on ait encore

$$f'_E = \text{int}(\mu\mu_0)f_E$$

(en plus de  $f'_E = \text{int}(\mu)f_E$ ) ce qui signifie que

$$\text{int}(\mu_0)f_E = f_E$$

i.e.

$$\boxed{\mu_0 \in \text{Centr}_{\pi} f_E(E')}$$

C'est donc cela l'indétermination exacte dans le choix d'un 0-morphisme [?] 1-morphismes  $f$  et  $f'$  de  $D'$  dans  $D$ .

---

<sup>19</sup>décrit  $\mu_U$

<sup>20</sup>décrit  $\mu_{D^*}$

## A. GROTHENDIECK

Si par exemple on est dans les conditions où  $\pi \longrightarrow \pi$  induit par  $f_E : E' \longrightarrow E$  a une image d'indice fini (image ouverte) - cas d'un "morphisme non constant" ! - alors  $\mu_0$  doit centraliser un sous-groupe ouvert de  $\pi$  - sauf erreur cela aussi implique  $\mu_0 = 1$ , donc il semble bien que (dans les cas correspondants à des homomorphismes dominants de courbes algébriques) un 0-morphisme d'un  $f$  dans un  $f'$  (s'il existe) est unique, i.e.  $\underline{\text{Hom}}(D', D)$  est une catégorie *discrète*.

On peut interpréter  $D$  comme  $E$  muni de *sous-groupes*  $E_i \subset E$ , et de  $p : E \longrightarrow \Gamma$ , (noyau  $\pi$ ) enfin d'isomorphismes

$$\chi_i : T(\overline{K}) \simeq E_i \cap \pi = L_i$$

(commutant à l'action de  $E_i$ ).

Si on a une autre système  $(E', (E'_{i'})_{i' \in I'}, p' : E' \longrightarrow \Gamma, (\chi'_{i'})_{i' \in I'})$ , un morphisme du premier dans le second est *défini* par un

$$f : E' \longrightarrow E$$

satisfaisant les conditions suivantes

- a)  $\forall i' \in I', \exists i \in I$  tel que  $f(E'_{i'})$  soit contenu dans un conjugué de  $E_i$  [ soit  $\alpha_{i'} \in E$  tel que  $f(E'_{i'}) \subset \text{int}(\alpha_{i'}^{-1}(E_i))$  ]
- b)  $p_f$  est conjugué de  $f'$  [ soit  $\alpha \in \Gamma$  tel que  $p_f = \text{int}(\alpha)p'$  ]

N. B. Le  $i \in I$  correspondant à  $i' \in I'$  est unique, d'où  $\tau : I' \longrightarrow I$ . Si les  $\alpha_{i'}$  sont choisis, on déduit  $\forall i'$  homomorphisme induit  $f_{i'} : E'_{i'} \longrightarrow E_i$ ,  $f_{i'} = (\text{int}(\alpha_{i'}) \circ f) /_{E'_{i'}}$ , qui induit dès lors, via les  $\chi'_{i'}$ ,  $\chi_i$ , un endomorphisme  $f_{i'}^\circ : T(\overline{K}) \longrightarrow T(\overline{K})^{21}$ . On exige que  $\alpha \in \Gamma$  (qui conjugue  $f_E$  en  $f'_E$ , et est probablement uniquement déterminé par cette condition) et  $\alpha_{i'}$  (qui est sans doute déterminé modulo composition à gauche avec élément du normalisateur de  $E_i$  (du moins des transporteurs des  $E_i$  d'un sous-groupe ouvert de  $E_i$  - c'est itou si  $f$  est iso) puissent être choisis de telle façon que, posant  $\beta_{i'} = p(\alpha_{i'})\alpha$ , on ait

$$f_{i'}^\circ = (d_{i'}\chi(\beta_{i'}))\text{id}_{T(\overline{K})} \quad \text{i.e.} \quad \chi_{i'} = d_{i'}\chi(\beta_{i'})$$

où  $d_{i'} \in N^*$  est un entier naturel (évidemment uniquement déterminé quand  $\alpha$  et  $\alpha_{i'}$  sont choisis)<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup>N. B. A priori  $f_{i'}^\circ$  est la multiplication par un  $\chi_{i'} \in \widehat{Z}^*$  ; le centralisateur dans  $\Gamma$  d'un sous-groupe ouvert est réduit à l'unité.

<sup>22</sup>Cette condition sur les systèmes des  $\alpha_{i'}$  ne change pas ( $\alpha$  restant fixé) si on change  $\alpha_{i'}$  en  $\mu_{i'}\alpha_{i'} \in E_i$ .

## § 8. — RÉFLEXIONS TAXONOMIQUES

---

Le cas  $\dim X = 0$  se traduit sur le paradigme du système  $T(\bar{K}) \xrightarrow{\varkappa_i} E_i \xhookrightarrow{\rho_i} E \xrightarrow{p} \Gamma$  par la condition  $p$  injectif et donc  $I = \emptyset$  - donc ce cas décrit simplement par la donnée d'un sous-groupe ouvert de  $E \hookrightarrow \Gamma$ , i.e. une sous-extension finie  $L$  de  $\bar{K}/K$  (N.B. on aura bien sûr  $X' = \text{Spec } L$ , et le choix faits sur  $X$  - i.e. sur  $\Pi_{D^*}(=\emptyset) \longrightarrow \Pi_U \longrightarrow \Pi_e$  - aboutissant à cette description, reviennent ici au choix d'une telle  $K$ -immersion de  $L = H^0(X, O_X)$  dans  $\bar{K}/K$ ).

Le cas  $\dim X = 1$  se traduit par le fait que  $E \longrightarrow \Gamma$  n'est pas injectif - quand à  $I$ , il peut être vide ou non dans ce cas. S'il est vide, la description se fait donc simplement en termes d'un homomorphisme de groupes profinis  $E \xrightarrow{p} \Gamma$  (ou  $\Gamma$  donnée d'avance =  $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ ) =  $\text{Aut}_{\Pi_e}(\Omega)$ ).

Supposons données maintenant à la fois  $D = (E, p, I, (\rho_i : E_i \hookrightarrow E), (\varkappa_i : T(\bar{K}) \longrightarrow E_i))$  et  $D' = (E', p', I', (\rho'_i), (\varkappa'_i))$ , et revenons à la question de la description des morphismes de  $D'$  dans  $D$ . On va distinguer quatre cas suivant les deux valeurs possibles 0, 1 de  $n = \dim D$  et  $n' = \dim D'$  respectivement.

- I)  $n = 0, n' = 1, I = I' = \emptyset$  et les données se réduisent à des sous-groupes ouverts  $E \xhookrightarrow{p} \Gamma, E' \xhookrightarrow{p'} \Gamma$ . Dans la pesante description plus haut, les considérations relatives à  $I, I'$  tombent et un morphisme  $D' \longrightarrow D$  revient à une classe de couples  $(f, \alpha)$ , où

## A. GROTHENDIECK

$f : E' \longrightarrow E$  et  $\alpha \in \Gamma$ , tels que l'on ait  $pf = \text{int}(\alpha)f$

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{f} & E \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ \Gamma & \xrightarrow[\text{int}(\alpha)]{\sim} & \Gamma \end{array}$$

- ce qui implique que  $f$  est déjà déterminé par  $\alpha$ , étant induit par  $\text{int}(\alpha)$  [ $\alpha$  assujetti à  $\alpha \in_{\Gamma} (E', E) =_{\Gamma} (L, L')$ ] [qui induit bien un homomorphisme de  $L \subset \overline{K}$  dans  $L' \subset \overline{K}$ , donc un homomorphisme  $\text{Spec}(L') \longrightarrow (L)$  en sens inverse].

La condition que  $\alpha, \alpha' \in \Gamma$  définissent le même morphisme  $D' \longrightarrow D$  (ou encore  $\text{Spec } L' \longrightarrow \text{Spec } L$ ) se décrit par l'existence d'un  $\mu \in E$  tel que  $\alpha' = \mu\alpha$ . Le fait qu'on trouve une correspondance 1-1 entre  $\text{Hom}_K(X', X) \simeq \text{Hom}_K(L, L')$  avec  $\text{Hom}(D', D)$  explicité aussi, est clair.

II)  $n' = 1, n = 0$ . Ici  $n = 0$  implique déjà  $I = \emptyset$ . Pour que  $\text{Hom}(X', X) \neq \emptyset$ , il faut que l'on ait  $I' = \emptyset$  (par la condition  $F^{-1}(S) (= f^{-1}(\emptyset) = \emptyset) = S'$  qui implique  $S' = \emptyset$ , si  $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$ ) - dans la description des morphismes  $D' \longrightarrow D$ , cela correspond au fait qu'on ne peut avoir d'application  $\tau : I' \longrightarrow I (= \emptyset)$  que si  $I' = \emptyset$ . Se bornant donc au cas  $I' = \emptyset$  (sinon  $\text{Hom}(X', X) = \text{Hom}(D', D) = \emptyset$  et on est heureux), on trouve donc que  $D$  revient à la donnée de  $E \xhookrightarrow{p} \Gamma$  sous-groupe ouvert, et  $D'$  à la donnée d'un homomorphisme de groupes profinis  $p' : E' \longrightarrow \Gamma$ , dont l'image sera un sous-groupe ouvert de  $\Gamma$ , soit  $\Gamma'_0 \subset \Gamma$ , correspondant à une sous-extension finie  $L'$  de  $\overline{K}/K$ . Les choix faits relatifs à  $X'$  implique qu'on a un isomorphisme fixé  $L' \simeq H^0(X', \underline{O}_{X'})$ . Ceci dit, un  $K$ -morphisme de  $(X', \emptyset)$  dans  $(X, \emptyset)$  i.e. de  $X' \longrightarrow X$  revient (comme  $X$  affine) à la donnée d'un  $K$ -morphisme  $\text{Spec } L' \longrightarrow X (\simeq \text{Spec } L)$  de l'enveloppe affine, i.e. d'un  $K$ -homomorphisme  $L \longrightarrow L'$  (ce qui ne dépend que de  $L, L'$  ou encore que des sous-groupes  $E \hookrightarrow \Gamma$  et  $\Gamma'_0 \hookrightarrow \Gamma$  de  $\Gamma$ ).

D'autre part la description en termes des diagrammes  $D, D'$  revient à dire qu'un morphisme est déterminé par un couple  $(f, \alpha)$ ,  $f : E' \longrightarrow E$  et  $\alpha \in \Gamma$ , tels que l'on ait

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

encore commutativité

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{f} & E \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ \Gamma & \xrightarrow{\text{int}(\alpha)} & \Gamma \end{array} \quad pf = \text{int}(\alpha)p'$$

ce qui implique encore que  $f$  est déterminé par  $\alpha$  (savoir, induit par  $\text{int}(\alpha)$ ), et  $\alpha$  étant sujet à la seule condition

$$\alpha \in \text{Transp}_\Gamma(\Gamma'_0, E)$$

- et  $\alpha, \alpha'$  décrivant le même homomorphisme si et seulement si  $\exists \mu \in E$  tel que

$$\alpha' = \mu\alpha$$

donc on a encore

$$\begin{aligned} \text{Hom}(D', D) &\simeq_E \text{Transp}_\Gamma(\Gamma'_0, \Gamma) \\ &\simeq \text{Transp}_\Gamma(L, L') / \text{Fix}_\Gamma(L) \\ &\simeq \text{Hom}_{K-\text{ext}}(L, L') \end{aligned}$$

donc on trouve encore dans ce cas le pleine fidélité.

En fait, on aurait pu traiter ensemble les deux cas ( $n' = 0, n' = 1$ ) où  $n = 0$ , et la description de  $\text{Hom}(X, X')$  en termes de  $D, D'$  est valable d'ailleurs, sans faire des hypothèses draconiennes (projective, lisse, dimension  $\leq 1$ , anabélienne) sur  $X'$ .

En effet, comme  $X$  est fini étale sur  $K$ , son image inverse  $X_{X'} = X' \times_K X$  sur  $X'$  est fini étale sur  $X'$ , et

$$\text{Hom}_K(X, X') \simeq \text{Sections}(X_{X'}/X')$$

peut se décrire en termes de la catégorie  $\widehat{\Pi_1(X')} (= \Pi_U)$  des systèmes locaux finis sur  $X'$  i.e. des systèmes locaux finis sur  $\Pi_U$ . Suivant cette description, on aboutit à la description commune donnée dans I, II, sans aucune hypothèse autre sur  $X$  que la 0-connexité (pour pouvoir décrire  $\Pi_U = \Pi_{X'}$  sur  $\Pi_e$  en termes d'un homomorphisme de groupe  $p' : E' \longrightarrow \Gamma \dots$ )

Quand on se donne  $(X', S')$ , avec  $S'$  pas nécessairement vide,  $X'$  0-connexe (et  $X'$  lisse de dimension 1 aux points de  $S'$  (il suffirait même que  $S'$  ne disconnecte pas localement pas localement (ét)  $X'$ , donc  $X' \setminus S'$  0-connexe...), alors la donnée  $\Pi_1(X' \setminus S') \longrightarrow$

## A. GROTHENDIECK

$\Pi_1(e_K)$  es décrite encore par  $E' \xrightarrow{p'} \Gamma$  (indépendamment de la considération des  $E_i$  etc) et par suite  $\text{Hom}_K(X' \setminus S', X)$  est décrit comme on vient de dire. Mais on a (avec les hypothèses de normalité sur  $X'$  aux points de  $S'$ )  $\text{Hom}_K(X' \setminus S', X) = \text{Hom}_K(X', X)$ . Ceci encourage à modifier la définition des morphismes  $(X', S') \longrightarrow (X, S)$  donnée au début, via  $f : X' \longrightarrow X$  avec  $f^{-1}(S)_{\text{red}} = S'$ , en exigeant ceci non pour  $f$ , mais seulement pour la restriction de  $f$  à la réunion des composantes irréductibles de  $X'$  qui son envoyées dans des composantes irréductibles de  $X$  non discrète i.e. non réduites à un point. Dans la description correspondante  $D', D$ , on spécifiait que l'on n'exige la donnée d'une application  $I' \longrightarrow I$  (et des données correspondantes  $f_{i'}, \alpha_{i'}$ ) *que* si  $n \neq 0$  i.e.  $p_{si} : E \longrightarrow \Gamma$  pas injectif - dans le cas contraire (impliquant  $I = \emptyset$ ) si par hasard  $I' \neq \emptyset$ , on laisse tomber la connaissance des  $I'$  et des éléments de structure correspondants.

III)  $n' = 0, n = 1$ . Ici on a donc  $I' = \emptyset, p' : E' \hookrightarrow \Gamma$  i.e.  $D'$  se réduit à la donnée d'un sous-groupe ouvert  $E \hookrightarrow \Gamma$  de  $\Gamma$ .

[...]  $(X', S' = \emptyset)$  et  $(X, S)$ , la condition  $f^{-1}(S)_{\text{red}} = S' = \emptyset$  sur le  $K$ -morphisme  $f : X' \longrightarrow X$  implique que  $f$  se factorise par  $X' = \text{Spec}(L') \longrightarrow X \setminus S$ , sans préjudice si  $S = \emptyset$  ou non, i.e. si  $I = \emptyset$  ou non. Donc il s'agit de décrire  $\text{Hom}_{K\text{-sch}}(X', S \setminus S)$ , en termes de  $\Pi_1(X') \longrightarrow \Pi_e = \Pi_1(e_K)$  et de  $\Pi_1(X \setminus S)(= \Pi_U) \longrightarrow \Pi_e$ . Ici les éventuelles donnés supplémentaires relatives à  $I$  ne servent pas explicitement à la description, en termes de diagrammes de groupoïdes.

Sauf erreur, une réduction facile (descente galoisienne) nous ramène au cas où  $X' = \text{Spec} K$  i.e.  $E' \hookrightarrow \Gamma$ . La description des homomorphismes  $D' \longrightarrow D$  est alors encore en terme des couples  $(f, \alpha)$ , où  $f : \Gamma \longrightarrow E$  et où  $\alpha \in \Gamma$  avec les sempiternelles conditions  $pf = \text{int}(\alpha)p'$ , qui devient (comme  $p' = \text{id}$ )

$$pf = \text{int}(\alpha)$$

Ici bien sûr  $\alpha$  ne décrit plus  $f$  (mais l'inverse est vraie, ici la connaissance de  $f$  de  $pf \in \text{Aut}(\Gamma)$  implique celle de  $\alpha$ , i.e.  $\text{Centr}(\Gamma) = \{1\} \dots$ ). Les couples  $(f, \alpha)$  et  $(f', \alpha')$  définissent le même morphisme de diagramme, si et seulement si  $\exists \mu \in E$  tel que  $f' = \text{int}(\mu) \circ f, \alpha' = p(\mu)\alpha$ . Comme (si  $\exists(f, \alpha)$ )  $p$  surjectif, on veut que, quitte à choisir  $\mu$  au-dessus de  $\alpha^{-1}$ , et de remplacer  $(f, \alpha)$  par  $(f', \alpha') = (\text{int}(\mu)f, p(\mu)\alpha)$ , on peut toujours décrire un morphisme  $D' \longrightarrow D$  par  $(f, \alpha)$  avec  $\alpha = 1$  donc par une *section*  $f$



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

de l'homomorphisme  $E \longrightarrow \Gamma$ , et deux sections  $f, f'$  (correspondant à  $(f, 1), (f', 1)$ ) définissent le même homomorphisme de  $D'$  dans  $D$ , si et seulement si  $\exists \mu \in E$  tel que  $p(\mu) = 1$ , i.e.  $\mu \in \pi = \text{Ker}(p)$ , et tel que  $f' = \text{int}(\mu) \circ f$ .

Ainsi, les morphismes de  $D'$  (correspondant à  $X' = \text{Spec} K$ ) dans  $D$  correspondent exactement aux classes de scindages de  $E \xrightarrow{p} \Gamma$ , modulo automorphismes intérieures par des  $\mu \in K = \text{Ker } p$ . La “conjecture bordelique” dans le cas III équivaut donc à ceci:

$$\Gamma((X, S)/K) \longrightarrow \text{Classes de } \pi\text{-conjugaison de sections de } E \longrightarrow \Gamma$$

$$\text{i.e de sections de } \Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(e_K)$$

est bijective (si  $(X, S)$  est un couple permis “anabélien”)<sup>23</sup>.

Je sais en tout cas que cette application est *injective* - ceci vaut chaque fois qu'on a un schéma  $U$  sur  $K$  (ici  $X \setminus S$ ) qui se plonge dans un groupe algébrique  $G$  extension d'une variété abélienne par un tore, et résulte alors du théorème de Mordell-Weil “absolu” :  $G(K)$  est un  $\mathbb{Z}$ -module de type fini. En fait, il suffit de connaître la classe de splittage de l'extension  $E^\natural$  de  $\Gamma$  par  $\pi_{ab} = \pi / [\pi, \pi] \simeq H_1(U)$ , correspondant à un point de  $U$  rationnel sur  $K$  pour connaître ce point. Donc le résultat de fidélité est obtenu, avec des hypothèses moins draconiennes sur  $X$  que l'hypothèse anabélienne (avec les notations du lemme 5.2, cela signifie que  $g = 0 \Rightarrow n \geq 2$  i.e. qu'il n'y a pas de composante irréductible de  $U_{\bar{K}}$  qui soit isomorphe à  $\mathbb{P}_{\bar{K}}^1$  ou  $\mathbb{E}_{\bar{K}}^1 \dots$ ).

N.B. Ceci suggère une approche de la conjecture de Mordell, via une meilleure connaissance des extensions de  $\Gamma$  par  $\pi$  : le fait qu'il n'a ait (pour  $\geq 2$ ) qu'un nombre fini de classes de  $\pi$ -conjugaison de scindages d'une telle extension...

Itou pour une approche du théorème de Fermat, via une bonne connaissance d'une extension de  $\Gamma$  par  $\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}) \dots$

IV)  $n = 1, n' = 1$  i.e.  $X, X'$  de dimension 1.

a) Si  $I = I' = \emptyset$ , je n'ai rien à ajouter à la description des morphismes  $f : X \longrightarrow X'$  en termes de morphismes de diagrammes de groupoïdes. Ici la condition

---

<sup>23</sup>Faux tel que, cf. n°9 ci-dessus - il faut des conditions supplémentaires sur les  $f \dots$  Peut-être si  $I = \emptyset$ .

## A. GROTHENDIECK

$f^{-1}(S)_{\text{réd}} = S'$  n'est pas une restriction sur  $f$  - on n'exclut donc pas des applications constantes. Celles-ci (grâce à l'étude du cas II) sont d'ailleurs décrites de façon "pleinement fidèle" pas des homomorphismes de diagrammes - ils correspondent aux cas  $f : E' \longrightarrow E$  qui sont nuls sur  $\pi'$ .

- b) Le cas  $I' = \emptyset, I \neq \emptyset$  (i.e.  $S' = \emptyset, S \neq \emptyset$ ) signifie, avec la condition  $f^{-1}(S)_{\text{réd}} = S'$  i.e.  $f^{-1}(S) = \emptyset$ , que  $f$  doit appliquer  $X'$  dans  $X \setminus S$ , donc que tout  $f$  correspond à un morphisme de  $(X', \emptyset)$  dans  $(X, S)$  soit constant. La conjecture bordélique dans ce cas exprime donc essentiellement qu'au niveau des homomorphismes  $E' \xrightarrow{p'} \Gamma$  et  $E \xrightarrow{p} \Gamma$ , tout homomorphisme des groupes  $E' \xrightarrow{p} E$  tel que  $pf = \text{int}(\alpha)p'$  pour  $\alpha \in \Gamma$  [on est ramené au cas où  $\alpha = 1$ ,  $p, p'$  surjectifs, i.e. aux homomorphismes d'extensions de  $\Gamma$  par des groupes  $\pi = \pi_1(\overline{X \setminus X})$  et  $\pi' = \pi_1(\overline{X'})$ ] est trivial sur  $\pi'$  [i.e. "est" une section]. Il faudrait essayer de vérifier ce point directement, qui (modulo le cas III) établirait la "conjecture bordélique" dans ce cas-là.
- c) Le cas  $I' \neq \emptyset, I = \emptyset$  implique que  $\text{Hom}((X, S), (X', S')) = \emptyset$  (cas  $f^{-1}(S) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \neq S'$  !), ce qui correspond bien à  $\text{Hom}(D', D) = \emptyset$  puisque  $\nexists \tau : I' \longrightarrow I$ .
- d) Dans le cas  $I' \neq \emptyset, I \neq \emptyset$ , la condition  $f^{-1}(S)_{\text{réd}} = S'$  implique que  $f$  n'est pas constante (sinon on aurait  $f^{-1}(S)_{\text{réd}} = \emptyset$  ou  $X'$ ), donc  $f$  est dominant et fini, génériquement étale. [Donc, de tels  $f$  ne peuvent intervenir que si  $I$  et  $I'$  sont : tous deux  $\emptyset$  (cas a)], soit tous deux  $\neq \emptyset$  (cas actuel d)). Le fait que dans ces cas-là, la description diagrammatique galoisienne soit *fidèle* (peut-être pas pleinement) résulte aisément du résultat analogue dans le cas III. La pleine fidélité par contre est chose mystérieuse, même si le résultat correspondant dans le cas III était acquis (et encore semble loin, même si  $K$  fini sur  $Q \dots$ ).

**Réductions élémentaires.** Pour prouver la "conjecture bordélique", on est ramené (par des extensions finies du corps  $K$ ) au cas où  $E \longrightarrow \Gamma$  (et, si on y tient, aussi  $E' \longrightarrow \Gamma$ ) est épimorphique. Sauf erreur, la connaissance du cas III pour des extensions de type fini de  $K$ , implique le cas général pour  $K$  (avec suffisamment de sueurs techniques...).

Revenant cependant au cas général quand  $E \longrightarrow \Gamma$  est surjectif, dans toute classe d'équivalence de systèmes  $(f : E' \longrightarrow E, \alpha \in \Gamma, \tau : I' \longrightarrow I, (\alpha_i \in E_{\tau(i')=i})_{i' \in I'})$ , on peut

trouver un système avec  $\alpha = 1$ , de sorte que  $f : E' \longrightarrow E$  soit compatible avec les homomorphismes dans  $\Gamma$  (i.e. les structures d'extension). Quand on se borne à de tels systèmes, l'équivalence par conjugaison se fait par un système  $(\mu, (\mu_{i'})_{i' \in I'})$  avec  $\mu \in \pi (= \text{Ker } p)$ , et les  $\mu_{i'} \in E_{i=\tau(i')}$  comme avant. Ainsi,  $f : E' \longrightarrow E$  est un homomorphisme d'extensions, défini modulo automorphisme intérieur par un élément de  $\pi = \text{Ker}(E \longrightarrow \Gamma)$ , et satisfaisant à des conditions explicitées par ailleurs. Il se pourrait (comme on a déjà remarqué) que la connaissance de la classe de  $\pi$ -conjugaison de  $f$  suffise à déterminer le "morphisme bordélique" dans lequel  $f$  s'insère (si  $I, I' \neq \emptyset$ ). [C'est lié à la question de savoir si  $\forall d \in N^*, {}_E(L_i^d, L_i)$  est réduit à  $E_i$  (où  $L_i = \text{Ker}(p_i : E_i \longrightarrow \Gamma) = \text{Im}(\chi_i : T(\bar{K}) \longrightarrow E_i)$ ). Dans ce cas,  $E_i$  serait connu en termes de  $L_i \subset \pi$ , et même en termes du noyau de sous-groupes qu'il définit dans  $\pi$ , et a fortiori en termes des noyaux d'homomorphismes définis par  $\chi_i : T(\bar{K}) \longrightarrow \pi$ ...

**Cas où  $E_i \longrightarrow \Gamma$  sont surjectifs** (i.e. les  $k(s_i) = K$  i.e.  $s_i$  rationnel sur  $K$ ).

Alors si  $(f, \tau, (\alpha_{i'}))$  est un homomorphisme de  $D'$  dans  $D$ , quitte à corriger par des  $\mu_i \in E_i$  ayant même image que les  $\alpha_{i'}$  dans  $\Gamma$ , on peut supposer  $\alpha_{i'} \in \pi$ , en plus de  $\alpha = 1$  (obtenu en corrigeant par  $\mu$  convenable). Donc on décrit l'homomorphisme par  $(f, 1, \tau, (\alpha_{i'}))$ , les  $\alpha_{i'}$  appartenant à  $\pi$ . La condition ici est que  $f : E' \longrightarrow E$  soit un homomorphisme de groupes sur  $\Gamma$ , que  $f(E'_{i'}) \subset \text{int}(\alpha_{i'}^{-1} E_{\tau(i')=i})$ , et que l'homomorphisme induit  $E'_i \longrightarrow E_{i'}$  par  $\text{int}(\alpha_{i'})f$  induit sur  $T(\bar{K})$  (via  $\chi_{i'}, \chi_i$ ) l'homomorphisme de multiplication par  $d_i$  sans plus - que c'est beau !

Deux systèmes  $(f, \tau, (\alpha_{i'}))$  et  $(f', \tau', (\alpha'_{i'}))$  définissent le même morphisme, si et seulement si  $\tau = \tau'$  et s'il existe  $\mu \in \pi, \mu_{i'} \in L_{i=\tau(i')} = \chi_i(T(\bar{K}))$  tels que

$$f' = \text{int}(\mu)f \quad \alpha'_{i'} = \mu_{i'}\alpha_{i'}$$

Notons qu'à priori, pour  $(f, \tau)$  fixé, les  $\alpha_{i'}$  sont déterminés modulo multiplication à droite par des éléments de  $\text{Transp}_\pi((L_i^{d_{i'}}, L_i)$ , qui est sans doute  $= L_i = \text{Ker}(\chi_i : E_i \longrightarrow \Gamma) = 1 = \text{Im}(\pi_i : T(\pi) \longrightarrow E_i \pi)$ . Donc on trouve que la classe de  $\pi$ -conjugaison de groupes sur  $\Gamma$  de  $f : E' \longrightarrow E$  suffit à déterminer l'homomorphisme  $D' \longrightarrow D$  dans la catégorie bordélique. Je présume qu'un peu de sueur permettrait de prouver que cela marche encore dans le cas général (sans supposer les  $\Gamma_i = \text{Im}(E_i \longrightarrow \Gamma)$  égaux à  $\Gamma$ ).

Cela signifie (dans le cas actuel) que la structure essentielle qui décrit  $(X, S)$  est celle d'extension extérieure de  $\Gamma$  par un groupe  $\pi$  [homomorphisme extérieur surjectif d'un groupe, de  $[?]$  du  $R$ ], avec  $\pi$  muni d'une structure à lacets i.e. extérieurs  $\chi_i : T(= T(\bar{K}) \simeq \hat{Z}) \longrightarrow \pi$

## A. GROTHENDIECK

(satisfaisant certaines conditions), les homomorphismes de  $E' \longrightarrow \Gamma$  (noyau  $\pi'$ ) dans  $E \longrightarrow \Gamma$  (noyau  $\pi$ ) étant les classes de  $\pi$ -conjugaisons d'homomorphismes  $E' \longrightarrow E$  de groupes sur  $\Gamma$ , induisant des homomorphismes  $\pi' \longrightarrow \pi$  compatibles avec la structure à lacets.

## § 9. — STRUCTURE TANGENTIELLE EN LES $s \in S$ Les sections d'extensions “de deuxième type”

Revenant à la description des  $(X, S)$  par  $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \longrightarrow \Pi_e$ , un  $s_i \in S$  correspond donc à une composante connexe de  $\Pi_{D_i^*}$  dans  $\Pi_{D^*}$ , ou un  $\Pi_{D_i}$  de son quotient  $\Pi_D$ .

Considérons  $\Pi_{D_i^*} \xrightarrow{\sigma_i = \sigma_{D_i^* D_i}} \pi_{D_i}$ . On va décrire certaines sections (à isomorphisme près) de ce morphisme de groupoïdes, i.e. des couples  $(\gamma, \lambda)$  où  $\gamma$  est un foncteur  $\Pi_{D_i} \xrightarrow{\gamma} \Pi_{D_i^*}$  et  $\lambda$  un isomorphisme  $\sigma_i \circ \gamma \simeq \text{id}$ .

Si on choisit un  $\widetilde{D}_i^* \in \text{Ob } \Pi_{D_i^*}$  (revêtement universel de  $D_i^*$ ) d'où [un] homomorphisme surjectif  $E_i = \text{Aut}(\widetilde{D}_i^*) \longrightarrow \Gamma_i = \text{Aut}(\sigma_i(\widetilde{D}_i^*) = \widetilde{D}_i)$ , la donnée de  $(\gamma, \lambda)$ , et d'un isomorphisme  $\gamma(\widetilde{D}_i) \simeq \widetilde{D}_i^*$  donnant l'isomorphisme identique par application des  $\sigma_i$ , revient à celle d'un homomorphisme  $\Gamma_i \longrightarrow E_i$  - et les classes d'isomorphismes des couples  $(\gamma, \lambda)$  correspondent aux classes de  $L_i$ -conjugaison ( $L_i = \text{Ker}(E_i \longrightarrow \Gamma_i)$ ) de sections de l'extension  $E_i$  de  $\Gamma_i$  par  $L_i$ .

Ceci posé, on a

$$\Gamma_i = \text{Gal}(\overline{K}_i / K_i)$$

où  $K_i = K(s_i)$ ,  $\overline{K}_i$  est la clôture algébrique de  $K_i$  définie par  $\widetilde{D}_i$  (à priori, elle n'est pas canoniquement isomorphe à  $\overline{K}$  sur  $K \dots$ ), et les classes de scindages d'extensions forment un *torseur*  $\Sigma_i$  (s'il y en a, et on sait qu'il y en a...) sous  $H^1(\Gamma_i, L_i)$ , ou encore, comme  $\varkappa_i : L_i \xleftarrow{\sim} T(\overline{K}_i)$ , sous  $H^1(\text{Gal}(\overline{K}_i / K_i), T(\overline{K}_i)) \simeq H^1(K_i, T_l(\mathbb{G}_m)) \simeq \varprojlim_n (K_i, \mu_n)$ .

Or la suite exacte de Kummer donne

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(K_i, \mathbb{G}_m)_n & \longrightarrow & H^1(K_i, \mu_n) & \longrightarrow & {}_n H^1(K_i, \mathbb{G}_m) \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & & & \parallel \\ & & (K_i^*)_n & & & & 0 \end{array}$$

i.e.  $H^1(K_i, \mu_n) \simeq (K_i^*)_n$ , donc  $H^1(K_i, T(\mathbb{G}_m)) \simeq \varprojlim_n (K_i^*)_n$

Notons qu'on a un homomorphisme kummérien

$$K_i^* \longrightarrow \underbrace{H^1(K_i, T(\mathbb{G}_m))}_{H_i} \simeq \varprojlim_n (K_i^*)_n$$

dont le noyau est formé des  $x \in K_i^*$  tel que pour tout  $n \in N$ , on ait  $x \in K_i^{*n}$ . Comme  $K_i$  est de type fini sur  $Q$ , cet homomorphisme est injectif, i.e.  $K_i^*$  s'identifie à un sous-groupe de  $H_i$ .

Ceci posé, on va définir, dans le tore  $\Sigma_i$  sous  $H_i$  des scindages de  $D_i^*$  sur  $D_i$ , un sous- $K_i^*$ -torseur (i.e. un élément de  $\Sigma_i/K_i^*$ ).

Pour ceci, considérons plus généralement le cas d'un corps  $k$  ( $= K_i$ ) de caractéristique 0, et d'une  $k$ -algèbre  $O$  qui est une jauge hensélienne de corps résiduel  $k$ . Soit  $L$  le corps des fractions de  $O$ . On va, pour tout uniformisante  $t$  de  $O$ , définir une section  $(\gamma, \lambda)$  du groupoïde des clôtures algébriques de  $L$ , vers celui des revêtements universels de  $\text{Spec } O$  ou, ce qui revient au même, des clôtures algébriques de  $k$ . Pour ceci, soit  $O(n, t) = O[T_n]/(T_n^n - t)$ , et  $O(\infty, t) = \varinjlim_n O(n, t)$ , par  $T_n \mapsto T_{mn}^m$ .

Soit  $L(n, t) = O(n, t) \otimes_O K =$  corps de fractions de  $O(n, t)$ ,  $L(\infty, t) = \varinjlim_n L(n, t)$  le corps des fractions de  $O(\infty, t)$ . C'est une extension algébrique de  $L$  et pour toute extension finie ou ind-finie  $k'$  de  $k$ , posant  $O' = O \otimes_k k'$  (qui est aussi une jauge hensélienne sur  $k'$  de corps résiduel  $k'$ , de corps des fractions  $L' \simeq L \otimes_k k'$ ), on a des isomorphismes canoniques

$$O(n, t) \otimes_O O' \simeq O'(n, t)$$

$$O(\infty, t) \otimes_O O' \simeq O'(\infty, t)$$

d'où

$$L(n, t) \otimes_k k' \simeq L'(n, t)$$

$$L(\infty, t) \otimes_k k' \simeq L'(\infty, t)$$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Or si  $k'$  est algébriquement clos  $O'$  strictement hensélien, on sait que  $L'(\infty, t)$  est alors algébriquement clos. D'ailleurs comme  $K' \subset O'(\infty, t) \subset L'(\infty, t)$  dans ce cas  $k$  [?] s'identifie à la clôture algébrique  $\bar{k}$  de  $k$  dans  $L'(\infty, t) = \bar{L}$ . Donc on a bien trouvé une section de  $\Pi_{D^*}$  sur  $\Pi_D$ .

Mais si on remplace  $s$  par  $s' = su^n$ , avec  $u \in O^*$ , on trouve des isomorphismes

$$\lambda(n, u) : O(n, s) (= O[T_n]/(T_n^n - s)) \longrightarrow O(n, s') (= O[T_n]/(T_n^n - s'))$$

$$\text{par } T_n \mapsto u T_n$$

d'où par passage à la limite

$$\lambda(\infty, n) : O(\infty, s) \longrightarrow O(\infty, s')$$

induisant

$$L(\infty, s) \xrightarrow{\sim} L(\infty, s')$$

isomorphisme d'extension de  $L$ , d'où un isomorphisme entre les sections correspondantes des  $\Pi_L$  sur  $\Pi_k$ . Ceci implique que si  $s, s'$  diffèrent par un  $v \in O^*$  tel que son image dans  $k$  soit 1 (i.e.  $v \in 1 + m$  [qui est un sous-groupe divisible de  $O^*$ ] alors  $s, s'$  définissent des sections isomorphes).

On trouve une application canonique

$$(m/m^2)^* [ ]$$

On constate aussitôt que cette application est compatible avec l'homomorphisme

$$\theta : k^* \longrightarrow H^1(k, T(\mathbb{G}_m))$$

sur les groupes d'opérateurs de ces toiseurs.

Dans le cas où cet homomorphisme est injectif (par exemple  $k$  de type fini sur  $Q$ ) on trouve donc un plongement de  $m/m^2$  comme un sous  $\theta(k^*)$ -torseur du  $H^1(k, T(\mathbb{G}_m))$ -torseur des scindages de  $\Pi_{D^*}$  ( $\simeq$  groupoïde des clôtures algébriques de  $L$ ) sur  $\Pi_D$  ( $\simeq$  groupoïde des clôtures algébriques de  $k$ ).

Revenant au cas des  $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \longrightarrow \Pi_e, K \dots$  et des  $D : T(\bar{K}^*) \xrightarrow{x_i} E_i \hookrightarrow E \xrightarrow{p} \Gamma$  qui les explicitent, on trouve donc une structure supplémentaire sur ce  $D$  via les extensions  $E_i$  de  $\Gamma_i \subset \Gamma$  par  $T(\bar{K}^*)$ , savoir  $\forall i \in I$ , un sous- $K_i^*$ -torseur dans le toiseur sous

## A. GROTHENDIECK

$H^1(K_i, T(\mathbb{G}_m)) \simeq \varprojlim (K_i^*)_n$  des classes de scindages de  $E_i$ . Il faudrait expliciter le comportement de cette structure supplémentaire relativement à des morphismes (provenant de situations géométriques) et la relation avec la norme des 1-formes différentielles - j'ai la flemme de l'expliciter en long en en large !

La chose nouvelle que je retiens surtout, c'est que pour  $I \neq \emptyset$  et les  $E_i \longrightarrow \Gamma$  surjectifs (pour simplifier), on trouve  $\forall i$  une "famille transcendante" de scindages de  $E \longrightarrow \Gamma$  (via les scindages de  $E_i$  sur  $\Gamma$ ) - essentiellement [?] par  $H^1(K, T(\mathbb{G}_m)) \simeq \varprojlim (K^*)_n$  (plus précisément, par un tore sous le dit) - dans cette famille, une sous-famille de scindages qu'on peut qualifier de "géométriques", indexée par  $K^*$  (plus précisément, un sous-torseur...). On vérifie que les classes de  $\pi$ -scindages obtenus par des indices  $i, i'$  distincts sont distinctes, même en se ramenant aux scindages correspondants de l'extension de  $\Gamma$  par  $\pi_{ab}$  déduite de l'extension  $E$  de  $\Gamma$  par  $\pi$  (je ne fais pas le détail des vérifications, via Mordell-weil...) et distincts des scindages associées aux points rationnels sur  $K$  de  $X \setminus S$ .

Il faudrait corriger la conjecture bordélique dans le cas III, en énonçant (sous toutes réserves, encore !) qu'il n'y a (peut-être) pas d'autres scindages de l'extension  $E$  par  $\pi$  que ceux-là...



## § 10. — AJUSTEMENT DES HYPOTHÈSES (REMORDS)

---

Je me rends compte que dans la définition des morphismes  $(X', S') \xrightarrow{f} (X, S)$ , l'hypothèse  $f^{-1}(S)_{\text{red}} = S'$  est étriquée - il faut prendre des morphismes *quelconques*  $X' \setminus S' \xrightarrow{f} X \setminus S$  (se prolongeant bien sûr en  $\hat{f} : X' \rightarrow X$ ). On aura donc  $S' \supset \hat{f}^{-1}(S)_{\text{red}}$ , mais  $S'$  peut être strictement plus grand que  $\hat{f}^{-1}(S)_{\text{red}}$ .

Il faut ajuster en conséquence la description de la “catégorie bordélique” - les objets restent les diagrammes de groupoïdes  $D : \Pi_{D^*} \rightarrow \Pi_U \rightarrow \Pi_e$  (plus donnée de Kummer), mais un morphisme d'un  $D'$  dans un  $D$  ne définit plus nécessairement un  $\Pi'_{D^*} \rightarrow \Pi_{D^*}$  (en plus de  $\Pi'_U \rightarrow \Pi_U$ ) il faut se donner une partie  $I'_f$  de  $I' = \pi_0(\Pi'_{D^*})$  et se donner seulement  $\Pi'_{D^*, I'_f} \xrightarrow{f_{D^*}} \Pi_{D^*}$  (avec donnée de commutation  $\alpha_{D^*, U}$  relative au carré avec  $f_U$ ). Bien sûr, dans la description en termes de  $E', E$  etc, on exige que pour  $i' \in I' \setminus I'_f$ ,  $f_E : E' \rightarrow E$  est trivial sur  $E'_{i'} \subset E'$  - et  $\tau$  est défini comme  $I'_{f'} \rightarrow I$ ; les données relatives aux  $i' \in I'_{f'}$  ( $f_{i'} : E_{i'} \rightarrow E_{i=\tau(i')}$ , les  $\alpha_{i'} \in E$ ) sont pareilles que dans le cas envisagé précédemment.

N.B. Cela signifie en fait qu'on commence à “boucher les trous” (de  $X'$ ) correspondants aux  $i' \in I' \setminus I'_{f'}$ , en remplaçant  $E'$  par le groupe quotient de  $E'$  par le sous-groupe invariant engendré par les  $L_{i'} = \chi_{i'}(T(\overline{K}))(i' \in I' \setminus I'_{f'})$ , et les  $E_{i'}(i' \in I'_{f'})$  par leurs images dans le dit groupe quotient, et en oubliant  $I' \setminus I'_{f'}$  i.e. remplaçant  $I'$  par  $I'_{f'}$ .

[Pour bien faire, il faudrait exprimer ces opérations aussi au niveau des diagrammes de groupoïdes  $\Pi'_{D^*} \rightarrow \Pi'_U \rightarrow \Pi_e \dots$ ].

Cela signifie donc qu'en fait, on s'est ramené à la situation envisagée au début, où  $S' = \hat{f}^{-1}(S)_{\text{red}}$ . Donc finalement la différence des deux points de vue n'est pas énorme, et celui

## A. GROTHENDIECK

adopté au début a l'avantage de la simplicité plus grande (tout est relatif !)

## § 11. — CONDITIONS SUR LES SYSTÈMES DE GROUPOÏDES OBTENUS À PARTIR DE SITUATIONS GÉOMÉTRIQUES

---

On en a déjà cité au passage, par exemple que les groupes noyaux de  $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_e$  sont abéliens (avec l'isomorphisme de Kummer  $\varkappa$ ) et que les images sont des sous-groupes ouverts, et de même pour l'image des  $\pi_1$  dans le cadre de l'interprétation en termes de

$$T(\overline{K}) \xrightarrow{\varkappa_i} E_i \xrightarrow{\rho_i} E \xrightarrow{p} \Gamma$$

(cas de la “dim 1” - on n'exclut pas le cas  $I = \emptyset$  le cas “dim 0” étant trivial...)

- a) L'image  $\Sigma$  de  $p$  est ouverte, plus précisément il existe un sous-groupe ouvert  $\Gamma' \subset \Gamma$  au dessus duquel  $E$  ait une section [et même une “section admissible” en un sens qui sera défini par la suite - de sorte à exclure les sections “triviales” provenant des  $E_i$ ...].
- b) L'image  $\Sigma_i$  de  $E_i$  dans  $\Gamma$  est ouverte, et l'extension  $E_i$  de  $\Sigma_i$  par  $L_i(\simeq (\overline{K}))$  est triviale. [En fait, on a une classe privilégiée de scindages, dits “algébriques”, formant un torseur sous  $K_i^* \hookrightarrow \varprojlim (K_i^*)_n$ , cf n° 9 – mais on ne va pas considérer pour l'instant cet élément de structure supplémentaire...]

Le reste des conditions concerne essentiellement la structure des groupes

$$\pi = \text{Ker}(p : E \longrightarrow \Gamma)$$

avec ses classes de conjugaison de sous-groupes (ou plutôt les homomorphismes extérieures  $\varkappa_i : T(= T(\overline{K}^*)) \longrightarrow \pi$ ), et la façon dont  $\Sigma$  opère extérieurement sur  $\pi$ . Ces conditions

## A. GROTHENDIECK

s'expriment de façon particulièrement simple lorsque les  $\Sigma_i \subset \Gamma$  sont égaux à  $\Gamma$  ("les points de  $S$  sont rationnels sur  $K$ ") i.e.  $E_i \longrightarrow \Gamma$  surjectif, a fortiori  $\Sigma = \Gamma$  i.e.  $E \longrightarrow \Gamma$  surjectif. On va se borner à ce cas. Le cas général s'en déduit par extension finie du corps de base [chaque point de  $S$  non rationnel sur  $K$  i.e. chaque  $\Sigma_i \neq \Gamma$  donne naissance à  $n_i$  points,  $n_i = [\Gamma : \Sigma_i]$  - et  $X_{K'}$  se scinde en  $n = (\Gamma : \Sigma)$  composantes connexes qui sont géométriquement connexes] - mais j'ai la flemme d'explicitier comme il faudrait, dans le contexte des groupoïdes ou des homomorphismes de groupes profinis, l'opération d'extension du corps de base...

Il est entendu que les conditions que je vais décrire seront invariantes par extension du corps de base.

c)  $\forall i$ , l'homomorphisme extérieur

$$\chi_i : T \longrightarrow \pi$$

est compatible avec l'action extérieure de  $\Gamma$  (opérant sur  $T$  par le caractère cyclotomique  $\chi$ , et sur  $\pi$  grâce à l'extension  $E$  de  $\Gamma$  par  $\pi$ ). En d'autres termes, pour tout  $g \in E$ , existe un  $\alpha \in \pi$  (N.B. pas seulement  $\alpha \in E$  !) tel que l'on ait :

$$\text{int}(g)\chi_i(\xi) = \text{int}(\alpha)\chi_i(\chi(p(g))\xi) \quad \text{i.e.} \quad \text{int}(\alpha^{-1}g)\chi_i(\xi) = \chi_i(\chi(p(g))\xi)$$

Ceci signifie que 1°)  $\alpha^{-1}g$  normalise  $L_i = \chi_i(T)$  [et ceci signifie même, probablement, que  $\alpha^{-1}g \in E_i$  - et qu'on puisse trouver un tel  $\alpha \in \pi$  (tel que  $\alpha^{-1}g \in E_i$ ) provient de l'hypothèse  $E_i \longrightarrow \Gamma$  surjectif - on prend un  $\beta (= \alpha^{-1}g) \in E_i$  ayant même image que  $g$  dans  $\Gamma$  et on prend  $\alpha = g\beta^{-1}$ ] et que 2°) l'action intérieure de  $\beta = \alpha^{-1}$  sur  $T$  n'est autre que par multiplication par  $\chi(g) = \chi(\beta)$  - ce qui (pour  $\beta \in E_i$ ) n'est autre que la condition déjà explicitée que l'homomorphisme de groupes  $\chi_i : T \longrightarrow E_i$  est compatible avec l'action de  $E_i$ , opérant sur  $T$  via  $\chi \circ p|_{E_i}$ , et sur lui même par automorphismes intérieures.

Donc la condition c) n'est pas vraiment nouvelle - je la réexplicité en termes un peu différents, à cause de son importance. Elle implique que l'opération de  $\Gamma$  sur  $\pi$  est *très* non triviale (puisque  $\chi : \Gamma \longrightarrow \hat{Z}^*$  a une image ouverte !) - il n'était pas même évident, a priori (sans raisons arithmétiques profondes !) - compte tenu de la structure de  $\pi$  qu'on va donner - qu'il existe de telles opérations de  $\Gamma$  sur  $\pi$  !

Cette condition sera complétée par une condition de non trivialité à la Weil.

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

d)  $\exists \eta \in T^*$  (une base de  $T$ ), et des  $\alpha_i \in \pi$  (afin de conjuguer  $x_i$  en  $x'_i = \text{int}(\alpha_i) \circ x_i$ ), enfin un entier  $g \geq 0$  et des éléments  $x_j, y_j \in \pi$  ( $1 \leq j \leq g$ ), tels que l'on ait

1°) Les  $x'_i(\eta)$ , et les  $x_j, y_j$  engendrent le groupe profini  $\pi$ .

2°) Ils satisfont la relation

$$[x_1, y_1] \cdot [x_2, y_2] \cdots [x_g, y_g] x'_1(\eta) x'_2(\eta) \cdots x'_v(\eta) = 1$$

3°) Cette relation, avec les générateurs envisagés, décrit  $\pi$  (en tant que groupe profini) par générateurs et relations...

N.B. On sait que par ces conditions,  $g$  est uniquement déterminé, par exemple par le fait que  $\pi_{ab}/\Sigma x_i(T)$  est un  $\hat{Z}$ -module libre de rang  $2g - \pi_{ab}$  étant libre de rang  $2g + v - 1$  où  $v = \text{card}(I)$ .

Pour le choix de  $\eta$ , on voit que si  $\eta$  convient, alors tout  $\chi(\alpha)\eta$  aussi (où  $\alpha \in \Gamma$ ) - quitte à prendre des conjugués. Donc les  $\eta$  qui conviennent contiennent un sous-torseur de  $T^*$  sous le sous-groupe ouvert  $\chi(\Gamma)$  de  $\hat{Z}^*$ .

En fait, comme la structure du groupe  $\pi$  est indépendante de  $K$ , prenant  $K = Q$  (et en admettant qu'il existe une courbe lisse projective (géométriquement connexe de genre  $g$  sur  $Q$ , ayant  $v$  points rationnels sur  $Q$  !), on trouve que si les  $l_i$  ( $1 \leq i \leq v$ ) s'insèrent dans un système de générateurs privilégiés (avec des  $x_j, y_j$ ) alors pour tout  $\rho \in \hat{Z}^*$ , on peut trouver des conjugués  $l'_i$  des  $l_i^\rho$  qui s'insèrent de même. Même pour  $\rho = -1$  ce n'est pas entièrement trivial...

Enfin, on va énoncer une condition draconienne de non trivialité de l'opération de  $\Gamma$  sur  $\pi$ . Soient  $E'$  un sous-groupe ouvert (donc d'indice fini) de  $E$ ,  $\pi' = \pi \cap E' = \text{Ker}(E' \rightarrow \Gamma)$ ,  $\Gamma'$  l'image de  $E'$  dans  $\Gamma$ . On trouve donc une extension de  $\Gamma' (= \text{Gal}(\bar{K}'/K'))$  sur  $\pi'$ , donc aussi par  $(\pi'_{ab})(\ell)$  ( $\ell$  étant un nombre fourni), qui est (on le sait par  $d$ ) un  $Z_\ell$ -module libre de type fini, sur lequel  $\Gamma'$  opère.

[Avec un peu de travail<sup>24</sup>, on doit pouvoir mettre sur  $E' \rightarrow \Gamma$  une "structure à lacets" i.e. des  $E'_i$  comme pour  $E$ , et décrire dans  $(\pi'_{ab}(l))$  la somme des images des  $L'_i$ , sur lesquels  $\Gamma'$  opère donc via le caractère  $\chi$ . On s'intéresse au quotient de  $(\pi'_{ab})(l)$  par ce sous-module relativement trivial (la partie "VA" du module  $\ell$ -adique envisagé). Ceci posé, on exige que la

<sup>24</sup>CCa se fait très élégamment dans le contexte  $\Pi_{D^*} \rightarrow \Pi_U \rightarrow \Pi_e$ .

## A. GROTHENDIECK

représentation de  $\Gamma'$  là dessus soit “pure de poids 1” - et que les polynômes caractéristiques des frobenius (qui sont à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ , pas seulement dans  $\mathbb{Z}_\ell$ ) soient *indépendants* de  $\ell$ .

## § 12. — L'ANALOGIE TOPOLOGIQUE

---

Soit  $X$  une surface (topologique) compacte orientable,  $S$  une partie finie de  $X$ . Si  $X$  est connexe, on considère l'ensemble  $\Omega$  de ces deux orientations, on l'utilise pour tordre le groupe  $Z$ , d'où un groupe

$$T = Z \wedge_{\pm 1} \Omega$$

isomorphe (non canoniquement) à  $Z$ . Plus généralement, supposons donné un tel groupe  $T$ , i.e. un  $\omega \in \text{Ob Ens}_2$ , une  $T$ -orientation de  $X$  sera par définition un élément de l'ensemble  $(X) \wedge_{pm1} \omega$  [dans le cas précédent,  $X$  sera donc canoniquement  $T$ -orienté...]

Considérons le groupoïde fondamental de  $X \setminus S = U$  soit  $\Pi_U$ , et le groupoïde fondamental  $\Pi_{D^*}$  des germes d'espaces de  $X$  autour de  $S$ , *privé* de  $S$  (groupoïde des germes de revêtements universels de  $X \setminus S$  au voisinage de  $S$ ). On a donc un foncteur canonique

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U$$

et d'autre part, si  $X$  est  $T$ -orienté, on a une structure supplémentaire intéressante sur le groupoïde  $\Pi_{D^*}$  : le système local de ses  $\pi_1$  est canoniquement isomorphe à  $T$ .

Associant à tout  $X$   $T$ -orienté le système

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_X, \quad \kappa : T_{(\Pi_{D^*})} \simeq \pi_1(\Pi_{D^*}/e),$$

on trouve une 2-équivalence entre la 2-catégorie isotopique des couples  $(X, S)$  d'une variété compacte  $T$ -orientée (pour les homéomorphismes à isotopie près...), et de la 2-catégorie des systèmes précédents (pour les équivalences) qui satisfont les conditions

## A. GROTHENDIECK

a)  $\pi_0(\Pi_{D^*}), \pi_0(\Pi_X)$  finis

b) Pour toute composante connexe de  $\Pi_U$ , soit  $\Pi_{U_0}$ , et la partie  $\Pi_{D_0^*}$  au-dessus, explicitant la situation groupoïde par un groupe  $\pi$ , et une famille d'homomorphisme  $T \xrightarrow{x_i} \pi$  (N.B. le tout dépendant de choix, mais  $\pi$  étant intrinsèque comme groupe extérieur, et les  $x_i$  comme homomorphismes extérieurs - définissant une “ $T$ -structure à lacets sur  $S$ ” -) on a ce qui suit :

il existe générateur  $t \in T$  (i.e.  $t \in T^*$ ) et un ordre  $i_1, \dots, i_\nu$  sur l'ensemble  $I$ , des conjugués  $l_i$  des  $x_i(g)$ , et  $g \in N$  et des  $x_\alpha, y_\alpha \in \pi(1 \geq \alpha \geq g)$  tels que l'on ait

$$\left(\prod_{\alpha=1}^g [x_\alpha, y_\alpha]\right) \prod_{i=1}^\nu l_i = 1$$

et que ceci soit une relation de définition de  $\pi$ .

Il y a cependant un grain de sel pour  $I = \emptyset$  (auquel cas  $T$  ne sert à rien apparemment dans la description groupoïde de  $(X, S) = (X, \emptyset) = X$ ) il faut alors, au lieu des données “kummériennes”  $\kappa$ , se donner un isomorphisme<sup>25</sup>

$$H^2(\pi, Z) \simeq T$$

Enfin, il faut (même avec ce grain de sel) exclure le cas  $X = \mathbb{S}^2, S = \emptyset$  (en tant que composante connexe) - i.e. du côté groupes, le cas d'une composante connexe de  $\Pi_U$  avec  $\pi = (1)$  et  $I = \emptyset$ . Si je me rappelle bien, il n'y a pas lieu d'exclure  $(\mathbb{S}^2, pt.)$  (i.e.  $X \setminus S = U \simeq \mathbb{R}^2 \simeq E_C^1$  où pourtant on a  $\pi = 0$ ). Mais sauf dans ces deux cas (correspondant au cas  $g = 0, \nu = 1$ ) l'homomorphisme  $x_i : T \longrightarrow \pi$  est injectif. Si  $T = Z$ , la donnée des  $x_i$  équivaut à celle d'éléments  $l_i \in \pi$ , et on retrouve la définition usuelle des structures à lacets.

Ceci est explicité dans la thèse de Yves Ladegaillerie - ce qui y manque, est (entre autre) la considération de flèches entre  $(X, S)$  autres que des homéomorphismes (modulo isotopies) ; par exemple des applications  $X' \xrightarrow{f} X$  telles que  $S' = f^{-1}(S)$  [et que  $X'$  soit étale sur  $X \setminus S$ , si on y tient], ce qui se ramène au cas précédent - le cas plus général où on suppose seulement que  $X'$  est un revêtement ramifié de  $X$  (pouvant être ramifié aussi en dehors de  $S'$ )

---

<sup>25</sup>Il faut introduire ceci comme donnée supplémentaire dans la définition des groupes à lacets. L'exclusion des cas  $X_0 \simeq \mathbb{S}^2$  (dans le cas  $S = \emptyset$ ) est alors particulièrement convaincante.



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

et  $S' \supset f^{-1}(S)$  (mais  $S'$  pouvant être plus grand) demanderait une étude soignée, avec une notion ad-hoc de l'isotopie...

Une autre direction importante (notamment pour l'étude du cas non orienté, non orientable) est l'introduction de groupes finis d'homéomorphismes, ne respectant pas nécessairement l'orientation. Pour traiter le cas du changement d'orientation, notons que dans la description groupoïdale  $(\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U, \kappa)$  d'une  $(X, S)$   $T$ -orientée, le passage à l'orientation opposée s'exprime en gardant tel que  $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U$ , et en remplaçant  $\kappa$  par  $\bar{\kappa} = \kappa^{-1}$

$$\bar{\kappa}(\xi) = \kappa(-\xi) = \kappa(\xi)^{-1}$$

(si  $T = \mathbb{Z}$ , sur le système  $(\pi, (l_i))$ , cela revient à remplacer les  $l_i$  par les  $l_i^{-1} \dots$ ), et itou (si  $I = \emptyset$ ) pour  $\kappa : T \simeq H^2(\pi, \mathbb{Z})$  remplacé par  $-\kappa$ .

Soit donc  $\Gamma$  un groupe (a priori pas nécessairement fini) qui opère sur  $(X, S)$  donc sur  $U = X \setminus S$  et sur  $\Pi_U, \Pi_{D^*}$ . On trouve alors des groupoïdes fondamentaux mixtes par la construction bien connue

$$\Pi_{D^*, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{U, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{e, \Gamma}$$

(où  $\Pi_{e, \Gamma}$  est la catégorie des  $\Gamma$ -torseurs i.e. des objets 1-connexes dans  $\Gamma - \text{Ens}$ ) correspondant aux foncteurs en sens inverse

$$\Gamma - \text{revêtement étale de } D^* \longleftarrow \Gamma - \text{revêtement étale de } U \longleftarrow \Gamma - \text{Ens}.$$

Les composantes connexes de  $\Pi_{D^*, \Gamma}$  correspondent aux *orbites de  $\Gamma$  dans  $S = \pi_0(\Pi_{D^*})$* , et même pour celles de  $\Pi_{U, \Gamma}$ . Le cas  $\Pi_{U, \Gamma}$  connexe i.e. le topos  $\hat{\Pi}_{U, \Gamma}$  connexe est celui où  $\Gamma$  transitif sur  $\pi_0(U) \simeq \pi_0(X)$  - quitte à remplacer  $X$  par une composante connexe  $X_0$ , et  $\Gamma$  par le sous-groupe  $\Sigma \subset \Gamma$  qui le stabilise, on serait ramené (pour l'étude des topos  $\hat{\Pi}_{U, \Gamma}$  et des morphismes de topos

$$\hat{\Pi}_{D^*, \Gamma} \longrightarrow \hat{\Pi}_{U, \Gamma} \longrightarrow (\hat{\Pi}_{e, \Sigma} \longrightarrow) \hat{\Pi}_{e, \Gamma}$$

au cas de  $(X_0, S_0, \Sigma)$ . Mais l'analogie que j'ai en vue le cas "arithmétique" prend cette réduction inopportune dans le cas général (cas dans le cas arithmétique, on ne se borne pas non plus au cas où  $\Sigma = \Gamma$  i.e.  $E \longrightarrow \Gamma$  surjectif, i.e. la composante connexe  $X$  *géométriquement* connexe sur  $K$ ). Notons ici que  $(X, S, \Gamma)$  se récupère à partir des  $(X_0, S_0, \Gamma_0 = \Sigma)$  comme somme amalgamée  $X = X_0 \wedge_{\Sigma} \Gamma \dots$

## A. GROTHENDIECK

Quand on exprime (pour  $\Pi_{U,\Gamma}$  connexe) la situation en termes de théorie de groupes, on trouve donc un groupe fondamental mixte

$$E_{U,\Gamma} = \pi_1(U, \Gamma)$$

et un homomorphisme

$$E_{U,\Gamma} \longrightarrow \Gamma$$

surjectif si et seulement si  $U$  connexe (on a  $\Gamma/\Sigma \simeq \pi_0(U)$ ), enfin un ensemble d'indices  $I$  ( $\simeq S/\Gamma \simeq \pi_0(\Pi_{D^*,\Gamma})$ ) et des groupes fondamentaux mixtes.

$$E_i \simeq \pi_1(D_i^*, \Gamma) \simeq \pi_1(D_{i,0}^*, \Sigma_i)$$

où  $D_{i,0}^*$  est une composante connexe du multidisque troué  $D_i^*$ , (correspondant au choix d'un  $s_{i,0} \in S$ ) et où  $\Sigma_i \subset \Gamma$  est son stabilisateur (i.e. le stabilisateur de  $s_{i,0}$  dans  $\Gamma$ , qui est (si  $\Gamma_i$  est fini et opère fidèlement au voisinages de  $s_i$ ) un groupe cyclique ou diédral... On trouve donc, si  $X$  est  $T$ -orientée, une extension de  $\Gamma_{i,0}$  par  $T$ , l'homomorphisme  $E_i \longrightarrow \Sigma_i \hookrightarrow \Gamma_i$  étant induit bien sûr via  $E_{U,\Gamma} \longrightarrow \Gamma$  et  $E_i \longrightarrow E_{U,\Gamma}$ .

Il faut encore lier l'action de  $\Gamma$  sur  $X$  à l'orientation de  $X$  - pour ceci on suppose donné un caractère

$$\chi : \Gamma \longrightarrow Z^* = \{\pm 1\}$$

et on exige que pour  $g \in \Gamma$ ,  $g_X$  conserve l'orientation si  $\chi(g) = 1$ , la renverse si  $\chi(g) = -1$ . Ceci implique que l'on a un isomorphisme

$$\underbrace{\pi_1(\Pi_{D^*,\Gamma}/\Pi_{e,\Gamma})}_{\text{système local des noyaux des } \pi_1(\xi) \longrightarrow \pi_1(\varphi\rho(\xi)) \text{ pour } \xi \in \text{Ob } \Pi_{D^*,\Gamma}} \xleftarrow{\sim} T$$

$T$  étant considéré comme système local sur  $\Pi_{\Gamma,e}$  i.e. comme  $\Gamma$ -groupe, grâce à l'action de  $\Gamma$  via le caractère  $\chi$ . Il revient au même de dire que  $\forall i \in I$ , l'application

$$\chi_i : T \xrightarrow{\sim} L_i = \text{Ker}(E_i \longrightarrow \Gamma)$$

en tant que homomorphisme de  $T$  dans  $E_i$ , est compatible avec l'action de  $E_i$  (opérant sur  $T$  via  $\chi p_i$  ( $p_i : E_i \longrightarrow \Gamma$ )), et sur lui même par automorphisme intérieure...

Si on exclut le cas où  $(X_0, S_0)$  est isomorphe à  $(\mathbb{S}^2, \emptyset)$  ou  $(\mathbb{S}^2, 1pt.)$  (i.e. le cas  $\pi = 0$ ), les  $\chi_i : T \longrightarrow \pi$  sont injectifs, donc aussi les  $E_i \longrightarrow E_{U,\Gamma}$ , donc les  $E_i$  peuvent être considérés comme des *sous-groupes* de  $E_{U,\Gamma}$ .

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Ici il serait particulièrement contre-indiqué (même si on suppose  $\Sigma = \Gamma$  i.e.  $X = X_0$  i.e.  $X$  connexe) de supposer que les  $\Gamma_i$  sont égaux à  $\Gamma$  i.e. que les  $s \in S$  sont fixés par  $\Gamma$  !

Comme le centre de  $\pi$  est réduit à 1 (si on excepte le cas  $(X_0, S_0) \simeq (\mathbb{S}^2, \text{deux points})$  i.e.  $U_0 \simeq C^*$  - cas de la couronne -), la donnée d'une extension de  $\Sigma (\subset \Gamma)$  par  $\pi$  revient (à isomorphisme unique près) à la donnée d'un homomorphisme

$$\Sigma \longrightarrow \text{Autext}(\pi)$$

$E$  se reconstitue comme image inverse de l'extension

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \text{Aut}(\pi) \longrightarrow \text{Autext}(\pi) \longrightarrow 1.$$

Mais ici les automorphismes extérieurs relatifs aux  $\alpha \in \Sigma$  respectent la structure à lacets de  $\pi$ , modulo le signe  $\chi(\alpha)$  - i.e. pour  $g \in E$ , et  $s \in S \exists \alpha \in p_i$  et  $s' \in S$  ( $s'$  unique !) tels que

$$\text{int}(\alpha^{-1}g)\chi_s(\xi) = \text{int}(\alpha)\chi_{s'}(\chi(p(g))\xi)$$

$\forall \xi \in \Gamma$ , i.e.

$$\text{int}(\alpha^{-1}g)\chi_s(\xi) = \chi_i(\chi(p(g))\xi)$$

Ainsi, l'opération de  $\Sigma$  sur  $S_0$  (donc de  $\Gamma$  sur  $S = S_0 \wedge_{\Sigma} \Gamma$ ) est connue, par l'opération extérieure de  $\Sigma \subset \Gamma$  sur  $\pi$  muni de sa structure à "T-lacets" (i.e. les homomorphismes extérieurs  $\chi_s : T \longrightarrow \pi$ ) - donc aussi  $I = S_0/\Sigma \simeq S/\Gamma$ . Peut-on reconstituer  $E_i$  ( $i \in I$ ) à partir de la structure d'extension ? On voit, en vertu des choix faits, que si  $i \in I$  (donc  $i$  une orbite de  $\Sigma$  dans  $S_0$ )  $\exists s \in i$  tel que  $(\text{Ker } E_i \longrightarrow \Gamma)$  ne soit autre que  $L_s = \chi_s(T)$ , et on a donc  $E_i \subset \text{Norm}_E(L_s)$ , mais on a

$$\text{Norm}_E(L_s) \cap \pi = \text{Norm}_{\pi}(L_s) = L_s = E_i \cap \pi,$$

et d'autre part l'image de  $\text{Norm}_E(L_s)$  dans  $\Sigma \subset \Gamma$  est inclus dans  $\Sigma_s = \text{stabilisateurs de } s \text{ dans } \Sigma = \text{Image de } E_i \text{ dans } \Sigma$ , donc en résumé

$$E_i = \text{Norm}_E(L_s)$$

Inversement, la donnée de  $E \longrightarrow \Gamma$  et des  $E_i, \chi_i : T \longrightarrow E_i$  redonne la structure à lacets de  $\pi$ , en prenant les  $\chi_i$  et tous les conjugués extérieurs distincts par les  $\alpha \in \Sigma$  (modifiés par  $\chi(\alpha) \dots$ ).

Donc la donnée de la situation  $E \xleftarrow{p} \Gamma, E_i \hookrightarrow E$  (famille de sous-groupes, chacun défini modulo conjugaison dans  $E$ ) équivaut à la donnée de

## A. GROTHENDIECK

a)  $\pi = \text{Ker } p$ , avec sa structure à  $T$ -lacets (ensemble fini d'homomorphismes extérieurs de  $T$  dans  $\pi$ )

b) Un sous-groupe  $\Sigma \subset \Gamma$ , et un homomorphisme

$\Sigma \longrightarrow \text{Teichmüller étendu de } \pi$  (automorphismes extérieurs de  $\pi$ , respectant la structure à lacets mo

compatible avec le caractère  $\chi|_{\Sigma}$  et le caractère “signe” sur Teichmüller étendu. En fait,  $(X, S, \Gamma)$  où  $(U, \Gamma)$  ne définit  $\pi$  que comme groupe extérieur à  $T$ -lacets, sur lequel  $\Gamma$  opère de façon compatible avec  $\chi$ .

En résumé, on a un foncteur canonique

Catégorie isotopique<sup>26</sup> des  $(X, S, \Gamma)$ ,  $X$  surface compacte  $T$ -orientée,  $S$  partie discrète,  $\Gamma$  opérant par  $\chi$ -aut

↓

Catégorie<sup>27</sup> des groupes extérieures à

Je présume que la démonstration du fait que ce foncteur soit pleinement fidèle ne fasse pas de difficultés essentielles<sup>28</sup>, en utilisant ce qui est connu pour  $\Gamma = 1$ . Mais le fait que, pour  $\Gamma$  groupe fini donné, il soit essentiellement surjectif est un problème ouvert sur lequel les gens sèchent. Bien sûr on peut supposer  $\Sigma = \Gamma$ , et  $\Gamma \subset \text{Teichmüller étendu}$  et la question est si tout sous-groupe fini de Teichmüller étendu se réalise comme groupe opérant sur  $(X_0, S_0)$ , de façon essentiellement unique. Plus précisément, si  $A = \text{groupe des homéomorphismes (ou difféomorphismes, si } X_0 \text{ est différentiable) de } X_0, A^\circ \text{ sa composante connexe [neutre]}$  (N.B.  $A^\circ$  est contractile dans le cas anabélien) donc  $A/A^\circ = T_{g,\nu}$  (groupe de Teichmüller pour genre  $g$  et  $\nu$  trous), la question revient à ceci si pour tout homomorphisme d'un groupe fini  $\Sigma$  dans  $T_{g,\nu}$ , (on peut supposer  $\Sigma \subset T_{g,\nu}$ ), celui-ci se relève en un homomorphisme dans  $A$ , et si deux tels relèvements sont conjugués par un  $a \in A^\circ$  (isotopie au sens strict de deux relèvements...).

Ayant aboutit à une réinterprétation tellement simple de la 1-catégorie (“1-isotopique”) déduite de la 2-catégorie des systèmes

$$(\Pi_{D^*, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{U, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{e, \Gamma}, \mathcal{K})$$

---

<sup>28</sup>Ca vaudrait drôlement le coup de le faire très soigneusement...

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

en termes de groupes extérieurs à lacets  $\pi$  [munis d'un ensemble d'homomorphismes extérieurs  $\chi_i : T \longrightarrow \pi$ , et à défaut d'un  $\chi : T \longrightarrow H^2(\pi, Z)$  (pour bien faire, il faudrait écrire  $T^{(\otimes -1)} \simeq H^2(\pi, Z)$ , mais ici on a un isomorphisme canonique  $T^{\otimes -1} \simeq T$  i.e.  $T^{\otimes 2} \simeq Z \dots$ )], la question se pose comment récupérer, (à équivalence définie à isomorphisme unique près) ce diagramme, en termes de  $\chi$  ; tout revient à la description des catégories  $\Pi_{D^*, \Gamma}$  et  $\Pi_{U, \Gamma}$  et des deux foncteurs  $\Pi_{D^*, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{U, \Gamma}$ ,  $\Pi_{U, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{e, \Gamma}$  ; ou ce qui revient au même, des topos (multigaloisiens) et morphismes de topos correspondants.

a) Description de  $\Pi_{U, \Gamma}$  et de  $\Pi_{U, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{e, \Gamma}$ .

Soit plus généralement  $\pi$  un groupe extérieur *dont le centre soit trivial* (ceci correspond à l'hypothèse anabélienne !), montrons comment on lui associe une topos classifiant  $B_\pi$ , qui (comme catégorie de faisceaux) sera  $\text{Ens}(\pi)$  de façon “fonctorielle” (pour les isomorphismes). Tout revient à voir comment, à une *classe de conjugaison d'isomorphismes*

$$\pi' \xrightarrow{u} \pi$$

on associe un foncteur “image inverse”  $\text{Ens}(\pi) \longrightarrow \text{Ens}(\pi')$ , défini à isomorphisme unique près. Considérons pour tout  $u$  de la classe  $\theta$ , le foncteur “ $u$ -restriction des opérations”

$$\text{Ens}(\pi) \xrightarrow{u^*} \text{Ens}(\pi')$$

[qui définit donc,  $[?]$  ( $u^{-1}$ ) $^*$ , une équivalence de topos

$$B_{\pi'} \xrightarrow[\approx]{u^\bullet} B_\pi \quad ]$$

On va, entre ces équivalences pour  $u \in \theta$ , définir un système transitif d'isomorphismes (ce qui permet donc de les identifier entre eux !).

Soit  $u, u' \in \theta$ , d'où  $u^*, u'^*$  ; on a par hypothèse un  $g \in \pi$  tel que  $u' = \text{int}(t) \circ u$ , de plus  $g$  est déterminé module un élément de  $\text{Centr}_\pi u(\pi') = \text{Centr}(\pi) = 1$ , donc ici  $g$  est unique. Mais  $g$  peut servir à définir un isomorphisme fonctoriel

$$i_{u', u} : u^* \xrightarrow{\sim} u'^*$$

en prenant, pour  $E \in \text{Ob } \text{Ens}(\pi)$ ,

$$i_{u', u}(E) : u^*(E) \longrightarrow u'^*(E) \quad i_{u', u}(E) = g_E.$$

## A. GROTHENDIECK

N.B. Le raisonnement marche pour toute classe de conjugaison d'homomorphismes de groupes  $\pi' \longrightarrow \pi$  (i.e. tout homomorphisme extérieur) dont le centralisateur dans  $\pi$  est réduit à 1 (ce qui pour un épimorphisme se réduit à l'hypothèse  $\text{Centr}(\pi) = 1$ )<sup>29</sup>.

Si maintenant un groupe  $\Sigma$  opère sur le groupe extérieur  $\pi$ , alors par le résultat précédent on peut dire qu'il opère aussi sur le topos  $B_\pi$ , d'où un topos  $B_{\pi,\Gamma}$ . On peut dire aussi que (comme  $\text{Centr}(\pi) = 1$ ) l'opération de  $\Sigma$  sur  $\pi$  définit une extension  $E$  de  $\Sigma$  par  $\pi$  d'où un topos  $B_{\pi,\Gamma} = B_E$ . On récupère bien sûr aussi  $B_{\pi,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$ . Pour se tranquilliser il faudrait s'assurer que si on a un homomorphisme de groupes extérieurs  $\pi' \xrightarrow{\theta} \pi$  commutant à l'action d'un  $\Sigma$ , avec  $\text{Centr}_\pi(\theta) = (1)$ , alors il existe un  $\theta_\Gamma : B_{\pi,\Gamma} \longrightarrow B_{\pi,\Gamma}$  défini à isomorphisme canonique près.

Or tout  $u \in \theta$  définit un homomorphisme d'extension  $u_\Gamma$  (de  $\Sigma$  par  $\pi'$  resp.  $\pi$ )  $E' \longrightarrow E$  au-dessus de  $u$ , et si on passe de  $u$  à  $u' = \text{int}(g) \circ u$ , on aura  $u'_\Gamma = \text{int}_E(g) \circ u_\Gamma$ , et on termine comme plus haut avec unicité de  $g$  ; c'est maintenant un homomorphisme extérieur *injectif*

$$\Lambda = [\chi] : T \longrightarrow \pi \quad (T \text{ commutatif})$$

( $\Lambda$  comme initiale de "lacets")

L'injectivité dans le cas qui nous intéresse résulte de l'hypothèse anabélienne.

Supposons que (pour  $\chi \in [\chi]$ )

$$\text{Centr}_\pi \chi = \chi(T)$$

(ce qui ne dépend pas de choix de  $\chi$  dans  $[\chi]$ ). Je vais alors définir un groupoïde abélien connexe  $\Pi_\chi$ , et un isomorphisme de son  $\pi_1$  avec  $T$  (d'où un topos, qui joue le rôle de  $\hat{\Pi}_D$ ). Un objet sera un  $\chi \in [\chi]$ . Un homomorphisme de  $\chi$  dans  $\chi'$  sera un élément  $g \in \text{Transp}_\pi(\chi, \chi')$ . La composition des homomorphismes est évidente. On trouve bien un groupoïde connexe, dans lequel

$$\text{Aut}(\chi) = \text{Centr}_\pi(k\chi) = \chi(T) \simeq T. \quad \text{OK.}$$

Bien sûr, on a un homomorphisme

$$\Pi_\Lambda \longrightarrow \text{groupoïde ponctuel}$$

---

<sup>29</sup>Marche pour les groupes à lacets anabéliens, et les homomorphismes de tels dont l'image soit d'indice fini... (car le centralisateur dans un tel groupe  $\pi$  d'un sous-groupe d'indice fini est encore réduit à  $e$ )

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

d'où sur les topos classifiants définis par  $\pi$

$$B_\Lambda \longrightarrow B_\pi$$

Il faut voir le comportement de cette construction par homomorphisme extérieur. Soit donc

$$\theta = f_\pi = [u] : \pi' \longrightarrow \pi$$

un homomorphisme extérieur tel que  $\text{Centr}_\pi(\theta) = 1$ , et  $\Lambda' : T \longrightarrow \pi'$  un homomorphisme extérieur injectif tel que  $\chi' \in \Lambda' \Rightarrow \text{Centr}_{\pi'}(\chi') = \text{Im} \chi'$  et considérons le composé

$$f_\pi \circ \Lambda' : T \longrightarrow \pi$$

soit  $d \in Z$  et considérons

$$\Lambda = f_\pi \circ \Lambda' \circ (d \text{ id}_T)$$

supposons que  $\chi \in \Lambda (\Rightarrow \text{Centr}_\pi(\chi) = \text{Im} \chi)$ .

On va définir un homomorphisme de  $\Pi_{\Lambda'}$  dans  $\Pi_\Lambda$ , d'où un homomorphisme de topos  $B_{\Lambda'} \longrightarrow B_\Lambda$ , et une donnée de commutativité  $\alpha$  du (\*):

$$\begin{array}{ccc} B_{\Lambda'} & \xrightarrow{f_D} & B_\Lambda \\ \downarrow & \nearrow \alpha & \downarrow \\ B_{\pi'} & \xrightarrow{B_{f_\pi}} & B_\pi \end{array}$$

La fonctorialité de cet objet par rapport à  $\chi'$  variable est évidente : on peut dire que  $u \in \theta$  définit un homomorphisme de groupoïdes  $u_\Lambda : \Pi_\Lambda \longrightarrow \Pi_{\Lambda'}$ , et entre ceux-ci il y a un système transitif d'isomorphismes. En fait, pour  $u$  fixé on a un diagramme commutatif d'homomorphismes de groupoïdes

$$\begin{array}{ccc} \Pi_{\Lambda'} & \xrightarrow{u_\Lambda} & \Pi_\Lambda \\ \downarrow & & \downarrow \\ (e, \pi') & \xrightarrow{u} & (e, \pi) \end{array}$$

et entre ces diagrammes il y a un système transitif d'isomorphismes, d'où le diagramme (\*) et la donnée de commutation  $\alpha$ .

## A. GROTHENDIECK

Quant on a une famille  $\Lambda'$  (ou un ensemble) d'homomorphisme extérieurs  $\Lambda'_{i'}$  ( $i' \in I'$ ) :  $T \longrightarrow \pi'$ , et une famille  $\Lambda(\Lambda_i)_{i \in I}$  d'homomorphismes extérieurs  $T \longrightarrow \pi$ , et un  $\tau : I' \longrightarrow I$ , et  $(d_{i'})_{i' \in I'}$  avec  $d_{i'} \in Z$ , tels que (pour  $\theta : \pi' \longrightarrow \pi$  homomorphisme extérieur donné)  $\forall i' \in I'$ , posant  $i = \tau(i')$ , on ait  $\Lambda_i = \Lambda_{i'} \circ \theta \circ (d_i \text{ id})$

[N.B. Si  $I \longrightarrow (T, \pi)$  injectif, ces conditions montrent que  $\tau$  est déterminé par  $\theta$ , et si de plus  $Z$  opère fidèlement sur  $T$ , par exemple si  $T \simeq Z$ , alors  $(d_{i'})$  est également unique...] alors on construit  $\Pi_{D^*, \Lambda'} =$  groupoïde somme des  $\Pi_{\Lambda'_{i'}}$  et de même  $\Pi_{D^*, \Lambda}$ , et on trouve un diagramme essentiellement commutatif de topos

$$\begin{array}{ccc} B_{D^*, \Lambda'} & \longrightarrow & B_{D^*, \Lambda} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\pi'} & \longrightarrow & B_{\pi} \end{array}$$

Supposons maintenant (ouf !) que  $\Sigma$  opère sur [un] groupe extérieur à lacets... Je déclare forfait - il est évident que tout marche bien !



### § 13. — RETOUR AU CAS ARITHMÉTIQUE

---

Retour au cas arithmétique, où on veut décrire en termes “galoisiens” les couples  $(X, S)$  anabéliens connexes sur un corps  $K$  de type fini sur  $Q$ . [N. B. Si on prend un  $K$  de type fini sur  $F_p$ , il faudrait se borner aux groupes fondamentaux “premiers à  $p$ ”, à cela près nos développements pourraient se faire quand même...]

Il est devenu clair qu’en termes d’une clôture algébrique  $\overline{K}$  de  $K$ , d’où un groupe de Galois profini  $\Gamma = \text{Gal}(\overline{K}/K)$ , la description la plus simple est en termes de groupes extérieures à lacets et d’actions extérieures de sous-groupes ouverts  $\Sigma$  de  $\Gamma$  dessus.

De façon précise, on choisit une composante connexe  $\overline{X}_0$  de  $\overline{X}$  (ou ce qui revient au même,  $\overline{U}_0$  de  $\overline{U} = (X \setminus S)_{\overline{K}}$ ), soit  $\Sigma$  son stabilisateur dans  $\Gamma$  (il est remplacé par un conjugué, quand on change  $\overline{U}_0$ ). Alors  $\Sigma$  opère sur le schéma  $\overline{U}_0$ , donc opère extérieurement sur  $\pi_1$  (considéré comme groupe extérieure). Or sur celui-ci il y a une  $T(\overline{K})$ -structure à lacets, avec comme ensemble d’indices  $I = S_0(\overline{K}) \subset S(\overline{K}) \simeq S_0(K) \wedge_{\Sigma} \Gamma$  [vide si et seulement si  $S \neq \emptyset$ ] et l’opération de  $\Sigma$  sur  $\pi$  est compatible avec cette structure à lacet, et le caractère cyclotomique  $\chi : \Gamma \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$  (plutôt,  $\chi|_{\Sigma}$ ). Ainsi l’opération de  $\Sigma$  sur  $\pi$  implique son action sur  $\Sigma$ , d’où  $S(\overline{K}) \simeq S_0(\overline{K}) \wedge_{\Sigma} \Gamma$  en tant que  $\sigma$ -ensemble - on récupère donc le  $K$ -schéma étale  $S$ . Mais mieux, on récupère tout le diagramme

$$\Pi_{\overline{D}_0^*} \longrightarrow [\Pi_{\overline{U}_0} \longrightarrow] \Pi_{\overline{U}} \longrightarrow \Pi_e$$

et l’opération de  $\Sigma$  dessus d’où le diagramme des topos classifiant - où si on préfère, le diagramme

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \longrightarrow \Pi_e$$

## A. GROTHENDIECK

(avec les notations du début de ces notes, qui deviendraient ici

$$\Pi_{D^*, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{U, \Gamma} \longrightarrow \Pi_{e, \Gamma}$$

plus bien sur  $K$  [?].

Les homomorphismes  $(X', S') \xrightarrow{f} (X, S)$  [ $S' \supset f^{-1}(S)$ ,  $f$  dominant] se décrivent simplement (via le choix d'un  $\overline{X}'_0$  au dessus d'un  $\overline{X}_0$  par des homomorphismes extérieures  $\pi(= \pi_1(\overline{X}_0)) \longrightarrow \pi(= \pi_1(\overline{X}'_0))$ , compatibles avec les actions de  $\Sigma$  ( $\subset \Sigma$ ) et de  $\Sigma$ , et avec les structures à lacets anabéliennes (ce qui s'exprime à l'aide d'une application  $\tau : (I' \subset \overline{S}'_0) \longrightarrow I = \overline{S}_0$ <sup>30</sup> compatible avec  $\sigma'$ , et un système d'entiers naturels  $(d_{i'})_{i' \in I'}$ ).

Il faut cependant compléter, pour  $I = \emptyset$ , la définition de la structure à lacets, par la donnée d'un isomorphisme

$$\chi : T^{\otimes -1} \xrightarrow{\sim} H^2(\pi, \hat{Z})$$

[N.B. en caractéristique  $p \geq 0$ , on doit se borner aux composantes  $\ell$ -adiques avec  $\ell \neq p$ ] i.e.

$$\hat{Z} \xrightarrow{\sim} H^2(\pi, T)$$

compatible avec l'action de  $\Sigma$  - et il faut exiger, dans l'interprétation "galoisienne" de  $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$ , quand  $S = S' = \emptyset$  que l'homomorphisme  $\pi \longrightarrow \pi'$  induit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \hat{Z} & \xrightarrow[\sim]{\chi} & H^2(\pi, T) \\ d \downarrow & & \downarrow f^* \\ \hat{Z} & \xrightarrow[\sim]{\chi'} & H^2(\pi', T) \end{array}$$

où  $d \in N$  est le *degré* (défini de façon unique par cette condition, comme l'ordre de  $f^*$ ). Quand  $S = \emptyset$ , mais  $S' \neq \emptyset$ , il devrait y avoir encore une compatibilité pour les données kummériennes (de natures différentes sur  $\pi'$ , où il y a bel et bien "des lacets", et sur  $\pi$ , où elle est purement cohomologique). La question équivaut sans doute à celle de décrire une structure kummérienne "cohomologique" sur le groupe  $\tilde{\pi}'$ , déduit d'un  $\pi'$  à lacets (avec  $I' \neq \emptyset$ ) en divisant par les dits lacets<sup>31</sup>. La question est la même, semble-t-il dans le cadre topologique, ou le cadre arithmétique, il me faudra revenir dessus. Il faudrait que pour tout

---

<sup>30</sup>N.B.  $I' = \overline{S}'_0 \cup f^{-1}(\overline{S}_0)$

<sup>31</sup>Paradigme du passage de  $(X, S)$  à  $X$  : "bouchage de trous"...

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

homomorphisme  $\pi' \longrightarrow \pi$  de groupes à lacets, l'homomorphisme  $\tilde{\pi}' \longrightarrow \tilde{\pi}$  correspondant respecte aussi (pour un degré convenable) la structure à lacets.

Quand on s'intéresse aux systèmes anabéliens  $(\overline{X}, \overline{S})$  définis directement sur  $\overline{K}$ , avec  $\overline{X}$  connexe disons, ceci s'exprime par un groupe extérieur à  $T$ -lacets, muni d'une action (non de  $\Gamma$  mais des) *noyaux* de groupes profinis définis par  $\Gamma$ . Si on considère les “ $\Gamma$ -automorphismes” d'un tel objet (formés d'un  $\gamma \in \Gamma$  et d'un automorphisme extérieur  $f$  de  $\pi$  respectant la structure à lacets,  $f$  et  $\gamma$  étant compatible dans un sens évident...), on trouve un groupe (profini ???) (“discret” ??)  $G$  et un homomorphisme  $G \longrightarrow \Gamma$  (à image un sous-groupe ouvert de  $\Gamma$ , et à noyau  $G_0$  le sou-groupe des automorphismes extérieures à lacets de  $\pi$  qui commutent à l'action extérieure du “noyau” (lequel  $G_0$  est conjecturellement par la “conjecture bordélique”, isomorphe au groupe fini  $\text{Aut}_{\overline{K}}(\overline{K}, \overline{S} \dots)$ ). En termes de cette suite exacte

$$1 \longrightarrow G_0 \longrightarrow G \longrightarrow \Gamma$$

la “restriction de  $(\overline{X}, \overline{S})$  au corps  $K$ ” s'exprime donc (on l'espère, de façon pleinement fidèle, si la conjecture bordélique est valable) par un scindage  $\Gamma \longrightarrow G$  de  $G \longrightarrow \Gamma \dots$

## § 13 bis. — RETOUR SUR LA NOTION DE GROUPE À LACETS

Soit  $\pi$  un groupe,  $([L_i])_{i \in I}$  une famille de classes de conjugaison de sous-groupes de  $\pi$ . On dit que cela définit une “structure à lacets” sur  $\pi$  (de type  $(g, \nu)$ ) si  $\exists g \in N$ ,  $\forall i \in I$  un  $L_i \in [L_i]$ , un générateur  $l_i \in L_i$ , des éléments  $x_\alpha, y_\alpha \in \pi$  ( $i \leq \alpha \leq g$ ) enfin un ordre  $i_1, \dots, i_\nu$  sur  $I$  ( $\nu = \text{card}(I)$ ) tels que (posant  $l_\alpha = l_{i_\alpha}$  pour simplifier)

$$[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_g, y_g] l_1 \dots l_\nu = 1$$

soit une présentation du groupe  $\pi$ . On n'exclut pas a priori le cas  $g = 0$ , ni le cas  $\nu = 0$ , i.e.  $I = \emptyset$ .

On déduit de ceci :

- a) Si  $\nu \neq 0$ ,  $\pi$  est libre (à  $2g + \nu - 1$  générateurs) - donc libre *non abélien* sauf si  $g = 0$ ,  $\nu \leq 2$ .
- b) <sup>32</sup> Si  $\nu = 0$ , le seul cas où  $\pi$  abélien est celui où  $g \leq 1$ . [donc  $\pi \simeq \pi_{g, \nu}$  est abélien si et seulement si  $g = 0, \nu \leq 3$  ou  $g = 1, \nu = 0$ ]

En tout cas<sup>33</sup>, on a une suite exacte canonique de  $\mathbb{Z}$ -modules libres de types finis

$$0 \longrightarrow T_\pi \longrightarrow \prod_{i \in I} L_i \xrightarrow{i} \pi_{ab} \longrightarrow \tilde{\pi}_{ab} \longrightarrow 0$$

où pour  $I \neq \emptyset$ ,  $\pi \neq \emptyset$   $T_\pi$  est  $\simeq \mathbb{Z}$  (défini comme  $\text{Ker } i$ ), et où les projections

$$T_\pi \longrightarrow L_i$$

<sup>32</sup>Dire que  $\pi = 0$  si et seulement si  $\nu = 0$  ou 1, et qu'en dehors de ces cas les  $L_i$  sont  $\simeq \mathbb{Z}$

<sup>33</sup>N. B. Sauf si  $\pi = 0$

sont des isomorphismes. Dans le cas  $I \neq \emptyset$ , on appelle  $T_\pi$  le  $Z$ -module des orientations de  $\pi$  (muni de la famille des  $(L_i)$ ) - on définit, si  $I = \emptyset$ , ( $\nu = 0$ ) mais  $g \neq 0$  (donc  $\pi \neq 1$ )

$$T_\pi = \underbrace{H^2(\pi, Z)}_{Z\text{-module libre de rang } 1}^{\otimes -1}$$

[on établira plus loin une relation entre les deux définition de  $T_\pi$ ]. Ainsi  $\pi_{ab}$  est libre de rang  $2g + \nu - 1$  si  $\nu \neq 0$ ,  $2g$  si  $\nu = 0$  (donc  $g$  est uniquement déterminé par  $\pi$  et  $\nu = \text{card } \pi$ ).

Notons que [si  $\nu \neq 0$ , et] sauf les cas “abéliens”  $g = 0$ ,  $\nu = 1, 2$ , les classes de conjugaison des  $L_i$  ( $i \in I$ ) sont distinctes, donc la structure à lacets de  $\pi$  peut se décrire comme la donnée d’un ensemble de  $\nu$  classes de conjugaison de sous-groupes de  ${}_p i$ . De plus, on voit que tout  $g \in \pi$  qui normalise un  $L_i$  le centralise<sup>34</sup> (c’est évident en tout cas pour  $\nu \geq 2$ , car alors  $L_i \longrightarrow \pi_{ab}$  est injectif), ce qui implique que les  $L_i$  d’une même classe  $[L_i]$  sont canoniquement isomorphes entre eux (ce qui donne un sens intrinsèque au terme  $\prod L_i$  dans la suite exacte plus haut, et à l’isomorphisme canonique  $T_\pi \longrightarrow L_i \dots$

Si<sup>35</sup> un groupe  $\Sigma$  opère sur la structure à lacets  $(\pi, ([L_i]))$  il opère sur le  $Z$ -module inversible  $T_\pi$ , d’où un caractère

$$\chi : \Sigma \longrightarrow Z^* = \{\pm 1\}$$

inversement, si l’on a un caractère  $\chi$  sur  $\Sigma$  donné d’avance, on parlera d’une action de  $\Sigma$  sur  $(\pi, ([L_i]))$  compatible avec  $\chi$ .

On a es variantes profinies (ou profinies premières à  $p$ , si  $p$  est premier donné...) - mais il y a dès maintenant à signaler deux points à vérifier dans ce cas :

$\text{Norm}_\pi(L_i) = \text{Centr}_\pi(L_i) = L_i$  dans le cas  $\nu = 1$ , sinon pas de problème.

$\text{Centr}(\pi) = 1$  (cas anabéliens) plus généralement, le centralisateur de tout sous-groupe discret ouvert de  $\pi$  est réduit à  $1 \dots$

([ces deux points ne sont] *démontrés* pour le moment dans *aucun* cas anabélien profini !)

<sup>34</sup>voir à part le cas  $\nu = 1$  : normalisateur du sous-groupe engendré par  $\prod [x_\alpha, y_\alpha]$ , dans le groupe libre engendré par les générateurs  $x_\alpha, y_\alpha, \dots$

<sup>35</sup>On suppose dorénavant qu’on est dans le cas anabélien, ou du moins on exclut  $g = 0$ ,  $\nu \leq 2$

## § 14. — DIGRESSION COHOMOLOGIQUE (SUR LE “BOUCHAGE DE TROUS”)

---

Soit<sup>36</sup> un schéma localement noethérien, régulier de dimension 1,  $S$  un sous-schéma fermé réduit discret tel que  $\forall s \in S, \dim_s S = 1$  (donc  $S$  défini par une partie fermée discrète de  $X$ ),  $U = X \setminus S$ . On veut expliciter par voie galoisienne les faisceaux d'ensembles étales constructibles sur  $X$  tels que  $F|_U$  soit localement constant. Par le tapis d'Artin sur les ouverts du topos, ils correspondent aux triples

$$(F_U, F_S, \varphi)$$

où  $F_U$  est un faisceau constructible localement constant sur  $U$ ,  $F_S$  un faisceau (nécessairement localement constant) et  $\varphi$  un homomorphisme

$$F_S \xrightarrow{\varphi} j^* i_*(F_U)$$

(où  $i : U \hookrightarrow X$  et  $j : S \hookrightarrow X$  sont les inclusions). Toute condition de constructibilité etc mises à part, un faisceau étale  $F$  sur  $X$  correspond à un tel triple - on se restreint ici aux  $F$  tels que  $F_U$  provienne du topos fondamental  $B_{\Pi_1(U)}$  de  $U$ ... (il n'y a pas lieu de supposer  $F_U$  à fibres finies pour ce qui suit).

Soit pour tout  $s$  dans  $S$ ,  $\underline{\mathcal{O}}_s$  un hensélisé de  $\underline{\mathcal{O}}_{X,s}$ ,  $D_s = \text{Spec } \underline{\mathcal{O}}_s$  (“disque en  $s$ ”),  $D_s^* = D_s \setminus \{s\} = K_s$  ( $K_s$  corps des fractions de  $\underline{\mathcal{O}}_s$ ) (“disque épointé” en  $s$ ),  $D = \coprod_{s \in S} D_s$ ,  $D^* =$

---

<sup>36</sup>Il vaudrait peut être mieux démarrer avec le cas purement topologique d'une surface... et faire le lien avec les groupes *discrets*.

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

$\Pi_{s \in S} D_s^*$ . On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 & D^* & & & \\
 \rho \swarrow & & \searrow \sigma & & \\
 U & & & D(\xleftarrow{j_0} S) & \\
 & \searrow i & \nearrow k & \nearrow j & \\
 & X & & & 
 \end{array}$$

en on voit (par Artin) que ce diagramme permet d'exprimer les faisceaux étales sur  $X$  comme des systèmes  $(F_U, F_D, \varphi)$  avec  $F_U$  faisceau étale sur  $U$ ,  $F_D$  faisceau étale "essentiellement localement constant" sur  $D$  [N.B. l'inclusion  $S \hookrightarrow D$  définit une équivalence entre la catégorie de ces faisceaux sur  $D$ , et celle des faisceaux étales sur  $S$ ] et un homomorphisme de faisceaux

$$F_D \longrightarrow \sigma_* \rho^* F_U$$

ou encore

$$\boxed{\sigma^*(F_D) \xrightarrow{\varphi} \rho^*(F_U)}$$


Or, si on se borne aux  $F_U$  tels que  $F_U$  soit lui-même essentiellement localement constant, alors les données  $F_U, F_D, \varphi$  ne font intervenir que des faisceaux essentiellement localement constants, i.e. des topos fondamentaux (multigaloisiens) associés aux schémas envisagés, donc se décrivent entièrement en termes des diagrammes (\*)

$$\begin{array}{ccc}
 & B_{\Pi_1 D^*} & \\
 \rho \swarrow & & \searrow \sigma \\
 B_{\Pi_1 U} & & B_{\Pi_1 D}
 \end{array}$$


- d'ailleurs le cas où  $\varphi$  est un *isomorphisme* correspond justement au cas des faisceaux localement essentiellement constant sur  $X$ , i.e. de faisceaux sur  $B_{\Pi_1 X}$  - lequel topos fondamental apparaît donc comme somme amalgamée du diagramme de topos précédent, s'insérant dans

## A. GROTHENDIECK

le carré



Supposons pour simplifier  $U$  connexe, choisissons un revêtement universel de  $\tilde{U}$  de  $U$ , et un revêtement universel  $\tilde{D}_i^*$  de chaque  $D_i^*$  - d'où un revêtement universel  $\tilde{D}_i$  de  $D_i$  - et des isomorphismes (= "classes de chemins") entre  $\rho_i(\tilde{D}_i^*)$  et  $\tilde{U}$  - donc le diagramme de topos (\*) - ou des groupoïdes fondamentaux - s'explique en termes d'un diagramme



et la donnée d'un  $F$  comme envisagé sur  $X$  revient à la donnée d'un système  $(E_U, (E_i)_{i \in I}, (\varphi_i)_{i \in I})$  où  $E_U$  est un  $E$ -ensemble,  $E_i$  un  $\Gamma_i$ -ensemble ( $\forall i \in I$ ), et  $\varphi_i$  un  $E_i$ -homomorphisme de  $E_i$  dans  $E_U$  (i.e. un  $\Gamma_i$ -homomorphisme

$$\varphi_i : E_i \longrightarrow E_U^{\pi_i},$$

où  $\pi_i = \text{Ker}(\sigma_i)$  s'insère dans la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_i \longrightarrow E_i \longrightarrow \Gamma_i \longrightarrow 1 \quad )$$

Le cas où les  $E_i \longrightarrow E_U$  sont des isomorphismes, i.e.  $E_i$  s'identifiant tous à  $E_U$ , avec action triviale de  $\pi_i$  sur  $E_U$ , correspond au cas où  $F$  est essentiellement localement constant sur  $X$ , d'où aussitôt

$$\pi_1(X) = E = \pi_1(U) / \text{sous-groupe invariant engendré par les } \rho_i(\pi_i)$$



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Notre propos est celui d'un calcul galoisien (si possible) de la cohomologie de  $X$  pour les  $F$  envisagés.

Soit  $B_{X,U}$  le topos dont les faisceaux sont les triples  $(F_U, F_D, \varphi)$  comme dessus, qui s'envoie donc dans le topos  $B_{\Pi_1 X}$ , correspondant aux couples pour lesquels  $\varphi$  est un isomorphisme, et reçoit le topos  $X_{\text{ét}}$  :

$$X_{\text{ét}} \xrightarrow{f} B_{X,U} \xrightarrow{g} B_{\Pi_1 X}$$

On se pose la question

- a) Calcul [?] “explicite”, en termes de cohomologie des groupes profinis, de la cohomologie du topos abracadabra  $B_{X,U}$ . (N.B. La cohomologie de  $B_{\Pi_1 X}$  n'est autre que la cohomologie galoisienne profinie de  $\pi_1(X) = E/\dots$  calculée plus haut...).
- b) Vérifier si pour un faisceau de torsion  $F$  sur  $B_{X,U}$  l'homomorphisme canonique

$$H^*(B_{X,U}, F) \longrightarrow H^*(X_{\text{ét}}, f^*F)$$

est un isomorphisme.

$$T_i \xrightarrow[\sim]{x_i} \Pi_1$$

On aimerait pouvoir paraphraser, sur  $B_{X,U}$ , la suite exacte de cohomologie bien connue

$$\longrightarrow H^i(X, F) \longrightarrow H^i(U, F) \longrightarrow H^{i+1}_S(X, F) \longrightarrow \dots$$

relative à l'ouvert  $U$  du topos  $X$ , et son “complémentaire” fermé  $S$ . Or, tout comme  $X$  s'insère dans un diagramme de topos

$$\begin{array}{ccccc} & & D_{\text{ét}}^* & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ U_{\text{ét}} & & & & D_{\text{ét}} \longleftarrow S_{\text{ét}} \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & X_{\text{ét}} & & \end{array}$$

## A. GROTHENDIECK

de même  $B_{X,U}$  s'insère dans

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B_{\Pi_1 D^*} & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 B_{\Pi_1 U} & & & & B_{\Pi_1 D} \xleftarrow{\approx} B_{\Pi_1 S}, \\
 & \searrow & & \swarrow & \\
 & & B_{X,U} & & 
 \end{array}$$

[N.B. Les  $\varprojlim$  finies et les  $\varinjlim$  quelconques dans  $B_{X,U}$  i.e. pour les  $(F_U, F_D, \varphi)$ , se calculent “termes à termes”]

Je dis que

[]

On voudrait en déduire un diagramme de morphismes de topos

$$\begin{array}{ccccc}
 B_{\Pi_1 U'} & \longrightarrow & B_{X',U'} & \longrightarrow & B_{\Pi_1 X'} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 B_{\Pi_1 U} & \longrightarrow & B_{X,U} & \longrightarrow & B_{\Pi_1 X}
 \end{array}$$

et un homomorphisme *trace* sur la cohomologie à supports propres de  $U'$ ,  $U$  (définie en termes de cohomologie sur  $B_{X',U'}$ ,  $B_{X,U}$  relativement) qui induise un isomorphisme

$$H_i^2(U', \hat{Z}) \longrightarrow H_i^2(U, \hat{Z})$$

qui soit justement (contragrédiant de) l'isomorphisme des modules d'orientations associé à  $f \dots$

## § 14 bis. — OÙ ON REVIENT SUR LES MORPHISMES *MIXTES*

---

(Correspondants, dans le cadre topologique, au cas de  $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$  (avec  $X, X'$   $T$ -orientés) tels que l'on ait  $[f(X' \setminus S') \subset X \setminus S$ , i.e.  $S' \supset f^{-1}(S)$ , mais]  $S' \neq f^{-1}(S)$ , i.e. il y a des points de  $S'$  qui sont envoyés dans  $U = X \setminus S$ ).

Dans le paradigme toposique et groupoïdal,  $(X, S)$  est décrit par un diagramme de groupoïdes

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \quad (\text{et } \kappa : T_{\Pi_{D^*}} \simeq \text{ système local des } \pi_1 \text{ sur } \Pi_{D^*})$$

ou de topos

$$B_{D^*} \longrightarrow B_U$$

et un isomorphisme  $\kappa$  du système local constant  $T$ , qui permet de définir le topos discret  $B_D (\simeq B_{\Pi_0 D^*})$  et le topos  $B_{X,U}$ , s'insérant dans le diagramme de topos

$$\begin{array}{ccc} & B_{D^*} & \\ \rho \swarrow & & \searrow \sigma \\ B_U & & B_D \\ \varphi \searrow & & \swarrow \psi \\ & B_{X,U} & \end{array} \quad (\text{topos discret } \simeq B_S)$$

où  $\varphi, \psi$  sont des morphismes d'inductions de sous-topos,  $\varphi$  ouvert  $\psi$  fermé, complémentaire

## A. GROTHENDIECK

l'un de l'autre, et pour  $(X', S')$ , décrit par un diagramme analogue

$$\begin{array}{ccc}
 & B_{D'^*} & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 B_{U'} & & B_{D'} \simeq B_{S'} \\
 \searrow & & \swarrow \\
 & B_{X', U'} &
 \end{array}$$

Ceci dit, on veut absolument, dans une description de  $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$ , que celle-ci permette de retrouver non seulement  $B_{U'} \longrightarrow B_U$  (ce qui sera acquis par la donnée d'un  $f_\pi : \pi' \longrightarrow \pi$ ), mais aussi  $B_{X', U'} \longrightarrow B_{X, U}$ . On aura  $S' = S'_0 (= f^{-1}(S)) \amalg S'_1$ , donc  $D' = D'_0 \amalg D'_1$  et en fait  $f$  induit  $S'_1 \xrightarrow{f} U$  (et non  $S'_1 \longrightarrow S$ ) qui doit s'explicitier, au niveau des topos multigaloisiens, par un morphisme

$$B_{D'_1}(\simeq B_{S'_1}) \longrightarrow B_U$$

i.e. la donnée d'une famille de revêtements universels de  $U$ , paramétrée par  $S'_1 = I'_1$ , ou (si un revêtement universel est choisi,  $U$  étant connexe, d'où un  $\pi = \text{Aut}(\tilde{U})$ ) par une famille de toiseurs sous  $\pi$ ,  $(P_{i'})_{i' \in I'_1}$ . Ceci étant posé, on pourra décrire, en termes de

$$\begin{array}{ccc}
 B_{D'_0} & \longrightarrow & B_{U'} \\
 \downarrow & \nearrow \sim & \downarrow \\
 B_{D^*} & \longrightarrow & B_U
 \end{array}$$

et de

$$B_{D'_1} \longrightarrow B_{D'_1} \longrightarrow B_U$$

l'homomorphisme de topos  $B_{X', U'} \longrightarrow B_{X, U}$ <sup>37</sup>

- Je passe sur le détail de la description.

Quand on se donne un groupe d'opérateurs  $\Gamma$  sur la situation  $(X', S') \longrightarrow (X, S)$  donc sur la situation groupoïdale ou toposique, il faut en tenir compte dans la description ci-dessus.

---

<sup>37</sup>Il semble qu'on soit en train de faire la description des morphismes de topos  $B_{X', U'} \longrightarrow B_{X, U}$  qui induisent  $U' \longrightarrow U$  et qui sur  $D_1'^* (= D'^*|_U)$ , se factorisent par  $D_1'^* \longrightarrow D_1' \dots$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Ainsi  $I'_0[?] I'_1$  sera stable par  $\Gamma$ , et le morphisme  $B_{D'_1} \longrightarrow B_U$  doit être stable par  $\Gamma$ . CE qui signifie aussi, sans doute, qu'on a un morphisme de topos de  $B_{D'_1, \Sigma} = B_{I'_1, \Sigma}$  dans  $B_{U, \Gamma}$ . Choissant pour toute orbite de  $\Gamma$  dans  $I'_1$  un représentant  $s' \in I'_1$ , et considérant son stabilisateur  $\Gamma_{s'} \subset \Gamma$ , il faut donc pour toute telle orbite i.e. tout  $i'$  se donner un  $\Gamma_{s'}$  objet de la catégorie des revêtements universels de  $(U, \Gamma)$ .

Décrivant  $(U, \Gamma)$  en termes d'une extension  $E$  de  $\Sigma \subset \Gamma$  par  $\pi$  (en choisissant un revêtement universel  $\tilde{U}$  de  $U$ ), la donnée de  $B_{\Gamma_{s'}} \longrightarrow B_{X, U}$  compatible avec tout revient sauf erreur à la donnée d'un torseur  $P$  à droite sous  $\pi$  (permettant de tordre le revêtement universel de référence  $\tilde{U}$  de  $U$ , à l'aide de  $P$  don aussi de tordre  $E$  par  $P$ ), et d'un scindage de  $E^P \longrightarrow \Gamma$  au dessus de  $\Gamma_{s'} \dots$ )

Un automorphisme d'un tel couple  $(P, \Gamma_{s'} \xrightarrow{q} E^P)$  correspond à un  $\alpha \in \pi$  qui *centralise*  $\Gamma_{s'}$ , i.e. qui soit fixé par  $\Gamma_{s'}$  opérant sur  $\pi$ .

Si les  $\Gamma_{s'_i}$  opèrent assez fortement sur  $\pi$  pour que l'on sache que  $\pi^{\Gamma_{s'_i}} = (1)$ , l'objet  $(P, q : \Gamma_{s'_i} \longrightarrow E^P)$  est défini à *isomorphisme unique* près par la classe d'isomorphie (classe de scindage de  $E$  sur  $\Gamma_{s'_i}$ ).

Il me semble probable que ceci soit toujours le cas dans le cas *arithmétique*, où  $\Gamma_{s'_i}$  est un sous-groupe ouvert du groupe de Galois  $\Gamma$  (dont l'opération extérieure est alors draconienne!); ceci en direction de la conjecture qu'une classe de scindage de  $E$  sur  $\Gamma$  est "aussi bonne" qu'un point rationnel de  $U$  sur  $K$  - et permet de paradigmer ce qu'un tel point rationnel permettrait d'obtenir...

## § 15. — RETOUR SUR LE CAS TOPOLOGIQUE

---

§ 16. — BOUCHAGE ET FORAGE DE TROUS : PRÉLIMINAIRES  
TOPOLOGIQUES GÉNÉRAUX

---

§ 17. — COMPLÉMENTS SUR LES OPÉRATIONS DE GROUPES  
FINIS SUR LES SURFACES (COMPLÉMENT AU PARAGRAPHE 15)

---



§ 18. — FORAGE DE TROUS ; APPLICATION AUX ACTIONS  
EXTÉRIEURES DE GROUPES FINIS

---

Soit  $\pi'$  un groupe à lacets de type  $(g, \nu + 1)$  non abélien

## § 19. — TOUR DE TEICHMÜLLER

---

§ 20. — DIGRESSION : DESCRIPTION 2-ISOTOPIQUE DE LA  
CATÉGORIE DES SPHÈRES TOPOLOGIQUES

---

## § 21. — LIEN AVEC LES ESPACES DE TEICHMÜLLER

---

## § 23. — RETOUR SUR LES SURFACES À GROUPES D'OPÉRATEURS

---

§ 24. — ESSAI DE DÉTERMINATION DE  $\mathcal{A}^{0\Gamma}$ ; LIEN AVEC LES  
RELATIONS  $\pi_{g,(\nu,\nu+n-1)}^\Gamma = \{1\}$ , ET PROGRAMME DE TRAVAIL

---

## § 25. — GROUPES DE TEICHMÜLLER SPÉCIAUX

---

Revenons aux notations du n° 19, on va définir un sous-groupe  $SA_{g,\nu}$  de  $A_{g,\nu}^!$

$$SA_{g,\nu} = \{u \in A_g \mid u \text{ induit l'identité sur un voisinage de } S_{g,\nu}\}$$

i.e. ensemble des automorphismes de  $U_{g,\nu}$  qui induisent l'identité dans le complémentaire d'un compact.

Contrairement aux autres sous-groupes de  $A_g$  considérés jusqu'à présent, celui-ci n'est pas un sous-groupe fermé. N.B. Dans le cas où on travaille avec des surfaces compactes à bord au lieu de surfaces compactes (sans bord) "trouées", il y aurait lieu de prendre le groupe des automorphismes qui induisent l'identité sur le bord.

$SA_{g,\nu}$  est un sous-groupe invariant de  $A_{g,\nu}$ , le quotient  $A_{g,\nu}/SA_{g,\nu}$  étant isomorphe au groupe des germes d'automorphismes de  $X_g$  au voisinage de  $S_{g,\nu}$ , ou encore le groupe des germes à l'infini d'automorphismes de  $U_{g,\nu}$  ([ ] les complémentaires de compacts...)

On aura évidemment, puisque  $SA_{g,\nu} \subset A_{g,\nu}$

$$(SA_{g,\nu})^\circ \subset A_{g,\nu}^\circ$$

Posons

$$SA_{g,\nu}^! = SA_{g,\nu}/SA_{g,\nu}^\circ$$

on aura un homomorphisme canonique

$$SA_{g,\nu}^! \longrightarrow \Gamma_{g,\nu}^{!+}$$

## A. GROTHENDIECK

qu'on va interpréter de façon algébrique, en termes de l'interprétation de  $\Gamma_{g,\nu}^!$  comme le groupe des automorphismes extérieures du groupe à lacets  $\pi_{g,\nu}$ , induisant l'identité sur  $S_{g,\nu} = I(\pi_{g,\nu})$ .

Pour tout  $i \in S_{g,\nu}$ , choisissons un  $L_i$  de classe  $i$  dans  $\pi_{g,\nu}$  - ce qui revient à se donner un "point" de  $B_{D_i^*}$  ( $\simeq$  un revêtement universel  $\widetilde{D_i^*}$ ) et un isomorphisme entre son image dans  $B_{U=U_{g,\nu}}$  avec le "point"  $s = s_{g,\nu}$  de référence, qui servait à définir  $\pi_{g,\nu}$  comme  $\text{Aut}_{B_U} \simeq \pi_1(B_U, s)$ .

Ceci dit, si  $u$  est un automorphisme de  $\pi = \pi_{g,\nu}$  le fait qu'il respecte (strictement, en induisant l'identité sur  $S_{g,\nu}$ ) la structure à lacets, s'exprime par l'existence d'une famille d'éléments  $g_i \in \pi$ , tels que

$$u(l) = \text{int } g_i^{-1}(l^\alpha) \quad (i \in I, l \in L_i, \alpha = \chi(n))$$

-lesquels  $g_i$  sont déterminés par  $u$  modulo multiplication à droite par des  $\lambda_i \in L_i$ . Si on a de même  $v, (h_i)$ , alors : pour  $l \in L_i$  on a (si  $\alpha = \chi(u), \beta = \chi(v)$ )

[]



## § 25 bis. — CAS DES DEUX GROUPES. RETOUR SUR LES NOTATIONS

---

On se place d'abord pour fixer les idées dans le cas topologique et discret, mais la motivation est le cas d'une courbe algébrique  $U$  sur un corps de type fini  $K$ , où on a à la fois le groupe  $G_K = \text{Aut}_K(U)^{38}$  et  $\Gamma = \text{Gal}(\bar{K}/K)$  qui opèrent extérieurement sur le  $\pi_1(U_{\bar{K}})$ .

Dans ce cas,  $G$  et  $\Gamma$  commutent, mais on peut regarder plus généralement le cas du groupe (plus gros que  $G_K$ )  $G_{\bar{K}} = \text{Aut}_{\bar{K}}(U)$ , sur lequel  $\Gamma$  opère (de façon pas nécessairement triviale - cette opération décrit un groupe algébrique étale fini sur  $K$ ).

Supposons donc qu'on ait une surface  $U$  (orientable,  $U = X \setminus S$ ,  $X$  compacte connexe,  $S$  finie) sur laquelle opèrent deux groupes  $G, \Gamma$ , l'action de  $\Gamma$  normalisant celle de  $G$  - donc on a un groupe  $\mathcal{G} = \Gamma G$  (produit semi-direct, pour une certaine action de  $\Gamma$  sur  $G$ ) qui opère sur  $U$ . On suppose  $G$  fini, mais pas nécessairement  $\Gamma$  fini.

On suppose choisi un revêtement universel  $\tilde{U}$  de  $U$ , d'où un groupe à lacets  $\pi = \text{Aut}(\tilde{U})$ , sur lequel  $\mathcal{G}$  opère extérieurement, d'où l'extension

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow E \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 1(1)$$

Si l'action de  $\mathcal{G}$  sur  $U$  est fidèle, alors  $\mathcal{G} \hookrightarrow \text{Autext}(\pi)$ , et l'extension précédente est l'image inverse de l'extension de Teichmüller de  $\pi$

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi) \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi) \longrightarrow 1$$

---

<sup>38</sup>Cas anabélien donc  $G$  fini.

## A. GROTHENDIECK

On aura à regarder d'autres revêtements universels que  $\tilde{U}$ , et leurs isomorphismes avec  $\tilde{U}$ . Quand  $\tilde{U} = \tilde{U}(P)$  est le revêtement universel basé en un certain  $P \in U$ , alors pour les revêtements universels  $U(Q)$  basés en un point, les  $U$ -isomorphismes  $\tilde{U}(P) \xrightarrow{\sim} \tilde{U}(Q)$  correspondent donc aux classes de chemins de  $P$  à  $Q$ .

Soit  $Q \in U$  tel que son sous-groupe d'isotropie  $G_Q$  dans  $G$  soit tel que  $G_Q^+ \neq 1$ . (Donc  $G_Q^+$  est cyclique). Choissant une classe de chemins de  $P$  à  $Q$ , on trouve une opération de  $G_Q$  sur  $\tilde{U}(P)$  i.e. un relèvement  $G_Q \xrightarrow{r_{G_Q}} E$  dans l'extension (1) - le changement de classe de chemins de  $\lambda$  en  $\lambda'$  donnera un relèvement  $r'_{G_Q}$  qui sera conjugué de  $r$  par un unique élément de  $\pi = \pi_1(U, P)$  (l'unicité provient de  $\pi^{G_Q} = 1$ ), savoir celui qui fait passer d'un chemin à l'autre.

Considérons le stabilisateur  $\Gamma_Q$  de  $Q$  dans  $\Gamma$ , qui opère bien sur  $\tilde{U}(Q)$  tout comme  $G_Q$  (en fait c'est  $\mathcal{G}_Q$  qui opère d'où  $r : \mathcal{G}_Q \longrightarrow E \dots$ ), donc via  $\lambda$  on a aussi un relèvement  $r_{\Gamma_Q} : \Gamma_Q \longrightarrow E$ , qui a la même propriété de normaliser  $r_{G_Q}$  (avec opération de  $\Gamma_Q$  dessus, qui est celle provenant de l'opération de  $\Gamma$  sur  $G$ )<sup>39</sup>. Pour simplifier, supposons quand même que  $\Gamma$  opère trivialement sur  $G$  i.e.  $\mathcal{G} = \Gamma \times G$ , alors  $r_{\Gamma_Q}(\Gamma_Q) \subset E$  est contenu dans le *centralisateur* de  $r$  (ou de  $r(G_Q)$ ) et comme  $\pi^{r(G_Q)} = 1$ , donc l'homomorphisme

$$\text{Centr}(r(G_Q)) \longrightarrow \mathcal{G}$$

est injectif<sup>40</sup>, le relèvement en question  $r_{\Gamma_Q}$  est uniquement déterminé par la condition précédente.

En ait, l'image de  $\text{Centr}(r(G_Q))$  dans  $\mathcal{G}$  contient  $\mathcal{G}_Q$ , et on [] de même le relèvement  $\mathcal{G}_Q \xrightarrow{r_{G_Q}} E$ . La chose intéressante, c'est que le choix d'un relèvement du (petit) groupe  $\mathcal{G}_Q$ , impose déjà le choix d'un relèvement du (grand) groupe  $\Gamma_Q$ , ou  $\mathcal{G}_Q$ .

Je dis que l'image dans  $\mathcal{G}$  du centralisateur (et même du normalisateur) de  $r(G_Q)$  est  $\mathcal{G}_Q$  lui-même (a priori il le contient).

Revenant à  $\tilde{U}(Q)$  lui-même, cela signifie que si  $g \in \mathcal{G}$  est tel qu'il existe un automorphisme  $\tilde{g}$  de  $\tilde{U}(Q)$  qui relève  $g$ , en normalisant l'action de  $G_Q$ , alors  $g \in \mathcal{G}_Q$  et  $\tilde{g}$  est le

<sup>39</sup>N. B. Comme l'ensemble des points  $Q$  est fini, et que  $\mathcal{G}$  opère dessus, l'orbite de  $Q$  sous  $\mathcal{G}$  est finie, i.e.  $\mathcal{G}_Q$  est d'indice fini dans  $\mathcal{G}$  et de même  $\Gamma_Q$  sous  $\Gamma$ .

<sup>40</sup>N. B. Indépendamment de toute hypothèse que  $\Gamma$  centralise  $G$ , le normalisateur de  $r(G_Q)$  dans  $\pi$ , égal à son centralisateur, est réduit à 1, donc  $\text{Norm}(r(G_Q)) \longrightarrow \mathcal{G}$  est injectif.

relèvement évident). En effet, si  $\tilde{g}$  normalise l'action de  $G_Q$ , il invarie l'ensemble des points fixes de  $G_Q$  dans  $\tilde{U}(Q)$ , qui est réduit au point  $\overline{Q}$ .

L'ensemble  $U^!$  des points  $Q \in U$  tels que  $G_Q^+ \neq (1)$  est stable par l'action de  $\mathcal{G}$ , et s'identifie (avec cette action) à l'ensemble des relèvements maximaux modulo  $\pi$  de sous-groupes (cycliques)  $\neq 1$  de  $G^+$ .

Quand on connaît, pour un relèvement partiel  $r$  d'un  $G_Q$  dans  $E$ , i.e. le relèvement correspondant de  $\mathcal{G}_Q$ , alors de même pour les conjugués de  $r$  par n'importe quel élément  $g$  (non seulement de  $\pi_1$  mais même de  $E$ ), par simple conjugaison. Donc les cas à déterminer correspondent pratiquement aux orbites de  $\mathcal{G}$  dans  $U^!$ .

On peut s'intéresser à décrire  $\mathcal{G} \longrightarrow \Gamma$  en tant que sous-groupes de  $\text{Autext}_{\text{lac}}(\pi) = \Gamma'$  donnant lieu à l'extension  $E'$  de  $\Gamma'$  par  $\pi$  (donc  $E \subset E'$ ). Mais pour tout relèvement  $r$  d'un  $G_Q$ , considérons  $\text{Centr}_{E'}(r)$ , on a encore  $\text{Centr}_{E'} \cap \pi = (1)$  i.e. on trouve une section au dessus de l'image de ce centralisateur dans  $\Gamma'$ , soit  $\Gamma'(Q)$ . Cette image ne dépend que de  $Q$  i.e. de la classe de  $\pi$ -conjugaison de  $r$  ou de  $r(G_Q)$ , et est remplacée par un  $G$ -conjugué quand  $Q$  est remplacé par un  $G$ -conjugué. Ceci dit, l'intersection  $\Gamma'^{\natural}$  des  $\Gamma'(Q)$ , pour  $Q \in U^!$ , est un sous-groupe de  $\Gamma'$  qui contient l'intersection  $\mathcal{G}^{\natural}$  des  $\mathcal{G}_Q$ , et le centralisateur de  $G$  dans  $\Gamma'^{\natural}$  contient de même l'intersection  $\Gamma^{\natural}$  des  $\Gamma_Q$ , qui est un sous-groupe invariant d'indice fini de  $\Gamma$ . Et on peut alors se proposer de voir s'il est possible de caractériser au moins le sous-groupe fini  $\Gamma^{\natural}$  de  $\Gamma$  comme  $\text{Centr}_{\Gamma^{\natural}}(G)$ , et de récupérer peut être  $\Gamma$  comme le normalisateur de  $\Gamma^{\natural}$  dans  $\text{Centr}_G(\Gamma)$ .

Je m'intéresse plus particulièrement à la variante profini de ceci, dans le cas où  $U = \mathbb{P}_Q^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ ,  $G = \mathfrak{S}_3$ ,  $\Gamma =$  groupe de Galois sur  $Q$  de la clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$  dans  $C$  et  $p = \exp(2i\pi/6)$ .

Je n'ai pas vérifié que  $\Gamma \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\hat{\pi})$  soit injectif, cela m'empêche de faire des calculs dans  $\text{Aut}_{\text{lac}}(\hat{\pi})$ , fussent-ils heuristiques pour le moment.

Je bute sur des ennuis de notations - trop de groupes sont désignés par la lettre  $\Gamma$  (avec éventuellement des primes, indices, exposants...) Il y a trois types de groupes qui interviennent dans mes réflexions :

- a) Les groupes de Teichmüller et ses variantes, qui jouent le rôle de groupes "universels" opérant (éventuellement modulo isotopie) sur des surfaces, ou sur des groupes extérieurs à lacets. Ces groupes ont tendance à être infinis.

Des groupes (le plus souvent finis) opérant sur des surfaces topologiques, ou sur des courbes algébriques (sans, dans ce cas là, bouger le corps de base).

- c) Des groupes de Galois profinis (donc infinis),  $[\ ]$  de corps de type fini sur  $Q$ , opérant “arithmétiquement” sur des surfaces et leurs  $\hat{\pi}_1$ -géométries<sup>41</sup>.

C’est à cause des analogies profondes entre les cas b) et c), et leurs relations étroites avec le cas a), que j’avais été induit à adopter des notations communes, mais qui à la longue finissent par aboutir à des collisions. Il y a donc lieu de revoir les notations. Je vais réserver la lettre  $G$  et variantes pour des actions géométriques (cas b)) de groupes, le plus souvent finis, la lettre  $\Gamma$  et variantes pour des groupes de Galois, la lettre  $\mathcal{G}$  pour des groupes mixtes.

Quant aux groupes “universels” de type Teichmüller, comme ceux notés  $\Gamma_{g,v}$  précédemment, je vais plutôt les noter  $\mathfrak{Z}, \mathfrak{Z}_{g,v}$  (initiale de “Teichmüller”, alors que  $\Gamma, G$  sont l’initiale de Galois).

Le groupe de Galois sur  $Q$  de la clôture  $\overline{Q}$  de  $Q$  dans  $C$  mérite une lettre spéciale, je le noterai  $\Pi$ . Le quotient  $\text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}}(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v})/(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v})$ , qui s’apparente plus à un groupe de Galois qu’à un group de Teichmüller, sera noté  $\Pi_{g,v}$  (lettre grasse !). Dans le cas  $(g,v) = (0,3)$  qui m’occupe plus particulièrement,  $\Pi_{0,3}$ <sup>42</sup> s’identifie au centralisateur de  $G = \mathfrak{S}_3 = \mathfrak{Z}_{0,3}^+$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_{0,3}$  il est contenu dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_{0,3}^!$ , et peut-être égal. On a un homomorphisme canonique  $\Pi \longrightarrow \Pi_{0,3}$  (plus généralement  $\Gamma \longrightarrow \Gamma_{g,v}$ ) dont j’ignore pour l’instant s’il est injectif, et encore plus s’il est surjectif. Les réflexions qui précèdent suggèrent des conditions sur l’image, qui sont surtout intéressantes si on admet les relations

$$\hat{\pi}^\rho S = \widehat{\pi^{\sigma_0}} = (1)$$

On a désigné par  $E_{g,v}$  l’extension canonique de  $\mathfrak{Z}_{g,v}$  par  $\pi_{g,v}$  (qui pour  $(g,v)$  anabélien s’identifie à  $\mathfrak{Z}'_{g,v+1}$ ). L’opération extérieure d’un groupe  $G, \Gamma, \mathcal{G}$  définit aussi une extension par  $\pi$  (ou par  $\hat{\pi}$ ), qu’on a également désigné par la lettre  $E$  (initiale d’extension) - il y a à nouveau collisions de notations.

Je vais prendre la lettre  $\mathfrak{S}$  (qui fait penser à  $\mathfrak{Z}$ ) pour ces extensions dans les cas universels à la Teichmüller, (en écrivant  $\mathfrak{S}_{g,v}$  au lieu de  $\Gamma'_{g,v+1}$ , puisque l’optique est différente...), et en

<sup>41</sup>Les cas b) et c) se mélangent parfois (dans un groupe  $\mathcal{G}$  extension d’un groupe de Galois  $\Gamma$  par un groupe fini  $G$ ) dans le cas de la Géométrie Algébrique.

<sup>42</sup> $\Pi$  est ici produit semi-direct de  $\mathfrak{S}_3 = \mathfrak{Z}^+$  par  $\mathfrak{Z}^!$ .

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

gardant la lettre  $E$  dans le cas précédent. Donc  $E$  a tendance à être une sous-extension d'un  $\mathfrak{S}$ .

Admettant que  $\Pi \longrightarrow \Pi_{0,3}$  est injectif, on aurait donc

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\mathfrak{S}}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\mathfrak{Z}}_{0,3} \longrightarrow 1 \\
 & & \uparrow \simeq & & \uparrow & & \uparrow \\
 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}' & \longrightarrow & \mathfrak{Z}_{0,3}^+ \times \Pi_{0,3} \longrightarrow 1 \\
 & & \uparrow \simeq & & \uparrow & & \uparrow \\
 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \mathfrak{S} \times \Pi \longrightarrow 1 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 1
 \end{array}$$

N. B. On note  $\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}'$  le normalisateur de  $\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^+$  dans  $\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ , extension de  $\Pi_{g,\nu}$  par  $\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^+$ .

Si  $\gamma \in \Pi_{0,3}$ , pour qu'il soit dans l'image de  $\Pi$  il faut qu'il admette un relèvement  $u$  qui commute à  $\rho$ , et un relèvement qui commute à  $\sigma_0$  (ce qui, dès que  $\gamma \in \widehat{\mathfrak{Z}}_{0,3}$ , implique déjà que  $\gamma$  dans  $\widehat{\mathfrak{Z}}_{0,3}$  commute à  $\mathfrak{Z}_{0,3}^+ = \mathfrak{S}_3$ , i.e. qu'il est dans  $\Pi_{0,3}$ ). Il se pourrait que tout élément de  $\Pi_{0,3}$  ait déjà cette propriété, donc que cette condition ne pose pas de restriction sur l'image de  $\Pi$  dans  $\Pi_{0,3}$ .

## § 26. — GROUPES DE TEICHMÜLLER PROFINIS (DISCRÉTIFICATION ET PRÉDISCRÉTIFICATION)

---

Soit  $\pi$  un groupe profini à lacets de type  $g, \nu$ ,  $T$  le  $\hat{Z}$ -module inversible de ses orientations. On suppose qu'on est dans le cas anabélien, et on admettra qu'alors

$$\text{Centre}(\pi) = \{1\}, (1)$$

plus généralement que le centralisateur dans  $\pi$  de tout sous-groupe ouvert de  $\pi$  est réduit à  $\{1\}$ . On aura donc encore une suite exacte canonique de groupes profinis

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi) \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi) \longrightarrow 1. (2)$$

On posera aussi

$$\text{Autext}_{\text{lac}}(\pi) = \hat{\mathfrak{Z}}(\pi), (3)$$

et on l'appellera le *groupe de Teichmüller étendu* de  $\pi$ . On posera aussi  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi) = \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi)$ , de sorte qu'on peut écrire (2) comme

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi) \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \longrightarrow 1. (2')$$

Appelons “base” de  $\pi$  un ensemble d'éléments de  $\pi$ :  $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq g}, (l_j)_{1 \leq j \leq \nu}$ , les  $l_j$  engendrant les différents groupes à lacets, satisfaisant

$$l_\nu l_{\nu-1} \cdots l_1 [x_g, y_g] \cdots [x_1, y_1] = 1, (4)$$

et tels que ceci soit une relation génératrice. Si on choisit dans  $\pi_{g,v}$  une base (discrète) (définition correspondante)<sup>43</sup>, d'où une base de  $\hat{\pi}_{g,v}$ : on aura une bijection évidente

$$\text{Bases}(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi). (5)$$

L'ensemble des bases de  $\pi$  est un ensemble homogène sous  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi) = \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi)$ . Si la base correspond à un isomorphisme  $u : \hat{\pi}_{g,v} \longrightarrow \pi$ , le groupe  $\pi_0$  engendré par les  $x_i, y_i, l_j$  n'est autre que  $u(\pi_{g,v})$ . Les sous-groupes de  $\pi$  qui peuvent s'obtenir ainsi sont appelés les *discrétifications* de  $\pi$ . Celles-ci forment un ensemble homogène sous  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi) = \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi)$ , canoniquement isomorphe au quotient du  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,v}$ -ensemble à droite  $\text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi)$  par  $\mathfrak{S}_{g,v}$ <sup>1</sup>:

$$\text{Discrét}(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi) / \mathfrak{S}_{g,v}. (6)$$

Les automorphismes (profinis à lacets) de  $\pi$  fixant une discrétification  $\pi_0$  s'identifient aux automorphismes du groupe discret à lacets  $\pi_0$ :

$$\text{Aut}_{\text{lac}}(\pi, \pi_0) \simeq \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi_0). (7)$$

La bijection (5) met sur l'ensemble des bases de  $\pi$  une structure de bitorseur sous  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$ ,  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,v}$ , et la topologie correspondante en fait un ensemble profini. L'ensemble des discrétifications de  $\pi$ , qui est un quotient de l'ensemble précédent, hérite d'une topologie quotient, qui n'est autre que la topologie quotient du deuxième membre de (6). Cet espace n'est pas séparé ( $\mathfrak{S}_{g,v}$  est toujours infini), car le groupe  $\mathfrak{S}_{g,v} \subset \hat{\mathfrak{S}}_{g,v}$  n'est pas fermé. On désigne par  $\text{Discrét}'(\pi)$  l'espace topologique séparé associé, s'identifiant à  $\text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi) / \overline{\mathfrak{S}}_{g,v}$ , où  $\overline{\mathfrak{S}}_{g,v}$  désigne l'adhérence de  $\mathfrak{S}_{g,v}$  dans  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,v}$ . On a d'ailleurs un homomorphisme évident  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,v} \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}_{g,v}$  dont l'image est  $\overline{\mathfrak{S}}_{g,v}$ , nous admettrons qu'il est injectif et identifions  $\overline{\mathfrak{S}}_{g,v}$  à  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,v}$ . Ainsi

$$\text{Discrét}'(\pi) \simeq \text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi) / \hat{\mathfrak{S}}_{g,v}. (8)$$

Un élément de  $\text{Discrét}'(\pi)$  s'appelle une classe de discrétifications de  $\pi$  (ou prédiscrétification de  $\pi$ ). Si  $\pi_0$  est une discrétification, on désigne sa classe par  $\pi_0^{\natural}$ . L'ensemble des classes de

<sup>43</sup>ou encore on définit  $\pi_{g,v}$  comme le groupe discret de générateurs les  $x_i, y_i, l_j$  et de relation de définition (4)

## A. GROTHENDIECK

discrétifications de  $\pi$  est un espace homogène sous  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$ , le stabilisateur de  $\pi_0^{\natural}$  s'identifiant à l'adhérence de  $\mathfrak{S}(\pi_0) = \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi_0)$  dans  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$ , ou encore à  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)$ . Celle-ci contient toujours  $\pi$ .

$$\text{Aut}_{\text{lac}}(\pi, \pi_0^{\natural}) \simeq \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0).^{2(9)}$$

Pour toute [pré?]discrétification  $\pi_0^{\natural}$ , le sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$  des automorphismes à lacets qui fixent  $\pi_0^{\natural}$  est noté  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0^{\natural})$ . C'est donc l'image inverse d'un sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , noté  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0^{\natural})$ .<sup>44</sup> On a donc une inclusion de structures d'extensions:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0^{\natural}) & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0^{\natural}) \longrightarrow 1 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi) & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \longrightarrow 1. \end{array} \quad (10)$$

(On montre par voie arithmético-géométrique que l'inclusion  $\hat{\mathfrak{Z}} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}$  n'est jamais un isomorphisme). On trouve ainsi une application

$$\text{Discrét}'(\pi) \longrightarrow \text{sous-groupes fermés de } \hat{\mathfrak{Z}}(\pi), \quad (11)$$

$$[\pi_0^{\natural} \mapsto \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0^{\natural})]$$

évidemment compatible à l'action de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$  (transport de structure) – opérant à droite via  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  et ses automorphismes intérieurs sur lui-même.<sup>3</sup>

On trouve ainsi une classe de conjugaison bien déterminée de sous-groupes fermés de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , qu'on appelle ses sous-groupes de Teichmüller “géométriques”. Il se pourrait d'ailleurs que  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}$  soit son propre normalisateur dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}$ , ce qui équivaut à l'assertion que (11) est bijective: la donnée d'une classe de discrétifications de  $\pi$  serait équivalente à celle d'un sous-groupe de Teichmüller géométrique dans son groupe de Teichmüller étendu  $\hat{\mathfrak{Z}}$ .<sup>45</sup>

<sup>44</sup>NB. L'ensemble des classes de discrétification de  $\pi$  se décrit en termes de groupes *extérieurs* définis par  $\pi$  comme  $\text{Isomext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi)$  divisé par  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}$ ; on a d'ailleurs une application de degré 2  $\text{Isomext}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi)/\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+ \longrightarrow \text{Isomext}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi)/\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}$ , ce qui permet pour toute classe de discrétification de définir ses deux *orientations* et de parler des classes de discrétification *orientées*.

<sup>45</sup>c'est complètement déconnant et ultra-faux; un moment d'égarement! Cela apparaît clairement par la suite...La question judicieuse (avec laquelle j'ai dû sur le coup confondre) c'est si  $\hat{\mathfrak{Z}}$  est *invariant* dans  $\hat{\mathfrak{Z}}$ , i.e. si le normalisateur est  $\hat{\mathfrak{Z}}$  tout entier.



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Notons qu'on a des homomorphismes canoniques

$$\hat{\mathfrak{Z}} \xrightarrow{\chi} \hat{Z}_*(12)$$

$$\hat{\mathfrak{Z}} \longrightarrow \mathfrak{S}_I(13)$$

(où  $I = I(\pi)$  est l'ensemble des classes de conjugaison des sous-groupes à lacets de  $\pi$ ), induisant sur  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0^{\natural})$  des homomorphismes correspondants – d'où la définition des sous-groupes  $\hat{\mathfrak{Z}}^!, \hat{\mathfrak{Z}}^+, \hat{\mathfrak{Z}}^{!+}$  et de même pour  $\hat{\mathfrak{Z}}$ . Notons que  $\chi$  ne prend sur  $\hat{\mathfrak{Z}}$  que les valeurs  $\pm 1$ .<sup>4</sup>

Le sous-groupe  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  des automorphismes extérieurs du groupe à lacets profinis  $\pi$ , fixant une classe de discrétifications  $\pi_0^{\natural}$  et de multiplicateur  $+1$ , joue un rôle très particulier. A l'opposé de ce qu'on peut conjecturer sur  $\hat{\mathfrak{Z}}$  (dont  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  est un sous-groupe ouvert d'indice 2), on supposerait plutôt que  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  est invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}$  [voir note en bas de page précédente]. En tout état de cause, les sous-groupes ainsi définis dans  $\hat{\mathfrak{Z}}$  via classes de discrétification de  $\pi$  (peut-être n'y en a-t-il qu'un seul et unique!)<sup>5</sup> s'appelleront les sous-groupes de Teichmüller géométriques *stricts*. Le choix d'un tel sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{Z}}$  est, en tout état de cause, un élément de structure nettement plus faible que celui d'une classe de discrétification, et même que celui d'un sous-groupe de Teichmüller géométrique (pas strict). Pour préciser les relations entre ces deux notions, rappelons d'abord que  $\hat{\mathfrak{Z}}^+ = \Sigma$  se déduit de  $\hat{\mathfrak{Z}}$  comme noyau de  $\chi|_{\hat{\mathfrak{Z}}} : \hat{\mathfrak{Z}} \longrightarrow \{\pm 1\}$ . D'autre part (pour un sous-groupe de Teichmüller géométrique strict choisi  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$ ), considérons

$$\mathcal{N}_{\Sigma} = \mathcal{N} = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}}(\Sigma)(14)$$

où  $\Sigma = \hat{\mathfrak{Z}}^+$  ( $[\mathcal{N}_{\Sigma}]$  est] peut-être toujours égal à  $\hat{\mathfrak{Z}}$  tout entier), évidemment (si  $\Sigma$  provient d'un  $\hat{\mathfrak{Z}}$ )

$$\Sigma = \hat{\mathfrak{Z}}^+ \subset \hat{\mathfrak{Z}} \subset \mathcal{N}_{\Sigma}.(15)$$

Le groupe profini  $\mathcal{N}/\Sigma$  associé à  $\Sigma$  se note  $\Pi_{\Sigma}$  (si  $\Sigma$  est unique, on note  $\Pi_{\pi}$ ), et les  $\hat{\mathfrak{Z}}$  donnant naissance au même  $\Sigma$  correspondent à une classe de conjugaison d'éléments d'ordre 2 de  $\Pi_{\Sigma}$ . Il est clair en tous cas qu'on a une application injective

$$\{\text{ensemble des sous-groupes de Teichmüller géométriques } \hat{\mathfrak{Z}} \text{ dans } \hat{\mathfrak{Z}} \text{ tels que } \hat{\mathfrak{Z}}^+ = \Sigma\}$$

↓

$$\{\text{ensemble des éléments d'ordre 2 dans } \Pi_{\Sigma}\}(16)$$

## A. GROTHENDIECK

et que son image est stable par conjugaison. Montrons que deux éléments de l'image sont conjugués dans  $\Pi_\Sigma$ . En effet, soient  $\hat{\mathfrak{Z}}, \hat{\mathfrak{Z}}' \supset \Sigma$  tels que  $\Sigma = \hat{\mathfrak{Z}}^+ = \hat{\mathfrak{Z}}'^+$ . Il existe  $g \in \hat{\mathfrak{Z}}$  tel que  $\hat{\mathfrak{Z}}' = \text{Int}(g)\hat{\mathfrak{Z}}$ , et on aura alors  $\hat{\mathfrak{Z}}'^+ = \text{Int}(g)\hat{\mathfrak{Z}}^+$ , i.e.  $g \in \mathcal{N}$ , OK.

Les éléments d'ordre 2 ainsi obtenus dans  $\Pi_\Sigma$  s'appellent les involutions canoniques. On en donnera une interprétation conjecturale remarquable plus bas. L'ensemble  $\hat{\mathfrak{Z}}/\mathcal{N}$  s'identifie à l'ensemble des sous-groupes de Teichmüller géométriques stricts (une fois choisi l'élément "origine"  $\Sigma$ ).<sup>6</sup> Plus intrinsèquement, on aura:

$$\{\text{Ensemble des sous-groupes de Teichmüller géométriques stricts de } \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)\}$$

↑

$$\text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}, \pi) / \mathcal{N}_{g,v} (17)$$

où on pose, comme de juste,

$$\mathcal{N}_{g,v} = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}}(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+) (18)$$

(peut-être égal à  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}$  tout entier!).

Considérons maintenant le *topos modulaire sur*  $Q$  des courbes algébriques de type  $(g, v)$ , noté  $\mathcal{M}_{g,v,Q}$  ou simplement  $\mathcal{M}_{g,v}$ . Si nous choisissons un revêtement universel  $\widetilde{\mathcal{M}}_{g,v}$  (d'où un revêtement universel de  $\text{Spec } Q$ , i.e. une clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$ ), on peut préciser le  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,Q})$  comme le groupe des  $\mathcal{M}_{g,v,Q}$ -automorphismes de ce revêtement et l'appeler le *groupe de Teichmüller arithmétique* de type  $(g, v)$  (relatif au choix de  $\widetilde{\mathcal{M}}_{g,v,Q}$ ). On aura donc une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}) \longrightarrow \pi_1(\mathcal{M}_{g,v}) \longrightarrow \text{Gal}(\overline{Q}/Q) \longrightarrow 1, (19)$$

(où  $\overline{Q}$  et les points base sont explicités comme il a été dit). Notons que par la théorie transcendante de Teichmüller on a un isomorphisme (défini modulo l'opération induite par  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v})$  sur  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}})$ ):

$$\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}) \simeq \hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+ (20)$$

(où  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+$  est le compactifié profini de  $\mathfrak{Z}_{g,v}^+$ ).

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Considérons d'autre part le schéma  $\mathcal{U}_{g,v}$  sur  $\mathcal{M}_{g,v}$ , courbe de type  $(g, v)$  “universelle”. On a donc, en choisissant un revêtement universel  $\widetilde{\mathcal{U}_{g,v}}$  de celle-ci *au-dessus* du revêtement universel choisi  $\widetilde{\mathcal{M}_{g,v}}$  de  $\mathcal{M}_{g,v}$ , un diagramme commutatif:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \pi_1(\mathcal{U}_{g,v}) & \longrightarrow & \pi_1(\mathcal{M}_{g,v}) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi) & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \longrightarrow 1 \end{array} \quad (21-22)$$

et de même pour  $\mathcal{U}_{g,v,\overline{Q}} \longrightarrow \mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}$ :

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \pi_1(\mathcal{U}_{g,v,\overline{Q}}) \longrightarrow \pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}) \longrightarrow 1. (21')$$

On a bien sûr un isomorphisme de groupes à lacets

$$\pi \simeq \hat{\pi}_{g,v} (23)$$

dont on voudrait déterminer l'indétermination de façon précise.<sup>7</sup>

Notons  $\mathcal{M}_{g,v,C}$  le topos modulaire de Teichmüller complexe, défini à l'aide de la surface  $C^\infty \mathcal{U}_{g,v}$ ; il est muni du revêtement universel canonique  $\widetilde{\mathcal{M}_{g,v,C}}$  (§21;  $\widetilde{\mathcal{M}_{g,v,C}} \simeq E_g/A_{g,v}^o$ ) de groupe d'automorphismes  $\mathfrak{Z}_{g,v}^+$  justement -  $\mathcal{U}_{g,v,C}$  étant lui aussi muni d'un revêtement universel au-dessus du précédent, ( $\widetilde{\mathcal{U}_{g,v,C}} = E_g/A_{g,v+1}^o$ ). Ceci donne naissance aux suites exactes des groupes discrets (dans le contexte topologique général)

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_{g,v} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{g,v}^+ & \longrightarrow & \mathfrak{Z}_{g,v}^+ \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi_{g,v} & \longrightarrow & \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi_{g,v}) & \longrightarrow & \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi_{g,v}) \longrightarrow 1 \end{array} \quad (24)$$

(la première suite s'envoyant dans la seconde par un isomorphisme de structures d'extensions [avec les identifications]  $\mathfrak{S}_{g,v}^+ = \pi_1(\mathcal{U}_{g,v,C})$  et  $\mathfrak{Z}_{g,v}^+ = \pi_1(\mathcal{M}_{g,v,C})$ ) qui par passage aux complétés profinis donne la suite exacte analogue pour les multiplicités algébriques sur  $C$ .

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,v} & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}_{g,v} & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+ \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow \\ \hat{\pi}_{g,v} & \longrightarrow & \text{Aut}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}) & \longrightarrow & \text{Autext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,v}) & \longrightarrow & 1. \end{array} \quad (25)$$

Cette situation provient d'ailleurs canoniquement d'une situation analogue sur  $\overline{Q_0} =$  clôture algébrique de  $Q$  dans  $C$ , le choix de  $\mathcal{U}_{g,v,C}$  définissant un  $\mathcal{U}_{g,v,\overline{Q_0}}$ , d'où un  $\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q_0}}$ . Pour

## A. GROTHENDIECK

définir un isomorphisme entre cette suite (25) et la suite exacte (21') (munie canoniquement de deux homomorphismes dans (22)) il faut

- 1) choisir un isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$  – l'indétermination est dans  $\text{Gal}(\overline{Q}/Q)$ ; ceci permet d'identifier  $\overline{Q}$  et  $\overline{Q}_0$ ;
- 2) Choisir un isomorphisme (sur  $\overline{Q} = \overline{Q}_0$ ) de  $(\widetilde{\mathcal{U}}_{g,v})_0$  (construit par voie transcendant sur  $C$  et descendu à  $\overline{Q}_0$ ) avec  $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,v,\overline{Q}}$  – l'indétermination est dans  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}})$ . En résumé, on a une classe d'isomorphismes de (21) et (25), définie modulo automorphismes intérieurs dans le groupe profini  $\pi_1(\mathcal{U}_{g,v})$ . Une fois choisi l'isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ , les isomorphismes correspondants transforment la *classe de discrétifications orientée* standard de  $\hat{\pi}_{g,v}$  en exactement une classe de discrétifications orientée de  $\pi$ .

Changeant le choix de l'isomorphisme en son complexe conjugué, on trouve la quasi-discrétification orientée opposée.<sup>8</sup>

On voit d'autre part que l'image de  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}) \subset \pi_1(\mathcal{M}_{g,v})$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  n'est autre que le  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  correspondant à une quelconque des classes de quasi-rigidification discrètes choisies – le sous-groupe ne dépend pas du choix de cette classe – ce qui ne fait qu'exprimer que l'image de  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}})$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , considérée comme sous-groupe de l'image du groupe plus grand  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v})$ , y est invariante – ce qui résulte du fait que  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}})$  est invariant dans  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,Q})$ . Ainsi  $\pi$  est muni canoniquement (non d'une quasi-rigidification discrète orientée, ce qui dépend du choix d'un isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ , i.e. d'un plongement  $\overline{Q} \hookrightarrow C$ ), mais du moins d'un groupe de Teichmüller géométrique strict  $\Sigma \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , à savoir l'image de  $\pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}})$  (isomorphe à [??])<sup>9</sup> Ceci posé, on a un homomorphisme canonique d'extensions de groupes

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & \longrightarrow & \pi_1(\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}) & \longrightarrow & \pi_1(\mathcal{M}_{g,v}) & \longrightarrow & \text{Gal}(\overline{Q}/Q) \longrightarrow 1 \\
 & & \wr \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 1 & \longrightarrow & \Sigma & \longrightarrow & \mathcal{N}_\Sigma & \longrightarrow & \Pi_\Sigma \longrightarrow 1,
 \end{array} \tag{26}$$

où  $\mathcal{N}_\Sigma = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)}(\Sigma)$  et  $\Pi_\Sigma$  est le groupe des automorphismes extérieurs “arithmétiques” de  $\pi$  (muni de  $\Sigma$ ).

Pour le choix d'un isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ , i.e. d'un plongement  $\overline{Q} \hookrightarrow C$ , l'image de la conjugaison complexe de  $\text{Gal}(\overline{Q}_0/Q)$  n'est autre que l'élément d'ordre 2 de  $\Pi_\Sigma$  associé au

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

sous-groupe de Teichmüller géométrique, associé à la quasi-discrétification (orientée, mais peu importe) canonique sur  $\pi$  (définie par  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ ).

La conjecture naturelle ici, c'est que

$$\mathrm{Gal}(\overline{Q}/Q) \longrightarrow \Pi_{\Sigma}(27)$$

du groupe de Galois vers les automorphismes extérieurs arithmétiques de  $(\pi, \Sigma)$  soit un isomorphisme. On peut la compléter par la conjecture, encore plus hardie, que de plus  $\Sigma$  est invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  ( $\Leftrightarrow \Sigma_{g,\nu}$  invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$ ), ce qui signifierait donc que  $\mathcal{N}_{\Sigma} = \hat{\mathfrak{Z}}$ , ou encore que<sup>46</sup>

$$\pi_1(\mathcal{M}_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) = \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi) \quad (28)$$

et  $\mathrm{Gal}(\overline{Q}/Q)$  s'identifierait au quotient "arithmétique" du groupe des automorphismes extérieurs à lacets de  $\pi$ .

Soit maintenant  $U$  une courbe algébrique de type  $g, \nu$  sur  $\overline{Q}$ . Elle est définie par un point de  $\mathcal{M}_{g,\nu,\overline{Q}}$  sur  $\mathrm{Spec} \overline{Q}$ , et comme fibre de  $\mathcal{U}_{g,\nu}$  en ce point. Choisissons un revêtement universel de  $\mathcal{U}$ , d'où un groupe  $\pi(\mathcal{U})$ , canoniquement isomorphe au groupe  $\pi$  ci-dessus, une fois choisi un isomorphisme entre  $\widetilde{\mathcal{U}_{g,\nu}}$  et le revêtement universel de  $\mathcal{U}_{g,\nu}$  déduit de  $\widetilde{\mathcal{U}}$ , ce qui donne une indétermination dans  $\pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu,\overline{Q}}) \simeq \hat{\mathfrak{S}}^+$ . Ainsi, une fois choisi un isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ , on trouve sur  $\pi_1(\mathcal{U})$  une quasi-discrétification orientée [voir <sup>8</sup>] (évidente d'ailleurs à définir directement, par voie transcendante), changée en son opposée par changement de l'isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$  par conjugaison complexe. D'autre part, le sous-groupe  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , correspondant à cette quasi-discrétification (orientée, peu nous chaut) ne dépend pas du choix de l'isomorphisme en question  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ , il est canoniquement associé à  $\pi$  en tant que groupe fondamental d'un  $\mathcal{U}$  sur un corps algébriquement clos (N.B. on pourrait prendre un corps algébriquement clos de caractéristique zéro quelconque, pas la peine que ce soit sur  $\overline{Q}$ , cf. plus bas).

Si la conjecture sur  $\Pi$  est vérifiée, il en résulterait que la donnée d'un groupe profini à lacets  $\pi$  de type  $(g, \nu)$ , muni d'un groupe de Teichmüller géométrique strict  $\Sigma \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  (ce qui peut-être n'est pas une structure supplémentaire du tout –  $\Sigma$  serait uniquement déterminé par  $\pi!$ ) équivaudrait à la donnée d'une extension algébriquement close  $\overline{Q}$  de  $Q$  (dont

---

<sup>46</sup>conjectural!

## A. GROTHENDIECK

le groupe de Galois serait  $\mathcal{N}_\Sigma(\Sigma)/\Sigma = \Pi_\Sigma$ ) et le  $\Pi_0$ -torseur  $\text{Isom}(\overline{Q}, \overline{Q}_0)$  s'identifierait à l'ensemble  $(\subset \text{Isom}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\hat{\mathfrak{Z}}_0^{\pi})$  des quasi-rigidifications *orientées* donnant naissance à  $\pi...$ ) et d'un revêtement universel de  $\mathcal{U}_{g,\nu,\overline{Q}}$  ou simplement d'un revêtement universel  $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,\nu}$  de  $\mathcal{U}_{g,\nu} = \mathcal{U}_{g,\nu,Q}$ .<sup>47</sup> La donnée d'un isomorphisme  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$  revient donc à celle d'une quasi-rigidification orientée sur  $\pi$  compatible avec  $\Sigma$  (condition peut-être automatiquement satisfaite...). Ceci dit, la donnée d'une courbe algébrique de type  $g, \nu$  sur un corps algébriquement clos  $\overline{Q}$ , et d'un revêtement universel de celle-ci reviendrait à la donnée d'une donnée précédente (à savoir un revêtement universel d'un  $\mathcal{M}_{g,\nu}$ , *plus* un point de  $\mathcal{M}_{g,\nu,\overline{Q}}$  sur  $\overline{Q}$  définissant un revêtement universel)<sup>48</sup>, et cette dernière donnée s'identifierait à un germe de scindage dans l'extension

$$1 \longrightarrow \pi_1(\mathcal{M}_{g,\nu,\overline{Q}}) \longrightarrow \pi_1(\mathcal{M}_{g,\nu}) \longrightarrow \pi_1(Q) \longrightarrow 1.$$

L'interprétation profinie (en termes des groupes *extérieurs* à lacets  $\pi$ ) est alors un  $(\pi, \Sigma)$ , et un germe de scindage de

$$1 \longrightarrow \Sigma \longrightarrow \mathcal{N}_\Sigma \longrightarrow \Pi_\Sigma \longrightarrow 1.$$

Si on veut une courbe sur une sous-extension finie  $K'$  de  $\overline{Q}/Q$ , correspondant à un sous-groupe d'indice fini  $\Gamma' \subset \Pi_\Sigma$ , il s'agira d'un scindage partiel  $\Gamma' \longrightarrow \mathcal{N}_\Sigma$ .

Mais sûrement, si cette description des courbes algébriques anabéliennes est pleinement fidèle, elle n'est pas 2-fidèle, i.e. il faut des conditions sur ce scindage, qu'il faudra examiner par la suite.

La description d'une courbe algébrique de type  $g, \nu$  sur un corps fixé, de type fini sur  $Q, K$  quelconque, muni d'une extension algébriquement close  $\overline{K}$  (donc  $\Pi = \text{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \Pi_0 = \text{Gal}(\overline{Q}/Q)$ , où  $\overline{Q}$  est la clôture algébrique de  $Q$  dans  $\overline{K}$ ), en termes de  $\Pi \leftarrow \Pi_0$ , serait la suivante: donnée d'un groupe extérieur à lacets  $\pi$  de type  $g, \nu$ , d'un sous-groupe de Teichmüller  $\Sigma$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , d'un isomorphisme  $\overline{Q} \simeq$  corps défini par cette situation (ayant comme groupe de Galois  $\mathcal{N}_\Sigma/\Sigma$ , de sorte qu'on trouve un isomorphisme  $\Pi_0 \simeq \mathcal{N}_\Sigma/\Sigma$ ), enfin d'un relèvement de  $\Pi \longrightarrow \Pi_0$  (qui décrit une action arithmétiquement extérieure de  $\Pi$  sur  $(\pi, \Sigma)$ ) en une action extérieur  $\Pi \longrightarrow \mathcal{N}_\Sigma$  de  $\Pi$  sur  $(\pi, \Sigma)$  avec des conditions qu'il faudra essayer de dégager (nécessaires et suffisantes conjecturalement) sur ce relèvement.

<sup>47</sup>si on se donne seulement  $\pi$  comme groupe extérieur, avec  $\Sigma$ , ce qui revient à la donnée d'un revêtement universel de  $\mathcal{M}_{g,\nu}$ .

<sup>48</sup>NB. Si on renonce à choisir  $\widetilde{\mathcal{U}}$ , ceci revient à travailler avec les groupes à lacets *extérieurs*.

## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Notons que tout plongement  $\overline{K} \hookrightarrow C$  définit canoniquement sur le groupe extérieur  $\pi = \pi_1(\mathcal{U}_{\overline{K}})$  une quasi-discrétification orientée, remplacée par l'opposée quand on remplace le plongement par le complexe conjugué. Je dis que ces quasi-discrétifications définissent toutes  $\Sigma$  comme groupe des automorphismes et que la quasi-discrétification définie par  $\overline{K} \hookrightarrow C$  ne dépend que de sa restriction en  $\overline{Q} \hookrightarrow C$  – de façon plus précise, c'est celle qu'on définit directement à l'aide de  $\overline{Q} \hookrightarrow C$ , i.e. de  $\overline{Q} \simeq \overline{Q}_0$ . Mais il y a lieu d'examiner aussi la façon d'obtenir des *discrétifications*. Ainsi, si un  $\mathcal{U}$  est défini sur  $\overline{Q}_0$ , [c'est] un  $\pi$  extérieur de type  $(g, \nu)$ , muni d'une quasi-discrétification orientée  $\pi_0^{\natural+}$ , et d'un germe de scindage de

$$1 \longrightarrow \Sigma \longrightarrow \mathcal{N}_{\Sigma} \longrightarrow \Pi_{\Sigma} \longrightarrow 1,$$

où  $\Sigma = \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi, \pi_0^{\natural+})$ , qui fait opérer extérieurement le noyau du groupe défini par  $\Pi_{\Sigma}$  sur  $\pi$ , les points rationnels sur  $\overline{Q}_0$  correspondant aux classes de  $\pi$ -conjugaison des germes de relèvement de cette opération extérieure en une vraie opération. Supposons donc donné un tel point, i.e. on a un sous-groupe ouvert  $\Pi \subset \Pi_{\Sigma}$  qui opère bel et bien sur  $\pi$ , l'opération définie mod automorphismes intérieurs (lui-même unique car  $\pi^{\Gamma} = \{1\}$ !) Dans cette situation, il faudrait définir dans  $\pi \simeq \pi_1(\mathcal{U}_P, P)$  une *discrétification orientée*  $\pi_0 \subset \pi$ , et pas seulement une quasi-discrétification orientée! (Bien sûr, elle doit être dans la classe qu'on s'est donnée d'avance de discrétifications orientées, qu'on avait justement notée  $\pi_0^{\natural+}$ . On y reviendra – ainsi qu'à la situation analogue sur un corps de base  $K$  de type quelconque...)

Je réfère au début du § suivant (§27) pour le changement de terminologie, la “quasi-discrétification” devenant une “prédiscrétification”. Mais il y a lieu d'introduire aussi une notion plus fine, correspondant au cas d'un  $\pi_1$  (profini) d'une variété algébrique  $X$  définie sur un corps algébriquement clos  $\overline{K}$ , quand on plonge  $\overline{K}$  dans  $C$ : il y a une discrétification mod automorphismes intérieurs – on l'appellera une *prédiscrétification stricte*. Dans le cas d'un  $\pi$  à lacets, l'espace homogène sous  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  de celles-ci s'identifie à

$$\text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi) / (\hat{\pi}_{g,\nu} \cdot \mathfrak{Z}_{g,\nu}) \simeq \text{Isomext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi) / \mathfrak{Z}_{g,\nu},$$

et cette action également ne dépend que du groupe profini à lacets extérieur défini par  $\pi_{g,\nu}$ , et équivaut à celle d'une “base extérieure” de  $\pi$  mod action de  $\mathfrak{Z}_{g,\nu}$ , i.e. d'un isomorphisme de  $\pi$  avec le  $\hat{\pi}_{g,\nu}$  “type”, mod action de  $\mathfrak{Z}_{g,\nu}$ . L'application

$$\text{Bases extérieures de } \pi \longrightarrow \text{Prédiscrétifications de } (\pi)$$

## A. GROTHENDIECK

fait donc du membre de gauche un toseur relatif à droite sur celui de droite, de groupe  $\mathfrak{Z}_{g,v}$ .

Une prédiscrétification de  $(\pi, \Sigma)$  correspond à un choix d'un isomorphisme de la clôture algébrique  $\overline{Q}_{(\pi, \Sigma)} = \overline{Q}$  associé à  $(\pi, \Sigma)$ , avec  $\overline{Q}_0$ . Quand on se donne  $(\pi, \Sigma)$  comme correspondant à une courbe algébrique sur  $\overline{Q}$ , i.e. qu'on se donne un germe de relèvement de  $\Pi_\Sigma$  dans  $\mathcal{N}_\Sigma \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , i.e. un germe d'actions extérieures de  $\Pi_\Sigma$  sur  $\pi$ , toute prédiscrétification doit donner naissance à une discrétification stricte et même à une discrétification quand on remonte un germe d'action ("admissible") de  $\Pi_\Sigma$  sur  $\pi$ ...



## § 27. — CHANGEMENT DE TYPE $(g, \nu)$ : a) BOUCHAGE DE TROUS

---

Je vais changer de terminologie, en appelant prédiscrétification ce que j’avais appelé (un peu péjorativement!) quasi-discrétification. En effet, on prévoit qu’une prédiscrétification – compatible avec  $\Sigma$  – qui revient moralement au plongement (modulo la conjugaison complexe) dans  $C$  de la clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$  canoniquement associé à  $(\pi, \Sigma(\subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)))$ , donne naissance, dès que l’action extérieure arithmétique de  $\Pi_\Sigma = \mathcal{N}_\Sigma/\Sigma$  sur  $\pi$  est relevée en un germe d’action sur  $\pi$ , à une vraie discrétification de  $\pi$ . Itou pour les prédiscrétifications orientées. Le groupe  $\mathcal{N}_\Sigma/\Sigma$  mérite aussi un nom – je vais l’appeler le *groupe de Teichmüller arithmétique* associé à  $(\pi, \Sigma)^{49}$ , et ses éléments seront appelés les automorphismes arithmétiquement extérieurs de  $\pi$  – déduits d’un automorphisme extérieur (normalisant  $\Sigma$ ) en négligeant les automorphismes extérieurs “géométriques” (i.e. justement ceux dans  $\Sigma$ ) – comme les automorphismes extérieurs ordinaires étaient décrits en négligeant les automorphismes intérieurs de  $\pi$ . On fera attention que le caractère “multiplicateur”

$$\chi : \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \longrightarrow \hat{Z}^*$$

est trivial sur  $\Sigma$ , par construction de  $\Sigma$ , et passe à  $\Pi_\Sigma$ :

$$\chi_\Sigma : \Pi_\Sigma \longrightarrow \hat{Z}^*.$$

Bien sûr, ce caractère s’appellera encore “multiplicateur”, ou “caractère cyclotomique”. Si notre conjecture fondamentale est vraie<sup>1</sup>, ce caractère identifie  $(\Pi_\Sigma)_{\text{ab}}$  à  $\hat{Z}^*$ . Par contre, si

---

<sup>49</sup>moralement,  $\Sigma = \hat{\mathfrak{Z}}^+$ , mais il n’y a pas de  $\hat{\mathfrak{Z}}^!$

## A. GROTHENDIECK

$I = I(\pi)$ , l'homomorphisme canonique

$$\hat{\mathfrak{Z}} \longrightarrow \mathfrak{S}_I$$

n'est pas trivial sur  $\Sigma$ , mais induit un homomorphisme surjectif:

$$\Sigma \longrightarrow \mathfrak{S}_I,$$

d'où un sous-groupe  $\Sigma^!$  tel que

$$\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_I.^{50}$$

On voit de suite que tout  $\gamma \in \hat{\mathfrak{Z}}$  qui normalise  $\Sigma$  normalise  $\Sigma^! = \Sigma \cap \hat{\mathfrak{Z}}^!$ , d'où  $\Sigma^!$  est aussi invariant dans  $\mathcal{N}_\Sigma$ . Soit  $\mathcal{N}_\Sigma^! = \mathcal{N}_\Sigma \cap \hat{\mathfrak{Z}}^!$ , on a un diagramme cartésien de sous-groupes de  $\hat{\mathfrak{Z}}$ :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}^! & \xhookrightarrow{\mathfrak{S}_I} & \mathcal{N} \\ \Pi_\Sigma \uparrow & & \uparrow \Pi_\Sigma \\ \Sigma^! & \xhookrightarrow{\mathfrak{S}_I} & \Sigma \end{array}$$

donnant un homomorphisme injectif  $\mathcal{N}/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^! \times \mathcal{N}/\Sigma$  (ici  $\mathcal{N}/\mathcal{N}^! = \mathfrak{S}_I$ ,  $\mathcal{N}/\Sigma = \Pi_\Sigma$  et  $\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^! \simeq \mathfrak{S}_I$ ), dont on voit de suite qu'il est bijectif

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^! \times \mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathfrak{S}_I \times \Pi_\Sigma,$$

et on a par suite aussi

$$\mathcal{N}^!/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\Sigma = \Pi_\Sigma,$$

i.e. le groupe  $\Pi_\Sigma$  des automorphismes arithmétiquement extérieurs de  $(\pi, \Sigma)$  peut se décrire aussi via les automorphismes extérieurs induisant l'identité sur  $I$ .

Dans le cas  $(g, \nu) = (0, 3)$ , on a  $\Sigma^! = \{1\}$ , donc  $\Sigma \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3$ .  $\mathcal{N}$  est le normalisateur de  $\mathfrak{S}_3$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}$ ,  $\mathcal{N}^! \xrightarrow{\sim} \Pi_\Sigma$  est son centralisateur, et  $\mathcal{N}$  s'identifie au produit direct des deux.

Soit maintenant  $I' \subset I$ ,  $\nu' = \text{card}(I')$ , et considérons le groupe extérieur  $\pi'$  déduit de  $\pi$  par “bouchage de trous” en  $I \setminus I'$ , d'où un homomorphisme

$$\pi \longrightarrow \pi'.$$

---

<sup>50</sup> moralement,  $\Sigma^! \simeq \hat{\mathfrak{Z}}^{I+}$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Considérons les bases de  $\pi$  pour lesquelles, les  $\nu'$  premiers  $l_i$  soient dans des groupes à lacets  $L_{i'}$  ( $i' \in I'$ ) – on les appelle adaptées à  $I'$ ; elles forment un toreur  $\subset \text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$  sous le sous-groupe  $\hat{\mathfrak{S}}_{g;(\nu,\nu')}$  de  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu} = \text{Aut}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu})$ , formé des  $u \in \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$  dont l'image dans  $\mathfrak{S}_I$  invarie l'ensemble des  $\nu'$  premiers éléments (ou encore l'ensemble complémentaire des  $\nu - \nu'$  derniers).

Pour une telle base, on trouve une base correspondante de  $\pi'$ . La donnée de  $(\pi, I')$  équivaut à celle d'un toreur sous  $\hat{\mathfrak{S}}_{g;(\nu,\nu')}$ , celle d'un  $\pi'$  à la donnée d'un toreur sous  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu'}$ , et le passage de  $\pi$  à  $\pi'$  est décrit par le changement de groupe d'opérateurs

$$\hat{\mathfrak{S}}_{g;(\nu,\nu')} \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu'}.^{51}$$


Cet homomorphisme envoie  $\hat{\mathfrak{S}}_{g;(\nu,\nu')}$  dans  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu'}$ , et même  $\mathfrak{S}_{g;(\nu,\nu')}$  dans  $\mathfrak{S}_{g,\nu'}$ , aussi  $\pi$  dans  $\pi'$ . Il s'ensuit que toute prédiscrétification de  $\pi$  en définit une de  $\pi'$ , de même pour les prédiscrétifications strictes, discrétifications, bases extérieures “adaptées à  $I'$ ”. Enfin, si on a une “préarithmétisation”<sup>2</sup> de  $\pi$ , i.e. un  $\Sigma \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , en déduit-on une préarithmétisation de  $\pi'$  – i.e. (par exemple) si deux prédiscrétifications de  $\pi$  sont compatibles i.e. ont le même groupe  $\Sigma \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  d'automorphismes extérieurs, en est-il de même de leurs images?

Pour y voir plus clair, on va écrire sous forme de diagramme les ensembles remarquables associés à  $\pi$ , et ceci de deux façons, l'une sans utiliser de structure particulière sur  $I = I(\pi)$ , l'autre en utilisant un ordre total, ce qui permet, dans le toreur  $\text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$  sous  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ , de définir le sous-toreur sous  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^!$  qu'on peut noter  $\text{Isom}_{\text{lac}}^!(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ .

---

<sup>51</sup>D'où aussi: toute base, toute discrétification, discrétification orientée de  $\pi$  en définit une de  $\pi'$ , itou pour les classes de  $\pi, \pi'$  conjugaison i.e. pour les prédiscrétifications (éventuellement orientées) strictes, et aussi pour les adhérences des classes i.e. pour les prédiscrétifications et prédiscrétifications orientées. Il n'y a que le cas des arithmétisations qui demande une analyse plus fine.

# A. GROTHENDIECK



N.B. On pose

$$\Pi_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu} / \Sigma_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu}^! / \Sigma_{g,\nu}^!$$

(où  $\Sigma_{g,\nu} = \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+$ ,  $\Sigma_{g,\nu}^! = \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^{!+}$ ). On peut aussi le décrire comme le groupe  $\Pi_\Sigma$  associé à un groupe extérieur profini à lacets  $\pi$  muni d'une prédiscrétification orientée  $\alpha$  (sans plus). Si on a deux tels couples  $(\pi, \alpha)$ ,  $(\pi', \alpha')$ , d'où  $\Pi_\Sigma$  et  $\Pi_{\Sigma'}$  ( $\Sigma = \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi, \alpha)$ ,  $\Sigma' = \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi', \alpha')$ ), on trouve en effet un isomorphisme *canonique*:

$$\Pi_\Sigma \xrightarrow{\sim} \Pi_{\Sigma'}$$

en prenant n'importe quel isomorphisme extérieur à lacets  $u$  de  $\pi$  avec  $\pi'$  transformant  $\alpha$  en  $\alpha'$  et l'isomorphisme associé  $\Pi_\Sigma \longrightarrow \Pi_{\Sigma'}$  ne dépend évidemment pas du choix de  $u$ .

Ceci posé, les couples  $(\pi, \Sigma)$  d'un groupe profini à lacets de type  $(g, \nu)$ , muni d'une préarithmétisation, avec comme morphismes les isomorphismes arithmétiquement extérieurs (relatifs à  $\Sigma$  et  $\Sigma'$ ...), forment un groupoïde connexe  $\Pi_{g,\nu}$ , ayant un objet "origine" défini à isomorphisme unique près comme étant  $(\hat{\pi}_{g,\nu}, \Sigma_{g,\nu})$ , où au choix n'importe quel  $(\pi, \Sigma_\alpha)$  provenant d'un  $(\pi, \alpha)$  ( $\alpha$  une prédiscrétification orientée de  $\pi$ ), et dont le groupe des automorphismes est justement  $\Pi_{g,\nu}$ .

On constate qu'à l'exception des deux espaces homogènes (sous  $\hat{\mathfrak{E}}(\pi)$ , mais pas nécessairement sous  $\hat{\mathfrak{E}}(\pi, I')$ , voire sous  $\hat{\mathfrak{E}}^!(\pi)$ ) Bases( $\pi$ ) et Bases ext( $\pi$ ), les quatre autres sont en fait des espaces homogènes sous  $\hat{\mathfrak{E}}^!$ , et s'expriment comme quotients du  $\hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu}^!$ -torseur  $\text{Isom}^!(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ , par les quatre sous-groupes  $\mathfrak{S}_{g,\nu}^!$ ,  $\mathfrak{S}_{g,\nu}^! \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}$ ,  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^!$ ,  $\mathcal{M}_{g,\nu}^!$  (ce dernier défini comme image inverse de  $\mathcal{N}_{g,\nu}^!$  dans  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^!$ , tout comme  $\mathcal{M}_{g,\nu}$  est défini comme image inverse de  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ ). On trouve d'autre part, si  $I' = \{i_0, \dots, i_{\nu'-1}\}$ , un homomorphisme  $\hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu}^! \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu'}^!$ , envoyant  $\mathfrak{S}_{g,\nu}^!$  dans  $\mathfrak{S}_{g,\nu'}^!$ , en envoyant  $\pi_{g,\nu}$  dans  $\pi_{g,\nu'}$ , donc  $\hat{\pi}_{g,\nu}$  dans  $\hat{\pi}_{g,\nu'}$ ,  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^!$  dans  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu'}^!$ , et le sous-groupe  $\mathfrak{S}_{g,\nu}^! \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}$  de  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^!$  dans le sous-groupe  $\mathfrak{S}_{g,\nu'}^! \cdot \hat{\pi}_{g,\nu'}$  de  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu'}^!$ . Enfin, comme  $\Sigma_{g,\nu}^!$  s'envoie dans  $\Sigma_{g,\nu'}^!$ ,  $\mathcal{N}_{g,\nu}^!$  s'envoie dans le normalisateur de  $\Sigma_{g,\nu'}^!$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu'}^!$ , je dis que ce n'est autre que  $\mathcal{N}_{g,\nu'}^!$ . Changeant de notation, ceci revient au

Lemme<sup>52</sup>. —  $\mathcal{N}_\Sigma^! = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}^!}(\Sigma^!) (= \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}^!}(\Sigma^!) \cap \hat{\mathfrak{Z}}^!)$ .

<sup>52</sup> pas prouvé

## A. GROTHENDIECK

Evidemment on a  $\mathcal{N}_\Sigma^! \subset \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}}(\Sigma^!) \cap \hat{\mathfrak{Z}}^!$ ; inversement soit  $g \in \hat{\mathfrak{Z}}^!$  qui normalise  $\Sigma^!$ , montrons qu'il normalise  $\Sigma$ , i.e. qu'il est  $\in \mathcal{N}$  (donc  $\in \mathcal{N}^! = \mathcal{N} \cap \hat{\mathfrak{Z}}^!$ )....

C'est pas clair. J'ai pourtant envie de prouver la

Conjecture. — *L'application canonique*

$$\text{Prédiscrét}^+(\pi) \longrightarrow \text{Prédiscrét}^+(\pi')$$

*est bijective. Pour que deux prédiscrétifications orientées  $\alpha, \beta$  de  $\pi$  aient même groupe d'automorphismes extérieurs  $\Sigma_\alpha = \Sigma_\beta$ , il faut qu'il en soit ainsi pour leurs images  $\Sigma_{\alpha'}$  et  $\Sigma_{\beta'}$ , i.e. que  $\Sigma_{\alpha'} = \Sigma_{\beta'}$ , de sorte que la bijection précédente induit une bijection*

$$\text{Préarithmétisation}(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Préarithmétisation}(\pi').$$

*Enfin, les bijections précédentes sont compatibles avec l'homomorphisme des groupes d'opérateurs  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi, I') \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi')^4$ , a fortiori avec  $\hat{\mathfrak{Z}}^!(\pi) \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}^!(\pi')$ , ce qui implique qu'elle induit (pour une préarithmétisation  $\Sigma \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  donnée de  $\pi$ , donnant  $\Sigma' \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi')$  dans  $\pi'$  avec  $\Sigma^! \longrightarrow \Sigma'^!$ )<sup>5</sup> un homomorphisme  $\mathcal{N}_\Sigma^! \longrightarrow \mathcal{N}_{\Sigma'}^!$ , et l'homomorphisme correspondant*

$$\Pi_\Sigma = \mathcal{N}_\Sigma^! / \Sigma^! \longrightarrow \Pi_{\Sigma'} = \mathcal{N}_{\Sigma'}^! / \Sigma'^!$$

*est un isomorphisme.*

Pour s'en convaincre il suffit de regarder le cas où  $I' = \{i\}$  (et si on note  $\pi = \pi_{g,v}$ ,  $I'$  réduit au dernier élément de  $I$ ). On a alors un homomorphisme

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi, i) \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}(\pi')^6$$

(les automorphismes extérieurs à lacets de  $\pi$  fixant  $i$  définissent des automorphismes bien déterminés de  $\pi'$  – pas seulement extérieurs, i.e.  $\hat{\mathfrak{E}}(\pi, i) \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}(\pi')$  est trivial sur  $\pi$ , et passe donc au quotient en  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi, i) \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}(\pi, i)$ ).

J'admets, en analogie avec le cas discret, que cet homomorphisme est un *isomorphisme*, de sorte qu'on a une suite exacte<sup>53</sup>

$$1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi, i) \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}(\pi, i) \longrightarrow 1$$

---

<sup>53</sup>rappelons qu'on suppose  $\pi$  anabélien, i.e.  $2g + v \geq 3$

ou encore

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g;(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

qui contient la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_{g,\nu-1} \longrightarrow \mathfrak{Z}_{g;(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \mathfrak{S}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

comme sous-suite exacte. Il est commode de travailler plutôt avec

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \mathfrak{Z}_{g,\nu}^{!+} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{g,\nu-1}^{!+} \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^{!+} & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}^{!+} \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^! & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}^! \longrightarrow 1. \end{array}$$

L'application  $\text{Prédiscrét}^+(\pi) \longrightarrow \text{Prédiscrét}^+(\pi')$  s'identifie alors à  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^! / \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^{!+}$ , on lit sur le diagramme que c'est  $\simeq \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}^! / \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}^{!+}$ , d'où la bijectivité sur les ensembles de prédiscrétifications orientées.

Dans le groupe  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^! = \mathfrak{Z}$ , on a un sous-groupe invariant  $\hat{\pi}_{g,\nu-1} = \pi'$ , et un sous-groupe  $\Sigma (= \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^{!+})$  entre  $\pi'$  et  $\mathfrak{Z}$ , donnant un sous-groupe  $\Sigma' \simeq \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}^{!+}$  dans  $\mathfrak{Z}' = \mathfrak{Z}/\pi' (\simeq \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}^!)$ , et on sait bien qu'alors  $\mathfrak{Z}/\Sigma \simeq \mathfrak{Z}'/\Sigma'$ , et que le normalisateur  $\mathcal{N}$  de  $\Sigma$  dans  $\mathfrak{Z}$  est l'image inverse du normalisateur  $\mathcal{N}'$  de  $\Sigma'$  dans  $\mathfrak{Z}'$ , de sorte que  $\mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathcal{N}'/\Sigma'$ , ce qui prouve ce qu'on voulait.

Corollaire. — *On a des isomorphismes canoniques:*

$$\Pi_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \Pi_{g,\nu-1} \xrightarrow{\sim} \dots$$

de sorte que si  $g \geq 2$ , on a canoniquement  $\Pi_{g,\nu} \simeq \Pi_{g,0}$ ; d'autre part  $\Pi_{1,\nu} \simeq \Pi_{1,1}$  ( $g = 1, \nu \geq 1$ ),  $\Pi_{0,\nu} \simeq \Pi_{0,3}$  ( $\nu \geq 3$ ).<sup>54</sup>

NB. Le “fait” admis est loin d'être évident – même que  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g;(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu-1}$  soit surjectif ou que  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g;(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}$  soit injectif, est loin d'être évident, et est peut-être tout à fait faux! Le fait admis revient à un énoncé d'existence d'un foncteur en sens inverse “forage de trous” qui en tout état de cause reste incompris.

<sup>54</sup>On voit aussi que  $\Sigma$  invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}$  équivaut à  $\Sigma'$  invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}'$ .

## § 28. — CHANGEMENT DE TYPE $(g, \nu)$ (SUITE): PASSAGE À UN REVÊTEMENT FINI

---

Soit  $\pi$  un groupe profini à lacets de type  $(g, \nu)$ , anabélien comme toujours,  $\pi'$  un sous-groupe d'indice fini. On sait (ou on vérifie, par passage au cas discret) que muni des traces sous  $\pi$  des sous-groupes à lacets de  $\pi$ ,  $\pi'$  est un groupe à lacets. Ses sous-groupes à lacets sont aussi les sous-groupes  $L'$  tels que

a)  $L' = \text{Centr}_{\pi}(L') \cap \pi'$

b)  $L = \text{Centr}_{\pi}(L')$  est un sous-groupe à lacets dans  $\pi$ .

On pose  $d(L') = [L : L']$ , et on a ainsi une fonction  $d : I' = I(\pi') \longrightarrow N^*$ , et une application  $I' \xrightarrow{\varphi} I$ , telles que  $\forall i \in I$ , on ait:

$$\sum_{\substack{i' \in I' \\ i' \text{ au dessus de } i}} d(i') = n \quad (\text{où } n = [\pi : \pi']). \quad (1)$$

On aura la formule de Hurwitz

$$2g' - 2 = n(2g - 2) + \sum_{i' \in I'} (d(i') - 1), \quad (2)$$

où la somme à droite est égale à  $(n \text{ card}(I) - \text{card}(I'))$ , i.e.

$$2g' - 2 + \text{card}(I') = n(2g - 2 + \text{card}(I)). \quad (3)$$



(NB.  $2g - 2 + \text{card}(I)$  est l'opposé de la caractéristique d'Euler-Poincaré à supports compacts de la courbe dont  $\pi$  est le groupe fondamental...).<sup>55</sup>

De façon évidente, toute discrétification de  $\pi$  en définit une de  $\pi'$  – et il en est de même pour les discrétifications orientées, modulo un peu de cohomologie, ce qui revient à dire, dans le cas discret par exemple, que  $T \simeq H_1^2(\mathcal{U}, Z) \longrightarrow H_1^2(\mathcal{U}', Z) \simeq T'$  peut s'écrire sous la forme  $n\theta^{-1}$ , où  $\theta$  est un isomorphisme bien déterminé (l'isomorphisme trace)  $T' \xrightarrow{\sim} T$ .

Il n'est pas clair pour moi à première vue si l'application

$$\text{Discrét}(\pi) \longrightarrow \text{Discrét}(\pi')$$

est surjective, ou injective. L'injectivité pour tout  $\pi'$  d'indice fini dans  $\pi$  signifierait que deux discrétifications  $\pi_0, \pi'_0$  de  $\pi$  qui sont commensurables, i.e. telles que  $\pi_0 \cap \pi'_0$  soit d'indice fini dans  $\pi_0$  et dans  $\pi'_0$ , sont égales.

Supposons que  $\pi'$  soit un sous-groupe invariant dans  $\pi$ , et posons  $G = \pi/\pi'$ .

*Conjecture.* — *L'application  $\text{Discrét}(\pi) \longrightarrow \text{Discrét}(\pi')$  est injective, et son image est formée des discrétifications  $\pi'_0 \subset \pi'$  telles que  $G \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi') \simeq \text{Autext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}'_0) \simeq \hat{\mathfrak{Z}}(\hat{\pi}'_0)$  se factorise par  $\mathfrak{Z}(\pi'_0) = \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi'_0)$  (et en fait, même par  $\mathfrak{Z}(\pi'_0)^+$ ). En d'autres termes,  $\forall g \in \pi, \exists h \in \pi'$  tel que  $\text{Int}(hg)(\pi'_0) \subset \pi'_0$ , i.e.  $\pi' \cdot \pi_0 = \pi$ , où  $\pi_0$  est le normalisateur de  $\pi'_0$  dans  $\pi$ .*

La condition pour qu'un  $\pi'_0$  soit dans l'image est évidemment nécessaire. Montrons qu'elle est suffisante, et que le  $\pi_0$  donnant naissance à  $\pi'_0$  par  $\pi_0 \cap \pi'$  est unique. On a une action extérieure de  $G$  sur  $\pi'_0$ , qui définit l'action extérieure sur  $\hat{\pi}'_0 \simeq \pi'$ , or  $\pi$  se récupère canoniquement à partir de cette dernière (car  $\text{Centre}(\hat{\pi}') = 1$ ), et on voit que c'est le complété profini de l'extension  $\pi_0$  de  $G$  par  $\pi'_0$ , définie par l'action extérieure de  $G$  sur  $\pi'_0$ . On a donc bien une discrétification généralisée  $\pi_0$  de  $\pi$ , au sens de la seule structure de groupe profini, et elle induit  $\pi'_0$  – mais il faut voir qu'elle est compatible avec la structure à lacets de  $\pi$ . Mais celle-ci s'explicite, à partir de la structure à lacets de  $\pi'$ , en prenant les sous-groupes à lacets  $L'$  de  $\pi'$ , et leurs centralisateurs dans  $\pi$ . Faisant itou pour  $\pi_0 \supset \pi'_0$ , on devrait trouver une structure à lacets sur  $\pi_0$ , donnant lieu aux mêmes  $d_i$ . J'ai l'impression que ça ne doit pas être

<sup>55</sup>NB. Dire qu'on est dans le cas anabélien signifie que  $-\text{EP}_1$  [i.e. l'opposé de la caractéristique d'Euler-Poincaré à support compact] est  $\geq 1$ , et cette relation est donc conservée par passage à un revêtement. L'entier  $-\text{EP}_1$  mesure par sa positivité stricte le degré d'anabélianité en quelque sorte..

## A. GROTHENDIECK

très vache à prouver – ce serait comme si on savait déjà que toute extension “sans torsion” d’un groupe fini par un groupe à lacets est de façon canonique un groupe à lacets...

Corollaire. — *En tout cas, l’application*

$$\text{Discrét}(\pi) \longrightarrow \text{Discrét}(\pi')$$

*est injective.*

N.B. Elle ne doit pas toujours être bijective, car il doit y avoir une action extérieure d’un  $G$  sur un  $\hat{\pi}'_0$ , i.e. un homomorphisme  $G \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\hat{\pi}'_0)$ , qui ne se factorise pas par  $\mathfrak{Z}(\pi'_0)$ , et qui pourtant est aussi bonne du point de vue groupe profini que celles provenant d’un  $\pi$  et d’un sous-groupe invariant  $\pi'$ . En fait, partons d’une telle situation *discrète*  $\pi_0 \supset \pi'_0$ , d’où  $G = \pi_0/\pi'_0$  et  $G \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi'_0) = \mathfrak{Z}(\pi'_0) \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\hat{\pi}'_0)$ , et *conjuguons*  $G$  par un élément  $\gamma$  de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$ , de façon à trouver  $G \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\hat{\pi}'_0)$  qui ne se factorise pas par  $\mathfrak{Z}(\pi'_0)$ . On trouve une extension  $\pi^\natural$  de  $G$  par  $\hat{\pi}'_0$ , *isomorphe* à  $\hat{\pi}_0$  (en tant qu’extension de  $G$  par  $\hat{\pi}'_0$ ), donc la structure à lacets de  $\hat{\pi}'_0$  en définit une sur  $\pi^\natural$  (de façon à être induite par cette dernière), mais pourtant la discrétification choisie  $\pi_0$  de  $\hat{\pi}_0$  n’est pas induite par une de  $\pi$ . Pour faire la construction, il suffit de trouver un élément  $\gamma \in \hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$  tel que  $\text{Int}(\gamma) \cdot G \not\subset \mathfrak{Z}$  i.e. tel que  $G$  ne stabilise pas  $\gamma^{-1}(\pi'_0) \subset \hat{\pi}'_0$ . Un tel  $\gamma$  existe toujours...

Bien sûr, il n’y a pas de raison, pour deux discrétifications  $\pi_0, \pi_1$  de  $\pi$ , que si  $\pi_0, \pi_1$  sont  $\pi$ -conjugués (i.e. définissent la même prédiscrétification stricte de  $\pi$ ), il en soit de même pour  $\pi'_0$  et  $\pi'_1$  pour l’action intérieure de  $\pi'$  (il faudrait que  $\pi_0, \pi_1$  soient conjugués par  $\pi'$ , et pas seulement par  $\pi$ ). Par contre, je présume que si  $\pi_0, \pi_1$  sont “adhérents” l’un à l’autre dans l’espace des discrétifications de  $\pi$ , i.e. s’ils définissent une même prédiscrétification, il en est de même pour  $\pi'_0, \pi'_1$ , et que l’application

$$\text{Prédiscrét}(\pi) \longrightarrow \text{Prédiscrét}(\pi')(4)$$

qu’on obtient ainsi, est encore bijective, et qu’elle passe à son tour au quotient, pour définir une application bijective

$$\text{Préarith}(\pi) \longrightarrow \text{Préarith}(\pi'), (5)$$

et que si  $\Sigma, \Sigma'$  se correspondent par cette dernière, on a un isomorphisme canonique

$$\Pi_\Sigma \longrightarrow \Pi_{\Sigma'}, (6)$$

compatible avec les actions de ces groupes sur l'ensemble  $P_\Sigma$  des prédiscrétifications de  $\pi$  compatibles à  $\Sigma$ , et l'ensemble  $P_{\Sigma'}$  des prédiscrétifications de  $\pi'$  compatibles à  $\Sigma'$  (qui sont respectivement des torseurs à gauche sous  $\Pi_\Sigma, \Pi_{\Sigma'}$ ). En même temps, on trouvera donc que  $\Sigma$  est unique pour  $\pi$ , i.e. invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , si et seulement si  $\Sigma'$  est unique dans  $\pi'$ , i.e. invariant dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi')$ .

En tout cas, la conjecture fondamentale qui interprète les  $\Pi_{g,v}$  comme  $\Pi_0 = \text{Gal}(\overline{Q_0}/Q)$  aurait au moins comme conséquence que l'application  $\text{Discrét}^+(\pi) \longrightarrow \text{Discrét}^+(\pi')$  passe au quotient de deux façons, pour donner un diagramme commutatif:

$$\begin{array}{ccc} \text{Discrét}^+(\pi) & \longrightarrow & \text{Discrét}^+(\pi') \\ \downarrow & & \downarrow \\ P = \text{Prédiscrét}^+(\pi) & \longrightarrow & P' = \text{Prédiscrét}^+(\pi') \\ \downarrow & & \downarrow \\ A = \text{Arithm}(\pi) & \longrightarrow & A' = \text{Arithm}(\pi') \end{array}$$

et que le carré inférieur est cartésien (sans préjuger de l'injectivité ou de la bijectivité de l'application  $A \longrightarrow A'$ ). Donc il faudrait que si  $\pi_0, \pi_1$  sont deux discrétifications orientées de  $\pi$ , qui définissent la même prédiscrétification (orientée), alors il en soit de même pour leurs traces sur  $\pi', \pi'_0$  et  $\pi'_1$ , relativement à  $\pi'$ . Mais déjà si  $\pi_0$  et  $\pi_1$  sont  $\pi$ -conjugués (i.e. définissent la même discrétification orientée, *stricte*), ce n'est pas tellement clair – mais si, car on aura  $\pi = \pi' \cdot \pi_0$  donc si  $\pi_1 = \text{int}(u) \pi_0$ , écrivant  $u = u' u_0$  avec  $u' \in \pi', u_0 \in \pi_0$ , on aura  $\pi_1 = \text{int}(u') \text{int}(u_0) \pi_0 = \text{int}(u') \pi_0$ , donc  $\pi'_1 = \text{int}(u') \pi'_0$  donc  $\pi'_0$  et  $\pi'_1$  sont conjugus. Tâchons de procéder de même dans le cas général d'un  $u \in \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)^+$  tel que  $\pi_1 = u(\pi_0)$ , en écrivant si possible  $u = u' u_0$ , avec  $u' \in \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0, \pi'_0)^+$ , et  $u_0 \in \mathfrak{S}(\pi_0)^+$ , où on définit  $\mathfrak{S}(\pi_0, \pi'_0)^+$  comme le groupe des automorphismes discrets de  $\pi_0$  qui *stabilisent*  $\pi'_0$ , et  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0, \pi'_0)^+$  est son compactifié profini. On aurait alors  $\pi_1 = u'(u_0(\pi_0)) = \dot{u}'(\pi_0)$ , où  $\dot{u}'$  désigne l'image de  $u'$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$ . En tous cas, il n'y a aucun problème si  $\pi'$  est un sous-groupe *caractéristique* de  $\pi$ , car alors on a un homomorphisme discret  $\mathfrak{S}(\pi_0) \longrightarrow \mathfrak{S}(\pi'_0)$ , définissant l'homomorphisme  $\hat{\mathfrak{S}}(\hat{\pi}_0) \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\hat{\pi}'_0)$ . Comme les sous-groupes ouverts caractéristiques de  $\pi$  sont cofinaux, on est ramené (pour les questions de factorisabilité de  $D(\pi) \longrightarrow D(\pi')$  en  $P(\pi) \longrightarrow P(\pi')$  et  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  et de bijectivité des applications  $P(\pi) \longrightarrow P(\pi')$  et  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$ ) au cas où  $\pi'$  est un sous-groupe *caractéristique*. On a alors factorisabilité de  $D(\pi) \longrightarrow D(\pi')$  en  $P(\pi) \longrightarrow P(\pi')$ . Montrons que cette application est injective... Cela signifie (a) que

## A. GROTHENDIECK

l'image inverse dans  $\hat{\mathfrak{S}}(\hat{\pi}_0)$  de  $\hat{\mathfrak{S}}(\hat{\pi}'_0)^+$  est  $\hat{\mathfrak{S}}(\hat{\pi}_0)^+$ , la surjectivité signifie (b) que tout élément de  $\hat{\mathfrak{S}}(\hat{\pi}'_0)$  est congru mod  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)^+$  à un élément de l'image de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)$ . La factorisabilité en  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  signifie que (c) par l'application précédente  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \hookrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$ , (NB. il est immédiat que c'est injectif) envoie  $\mathcal{M}(\pi_0) = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)}(\hat{\mathfrak{S}}^+(\pi_0))$  dans  $\mathcal{M}(\pi'_0)$ , l'injectivité de  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  que (d) l'on a même que  $\mathcal{M}(\pi)$  est exactement l'image inverse de  $\mathcal{M}(\pi')$ , la surjectivité de  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  que (e) tout élément de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$  est congru mod  $\mathcal{M}(\pi'_0)$  à un élément de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)$  (c'est plus faible que (b)) – et ces conditions réunies impliquent que l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{M}(\pi_0)/\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) = \Pi_{\pi_0} \longrightarrow \Pi_{\pi'_0} = \mathcal{M}(\pi'_0)/\hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$$

est un isomorphisme – il suffit même pour ceci d'avoir (c) (pour pouvoir définir cette application) et (a) (pour son injectivité), et (b) et le renforcement (d) de (c) (pour sa surjectivité). Donc on voit que tout est suspendu aux propriétés des homomorphismes d'inclusions de groupes:

$$\begin{array}{ccccc} \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi_0) & \hookrightarrow & \mathcal{M}(\pi_0) & \hookrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \\ \downarrow & & \downarrow? & & \downarrow \\ \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi'_0) & \hookrightarrow & \mathcal{M}(\pi'_0) & \hookrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0) \end{array} \quad (7)$$

à charge de prouver (a) et (b) (qui ne concernent que le carré composé) et (c).

Peut-être les propriétés (a), (b) et (c) sont-elles tout à fait fausses – pourtant (a) (qui correspond à l'injectivité de  $P(\pi) \longrightarrow P(\pi')$ ) semble assez plausible. La propriété (b) (qui exprimerait la surjectivité de  $P(\pi) \longrightarrow P(\pi')$ ) est beaucoup plus problématique, voir fausse. L'ennui, c'est que le groupe  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)$  peut être “beaucoup plus petit” que  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$ , on s'en rend compte en passant au quotient par le sous-groupe  $\hat{\pi}'_0 = \pi'$  (contenu dans le plus petit des groupes de (7), et invariant dans le plus grand), on trouve sur la deuxième ligne les groupes  $\hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi'_0)$ ,  $\mathcal{N}(\pi'_0)$  et  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$ , sur la première des extensions des groupes correspondants pour  $\pi_0$  ( $\hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi_0)$ ,  $\mathcal{N}(\pi_0)$  et  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)$ ) par le groupe fini  $G = \pi_0/\pi'_0 \simeq \pi/\pi'$ , notées par des  $\tilde{\phantom{x}}$ , de sorte que l'on a:

$$\begin{array}{ccccccc} G & \hookrightarrow & \tilde{\mathfrak{Z}}^+(\pi_0) & \hookrightarrow & \tilde{\mathcal{N}}(\pi_0) & \hookrightarrow & \tilde{\mathfrak{Z}}(\pi_0) \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow? & & \downarrow \\ & & \hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi'_0) & \hookrightarrow & \mathcal{N}(\pi'_0) & \hookrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0) \end{array} \quad (8)$$

qui montre que les groupes de la première ligne *normalisent* le sous-groupe  $G \subset \hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi'_0)$  (NB en fait on a  $G \subset \mathfrak{Z}^+(\pi'_0)$ , et  $\pi_0$  se reconstitue à partir de  $\pi'_0$  et de ce sous-groupe de  $\pi'_0$ ) – on doit pouvoir montrer sans trop de mal que dans (8),  $\tilde{\mathfrak{Z}}^+(\pi_0)$  et  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)$  sont justement les normalisateurs de  $G$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi'_0)$  et dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$  (ce qui impliquerait bien (a), d'ailleurs) – mais je ne vois aucune raison plausible que (b) soit vrai – ce qui signifierait, essentiellement, qu'il n'y a pas plus de “transcendance arithmétique” définie par le (“très gros”!)  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$  (mod  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)^+$ ), que celle définie par le (“bien plus petit”) groupe  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0) = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)}(G)$ ... D'ailleurs ces conditions (a), (b) ne sont pas impératives pour que la conjecture fondamentale reliant les  $\pi_{g,\nu}$  à  $\Pi_0$  soit cohérente – par contre il faudrait absolument avoir (c) pour pouvoir au moins définir  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  et (si  $\Sigma, \Sigma'$  se correspondent)  $\Pi_\Sigma \longrightarrow \Pi_{\Sigma'}$ , dans le cas  $\pi'$  caractéristique dans  $\pi$  (et dans tous les cas si on admet de plus (a), qui semble assez plausible, et donne les *injectivités* qu'il faut). Mais on se demande bien pourquoi un élément de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$  simplement parce qu'il est dans le normalisateur  $R$  de  $G$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0)$ , donc aussi  $R$ , et qu'il normalise  $R \cap \hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi'_0)$ , devrait normaliser aussi  $\hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi'_0)$  lui-même! Il est vrai qu'on a fait des hypothèses draconiennes au départ (partant d'un sous-groupe *caractéristique*  $\pi'_0$  de  $\pi_0$ ) qui doivent bien se refléter par des propriétés particulières de  $G \subset \mathfrak{Z}^+(\pi'_0)$ . Peut-être finalement l'astuce de se ramener à des sous-groupes caractéristiques pour examiner la situation n'est-elle pas si astucieuse. Pour y voir plus clair, on pourrait déjà essayer de comprendre le cas où (sans suppose  $\pi'$  caractéristique), on suppose  $\pi'$  d'indice 2 dans  $\pi$ , donc invariant et  $G \simeq Z/2Z$ , ou bien on prend le noyau de l'homomorphisme canonique  $\pi \longrightarrow (\pi_{ab})_2 \simeq (Z/2Z)^{2g}$  si  $\nu = 0$ ,  $\simeq (Z/2Z)^{2g-\nu-1}$  si  $\nu \geq 1$ , en prenant par exemple  $\pi = \hat{\pi}_{0,3}$  – situation de la courbe de Fermat  $x^2 + y^2 + z^2 = 0$  (revêtement octaédral de  $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$ ...)

Mais admettons provisoirement les hypothèses d'injectivité (relativement anodines), *plus* la condition (c), pas anodine du tout – d'où si  $\Sigma$  et  $\Sigma'$  se correspondent, un homomorphisme injectif

$$\Pi_\Sigma \hookrightarrow \Pi_{\Sigma'}, (9)$$

et voyons ce qu'on pourrait en tirer, en admettant même, provisoirement (pour voir) que (9) est un isomorphisme, c'est-à-dire toute la force de la conjecture principale  $\Pi_0 \simeq \Pi_{g,\nu}$ .

Soit  $\pi$  un groupe profini à lacets de type  $(g, \nu)$ ,  $\pi'$  de type  $(g', \nu')$ . Appelons “correspondance” entre  $\pi$  et  $\pi'$  un couple formé d'un  $\mathfrak{G}$  profini à lacets et d'homomorphismes à

## A. GROTHENDIECK

lacets  $\mathfrak{G} \xrightarrow{p} \pi$ ,  $\mathfrak{G} \xrightarrow{q} \pi'$  qui sont donc chacune composée d'un morphisme "bouchage de trous", et d'un isomorphisme avec un sous-groupe d'indice fini. Soient  $\mathcal{D}_p, \mathcal{D}_q \subset \mathcal{D} = I(\pi'')$  les sous-ensembles de  $\mathcal{D}$  qui correspondent aux "trous bouchés par  $p$ " resp. par  $q$ , on suppose s'il le faut que  $\mathcal{D}_p \cap \mathcal{D}_q = \emptyset$  (sinon on pourrait factoriser par un même quotient  $\tilde{\pi}''$  de  $\pi''$ ). En d'autres termes, si  $\overline{\mathcal{D}}_p, \overline{\mathcal{D}}_q$  sont les complémentaires de  $\mathcal{D}_p, \mathcal{D}_q$  dans  $\mathcal{D}$  (de sorte qu'on a  $\overline{\mathcal{D}}_p \setminus I = I(\pi)$ ,  $\overline{\mathcal{D}}_q \setminus I' = I(\pi')$ ), on a  $\overline{\mathcal{D}}_p \cup \overline{\mathcal{D}}_q = \mathcal{D}$ .

On va supposer maintenant  $\pi$  muni d'un  $\Sigma \in A(\pi)$ ,  $\pi'$  muni d'un  $\Sigma' \in A(\pi')$ , on appellera "correspondance arithmétique" entre  $\pi$  et  $\pi'$  un quadruplet  $(\mathfrak{G}, p, q, \Sigma_{\mathfrak{G}})$  où  $(\mathfrak{G}, p, q)$  sont comme dessus, et  $\Sigma_{\mathfrak{G}} \in A(\mathfrak{G})$ , tel que l'on ait  $\Sigma_{\mathfrak{G}} = p^*(\Sigma) = q^*(\Sigma')$ . Si  $P_{\Sigma}, P_{\Sigma'}, P_{\Sigma_G}$  sont respectivement les toseurs sous  $\Pi_{\Sigma}, \Pi_{\Sigma'}, \Pi_{\Sigma'}$  qu'on sait, on a deux diagrammes d'isomorphismes de toseurs:

$$\begin{array}{ccc} & P_{\Sigma_G} & \\ p^* \nearrow & & \nwarrow q^* \\ P_{\Sigma} & & P_{\Sigma'} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & \Pi_{\Sigma_G} & \\ p^* \nearrow & & \nwarrow q^* \\ \Pi_{\Sigma} & & \Pi_{\Sigma'} \end{array}$$

d'où par composition un isomorphisme

$$(P_{\Sigma}, \Pi_{\Sigma}) \xrightarrow{\sim} (P_{\Sigma'}, \Pi_{\Sigma'}).$$

On appelle "isomorphisme arithmétriquement extérieur" de  $(\pi, \Sigma)$  avec  $(\pi', \Sigma')$ , tout isomorphisme de toseurs qu'on peut obtenir de cette façon. Deux correspondances sont dites équivalentes du point de vue arithmétriquement extérieur, si elles définissent le même isomorphisme arithmétriquement extérieur. La composition est définie par composition des actions sur  $(P_{\Sigma}, \Pi_{\Sigma})$  – on voit que ça provient d'une correspondance. On trouve donc un groupoïde, dont on vérifie sans peine qu'il est connexe.<sup>56</sup> Je dis que les automorphismes de  $(\pi, \Sigma)$  "sont" les automorphismes de  $(P_{\Sigma}, \Pi_{\Sigma})$  définis par des éléments de  $\Pi_{\Sigma}$ . C'est facile...

Dans ce groupoïde, il y a un système transitif d'isomorphismes entre les  $(\hat{\pi}_0, \Sigma_{\pi_0})$ , où  $\pi_0$  est un groupe discret à lacets) plus généralement entre les  $(\pi, \Sigma_{\alpha})$ , où  $\alpha \in P(\pi)$  est un prédiscrétification de  $\pi$  – définissons donc un isomorphisme arithmétriquement extérieur de  $\pi_{g,v}, \pi \dots$  Le groupe de ces automorphismes est noté  $\Pi_0$ . Le groupoïde des courbes virtuelles arithmétiques extérieures s'identifie donc à la catégorie des toseurs sous  $\Pi_0$ . Une prédiscrétification (on pourrait aussi l'appeler une rigidification arithmétriquement extérieure) n'est pas

<sup>56</sup>On l'appellera le groupoïde des courbes arithmétiques extérieures.

## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

autre chose qu'un isomorphisme arithmétiquement extérieur entre cet élément de référence, et  $\pi$ .

## § 29. — CRITIQUE DE L'APPROCHE PRÉCÉDENTE

L'approche des paragraphes précédents semble finalement très brutale. J'ai même des doutes si la conjecture sur les propriétés du foncteur "bouchage de trous" est vraie telle quelle. Il est vrai que pour un groupe profini à lacets  $\pi$ , si on fixe  $i \in I(\pi)$ , on a un homomorphisme canonique

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi, i) = \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi'), (1)$$

(où  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$  est le stabilisateur de  $i$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ ), mais il est problématique si c'est un isomorphisme – et même si c'est injectif, ou si c'est surjectif. Mais, choisissant une discrétification  $\pi_0 \subset \pi$ , d'où itou  $\pi'_0$  pour  $\pi'$ , l'homomorphisme précédent induit bel et bien un isomorphisme

$$\mathfrak{Z}(\pi_0)_i \simeq \mathfrak{S}(\pi'_0)(2)$$

d'où

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0) \xrightarrow{\sim} \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)(3)$$

et par suite, la suite exacte  $1 \longrightarrow \hat{\pi}'_0 \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0) \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0) \longrightarrow 1$  donne:

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}'_0 \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0) \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_0) \longrightarrow 1(4)$$

et par suite on trouve un homomorphisme injectif

$$\hat{\pi}'_0 \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)_i \hookrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)_i \simeq \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$$

(où  $\hat{\pi}'_0 = \pi'$ ) donc un homomorphisme

$$i_{\pi_0} : \pi' \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i(5)$$



dont le composé avec (1) est l'injection canonique  $\pi' \hookrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi')$ . Remplaçant la discrétification  $\pi_0$  par une autre,  $\pi_1$ , on trouve a priori un autre homomorphisme  $i_{\pi_1} : \pi' \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$ . On peut supposer que  $\pi_1 = u(\pi_0)$ ,  $u \in \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)_i$  et par transport de structure on trouve

$$i_{\pi_1} = i_{u(\pi_0)} = \text{Int}(u) \circ i_{\pi_0} \circ u_{\pi'}^{-1}$$

où  $u_{\pi'}$  est l'automorphisme de  $\pi'$  défini par  $u$  via (1). Dire que  $i_{\pi_0}$  est indépendant du choix de la discrétification  $\pi_0$ , revient aussi à dire que son image dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$  est un sous-groupe invariant – et alors l'action de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$  sur le sous-groupe invariant  $i_{\pi_0}(\pi) = i(\pi)$  via automorphismes intérieurs, n'est autre que celle définie par (1). Dans ce cas, on trouve par passage au quotient un homomorphisme

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i / \pi' \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi')(6)$$

dont l'injectivité resp. surjectivité équivaudrait à celle de (1). Mais il n'est pas évident du tout qu'il en soit toujours ainsi.

S'il n'en était pas ainsi, il s'imposerait de regarder le sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$  formé des  $\gamma \in \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$  qui normalisent le sous-groupe  $i_{\pi_0}(\pi')$ , et tels que l'action induite sur  $i_{\pi_0}(\pi')$  corresponde à celle donnée par l'action (1) de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  sur  $\pi'$ . Ce sous-groupe  $H_{\pi_0}$  (qui contient  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)_i$ ) dépend donc a priori de la discrétification choisie. Remplaçant  $\pi_0$  par  $u(\pi_0)$  (où  $u \in \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i$ ) le remplace par  $\text{Int}(u) \cdot H$  – donc  $H$  tout au moins ne change pas, si on fait varier  $\pi_0$  dans une classe de prédiscrétifications.

On peut faire des choix plus symétriques, en considérant *pour tout*  $i \in I$  le quotient correspondant  $\pi'_i$  de  $\pi$ , d'où, pour une discrétification donnée  $\pi_0$ , des homomorphismes

$$i_{\pi_0,i} : \pi'_i \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi),$$

et on définit  $H_{\pi_0} \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  comme le sous-groupe des  $\gamma \in \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  qui “permutent les  $i_{\pi_0,i}$  entre eux” dans un sens évident. On a donc

$$H_{\pi_0} \cap \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i = H_{\pi_0,i}(7)$$

et

$$H \supset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0).(8)$$

## A. GROTHENDIECK

Le point que j'ai en vue, c'est que le sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)$  image de  $\pi_1(M_{g,\nu})$ , doit non seulement normaliser  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)^+$ , mais de plus être contenu dans un  $H$ . C'est là une condition que j'ai rencontrée par la bande, à la faveur de l'hypothèse (peut-être bien hâtive) que (1) est un isomorphisme, qui impliquait (facilement) que l'on avait  $H = \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)$  tout entier. Il est possible que  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)$  soit un groupe à tel point démesuré et pathologique, qu'il ne pourra jamais être question de dire des choses raisonnables (et vraies) sur le groupe tout entier, (tel que la bijectivité de (1) par exemple) et qu'on soit obligé de travailler avec des sous-groupes plus petits, qui restent proches du discret (avec quand-même des aspects supplémentaires "arithmétiques", dû au  $\Pi_0 = \text{Gal}(\overline{Q_0}/Q)$ !). En fait, il y a (pour  $I = I(\pi) \neq \emptyset$ , i.e.  $\nu \neq 0$ ) dans le groupe  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)$  une structure simpliciale d'extensions successives, qui va être respectée par l'action extérieure du groupe de Galois, et dont il faudrait tenir compte. Elle fait partie de la "structure à l' $\infty$ " dans le  $\pi_1$  des multiplicités modulaires  $M_{g,\nu}$ , qui même pour  $\nu = 0$  est sans doute non triviale, et il est possible qu'il faille en tenir compte, pour arriver à mettre le doigt sur  $\Pi_Q$ .

Sans essayer de donner d'emblée une description a priori de  $\Pi_Q$  "dans les  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$ ", on va procéder de façon plus inductive, en partant de la présence de  $\Pi_Q$  (pour des raisons arithmético-géométriques), et en essayant de dégager des propriétés de cette présence peut-être assez fortes pour finir par donner une caractérisation purement algébrique. Rappelons que, via le choix de  $\mathcal{U}_{g,\nu}$  (différentiable), on avait pu construire, par voie transcendante, un  $\widetilde{M_{g,\nu,\mathbb{C}}}$  et un  $\widetilde{\mathcal{U}_{g,\nu,\mathbb{C}}} = \widetilde{M_{g,\nu+,\mathbb{C}}}$ , d'où un  $\widetilde{M_{g,\nu,Q}}$ , et un  $\widetilde{\mathcal{U}_{g,\nu,Q}}$ , d'où un  $\pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu,Q})$ , avec une filtration en trois crans, dont les facteurs sont respectivement canoniquement isomorphes à

$$\hat{\pi}_{g,\nu}, \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_{g,\nu})^+, \Pi_Q = \text{Gal}(\overline{Q_0}/Q). (9)$$

Ce groupe s'envoie (on présume injectivement) dans  $\hat{\mathfrak{E}}(\pi_{g,\nu})$ , induisant un isomorphisme entre son sous-groupe  $\pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu,\overline{Q_0}})$  et  $\hat{\mathfrak{E}}(\pi_{g,\nu})$ ; désignons son image par  $\mathcal{M}_{g,\nu}$ . Donc c'est un sous-groupe fermé

$$\hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu} \subset \mathcal{M}_{g,\nu} \subset \hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu} (10)$$

et  $\hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu}^+$  est normal dans  $\mathcal{M}_{g,\nu}$  (mais pas  $\hat{\mathfrak{E}}_{g,\nu}$  !), La donnée d'un tel  $\mathcal{M}_{g,\nu}$  équivaut à celle d'un  $\mathcal{N}_{g,\nu}$

$$\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu} \subset \mathcal{N}_{g,\nu} \subset \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}, (11)$$

avec  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+$  normal dans  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ . On pose:

$$\Pi_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu} / \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+ \simeq \mathcal{M}_{g,\nu} / \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^+.^{57}(12)$$

On a un homomorphisme surjectif

$$\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{g,\nu}(13)$$

dont on présume qu'il est bijectif – i.e. que les  $\Pi_{g,\nu}$  sont canoniquement isomorphes entre eux.

Soit maintenant  $\pi_0$  un groupe discret à lacets de type  $g, \nu$ , alors on définit des sous-groupes  $\mathcal{M}_{\pi_0}, \mathcal{N}_{\pi_0}$  :

$$\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \subset \mathcal{M}_{\pi_0} \subset \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)(14)$$

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0) \subset \mathcal{N}_{\pi_0} = \mathcal{M}(\pi_0) / \hat{\pi}_0 \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi_0)(15)$$

(et on pose  $\Pi_{\pi_0} = \mathcal{M}_{\pi_0} / \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)$ ), en utilisant un isomorphisme  $\pi_0 \xrightarrow{\sim} \pi_{g,\nu}$  et en procédant par transport de structure – le résultat n'en dépend pas. Plus généralement, partons d'un couple  $(\pi, \alpha)$  d'un groupe  $\pi$  profini, muni d'une *prédiscretification*  $\alpha$ , qu'on peut donc interpréter comme une classe d'isomorphismes  $\hat{\pi}_{g,\nu} \longrightarrow \pi$ , définie modulo composition à droite par un  $u \in \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ . Alors par transport de structure on en déduit des groupes  $\mathcal{M}_\alpha, \mathcal{N}_\alpha$

$$\hat{\mathfrak{S}}_\alpha \subset \mathcal{M}_\alpha \subset \hat{\mathfrak{S}}(\pi)(16)$$

$$\hat{\mathfrak{Z}}_\alpha \subset \mathcal{N}_\alpha = \mathcal{M}_\alpha / \pi \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)(17)$$

avec  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)^+$  normal dans  $\mathcal{M}_\alpha$ , i.e.  $\hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi)$  normal dans  $\mathcal{N}_\alpha$ . On pose

$$\Pi_\alpha = \mathcal{M}_\alpha / \hat{\mathfrak{S}}_\alpha^+ \simeq \mathcal{N}_\alpha / \hat{\mathfrak{Z}}_\alpha^+.(18)$$

On a un élément canonique

$$\tau_\alpha \in \Pi_\alpha, \quad \tau_\alpha^2 = 1, \quad \tau_\alpha \neq 1.(19)$$

---

<sup>57</sup>Dans  $\Pi_{g,\nu}$ , on a un élément canonique d'ordre 2  $\tau_{g,\nu}$ , correspondant aux éléments de  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu} \setminus \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+ = \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^-$ .

## A. GROTHENDIECK

Soit maintenant  $\pi$  un groupe profini à lacets de type  $(g, \nu)$ . On appelle *arithmétisation* de  $\pi$  la donnée d'un élément de

$$A(\pi) = \text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi) / \mathcal{M}_{g,\nu} \simeq \text{Isomext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi) / \mathcal{N}_{g,\nu}. \quad (20)$$

Soit  $P(\pi)$  l'ensemble des prédiscrétifications orientées de  $\pi$ :

$$P(\pi) = \text{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi) / \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}^+ \simeq \text{Isomext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi) / \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+; \quad (21)$$

alors  $\Pi_{g,\nu}$  opère librement à droite sur  $P(\pi)$ , et

$$A(\pi) \simeq P(\pi) / \Pi_{g,\nu} \quad (22)$$

–  $P(\pi)$  est un toreur relatif sur  $A(\pi)$ , de groupe  $\Pi_{g,\nu}$ . Pour  $a \in A(\pi)$ , soit  $\mathcal{M}_a$  le sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$  des automorphismes de  $(\pi, a)$ , il opère sur le  $\Pi_{g,\nu}$ -torseur  $P_a$  des discrétifications orientées de  $\pi$  sur  $a$ . Pour  $\alpha \in P_a$ , soit  $\hat{\mathfrak{S}}_\alpha \subset \hat{\mathfrak{S}}(\pi)$ ; alors  $\hat{\mathfrak{S}}_\alpha^+$  ne dépend pas de  $\alpha$  (on le notera  $\hat{\mathfrak{S}}_a^+$ );<sup>58</sup> c'est aussi le noyau de l'opération de  $\mathcal{M}_a$  sur  $P_a$ . On a

$$\hat{\mathfrak{S}}_a^+ \subset \mathcal{M}_a \subset \hat{\mathfrak{S}}(\pi) \quad (23)$$

d'où encore

$$\hat{\mathfrak{Z}}_a^+ \subset \mathcal{N}_a \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \quad (24)$$

en posant

$$\mathcal{N}_a = \mathcal{M}_a / \pi, \quad \hat{\mathfrak{Z}}_a^+ = \hat{\mathfrak{S}}_a^+ / \pi. \quad (25)$$

On pose

$$\Pi_a = \mathcal{M}_a / \hat{\mathfrak{S}}_a^+ \simeq \mathcal{N}_a / \hat{\mathfrak{Z}}_a^+. \quad (26)$$

Alors  $\Pi_a$  s'identifie au commutant de  $\Pi_{g,\nu}$  opérant sur  $P_a$ , i.e. à  $\Pi_{g,\nu}$  “tordu” par le toreur  $P_a$ . Le choix d'un  $\alpha \in P_a$  revient donc au choix d'un tel isomorphisme

$$\Pi_a \simeq \Pi_{g,\nu} \quad (27)$$

qui est changé par automorphisme intérieur si on change  $\alpha$ ...

---

<sup>58</sup>mais attention,  $\hat{\mathfrak{S}}_\alpha$  dépend de  $\alpha$ , i.e.  $\tau_\alpha \in \Pi_a$  dépend de  $\alpha$ .

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

On a la catégorie des groupes à lacets extérieurs arithmétisés de type  $g, \nu$  – c’est un groupoïde connexe, avec une origine fixée  $(\hat{\pi}_{g, \nu}, a_{g, \nu})$  ( $a_{g, \nu}$  arithmétisation “canonique”), dont le groupe des automorphismes est  $\mathcal{N}_{g, \nu}$ , extension de  $\Pi_{g, \nu}$  par  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g, \nu}^+ \simeq \pi_1(M_{g, \nu, Q})$  (si  $\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{g, \nu}$  est injectif!) (calculé par rapport au revêtement universel canonique de  $M_{g, \nu, Q}$ )...

Se donner un objet de cette catégorie, c’est essentiellement la même chose (à isomorphisme unique près) que de se donner un revêtement universel  $\widetilde{M_{g, \nu, Q}}$  de  $M_{g, \nu, Q}$  – ou un toreur sous  $\mathcal{N}_{g, \nu}$ ; on considère alors la famille de courbes de type  $g, \nu$  sur  $\widetilde{M_{g, \nu, Q}}$

$$\mathcal{U}_{g, \nu} \times_{M_{g, \nu}} \widetilde{M_{g, \nu, Q}} = \mathcal{U}_{g, \nu}(\widetilde{M_{g, \nu, Q}}) \quad (28)$$

comme étant “la” courbe algébrique dont le  $\pi_1$  extérieur (qui est donc le  $\pi_1$  de ce schéma...) soit le groupe extérieur à lacets donné.

Si on prenait les groupes à lacets arithmétisés, pas extérieurs, on aurait encore un groupoïde connexe avec “origine”  $(\hat{\pi}_{g, \nu}, a_{g, \nu})$ , avec un groupe d’automorphismes qui est  $\mathcal{M}_{g, \nu} \simeq \pi_1(\mathcal{U}_{g, \nu, Q})$ . La donnée d’un objet de cette catégorie revient à la donnée d’un revêtement universel (non seulement de  $M_{g, \nu, Q}$ , mais) de  $\mathcal{U}_{g, \nu, Q}$ , soit  $\widetilde{\mathcal{U}_{g, \nu, Q}}$ , qui sert de revêtement universel de référence pour la courbe relative (28), permettant alors de préciser son groupe fondamental comme un vrai groupe à lacets (pas seulement un groupe extérieur).

On peut enfin regarder aussi la catégorie des groupes profinis à lacets arithmétisés, où on prend comme morphismes les *isomorphismes arithmétiquement extérieurs*. On trouve encore un groupoïde connexe avec origine marquée  $(\hat{\pi}_{g, \nu}, a_{g, \nu})$ , dont le groupe des automorphismes est maintenant  $\Pi_{g, \nu}$ . Maintenant les groupes  $\hat{\pi}_0$  ( $\pi_0$  groupe à lacets discret de type  $g, \nu$ ) sont canoniquement isomorphe entre eux. La catégorie est (conjecturalement, admettant que  $\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{g, \nu}$  soit un isomorphisme) équivalente à celle des revêtement universels de  $\text{Spec } Q$ , i.e. à celle des clôtures algébriques de  $Q$ , l’élément origine correspondant à  $\overline{Q}_0$ .

Quand on se donne un  $\pi$  avec arithmétisation  $a$ , alors il lui correspond donc canoniquement une clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$ . Le  $\Pi_Q$ -toreur des isomorphismes  $\text{Isom}(\overline{Q}_0, \overline{Q})$ , i.e. des plongements  $\overline{Q} \hookrightarrow C$ , est en correspondance 1-1 avec l’une  $(P_a)$  des prédiscretifications orientées de  $\pi$  donnant naissance à  $a$ .

Notons que tout  $\alpha$  définit un élément  $\tau_\alpha \in \Pi_a$ ,  $\tau_\alpha^2 = 1$  ( $\tau_\alpha \neq 1$ ), d’où une application canonique

$$P_a \longrightarrow {}_2\Pi_a. \quad (29)$$

## A. GROTHENDIECK

On voit que cette application est compatible avec l'action du groupe  $\pm 1$  sur  $P_a$ ,

$$\tau_\alpha = \tau_{-\alpha}.$$

S'il est vrai que  $\Pi_Q \xrightarrow{\sim} \Pi_{g,v}$ , alors (29) induit par passage au quotient une application bijective

$$(30) \quad P_a / \pm 1 \xrightarrow{\sim} \text{ensemble des éléments d'ordre 2 de } \Pi_a$$

(où  $P_a / \pm 1 = P_a^\natural = \text{ensemble des prédiscrétifications – pas orientées – sur } a$ ).

Cela provient du fait connu que dans  $\Pi_Q$ , les seuls éléments d'ordre 2 sont les conjugués de  $\tau$ , et que le centralisateur de  $\tau$  dans  $\Pi_Q$  est réduit à  $\{1, \tau\}$ . On peut dire que la donnée d'une discrétification (pas orientée)  $\alpha^\natural$  sous l'arithmétisation  $a$ , revient à la donnée d'une valuation archimédienne sur la clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$  définie par  $(\pi, a)$  (i.e. d'un isomorphisme  $\overline{Q}_1 \simeq \overline{Q}_0 \text{ modulo conjugaison complexe}$ ).

§ 30. — PROPRIÉTÉS DES  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ ,  $\Pi_{g,\nu}$  :  
a) PROPRIÉTÉS LIÉES AUX SOUS-GROUPES FINIS

---

On aimerait dégager des propriétés, inspirées par le contexte géométrico-arithmétique, mais qui puissent se formuler de façon purement algébrique – et qui soient assez fortes peut-être pour finir par caractériser les  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ .

Revenons à un  $(\pi, a)$ , groupe à lacets arithmétisé, heuristiquement, il correspond à la donnée d’une clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$ , et (si  $\pi$  est donné extérieurement) d’une famille algébrique, paramétrée par un revêtement universel  $\widetilde{M}_{g,\nu,\overline{Q}}$  de  $M_{g,\nu,\overline{Q}}$ , de courbes algébriques de type  $(g, \nu)$ . Dans cette optique, réduire cette famille à *une* courbe algébrique – i.e. se donner une courbe algébrique de type  $(g, \nu)$  sur  $\overline{Q}$  – doit revenir à se donner un noyau de relèvement de l’homomorphisme surjectif

$$\mathcal{N}_a \longrightarrow \Pi_a(1)$$

(de noyau  $\hat{\mathfrak{Z}}_a^+$ ). La donnée d’un tel relèvement sur un sous-groupe ouvert  $\Gamma'$  revient à la donnée d’une courbe algébrique de type  $g, \nu$ , définie sur l’extension finie  $K' \subset \overline{Q}$  définie par  $\Gamma'$ . Il s’agit ici non pas de relèvements continus quelconques, mais de relèvements ayant des propriétés particulières (dont certaines fort profondes, du genre “Weil”... mais *peut-être* conséquences de propriétés beaucoup plus simples). Les propriétés à dégager devraient en tout cas être stables par passage à un sous-groupe ouvert plus petit. Parmi ces propriétés, il y aurait que ces germes de relèvements pourraient à leur tour se remonter à  $\hat{\mathfrak{E}}(\pi)$  lui-même – de façon également “admissible” en un sens à préciser – et même qu’il y aurait “beaucoup” de classes de  $\pi$ -conjugaison de tels germes de relèvements, pour un germe d’action extérieure

## A. GROTHENDIECK

sur  $\pi$  déjà donné – ce qui correspond au fait naïf que la courbe algébrique  $\mathcal{U}$  sur  $\overline{Q}$  définie par cette action extérieure a “beaucoup de points” rationnels sur  $\overline{Q}$ . En fait, il suffirait, à la limite, de parler des propriétés de ces relèvements plus complets en un germe d’une vraie action de  $\Pi_a$  sur  $\pi$  (pas seulement extérieure) – dont les actions extérieures vont se déduire par composition avec

$$\mathcal{M}_a \longrightarrow \mathcal{N}_a \simeq \mathcal{M}_a / \pi.$$

On suppose donc donné un sous-groupe fermé

$$\Gamma \subset \mathcal{M}_a \subset \hat{\mathfrak{S}}(\pi)$$

tel que

$$\Gamma \longrightarrow \Pi_a = \mathcal{M}_a / \pi(a)$$

est injectif, et a comme image un sous-groupe ouvert de  $\Pi_a$  – étant entendu que deux sous-groupes conjugués sous  $\pi$  – voire même parfois, sous  $\mathcal{M}_a$  – ne sont pas considérés comme essentiellement distincts. On considère, en même temps que  $\Gamma$ , ses sous-groupes ouverts  $\Gamma'$ . On veut surement, pour de tels sous-groupes ouverts

$$\pi^{\Gamma'} = \{1\} \cdot (b)$$

Si on désigne par  $\tilde{\Gamma}$  l’image de  $\Gamma$  dans  $\mathcal{N}_a$ , de sorte qu’on a une extension

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \tilde{\Gamma} \longrightarrow 1(1')$$

(où  $\tilde{\Gamma}$  est isomorphe à  $\Gamma$ ); on peut considérer  $\Gamma$  comme une section de cette extension,  $\Gamma'$  comme une section partielle. L’hypothèse  $\pi^{\Gamma'} = \{1\}$  assure la *rigidité* de la catégorie des points de  $\mathcal{U}$  à valeurs dans  $\overline{Q}$ , paradigmée par celle des germes de scindage de l’extension (1’).

On peut aussi regarder les ensembles  $(\hat{\mathfrak{S}}_a^+)^{\Gamma'} = \text{Centr}_{\mathcal{M}_a}(\Gamma') \cap \hat{\mathfrak{S}}_a^+$  et  $(\hat{\mathfrak{Z}}_a^+)^{\Gamma'} = \text{Centr}_{\mathcal{N}_a}(\tilde{\Gamma}') \cap \hat{\mathfrak{Z}}_a^+$ ; on a donc une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi^{\Gamma'} \longrightarrow (\hat{\mathfrak{S}}_a^+)^{\Gamma'} \longrightarrow (\hat{\mathfrak{Z}}_a^+)^{\Gamma'} (2)$$

qui, compte tenu de l’hypothèse  $\pi^{\Gamma'} = \{1\}$ , donne

$$(\hat{\mathfrak{S}}_a^+)^{\Gamma'} \hookrightarrow (\hat{\mathfrak{Z}}_a^+)^{\Gamma'} . (3)$$



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Le deuxième membre de (3), par notre dictionnaire hypothétique, devrait être canoniquement isomorphe au groupe des automorphismes de la courbe  $\mathcal{U}$  sur  $K'$ , donc être un groupe fini, et même la limite inductive (pour  $\Gamma'$  décroissant) – qui est le groupe des automorphismes de  $\mathcal{U}$  sur  $\overline{Q}$  – est finie. Désignant par un exposant  $\natural$  le germe de groupe correspondant, on veut donc que

$$Z = (\hat{\mathfrak{Z}}_a^+)^{\Gamma^\natural} (= \text{Centr}_{\mathcal{N}_a}(\tilde{\Gamma}^\natural) \cap \hat{\mathfrak{Z}}_a^+) \text{ soit un groupe fini}(c)$$

– ce qui fait pendant à (b), et exprime que les groupes d'automorphismes des points de  $\mathcal{M}_{g,v,\overline{Q}}$  sur  $\overline{Q}$  sont finis.

En fait, on voudrait que  $Z$  soit conjugué dans  $\mathcal{M}_a$  à un sous-groupe de  $\mathfrak{Z}^+$  (si on suppose qu'on dispose d'une discrétification  $\pi_0$  de  $\pi$ , permettant de définir  $\mathfrak{Z}$  – sinon, on peut exprimer cette propriété en disant qu'il existe une discrétification  $\pi_0$  de  $\pi$ , compatible avec  $a$ , telle que  $Z \subset \mathfrak{Z}(\pi_0) \dots$ )

Considérons maintenant un sous-groupe fini quelconque  $G \subset \hat{\mathfrak{Z}}_a^+$ . [N.B. si on prend seulement  $G \subset \mathcal{M}_a$ , de sorte que l'image de  $G$  dans  $\Pi_a = \mathcal{M}_a / \hat{\mathfrak{Z}}_a^+$  est un sous-groupe fini, alors s'il est vrai que  $\Pi_a \simeq \text{Gal}(\overline{Q}, Q)$ , cette image doit être d'ordre 1 ou 2, et dans le deuxième cas, doit définir un  $\tau \in \Pi_a$  correspondant à une *prédiscrétification* (pas orientée) bien déterminée de  $\pi$ . Ce cas devrait être encore réutilisée dans la suite...] Supposons alors que [ce n'est sans doute *pas* automatique – si on ne suppose *pas*  $\mathcal{N}_a = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}}(\hat{\mathfrak{Z}}_a^+)$ ], que  $G$  est contenu dans  $\mathfrak{Z}^+$ , pour une discrétification convenable dans la classe  $a$ , et que l'action extérieure ainsi obtenue de  $G$  sur un  $\pi_0$  discret de type  $(g, v)$  soit toujours *réalisable*. Elle est donc réalisable aussi pour une action de  $G$  sur une structure complexe, donc algébrique, ce qui signifie qu'on peut trouver un germe de relèvement *admissible*

$$\Pi_a \longrightarrow \mathcal{N}_a$$

qui centralise  $G$ . Considérons d'autre part

$$\text{Centr}_{\mathcal{N}_a}(G) \longrightarrow \Pi_a(4)$$

dont le noyau est  $\text{Centr}_{\hat{\mathfrak{Z}}_a^+}(G) = \hat{\mathfrak{Z}}_a^{+G}$ . Si on se plaçait dans le contexte discret (avec une discrétification  $\pi_0 \subset \pi$  invariante par  $G$ ) on aurait, par les conjectures standard topologiques, que  $\hat{\mathfrak{Z}}_a^{+G}$  est le groupe des automorphismes, dans la catégorie isotopique, de l'action de  $G$

sur une surface  $\mathcal{U}$  de type  $(g, \nu)$ , décrite par l'opération extérieure donnée de  $G$  sur  $\pi_0$ . Ce groupe n'a aucune raison d'être fini – s'il l'était, l'homomorphisme (4) serait à noyau fini, donc serait un isomorphisme des noyaux des groupes, et il y aurait un germe de relèvement unique  $\Pi_a^{\natural} \longrightarrow \mathcal{M}_a$  qui centraliserait  $G$  – ce qui signifierait qu'il y a une seule façon de réaliser l'opération topologique de  $G$  sur  $\mathcal{U}$  par une opération analytique complexe, donc algébrique – or ce n'est sûrement pas le cas, l'ensemble des points fixes de  $G$  opérant sur l'espace de Teichmüller  $\widetilde{M}_{g,\nu}$  n'est pas réduit à un point – c'est (dans le contexte algébrique) une multiplicité schématique qui peut être de dimension quelconque – elle est de dimension  $> 0$  en tout cas, si le quotient  $\mathcal{U}/G$  n'est pas de genre 0.

A retenir en tout cas, comme propriétés plausibles:

(d) Pour tout sous-groupe fini  $G$  de  $\hat{\mathfrak{Z}}_a^+$  (ou du moins si  $G \subset \mathfrak{Z}^+$ , quand on dispose d'une discrétification  $\pi_0 \subset \pi$  dans  $a$ ), regardant  $\text{Centr}_{\hat{\mathfrak{Z}}}(G) = Z(G)$ ,  $\mathcal{N}_a \cap Z(G) \longrightarrow \Pi_a$  a une image ouverte (et il y a même des germes de relèvements admissibles  $\Pi_a \longrightarrow Z(G)$ ).

Ceci implique une propriété non triviale pour les  $g \in \mathcal{M}_a$  en tant qu'éléments de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , ou mieux de  $\mathcal{N}' = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}}(\hat{\mathfrak{Z}})$  [à savoir:  $\exists n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $g^n$  soit congru mod  $\hat{\mathfrak{Z}}_a^+$  à un élément de  $Z(G)$ ...]. Considérons en effet l'image  $Z'_G$  de  $Z(G) \cap \mathcal{N}'$  dans  $\Gamma' = \mathcal{N}'/\hat{\mathfrak{Z}}$ . On a évidemment  $\Pi_a \subset \Gamma'$ , et l'image de  $Z(G) \cap \mathcal{N}_a$  dans  $\Pi_a$  n'est autre que  $Z'_G \cap \Pi_a$ . Dire que celle-ci est ouverte, i.e. d'indice fini, implique donc que  $\forall g \in \Pi_a, \exists n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $g^n \in Z'_G$ .

Notons que dans  $\mathfrak{Z}(\pi_{g,\nu})$  il n'y a qu'un nombre fini de classes de conjugaison de sous-groupes finis, donc si on regarde leurs centralisateurs  $Z_G$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi_{g,\nu})$  et leurs images dans

$$\Gamma'_{g,\nu} = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}}(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+)/\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+,$$

on ne trouve qu'un nombre fini de sous-groupes de  $\Gamma'_{g,\nu}$ , soit  $Z'_{g,\nu}$  leur intersection. On voit donc que le sous-groupe  $\Pi'_{g,\nu}$  de  $\Gamma'_{g,\nu}$  est tel que  $\Pi'_{g,\nu} \cap Z'_{g,\nu}$  soit ouvert dans  $\Pi'_{g,\nu}$ .

Passons maintenant à des sous-groupes finis de  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$  lui-même – ou du moins de  $\mathcal{M}_a$  – ou, ce qui revient presque au même, de  $\hat{\mathfrak{S}}_a^+$ . On va, comme tantôt, se borner à des  $G \subset \mathfrak{S}(\pi_0)$ , pour une discrétification convenable  $\in a$ , car autrement il n'y aurait rien à dire. On sait qu'alors  $G$  est cyclique – et correspond à une action de  $G$  sur un  $\mathcal{U}$  topologique, avec point fixe. On peut la réaliser de façon complexe, ce qu'on exprime en disant qu'il existe un

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

relèvement admissible  $\Pi_a^\natural \longrightarrow \mathcal{M}_a$ , qui centralise  $G$ . On sait d'ailleurs, si  $G \neq 1$ , que

$$\pi^G = \{1\}(5)$$

(ou plutôt, on le sait dans le cas discret – on l'admet dans le contexte profini) – ce qu'on peut encore interpréter comme une propriété de rigidité – ainsi

$$\text{Centr}_{\hat{\mathfrak{S}}}(G) = \hat{\mathfrak{S}}^G \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}^G$$

est *injectif*, donc si on a  $\Gamma \subset \mathcal{N}_a$  qui est dans l'image, alors il existe un relèvement  $\Gamma \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}$  unique qui centralise  $G$ , i.e. tel que  $\Gamma \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}^G$ . Mais en fait ce qu'on saura, pour un  $\Gamma \subset \mathcal{M}_a$  donné (décrivant une courbe algébrique via son action extérieure sur un  $\pi_1$ ) c'est que  $\Gamma \subset \mathcal{M}_a^G$  (i.e. l'action extérieure commute à une action extérieure donnée de  $G$ , i.e.  $G$  opère sur la courbe algébrique) – et on voudrait néanmoins en conclure que lorsqu'on a relevé  $G \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}^+$  ou  $G \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}^+$  (i.e. quand on s'est donné un point fixe de l'action de  $G$  sur  $\mathcal{U}$ ) alors l'action de  $\Gamma^\natural$  se remonte automatiquement en  $\Gamma^\natural \longrightarrow \mathcal{M}_a$  de façon à commuter.....(i.e.  $\Gamma^\natural \longrightarrow \mathcal{M}_a^G$ ). Est-ce là une propriété du choix de  $\mathcal{M}_a$  ou de celui du relèvement  $\Gamma^\natural \longrightarrow \mathcal{N}_a$ , ou de  $G$ ??

Dans le cadre discret, sauf erreur, si on a une action fidèle discrète de  $G$  fini sur  $\pi_0$ , alors  $\mathfrak{S}(\pi_0)^G \longrightarrow \mathfrak{Z}(\pi_0)^G$  (qui est injectif, par  $\pi_0^G = 1$ ) est aussi surjectif. Non, il y a erreur – ça signifierait tel quel que si  $G$  opère fidèlement sur une surface topologique  $\mathcal{U}$  de type  $g, \nu$ , avec un point fixe  $P$ , alors les automorphismes qui commutent à  $G$  *fixent*  $P$  (au lieu de permuter seulement les points fixes entre deux...). Donc il ne faut *pas* s'attendre à ce que tout tout élément dans  $\mathcal{N}_a^G$ , ni même dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_a^G$ , se remonte à  $\mathcal{M}_a^G$  – mais plutôt ceci: pour un  $G \subset \mathfrak{Z}_a(\pi_0)$  sous-groupe fini donné, les classes de  $\pi$ -conjugaison de “remontages” à  $\hat{\mathfrak{S}}$ , qui s'interprètent comme des points fixes d'une action de  $G$  sur quelque  $\mathcal{U}$ , forment un ensemble fini, sur lequel  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)^G$  opère de façon naturelle, et le stabilisateur d'un point  $P$  i.e. d'une classe de conjugaison de relèvements se remonte de façon unique en  $\hat{\mathfrak{S}}^G$ . Il faudrait réexaminer ceci de façon plus soignée par la suite. Mais il me semble qu'on ne trouve pas ici de nouvelles propriétés des  $\Gamma \subset \mathcal{M}_a$  ni de  $\mathcal{M}_a$  lui-même, i.e. de  $\Pi_a$  comme sous-groupe profini de  $\Gamma' = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}}(\hat{\mathfrak{Z}})/\hat{\mathfrak{Z}}$ .

# § 31. — DIGRESSION SUR LES RELÈVEMENTS D'UNE ACTION EXTÉRIEURE D'UN GROUPE FINI $G$ SUR UN GROUPE PROFINI À LACETS $\pi$

---

On suppose l'action extérieure *fidèle*, i.e.  $G \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) = \hat{\mathfrak{Z}}$ , et que  $G = G^+$ . On suppose de plus qu'il existe une discrétification invariante  $\pi_0$ , i.e. telle que  $G \subset \mathfrak{Z}(\pi_0)$ . Si on suppose  $G$  cyclique, alors sauf erreur il est prouvé que la situation est *réalisable* topologiquement (donc aussi de façon analytique complexe...)

Dans le cas discret, la signification des classes de  $\pi_0$  conjugaison de relèvement  $G \longrightarrow \mathfrak{S}(\pi_0)$  est bien comprise, de même que pour les relèvements partiels. On trouve une réalisation canonique [si  $\mathcal{U}' \neq \emptyset$ ] du groupoïde fondamental associé au groupe extérieur  $\pi_0$ , par un groupoïde fini  $[\mathcal{U}']$  sur lequel  $G$  opère au sens strict, dont les points correspondent aux classes de  $\pi_0$ -conjugaison de sections partielles  $\neq 1$  maximales. Le groupe  $\mathfrak{Z}(\pi_0)^G$  opère de façon également canonique sur ce groupoïde. Si  $P \in \mathcal{U}'$  correspond à un relèvement  $G \longrightarrow \mathfrak{S}(\pi_0)$ , alors un élément  $\dot{u} \in \mathfrak{Z}(\pi_0)^G$  est dans l'image de  $\mathfrak{S}(\pi_0)^G$ , i.e. peut se remonter en  $u \in \mathfrak{S}(\pi_0)$  commutant à  $G$ , si et seulement si  $\dot{u}(P) = P$ , i.e. (si  $\dot{u}$  est remonté de façon quelconque en  $v$ ), si et seulement si  $v(G)$  est  $\pi_0$ -conjugué à  $G$ , i.e. si et seulement s'il existe  $g \in \pi_0$  tel que  $v(G) = \text{int}(g)(G)$ , i.e.  $u \stackrel{\text{def}}{=} \text{int}(g^{-1})v$  fixe  $G$  (auquel cas bien sûr il centralise, par l'hypothèse  $\dot{u} \in \mathfrak{Z}^G$ ). Donc notre brillante assertion est une tautologie, et donc le relèvement est unique. Comme  $\mathcal{U}'$  est fini, le stabilisateur  $\mathfrak{Z}(\pi_0)_P^G$  de  $P$  dans  $\mathfrak{Z}(\pi_0)^G$  est d'indice fini, et c'est donc ce sous-groupe d'indice fini qui se remonte gaillardement et canoniquement.

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Que peut-on dire dans le contexte profini? Bien sûr, on a une application canonique

$$\begin{array}{ccc}
 \text{classes de } \pi_0\text{-conjugaison} & & \text{classes de } \pi_0\text{-conjugaison} \\
 \text{de relèvements de} & & \text{des relèvements de} \\
 G \text{ en } G \longrightarrow \mathfrak{S}(\pi_0) & \longrightarrow & G \text{ en } G \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0), \\
 \text{i.e. de scindage de l'extension} & & \text{i.e. de scindage de l'extension} \\
 1 \longrightarrow \pi_0 \longrightarrow G \longrightarrow 1 & & 1 \longrightarrow \hat{\pi}_0 = \pi \longrightarrow \hat{E} \longrightarrow G \longrightarrow 1.
 \end{array}$$

Il faudrait examiner d'abord

- a) la question de la bijectivité de cette application,
- b) si  $\pi^G = 1$  (rigidité), pour  $G \neq \{1\}$ . (pour un relèvement donné, dans  $E$  pour simplifier).

J'ai envie de conjecturer sans vergogne qu'il en est ainsi – ce qui impliquerait par exemple que pour tout tel relèvement de  $G$ , il y a un sous-groupe *ouvert*  $(\mathfrak{Z}^G)_p$  du groupe (peut-être vraiment immense a priori!)  $\hat{\mathfrak{Z}}^G$ , qui se remonte canoniquement de façon à commuter à  $G$ ....

Il faudrait manifestement faire, en même temps qu'une théorie des opérations extérieures des groupes finis sur des groupes discrets à lacets (qui est pour le moment extrêmement conjecturale) une théorie analogue dans le cas profini – j'aurai sans doute à y revenir par la suite.

## § 32. — RETOUR SUR LES ASPECTS ARITHMÉTIQUES DU BOUCHAGE DE TROUS : RELATIONS ENTRE $\Pi_{g,\nu}$ et $\Pi_{g,\nu-1}$

Bien sûr, on a que

$$\mathcal{N}_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu$$

est surjectif (puisque  $\mathfrak{T}_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu$  l'est), donc on aura

$$1 \longrightarrow \mathcal{N}_{g,\nu}^! \longrightarrow \mathcal{N}_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu \longrightarrow 1(1)$$

et le diagramme cartésien de sous-groupes de  $\hat{\mathfrak{T}}_{g,\nu}$ :

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathfrak{T}}_{g,\nu}^+ & \hookrightarrow & \mathcal{N}_{g,\nu} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \hat{\mathfrak{T}}_{g,\nu}^{!+} & \hookrightarrow & \mathcal{N}_{g,\nu}^! \end{array} \quad (2)$$

$[\mathcal{N}_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu}^! \cdot \hat{\mathfrak{T}}_{g,\nu}^+]$  donnera un isomorphisme

$$\mathcal{N}_{g,\nu}^! / \hat{\mathfrak{T}}_{g,\nu}^{!+} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_{g,\nu} / \hat{\mathfrak{T}}_{g,\nu}^+ = \Pi_{g,\nu}.(3)$$

Dans le cas d'un  $(\pi, a)$ , ( $\pi$  groupe extérieur à lacets,  $a$  une arithmétisation), on aura de même:

$$\mathcal{N}_a^! / \hat{\mathfrak{T}}_a^+ \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_a / \hat{\mathfrak{T}}_a^+ = \Pi_a \mathcal{N}_a = \mathcal{N}_a^! \cdot \hat{\mathfrak{T}}_a^+. (4)$$

Considérons maintenant pour tout  $i \in I$  le stabilisateur  $\mathcal{N}_i$  de  $i$  dans  $\mathcal{N}$ , et le groupe à lacets (pas extérieur!)  $\pi_i$ , de type  $(g, \nu - 1)$ , déduit de  $\pi$  par “bouchage du trou  $i$ ”<sup>59</sup>. On a alors,

<sup>59</sup>On écrit ici  $\mathcal{N}$  etc. au lieu de  $\mathcal{N}_a$ ; on suppose  $(g, \nu - 1)$  aussi anabélien, i.e.  $2g + \nu \geq 4$ .

pour une discrétification choisie  $\alpha$  compatible avec l'arithmétisation, un homomorphisme injectif

$$\pi'_i \xrightarrow{\varphi_i} \hat{\mathfrak{Z}}^{+!} \subset \mathcal{N}^! \subset \hat{\mathfrak{Z}}_i, (5)$$

tel que le composé

$$\pi'_i \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_i \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_i)(\leftarrow \pi'_i)$$

soit l'inclusion canonique. Ceci posé, on veut <sup>60</sup> que l'image de (5) (qui n'est peut-être pas invariante dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_i$ ) soit *invariante dans*  $\mathcal{N}_i$ , <sup>61</sup> Cela signifie aussi que  $\varphi_i$  ne dépend pas du choix de la discrétification de classe  $\alpha$ ... ou ce qui revient au même, dans  $\mathcal{N}^!$  (car  $\mathcal{N}_i = \mathcal{N}^! \cdot \hat{\mathfrak{Z}}_i^+$ , or  $\hat{\mathfrak{Z}}_i^+$  invarie cette image). Revenant à la situation universelle, cela signifie:

$$(5') \mathcal{N}_{g,v}^! \subset \hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+ \text{ est contenu dans le normalisateur des } \pi'_i \hookrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^{!+} (1 \leq i \leq v-1),$$

qui sont donc invariants dans  $\mathcal{N}_{g,v}^!$  <sup>62</sup> De plus,  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^! \xrightarrow{\psi_i} \hat{\mathfrak{S}}_{g,v-1}^!$  induit un *isomorphisme*

$$\mathcal{N}_{g,v}^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{g,v-1}^!. (6)$$

Cette assertion se décompose en deux: tout d'abord que  $\psi_i$  applique bien  $\mathcal{N}_{g,v}^!$  dans  $\mathcal{M}_{g,v-1}^!$  – et ceci résulte de la définition arithmético-géométrique de ces groupes – cela implique d'autre part, puisque  $\psi_i$  induit aussi un isomorphisme

$$\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+ \xrightarrow{\sim} \hat{\mathfrak{S}}_{g,v-1}^+,$$

qu'il induit un homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \Pi_{g,v} & \xrightarrow{\lambda_i} & \Pi_{g,v-1} \\ \wr & & \wr \\ \mathcal{N}_{g,v}/\hat{\mathfrak{Z}}_{g,v}^+ & & \mathcal{M}_{g,v-1}/\hat{\mathfrak{S}} \end{array} (7)$$

et l'injectivité (resp. surjectivité) de (6) équivaut à celle de (7). D'ailleurs (7) s'insère, par construction, dans un diagramme commutatif:

$$\begin{array}{ccc} & \Gamma_Q & \\ \theta_{g,v} \swarrow & & \searrow \theta_{g,v-1} \\ \Pi_{g,v} & \xrightarrow{\quad} & \Pi_{g,v-1} \end{array} (8)$$

<sup>60</sup>Plutôt, *il est vrai que!*

<sup>61</sup>(\*\*\*)

<sup>62</sup>Il suffit me semble-t-il de le prouver pour *un*  $i$  pour le déduire pour les autres.

## A. GROTHENDIECK

avec  $\theta_{g,\nu}$  et  $\theta_{g,\nu-1}$  surjectifs, donc il est bel et bien évident que (6) est *surjectif*. La bijectivité signifie que  $\theta_{g,\nu}$  et  $\theta_{g,\nu-1}$  ont même noyau (alors qu'a priori il se pourrait que  $\theta_{g,\nu}$  ait un noyau plus petit, i.e. corresponde à une représentation de  $\Pi_Q$  “moins infidèle” que  $\theta_{g,\nu-1}$ ). D'ailleurs, il est évident (même, a priori, sans utiliser la définition ailleurs explicitée de  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ ) que l'homomorphisme  $\lambda_i$  de (7) ne dépend pas du choix de  $0 \leq i \leq \nu - 1$  – par exemple puisque l'on passe de l'un à l'autre en appliquant des opérations de  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  (puisque  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  opère transitivement sur  $I$ ) et que  $\hat{\mathfrak{Z}}^+$  opère trivialement dans  $\Pi_{g,\nu} \dots$

On peut dire que (6) décrit  $\mathcal{M}_{g,\nu-1}^!$  (donc  $\mathcal{N}_{g,\nu-1}^!$ ) en termes de  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  – mais l'inverse est moins clair, faute de savoir si  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu} \xrightarrow{\psi_i} \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}$  est injectif; si on le savait, on pourrait décrire  $\mathcal{N}_{g,\nu}^!$  comme l'image inverse de  $\mathcal{M}_{g,\nu-1}^! \dots$ . Il ne serait pas impossible d'ailleurs que (6) soit faux, i.e. que les  $\theta_{g,\nu}$  soient infidèles, mais de moins en moins quand on fait augmenter  $\nu$  – en passant à la limite projective  $\theta_{g,\infty}$ , seulement, aurait-on (peut-être!) une représentation fidèle de  $\Pi_Q$ ? Mais jusqu'à indication contraire, je préfère travailler hypothétiquement avec (6), ce qui s'exprime par les suites exactes fondamentales

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \xrightarrow{\varphi_i} \mathcal{N}_{g,\nu}^! \xrightarrow{\psi'_i} \mathcal{N}_{g,\nu-1}^! \longrightarrow 1^{63}(9)$$

qui étend la suite exacte

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \xrightarrow{\varphi_i} \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^! \xrightarrow{\psi'_i} \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu-1}^! \longrightarrow 1(10)$$

(et tient lieu de la suite exacte peut-être défailante

$$?? \quad 1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^! \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu-1}^! \longrightarrow 1 \quad ??).$$

Quand  $(\pi, a)$  est un groupe extérieur à lacets muni d'une arithmétisation – ce qu'on pourrait appeler une “courbe algébrique virtuelle” – alors ce qui précède permet de définir, sur chacun des  $\pi'_i$  de type  $(g, \nu - 1)$  associés aux  $i \in I(\pi)$ , une arithmétisation canoniquement associée à  $a$ , soit  $a_i$ , et on trouve alors une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi'_i \longrightarrow (\mathcal{N}_a)_i \xrightarrow{\psi_i} \mathcal{N}_{a_i^+} \longrightarrow 1(11)$$

telle que l'on ait

$$(\hat{\mathfrak{Z}}_a^+)_i = \psi_i^{-1}(\hat{\mathfrak{Z}}_{a_i^+}^+), (12)$$

---

<sup>63</sup>On pourrait l'inclure dans une suite exacte un peu plus grande, avec  $(\mathcal{N}_{g,\nu})_i$  et  $\mathcal{N}_{g,\nu-1} \dots$



induisant

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & \longrightarrow & \pi'_i & \longrightarrow & \mathcal{N}_a^! & \xrightarrow{\psi'_i} & \mathcal{N}_{a'_i}^! \longrightarrow 1 \\
 & & & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & & & \hat{\mathfrak{Z}}_a^{+!} = \psi'^{-1}_i(\hat{\mathfrak{Z}}_{a_i}^{+!}) & & \hat{\mathfrak{Z}}_{a'_i}^{+!}
 \end{array} \quad (11')$$

et induisant par passage au quotient

$$\Pi_a \xrightarrow{\sim} \Pi_{a_i}. (13)$$

De plus, l'application canonique

$$\text{Discrét}^+(\pi) \longrightarrow \text{Discrét}^+(\pi'_i)$$

définit par passage aux quotients

$$\mathbb{P}_a \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}_{a_i} (14)$$

compatible avec les actions de  $\Pi_a$ ,  $\Pi_{a'_i}$  et (13).

Je ne fais ici aucune assertion sur une soi-disant bijectivité entre ensemble des arithmétisations de  $\pi$ , et ensemble des arithmétisations de  $\pi'_i$  – ce qui reviendrait à la bijectivité de

$$\hat{\mathfrak{Z}}/\mathcal{N}_a \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}'/\mathcal{M}_{a'} \simeq \hat{\mathfrak{Z}}'/\mathcal{N}_{a'},$$

qui n'aurait guère de raison d'être que si on admettait  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \xrightarrow{\sim} \hat{\mathfrak{E}}(\pi'_i)$ , qui me semble bien problématique.

*Cependant, on trouve, par le foncteur “bouchage de trous”, une équivalence entre la catégorie des groupes profinis à lacets **extérieurs arithmétisés** de type  $(g, \nu)$ , et des groupes profinis à lacets (pas extérieurs!) **arithmétisés**, de type  $(g, \nu - 1)$ .*

On peut se proposer d'essayer de préciser le type de propriétés qui vont caractériser  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  dans  $\mathcal{N}'_{g,\nu} = \text{Norm}_{\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}}^+(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+)$ , ou encore  $\Pi_{g,\nu}$  dans  $\Pi'_{g,\nu} = \mathcal{N}'_{g,\nu}/\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+$ . On a des homomorphismes naturels

$$\Pi'_{g,\nu} \longrightarrow \text{Autext}(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+) \Pi'_{g,\nu} \longrightarrow \text{Autext}(\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^{+!}) (15)$$

et je présume que  $\Pi_{g,\nu}$  pourra se décrire comme image inverse d'un sous-groupe fermé convenable de l'un ou de l'autre des seconds membres, i.e. qu'on peut le décrire en termes des propriétés d'opérations extérieures sur  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^+$  ou sur  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$ . Les conditions (e) en tout cas, sont

## A. GROTHENDIECK

bien de ce type (propriété de normaliser des sous-groupes invariants  $\pi'_i$  de  $\mathfrak{Z}_{g,\nu}^{+!}$ ...). Bien sûr, on pourrait poser des conditions sur des automorphismes extérieurs (de  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}^{+!}$ , disons), qui soient stables par passage successifs à des  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu-1}^{+!}, \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu'-1}^{+!}$  etc....et qui soient engendrées par les conditions (5') et (6). Mais il n'est pas dit du tout que cela suffira à décrire les  $\Pi_{g,\nu} \subset \Pi'_{g,\nu}$ , ne serait-ce que parce que la condition devient vide pour le cas limite  $\nu = 0$  (si  $g \geq 2$ ; ou pour les cas  $g = 1, \nu = 1$ , ou  $g = 0, \nu = 3$ ). Il est possible qu'il faille faire intervenir des propriétés des  $\pi_1$  des  $\mathcal{M}_{g,\nu,\overline{Q}}$ , liées à la compactification. Ce n'est guère que dans le cas de  $(g, \nu) = (0, 3)$  qu'il ne faut pas s'attendre du tout à ce genre de condition.

Appelons “courbe algébrique potentielle” (sous-entendu, sur une clôture algébrique non précisée de  $Q$ ) la donnée d'un groupe extérieur profini  $\pi$  à lacets de type  $(g, \nu)$ , muni d'une arithmétisation  $a$ , et d'un germe de relèvement “admissible”

$$\Pi_a^{\natural} \longrightarrow \mathcal{N}_a. (16)$$

Elles forment une catégorie (pour les isomorphismes, pour le moment); si on se donne un torseur  $P$  sous  $\Pi_{g,\nu}$  (ce qui, moralement, revient à se donner une clôture algébrique  $\overline{Q}$  de  $Q$ ...) les courbes potentielles de type  $(g, \nu)$  *relatives* à ce torseur (moralement, correspondant à des courbes algébriques sur  $\overline{Q}$ ...) sont celles munies en plus d'un isomorphisme (“intérieur”)

$$\mathbb{P}_a \xrightarrow{\sim} P (17)$$

(définissant un isomorphisme

$$\Pi_a \longrightarrow \Gamma_P = \text{Aut}_{\Pi_{g,\nu}}(P).) (18)$$

Cette fois-ci, on s'attend à trouver des ensembles d'isomorphismes *finis*, au lieu de torseurs sous des groupes profinis considérables <sup>64</sup>.

On considère les *points* de  $\pi$ , comme les classes de  $\pi$ -conjugaison de relèvements “admissibles” de (16) en

$$\Pi_a^{\natural} \longrightarrow \mathcal{M}_a \subset \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) (19)$$

---

<sup>64</sup>Le cas où  $P$  est le torseur trivial est celui des  $\pi$  [extérieurs ?] munis d'une *prédiscretification* orientée  $\alpha$ ; d'où une suite exacte:

$$1 \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{\alpha} \longrightarrow \hat{\mathcal{N}}_{\alpha} \longrightarrow \Pi_{\alpha} \longrightarrow 1$$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

i.e. un germe de vraie action de  $\Pi_a$  sur  $\pi$  avec  $\pi^{\Pi_a} = 1$  ceci pour l'admissibilité.

*Question liminaire:* La connaissance de  $\pi$ , de  $\Sigma_a = \hat{\Sigma}_a^+ \subset \hat{\Sigma}(\pi)$ , et d'un sous-groupe  $\Gamma \subset \hat{\Sigma}(\pi)$  (normalisant  $\Sigma_a$ , tel que  $\Gamma \cap \Sigma_a = \{1\}$ ) permet-elle de retrouver l'arithmétisation de  $\pi$  – et, pour commencer, de retrouver  $\mathcal{N}_a$  (dans lequel  $\Gamma \cdot \Sigma$  est d'indice fini)? Il suffirait, pour pouvoir répondre par l'affirmative, de savoir que tout isomorphisme extérieur  $\pi \longrightarrow \pi_{g,\nu}$ , qui envoie  $\Sigma$  sur  $\hat{\Sigma}_{g,\nu} = \Sigma_{g,\nu}$ , et tout sous-groupe d'indice fini  $\Gamma' \cdot \Sigma$  de  $\mathcal{N}_a$  dans  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ , est compatible avec les arithmétisations. Or ceci revient exactement à:

(g) (facultatif, quand-même!) Pour tout sous-groupe ouvert  $\mathcal{N}'$  de  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ , les éléments de  $\hat{\Sigma}_{g,\nu}$  normalisant  $\hat{\Sigma}_{g,\nu}$  et qui transportent  $\mathcal{N}'$  dans  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ , sont dans  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  (a fortiori  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  serait son propre normalisateur dans  $\text{Norm}_{\hat{\Sigma}_{g,\nu}}(\hat{\Sigma}_{g,\nu})$ ).

Avec les “points de  $\mathcal{U}$ ” (définis comme classes de conjugaison de relèvements (19)) “admissibles” i.e. satisfaisant (20), on fait un groupoïde, ayant comme groupe fondamental extérieur  $\pi$ , et sur lequel  $\Gamma \subset \mathcal{N}_a$  opère strictement (NB. pour se reposer, on se donne maintenant  $\Gamma$  lui-même, pas seulement un germe – moralement, cela signifie qu'on a une courbe définie sur une sous-extension finie  $K$  de  $\overline{Q}/Q$ ... Les points fixes de  $\Gamma$  correspondent aux points rationnels sur  $K$ , les points fixes sous un sous-groupe fermé  $\Gamma'$  aux points rationnels sur la sous-extension  $K'$  de  $\overline{Q}/Q$  associée à  $\Gamma'$ ...)

Soit maintenant  $I' \subset I = I(\pi)$  une partie de  $I$ , stable par  $\Gamma$ . On trouve par “bouchage de trous en  $I'$ ” un groupe extérieur à lacets  $\pi'$ , et un homomorphisme extérieur

$$\pi \longrightarrow \pi'. (20)$$

D'ailleurs  $\pi'$  hérite d'une arithmétisation  $a'$  par  $\pi$  – et on aura

$$\Pi_a \xrightarrow{\sim} \Pi_{a'} P \simeq \mathbb{P}_a \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}_{a'} (21)$$

donc  $\pi'$  est défini sur la même  $P$  que  $\Pi_a$  (i.e. en faisant des trous dans  $\mathcal{U}$  pour trouver  $\mathcal{U}'$ , on n'a pas dérangé le corps de base algébrique absolu  $\overline{Q}$ ...). D'ailleurs on aura un homomorphisme canonique

$$\hat{\Sigma}(\pi) \longrightarrow \hat{\Sigma}(\pi')$$

## A. GROTHENDIECK

induisant

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}_a & \longrightarrow & \mathcal{N}_{a'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \hat{\mathfrak{Z}}_a & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}_{a'} \end{array} \quad (22)$$

(induisant justement  $\Pi_a \longrightarrow \Pi_{a'}$  par passage aux quotients), et on trouve, en composant

$$\Gamma \hookrightarrow CN_a \longrightarrow \mathcal{N}_{a'}$$

un homomorphisme également injectif

$$\Gamma \hookrightarrow CN_{a'} \quad (23)$$

qui est une quasi-section de  $\mathcal{N}_{a'}$  sur  $\Pi_{a'}$ . Donc sous réserve d’admissibilité, on trouve sur  $\pi'$  une structure de courbe algébrique potentielle, relative au même  $P$ .

Je suis vraiment gêné aux entournures, faute d’avoir une définition en forme d’“admissible” – je vais y revenir très vite – mais pour le moment, j’ai envie de noter que, si  $I' \neq \emptyset$ , le groupe extérieur  $\pi'$  peut se décrire par un vrai groupoïde, ayant  $I'$  comme ensemble d’objets, et sur lequel  $\Gamma$  opère en sens strict (ceci est de l’algèbre pure, indépendamment des histoires d’arithmétisation...) Le fait que  $\Gamma$  opère trivialement sur les  $i' \in I'$  implique que pour tout  $i' \in I'$ , on a un homomorphisme canonique

$$\Gamma \longrightarrow \pi'(i') \quad (24)$$

qui relève son action extérieure, d’où une classe de  $\pi'$ -conjugaison de relèvements de l’action extérieure de  $\Gamma$  sur  $\pi'$  en une vraie action de  $\Gamma$  sur  $\pi'$  – on espère qu’elle satisfait  $\pi'^\Gamma = 1$  – et on a donc une application canonique

$$I' \longrightarrow \text{Pts}(\pi', \alpha', \Gamma). \quad (25)$$

*Je dis que cette application est injective.* Ceci est “évident” quand on interprète “action extérieure admissible” par “réalisable par une vraie courbe algébrique”, et “relèvements admissibles” par “réalisables par des vrais points rationnels sur  $K$ , corps des invariants de  $\Gamma$ ”<sup>65</sup>. Mais on voudrait bien sûr des raisons internes à la donnée des  $(\mathcal{N}_{g,v})$ , et des propriétés de ces données! Ce point étant admis (en mettant entre parenthèses les deux définitions essentielles

---

<sup>65</sup>On est ramené au cas  $\text{Card}(I') = 2 \dots$

d’admissibilité, sur lesquelles on va revenir plus bas) on trouve un foncteur “bouchage de trous” (il faut faire aussi les restrictions anabéliennes habituelles):

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Courbes algébriques potentielles} & & \text{Courbes algébriques potentielles} \\
 \text{sur } P \text{ relatives à un sous-groupe ouvert } \Gamma & \longrightarrow & \text{sur } P \text{ relatives à } \Gamma \\
 \text{de } \Pi_P, \text{ et munies d'un ensemble} & & \text{munies d'une partie de l'ensemble} \\
 I' \text{ de points à l'infini} & \text{QuadQuad} & \text{des "points invariants sous } \Gamma \text{"}
 \end{array}$$

et sauf erreur, il est devenu évident que ce foncteur est une *équivalence de catégories* [pour les isomorphismes] et comme conséquence, il y a le foncteur en sens inverse: forer des trous en des “points” invariants sous  $\Gamma$  (ou en des points quelconques, quitte à passer à un  $\Gamma'$  plus petit).

Mais je me rends compte que ce n’est pas du tout évident – je vais essayer d’élucider la situation axiomatiquement. On a fixé un genre  $g$ , on suppose donné, pour  $\nu$  variable (tel que  $(g, \nu)$  anabélien) des sous-groupes fermés  $\mathcal{N}_{g,\nu} \subset \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$ , normalisant  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$ , et satisfaisant la condition essentielle que les  $\psi_i : \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu} \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu-1}$  induisent

$$\mathcal{M}_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{g,\nu-1},$$

ce qui permet de définir la notion d’arithmétisation d’un  $\pi$  profini de type  $(g, \nu)$  anabélien, et la théorie du bouchage d’un nombre quelconque de trous, et du forage d’un seul trou, dans la catégorie des groupes de type  $(g, \nu)$  arithmétisés.

On suppose d’autre part donné une sous-catégorie pleine <sup>66</sup> de la catégorie des groupes profinis (qui pourrait se réduire aux sous-groupes ouverts de  $\Pi_g$ , valeur commune des  $\Pi_{g,\nu}$ , ou des sous-groupes ouverts du groupe  $\Pi_a$ ,  $a$  une arithmétisation), et une notion d’opérations extérieures “admissibles” de tels  $\Gamma$  sur des  $\pi$  arithmétisés. On suppose

- (1) Si  $\Gamma$  opère admissiblement sur  $\pi$ , tout sous-groupe ouvert aussi (et inversement);
- (2) <sup>67</sup> Il suffit de la poser pour  $\text{Card}(I') = 1$ , i.e. bouchage d’un trou – d’ailleurs si on sait que la condition d’admissibilité ne dépend que de l’action des noyaux des groupes. Si de plus  $\Gamma$  invarie une partie  $I'$  de  $I = I(\pi)$ , alors en “bouchant  $I'$ ”, l’opération de  $\Gamma$  sur  $\pi'$  est admissible.

<sup>66</sup>On la supposera stable par passage à des sous-groupes ouverts.

<sup>67</sup>(\*\*\*)

## A. GROTHENDIECK

Quand on a une action *effective* (pas extérieure) de  $\Gamma$  sur un  $(\pi, a)$  de type  $(g, \nu)$ , alors le foncteur “forage de trous” donne une action extérieure sur un  $(\pi^\circ, a^\circ)$  de type  $(g, \nu + 1)$  et on dit que l’action de départ est admissible, si l’action *extérieure* déduite l’est. On trouve ainsi une *équivalence* entre la catégorie des systèmes  $(\pi, a, \Gamma, \psi, i)$  d’un  $(\pi, a)$  de type  $(g, \nu + 1)$ , avec une opération *extérieure* admissible  $\psi$  d’un  $\Gamma$  dessus, et un  $i \in I(\pi)$  stable par  $\Gamma$ , avec la catégorie des  $(\pi', a', \Gamma, \psi')$  des  $(\pi', a')$  de type  $(g, \nu)$ , avec une *vraie* action admissible  $\psi'$  de  $\Gamma$  dessus. La condition (2) assure que si  $\Gamma$  opère effectivement, de façon admissible, alors l’action extérieure déduite est admissible (mais l’inverse ne sera pas vrai – il y aura des relèvements “pathologiques” d’une action extérieure admissible donnée...). On suppose de plus

(3) Si  $\Gamma$  opère effectivement de façon admissible sur  $\pi$ , alors  $\pi^\Gamma = \{1\}$ .

Cela implique que la catégorie des  $\Gamma$ -points de  $\pi$ , ou si on veut des sections de  $B_{\pi, \Gamma} (\simeq B_\mu)$  sur  $B_\Gamma$ , est rigide. Mais considérons la catégorie limite inductive de la catégorie des sections de  $B_{\pi, \Gamma} \simeq B_\mu$  sur des  $B_{\Gamma'}$  ( $\Gamma'$  sous-groupe ouvert); elle est discrète et correspond à l’ensemble

$$\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi, \Gamma^\natural}) \simeq \varinjlim_{\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi, \Gamma'})}$$

où l’on prend la limite inductive sur les ouverts  $\Gamma'$  de  $\Gamma$ .

Si  $\mathrm{Pt}(B_{\pi, \Gamma}) \neq \emptyset$ , alors (du seul fait que  $\pi^{\Gamma'} = \{1\}$  pour tout sous-groupe ouvert de  $\Gamma$ ) le groupe extérieur  $\pi$  peut être décrit canoniquement par un groupoïde profini  $\underline{\mathrm{Pt}}(B_{\pi, \Gamma})$  ayant  $\mathrm{Pt}(B_{\pi, \Gamma})$  comme ensemble d’objets<sup>68</sup>, liés par le groupe extérieur  $\pi$ , sur lequel  $\Gamma$  opère en sens strict, le stabilisateur  $\Gamma_p$  de tout point étant ouvert, et  $\Gamma_p \longrightarrow \mathrm{Aut}(P) (\simeq \pi \text{ modulo automorphismes intérieurs})$  étant continue. On a ici que si à tout  $P \in \mathrm{Pt}(B_{\pi, \Gamma})$  on associe la classe d’isomorphie de sections de  $B_{\pi, \Gamma}$  sur  $B_\Gamma$ , on trouve une bijection – ce qui caractérise le  $\Gamma$ -groupoïde en question à *isomorphisme* unique près. On supposera:

(4) Si  $\Gamma$  opère admissiblement sur  $(\pi, a)$ , alors il existe un sous-groupe ouvert  $\Gamma'$  de  $\Gamma$  dont l’opération extérieure se relève en une opération effective admissible – i.e.  $\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\Gamma, \pi}) \neq \emptyset$ .

Notons que dans la situation envisagée, du bouchage d’un trou  $i \in I(\pi)$  d’un  $\pi$ , en plus de l’homomorphisme

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i \xrightarrow{\psi_i} \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_i)$$

---

<sup>68</sup>Le groupoïde à opérateurs stricts  $\underline{\mathrm{Pt}}(B_{\pi, \Gamma})$  dépend fonctoriellement de  $(\pi, \Gamma)$ , pour des morphismes extérieurs [??].

associé, donnant par composition

$$\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i \xrightarrow{\psi'_i} \hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_i)$$

d'où une action extérieure de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$  sur  $\pi'_i$ , de façon que les  $\pi \xrightarrow{p_i} \pi'_i$  commutent aux actions extérieures de  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , on a un homomorphisme canonique d'extensions, provenant de cette action extérieure et de l'homomorphisme  $p_i : \pi \longrightarrow \pi'_i$ ;

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{E}}(\pi)_i & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow p_i & & \downarrow \varphi_i & \nearrow [\psi_i] & \downarrow \psi'_i \\ 1 & \longrightarrow & \pi'_i & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{E}}(\pi'_i) & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}(\pi'_i) \longrightarrow 1 \end{array}$$

qui n'est *pas* le composé

$$\hat{\mathfrak{E}}(\pi)_i \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)_i \xrightarrow{\psi_i} \hat{\mathfrak{E}}(\pi'_i)$$

(il peut se définir chaque fois qu'on a un groupe  $\Gamma$ , i.e.  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , qui commute extérieurement sur deux groupes extérieurs  $\pi$ ,  $\pi'$ , et qu'on a un homomorphisme  $p_i : \pi \longrightarrow \pi'$  qui commute à l'action de  $\Gamma$ , et tel que le centre de  $\pi$  et le centralisateur de son image dans  $\pi'$  soient triviaux...) C'est aussi ici l'homomorphisme de "transport de structure", qui pour tout automorphisme à lacets  $u$  de  $\pi$ , associe l'automorphisme correspondant de  $\pi'_i$ . On a oublié de préciser:

(g) L'homomorphisme canonique  $(\hat{\mathfrak{E}}_{g,v})_i \longrightarrow \hat{\mathfrak{E}}_{g,v-1}$  associé à  $i \in [0, v-1]$  envoie  $(\mathcal{M}_{g,v})_i$  dans  $\mathcal{M}_{g,v}$ , donc il s'insère dans un homomorphisme de suites exactes:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \mathcal{M}_a(\pi)_i & \longrightarrow & \mathcal{N}_a(\pi)_i \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow \varphi_i & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi'_i & \longrightarrow & \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i) & \longrightarrow & \mathcal{N}_{a'}(\pi'_i) \longrightarrow 1 \end{array} \quad (26)$$

Ceci posé, si on a une opération extérieure admissible  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_a(\pi)$  de  $\Gamma$  sur  $\pi$ , fixant  $i$ , donc aussi par exemple  $\mathcal{N}_a(\pi) \longrightarrow \mathcal{N}_{a'}(\pi')$  sur  $\pi'_i$ , on peut considérer que tout relèvement  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_a(\pi)$  pour  $\pi$  définit par composition un relèvement  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i)$  pour  $\pi'_i$ . On conclut aisément de (2) que si le premier est admissible, le deuxième l'est. On trouve donc

$$\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi,\Gamma}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i,\Gamma}) \quad (27)$$

## A. GROTHENDIECK

et en passant à la limite, une application de  $\Gamma$ -ensembles:

$$\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi, \Gamma^\natural}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma^\natural}) \quad (28)$$

– qui correspond d’ailleurs à un homomorphisme de  $\Gamma$ -groupoïdes

$$\underline{\mathrm{Pt}}_{ad}(B_{\pi, \Gamma^\natural}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Pt}}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma^\natural}). \quad (29)$$

Ceci posé, soit  $P \in \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma})$  le “point canonique” de  $\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma}) = (\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma^\natural}))^\Gamma$ . On demande:

(5) L’application (27) induit une *bijection*

$$\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi, \Gamma}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma}) \setminus \{P\}$$

ou encore (passant à la limite) une bijection de  $\Gamma$ -ensembles

$$\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi, \Gamma^\natural}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi'_i, \Gamma^\natural}) \setminus \{P\}.$$

Ceci signifie trois choses:

- (a) L’homomorphisme canonique  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i)$ , composé de  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_a(\pi)$  et de  $\mathcal{N}_a(\pi) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i)$ , n’est pas  $\pi'_i$ -conjugué à un homomorphisme composé  $\Gamma \xrightarrow{\lambda} \mathcal{M}_a(\pi) \xrightarrow{\varphi_i} \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i)$ , où  $\Gamma \xrightarrow{\lambda} \mathcal{M}_a(\pi)$  est un relèvement admissible.
- (b) Si  $\lambda, \mu : \Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_a(\pi)$  sont deux relèvements admissibles de  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_a(\pi)$  tels que  $\varphi_i \circ \lambda$  et  $\varphi_i \circ \mu : \Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i)$  soient  $\pi'_i$ -conjugués, alors  $\lambda$  et  $\mu$  sont déjà  $\pi$ -conjugués.
- (c) Tout relèvement admissible de  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_{a'}(\pi'_i)$  en  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_{a'}(\pi'_i)$ , provient par composition d’un relèvement admissible  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_a(\pi)$ .

Grâce à ceci: l’équivalence de catégories entre systèmes  $(\pi, a, i, \Gamma, \theta : \Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_a)$  et les systèmes  $(\pi', a', \Gamma, \theta' : \Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_{a'}, P)$ , où  $P \in \mathrm{Pt}(B_{\pi', \Gamma^\natural})^\Gamma$ , se précise de façon parfaite au niveau des points: les points  $\Gamma$ -rationnels de  $B_\pi$  s’identifient à l’un des pts  $\Gamma$ -rationnels de  $B_{\pi'}$ , distincts de  $P$ .

Ceci nous permet alors (ce qui n’était pas faisable dans le contexte discret!) d’étendre l’équivalence de catégories en une équivalence:



[Catégorie des systèmes  $(\pi, \alpha, I', \Gamma, \theta : \Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_\alpha)$  d'un  $\pi$  arithmétisé par  $\alpha$  de type  $(g, \nu)$  avec  $2g + (\nu - \text{card}(I')) \geq 3$ , de  $I' \subset I(\pi)$ , d'une action *admissible* extérieure de  $\Gamma$  sur  $\pi$  telle que  $\Gamma$  fixe chaque point de  $I'$ ]

| )(30)

[Catégorie des systèmes  $(\pi', \alpha', I', \Gamma, \theta' : \Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_{\alpha'})$  d'un  $\pi'$  arithmétisé par  $\alpha'$  de type  $(g, \nu')$  [ $\nu' = \nu - \text{card}(I')$ ] avec opération extérieure admissible de  $\Gamma$  dessus, et une partie  $I' \subset \text{Pt}_{ad}(B_{\pi', \Gamma})$  (donc  $I' \subset \text{Pt}_{ad}(B_{\pi', \Gamma})^\Gamma$ ), i.e.  $I'$  formé de points invariants par  $\Gamma$ , i.e. “ $\Gamma$ -rationnels”].

On a alors un foncteur quasi-inverse: forage de trous en  $I'$ ! Il est à noter que dans cette approche, on a dû se borner au cas d'un ensemble de points  $I' \subset I(\pi)$ , non seulement stable par  $\Gamma$ , mais inclus dans  $I^\Gamma$ , ou encore à une partie  $I' \subset \text{Pt}(B_{\pi', \Gamma})$  non seulement stable par  $\Gamma$ , mais même dans  $\text{Pt}(B_{\pi', \Gamma})^\Gamma$ . Pour montrer que sans cette restriction, le foncteur naturel correspondant est néanmoins une équivalence, on est ramené à ceci:

(6) Soit  $(\pi, a, I' \subset I(\pi))$  avec  $(\pi, a)$  groupe à lacets extérieur profini arithmétisé de type  $(g, \nu)$ , d'où  $(\pi', a')$  – soit  $\Gamma$ , avec  $\Gamma'$  sous-groupe ouvert opérant sur  $(\pi, a)$  de façon admissible ( $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_a(\pi)$ ), et laissant stable  $I'$ , donc il opère de façon admissible sur  $(\pi', a')$ . Supposons donné un *relèvement* de cette action de  $\Gamma'$  en une action admissible de  $\Gamma$  sur  $\mathcal{N}_{a'}$ , qui invarie  $I' \subset \text{Pt}(B_{\pi', \Gamma}) \simeq \text{Pt}(B_{\pi', \Gamma'})$  [cf. le diagramme],

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{N}_a)_{I'} & \xleftarrow{\Gamma'} & \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathcal{N}_{a'} & \xleftarrow{\Gamma} & \end{array}$$

Alors il existe une action admissible unique de  $\Gamma$  sur  $(\pi, a)$ , qui prolonge celle de  $\Gamma'$  et qui donne naissance à celle donnée sur  $\pi'$ .

L'unicité est-elle de toutes façons claire? Considérons l'extension  $E$  de  $\Gamma$  par  $L = \text{Ker}((\mathcal{N}_a)_{I'} \longrightarrow \mathcal{N}_{a'})$ , image inverse de l'extension  $(\mathcal{N}_a)_{I'}$  (de  $\mathcal{N}_{a'}$  pas  $L$ ) via  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_{a'}$ , on a un scindage partiel de cette extension au dessus du sous-groupe  $\Gamma'$  de  $\Gamma$ , et l'assertion est que ce scindage se *prolonge, de façon unique* à  $\Gamma$ . On peut supposer  $\Gamma'$  invariant dans  $\Gamma$ , et on identifie  $\Gamma'$  à un sous-groupe de  $E$ . Toutes les sections de  $E$  sur  $\Gamma$  s'identifient à des sous-groupes, sections  $\tilde{\Gamma}$  de  $E$ . Pour un tel  $\tilde{\Gamma}$ , on a bien sûr  $\tilde{\Gamma} \subset \text{Norm}_E(\Gamma')$ , d'ailleurs on a évidemment:

$$\text{Norm}_E(\Gamma') \cap L = L^{\Gamma'} \quad (31)$$

## A. GROTHENDIECK

et je présume qu'on doit avoir  $L^{\Gamma'} = 1$  (qui généralise la condition (3) plus haut...) Or cette condition implique l'unicité – savoir  $\tilde{\Gamma} = \text{Norm}_E(\Gamma')$  et l'existence signifie que

$\text{Norm}_E(\Gamma') \longrightarrow \Gamma$  est un épimorphisme (donc un isomorphisme...).

Mais il faudra essayer de préciser, dans certains contextes (au moins celui des actions arithmétiquement fidèles, i.e.  $\Gamma \longrightarrow \Pi_a$  injectif – qui correspond normalement au cas des courbes algébriques définies sur des extensions *algébriques* de  $Q$ ) – la notion d'action “admissible”. Pour ceci, on doit revenir sur la relation entre courbes (potentielles) et revêtements finis, ce qui donne aussi une façon de faire varier  $g$ .

Mais j'ai envie d'abord de reprendre sous un autre aspect (peut-être plus général) le formalisme précédent, qui peut-être aussi s'applique au cas des groupes *discrets* à lacets (je pense au formalisme des  $\mathcal{U}^!$ , lié aux actions extérieures de groupes finis sur de tels groupes à lacets). Soit  $\mathcal{X}$  un ensemble  $\neq \emptyset$  (moralement, un ensemble de “points” d'une courbe algébriques, ou d'une surface topologique...); on suppose donné, pour toute partie finie  $I$  de  $\mathcal{X}$ , de complémentaire  $\mathcal{U}_I = \mathcal{X} \setminus I$ , un groupoïde  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$ , ayant  $\mathcal{U}_I$  comme ensemble d'objets. De plus, pour  $J \supset I$  i.e.  $\mathcal{U}_J \subset \mathcal{U}_I$ , on suppose donné un homomorphisme de groupoïdes

$$\Pi_{\mathcal{U}_J} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_I}$$

qui sur les objets soit l'inclusion  $\mathcal{U}_J \hookrightarrow \mathcal{U}_I$ . On supposera la transitivité (stricte) i.e. [l'existence d']un foncteur covariant de la catégorie des parties  $\mathcal{U}$  de  $\mathcal{X}$  complémentaires de parties finies <sup>69</sup> (avec les inclusions), vers la catégorie des groupoïdes, qui sur l'ensemble d'objets coïncide avec le foncteur évident... On suppose de plus que pour tout  $i \in I$ , on se donne un groupoïde  $\Pi_i$  (ou  $\Pi_{D_i^*}$ ), et pour  $i \in I \in \mathfrak{P}_f(??)$  un homomorphisme de groupoïdes

$$\Pi_{D_i^*} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_I}$$

compatible avec les morphismes de transition  $\pi_{\mathcal{U}_I} \longrightarrow \pi_{\mathcal{U}_J}$ ,  $I \supset J$ . On suppose que pour  $I$  fixé, on trouve sur  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$  une structure de groupoïde à lacets par

$$\Pi_{D_i^*} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_I}$$

---

<sup>69</sup>Si  $\mathcal{X}$  est fini et  $I = \mathcal{X}$ , on suppose que cependant  $\Pi_{\mathcal{U}_I} (= \Pi_{\emptyset})$  n'est pas le groupoïde vide, mais un groupoïde (qui s'envoie dans les précédents...) mais on ne pourra pas exiger la transitivité stricte Il faudrait peut-être faire des hypothèses anabéliennes sur  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$ .

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

sans d'ailleurs exclure le cas où  $I = \emptyset$ , et où ( $\Pi_{\mathcal{X}}$  étant connexe, disons) le genre est 0. On suppose de plus que si  $J \supset I$  i.e.  $\mathcal{U}_J \subset \mathcal{U}_I$ , et pour  $i \in J \setminus I$ , l'homomorphisme composé

$$\Pi_{D_i^*} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_J} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_I}$$

soit "constant", de telle façon que  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$  se déduise de  $\Pi_{\mathcal{U}_J}$  par "bouchage des trous" en  $J \setminus I$ .

Jusqu'à présent, tout ceci pouvait se visualiser par exemple en partant d'une surface topologique orientable  $X$ , et d'une partie  $\mathcal{X}$  de  $X$  rencontrant toute composante connexe, en prenant pour  $\Pi_I$  la restriction à  $\mathcal{X} \setminus I$  du groupoïde fondamental de  $X \setminus I$  (si  $I \neq \mathcal{X}$ ; si  $\mathcal{X} = I$ , ce qui exige  $\mathcal{X}$  fini, on prendra le groupoïde fondamental de  $X \setminus I = X \setminus \mathcal{X}$ , qu'on aura du mal à envoyer dans les autres avec transitivité *stricte*, qu'à cela ne tienne!) Mais, on est surtout intéressé au cas  $\mathcal{X}$  infini. Où on prend  $X$  courbe algébrique sur un corps algébriquement clos,  $\mathcal{X}$  partie de  $X$  rencontrant toute composante connexe, et on définit les  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$  comme précédemment.

Soit maintenant  $\Gamma$  une groupe qui opère sur la situation (*strictement*, s'entend), donc sur l'ensemble  $\mathcal{X}$ , les groupoïdes  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$ , les  $\Pi_{D_i^*}$  (NB qu'il permute entre eux), en commutant aux homomorphismes

$$\Pi_{\mathcal{U}_I} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_J} \text{ et les } \Pi_{D_i^*} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_I}.$$

(On aura des difficultés, si  $\mathcal{X}$  est fini, pour  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$  quand  $I = \mathcal{X}$ , pour la commutation *stricte* des  $\Pi_{\mathcal{U}_X} \longrightarrow \Pi_{\mathcal{U}_J} \dots$  mais passons...) Nous supposons définie une notion de sous-groupe *admissible* de  $\Gamma$  (ils sont en tout cas  $\neq \{1\}$ ) telle que si  $\Gamma'$  est admissible alors tout sous-groupe  $\Gamma'' \supset \Gamma'$  aussi.

On suppose

(1°)  $\forall P \in \mathcal{X}, \Gamma_P \neq \{1\}$ , et  $\Gamma_P$  d'indice fini dans  $\Gamma$  (i.e. l'orbite de  $P$  finie).

Nous voulons des conditions qui assurent que  $\mathcal{X}$  et les  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$  etc. peuvent se reconstruire à isomorphisme canonique près à l'aide des données purement groupoïdiques ou topologiques (à opérateurs  $\Gamma$ ) correspondantes. On peut le dire en langage topologique savant, mais on va l'exprimer en termes de théorie des groupes à lacets. Soit  $I$  une partie de  $\mathcal{X}$  stable par  $\Gamma$ , on voudrait poser des conditions qui permettent d'exprimer (pour tout tel  $I$ ) la situation des groupoïdes  $\Pi_V$  associés aux  $V \supset \mathcal{U}_I$  (i.e. les  $\mathcal{U}_J$  avec  $J \subset I$ ), les  $\Pi_{D_i^*}$  ( $i \in I$ ) et l'opération de  $\Gamma$  dessus, en termes des seules opérations de  $\Gamma$  sur le groupe extérieur à lacets  $\pi_1(\Pi_{\mathcal{U}_I})$  associé à  $I$  ou plutôt (car cela est immédiat, par l'opération de forage de trous), en sens inverse, montrer

## A. GROTHENDIECK

comment, sous réserve d'anabélianité, disons de  $\Pi_{\mathcal{X}}$  (pour fixer les idées), on peut plus ou moins reconstituer  $\Pi_{\mathcal{U}_I}$  et l'action de  $\Gamma$  dessus..., à partir de  $\Pi_{\mathcal{X}}$  (ou plutôt, du topos  $B_{\Pi_{\mathcal{X}}}$ ), et de l'action de  $\Gamma$  dessus. On veut au moins une description intrinsèque des éléments de  $\mathcal{X}$  et de l'action de  $\Gamma$  dessus, via cette action “molle” – qui, pour  $\mathcal{X}$  connexe, revient encore à une action extérieure de  $\Gamma$  sur un groupe à lacets (*sans* lacets!)  $\pi...$

Une première condition, sous forme faible, est que (supposant  $\mathcal{X}$  connexe, et appelant  $\pi(I)$  le groupe extérieur  $\pi_1(\Pi_{\mathcal{U}_I})$ , pour tout partie finie  $I$  de  $\mathcal{X}$ ) que pour  $\pi(I)$  anabélien (ce qui sera le cas pour  $I$  “assez grand”, du moins si  $\mathcal{X}$  est infini, donc qu'on puisse prendre  $I$  de cardinal arbitrairement grand...) l'application évidente

*classes de*

$\pi(I)$ -conjugaison  $U_I \longrightarrow \mathrm{Pt}(B_{\pi(I), \Gamma^\natural}) \xrightarrow{\sim} \text{de germes descindage de l'extension } E(I)(2^\circ) \text{ (compatible avec } \pi(I) \text{)}$  soit *injective*. Mais pour aller plus loin, il faudrait pouvoir donner une caractérisation de l'image. Notons (nous plaçant dans le contexte profini désormais) que si on se donne sur les  $\pi(I)$  des arithmétisations, compatibles avec les homomorphismes extérieurs de bouchage de trous  $\pi(I) \longrightarrow \pi(J)$ , et avec l'action de  $\Gamma$  sur les  $\pi(I)$ , on a donc un homomorphisme canonique de  $\Gamma$  dans le groupe commun  $\Pi$  des automorphismes arithmétiquement extérieurs de ces arithmétisations (et même  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{M}_{\pi(\theta)=\pi}$ , ce qui est déjà une donnée nettement plus forte). On peut donc supposer donnée une notion de *relèvement admissible* d'une telle action arithmétiquement extérieure, de telle façon que l'application (2°) soit une bijection

$$\mathcal{U}_I = \mathcal{X} \setminus I \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi(I), \Gamma^\natural}).$$

Ceci signifie d'ailleurs, pratiquement, que la notion d'admissibilité satisfait aux conditions (1°) à (6°) vues ci-dessus.

Quant à savoir ce qu'il y a lieu d'appeler opération extérieure “admissible” de  $\Gamma$  sur un groupe extérieur profini à lacets, cela reste pour le moment conjectural. On pourrait à titre expérimental conjecturer que la notion qui suit marcherait. Appelons “admissible” toute telle action

$$\Gamma \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$$

qui respecte une arithmétisation  $a$ , i.e. qui se factorise par le  $\mathcal{N}_a$  correspondant, telle que l'image de  $\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_a / \hat{\mathfrak{Z}} = \Pi_a$  soit ouverte, et que pour tout homomorphisme de bouchage

de trous en  $i \in I(\pi)$ ,  $\pi \longrightarrow \pi'_i$ ,  $\mathcal{N}(\pi)_i \longrightarrow \mathcal{M}(\pi'_i)$ , l'homomorphisme correspondant de  $\Gamma_i$  ni d'aucun sous-groupe ouvert  $\Gamma$  de  $\Gamma_i$ , ne normalise un  $L'_j$ ,  $j \in I(\pi'_i) = I \setminus \{i\}$ ; peut-être même faudrait-il imposer que  $\pi^{(\Gamma'^+)} = \{1\}$ , où  $\Gamma'^+$  est le noyau de  $\Gamma' \xrightarrow{\chi} \hat{\mathbb{Z}}^*$  – en tout cas on s'attend à ce que l'on ait alors  $\pi^{\Gamma'} = \{1\}$ , et si ce n'était le cas, il faudrait l'introduire dans la définition – pour chaque opération de bouchage de trous relatif à  $I' \subset I(\pi)$ , et un choix d'un  $i \in I'$ , permettant de définir  $\Gamma_{(I',i)} \longrightarrow \mathcal{M}(\pi(I'))$  <sup>70</sup>.

Notons qu'une vraie action de  $\Gamma$  sur  $\pi$  (pas seulement extérieure) qui relève une action donnée "admissible", est elle-même admissible (en ce sens qu'elle définit une action extérieure *admissible* sur un  $\pi'$  de type  $(g, \nu + 1)$ ), si et seulement si cette action ou plutôt son germe, ne normalise aucun  $L_i$  ( $i \in I(\pi)$ ), et qu'il en soit de même pour l'action induite sur chaque  $\pi(I')$  ( $I' \subset I = I(\pi)$ ) [il suffit de prendre les  $\pi(I')$  pour  $I'$  de la forme  $I \setminus \{j\}$ ,  $j \in I$ , du moins si  $g \neq 0$ ] – et qu'enfin l'action de  $\Gamma^\natural$  sur  $\pi'(I)$  (déduite de  $\pi'$  en bouchant les trous en  $I$ , de sorte que  $\pi'(I)$  a une seule classe de lacets;  $\pi'(I)$  se déduit aussi de l'action effective de  $\Gamma$  sur  $\pi(I)$  – avec 0 classe de lacets – en faisant "un trou" correspondant – relatifs à un point  $i \in I$ ), ne normalise pas de sous-groupe lacets... Mais je présume que la première condition (action de  $\Gamma^\natural$  ne normalisant aucun des  $L_i$ ) implique les autres. Mais il faut dans la définition d'admissibilité aussi tenir compte de la condition (4°), qui implique l'existence de suffisamment de relèvements...

J'en arrive (péniblement!) à une

**Conjecture provisoire profinie** <sup>71</sup> Pour  $\Gamma$  groupe profini donné, une action extérieure sur un  $(\pi, a)$  arithmétisé anabélien de type  $(g, \nu)$  est dite *admissible*, si

- a) L'homomorphisme  $\Gamma \longrightarrow \Pi_a$  a une image ouverte
- b) Les actions *effectives* déduites par bouchages de trous ( $i' \in I' \subset I = I(\pi)$ ) ne normalisent pas de sous-groupe à lacets.
- c) Il existe une infinité de classes de  $\pi$ -conjugaison de germes de scindages de l'extension de  $\Gamma$  par  $\pi$ , qui ne normalisent aucun sous-groupe à lacets de  $\pi$  <sup>72</sup> Cette condition c) exclut

<sup>70</sup> Plus généralement, pour  $i \in I' \subset I = I(\pi)$  on impose que la [??] action de  $\Gamma'_i$  sur  $\pi(I')$  correspondant à  $i$  ne normalise aucun sous-groupe  $L_j$  ( $j \in I \setminus I'$ ). On est ramené pour ceci au cas où  $I' = I \setminus \{j\}$ , donc où  $\pi(I')$  n'a qu'une seule classe de lacets... (si  $g \geq 1$ )

<sup>71</sup> Canulé, cf. plus bas...

<sup>72</sup> (\*\*\*)

## A. GROTHENDIECK

sans doute des cas comme  $\Gamma = \mathcal{N}_{g,\nu}$  avec  $(g, \nu) \neq (0, 3)$ , car l'extension  $\mathcal{M}_{g,\nu}$  de  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  par  $\hat{\pi}_{g,\nu}$  n'admet sans doute pas de germe de scindage - ce qui est équivalent (?) au fait que  $\mathcal{U}_{g,\nu}$  sur  $\mathbb{M}_{g,\nu}$  n'admet pas de multisection étale....

Une action effective de  $\Gamma$  sur  $\pi$  est dite effective, si l'action extérieure est effective, et si elle ne normalise aucun sous-groupe à lacets.

Ceci posé:

a) Si  $\Gamma$  opère effectivement de façon admissible, on a

$$\pi^\Gamma = \{1\}$$

(peut-être même  $\pi^{\Gamma^+} = \{1\}$ ).

b) Si  $i \in I$  est stable par  $\Gamma$  opérant extérieurement de façon admissible, alors l'action effective sur  $\pi' = \pi(i)$  ne normalise aucun  $L'_j$  ( $j \in I \setminus \{i\}$ ).

c) Si  $\Gamma$  opère effectivement sur  $\pi$  de façon admissible, en laissant fixe  $i \in I$ , alors l'action correspondante effective (par passage au quotient) sur  $\pi' = \pi(i)$  ne normalise aucun  $L_j$ ,  $j \in I \setminus \{i\}$ .

d) Si  $\Gamma$  opère effectivement sur  $\pi$  de façon admissible, alors l'application

$$\mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi, \Gamma^\natural}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi', \Gamma^\natural})$$

définie par c) est *injective*, et le complémentaire de son image est égal à  $\{P\}$ , où  $P$  est défini par le “trou”  $i$ .

Mais cette dernière partie de l'assertion, allant au-delà de la seule *injectivité* – et caractérisant l'image, me semble maintenant tout à fait douteuse – en effet, il suffit de regarder un schéma  $S$  de paramètres, de type fini sur  $Q$  (un  $K(\pi, 1)$  de préférence, par exemple une courbe algébrique) et de prendre pour  $\Gamma$  (non le groupe fondamental de son point générique, i.e. d'un corps, mais) le groupe fondamental de  $S$  lui-même. La donnée d'une action extérieure admissible de  $\Gamma$  sur un  $\pi$  correspond moralement à celle d'une famille de courbes  $\mathcal{U}$  de type  $g, \nu$  paramétré par  $S$ .<sup>73</sup> La condition c) est vérifiée par exemple si  $\mathcal{U}$  provient d'une courbe algébrique sur le corps de base lui-même, donc pas de problème – et il est manifeste

---

<sup>73</sup>Les scindages d'extensions correspondent aux section de  $\mathcal{U}$  sur  $S$ .

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

que la surjectivité déconne. La difficulté provient du fait que deux actions *distinctes* de  $\mathcal{U}$  sur  $S$  peuvent ne pas être *disjointes*!

Il faut pouvoir parler de sections “strictement distinctes” i.e. distinctes en tout point de  $S$  – ce qui, en traduction profinie, revient à comparer deux scindages de l’extension de  $\Gamma$  par  $\pi$ , avec les germes de scindages sur  $\Pi' \subset \Pi$  de  $\Gamma$  (en tant qu’extension de  $\Pi_Q$  par une partie géométrique) qui correspondent aux points de  $S$  – i.e. les (germes de scindage) *admissibles* justement. On a l’impression de tourner dans un cercle vicieux ou presque – il semblerait qu’il ne faudrait pas trop vouloir avaler à la fois – traiter d’emblée *tous* les groupes profinis  $\Gamma$  à la fois – mais plutôt se borner d’abord à ceux qui moralement, correspondent à des  $\pi_1$  de schémas de type fini sur  $Q$ , des  $K(\pi, 1)$  disons, ou même des variétés élémentaires à la Artin – et dans les définitions resp. conjectures se tirer par les lacets des souliers, en récurrant sur la dimension. Au premier cran donc (dimension 0) on se bornerait à des actions de groupes  $\Gamma$  qui soient (modulo tout au moins passage à un sous-groupe ouvert) “arithmétiquement fidèles”, par exemple  $\Gamma \longrightarrow \Pi_a$  injectif. Dans ce cas-là, la conjecture telle qu’elle est énoncée tantôt semble raisonnable, ou du moins pas nécessairement déconnante. Le test décisif, il est vrai, serait la possibilité d’obtenir les “courbes” ainsi définies comme des revêtements de  $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\} \dots$

### § 33. — DIGRESSION TOPOLOGIQUE

---

#### Anti-involutions des surfaces orientées algébroides

(<sup>74</sup>) On appelle surface algébroïde une surface  $U$  de la forme  $X \setminus S$ ,  $X$  surface compacte orientable,  $S$  fini. Alors  $X$  est déterminée à homéomorphisme unique près comme “compactifié pur” de  $U$ ; on la note  $\hat{U}$ . Les homéomorphismes de  $U$  avec lui-même s’identifient aux homéomorphismes de  $X$  qui appliquent  $S$  dans lui-même. Les orientations de  $X$  sont en correspondance 1-1 avec celles de  $U$ . Les anti-involutions de  $U$  (supposées orientées) sont en correspondance 1-1 avec celles de  $X$  qui conservent  $S$ .

On trouve alors une équivalence entre la catégorie des surfaces orientées algébroides  $U$  munies d’une anti-involution  $\sigma$ , et des surfaces à bord compactes  $Y$ , munies d’une partie finie  $T$ ; à  $(U, \sigma)$  correspond  $(\hat{U}/\sigma, (\hat{U} \setminus U)/\sigma)$  – et à  $(Y, T)$  correspond  $\tilde{Y} \setminus \tilde{T}$ , où  $\tilde{Y}$  est le “double orienté” de  $Y$  (qui est une surface orientée compacte), et  $\tilde{T}$  est l’image inverse de  $T$  dans  $\tilde{Y}$ .

Nous nous intéressons maintenant au cas où  $U$  est connexe de type  $(g, \nu)$ , en examinant d’abord le cas  $\nu = 0$ , i.e.  $U = \hat{U}$ ,  $S = \emptyset$  (auquel le cas général se ramènera). La condition  $\nu = 0$  correspond au cas où  $T = \emptyset$  – donc les  $U = X$  envisagés s’identifient aux doublements orientés de certaines variétés à bord compactes  $Y$ . Lesquelles? Evidemment il faut que  $Y$  soit *connexe, et non orientable*<sup>75</sup>. Donc  $Y$  est caractérisé, à homéomorphisme près, par son genre

---

<sup>74</sup> Finalement je ne regarde que les surfaces compactes – pourtant le cas non compact serait aussi très intéressant à regarder – pour essayer de retrouver par voie algébrique, sur l’automorphisme extérieur d’ordre 2 du  $\pi_1$ , la disposition des “points à l’infini” de la courbe sur les composantes connexes de  $X^\sigma = \hat{U}$ .

<sup>75</sup> Ce n’est pas vrai que  $Y$  soit nécessairement non orientable – seulement dans le cas où  $X^\sigma = \emptyset$ .



## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

$\gamma$  et le nombre  $\mu$  des composantes connexes du bord – il peut se déduire du plan projectif réel  $Y_0$  en y découpant  $\gamma$  rondelles disjointes, et y recollant des rubans de Möbius, puis en découpant encore  $\mu$  rondelles ouvertes – ce qui donne

$$\chi(Y) = \chi(Y_0) - \gamma \chi_!(\text{rondelles ouvertes}) + \gamma \chi_!(\text{rubans de Möbius ouverts}) \\ - \mu \chi_!(\text{rondelles ouvertes})$$

[où  $\chi(Y_0) = 1$  et  $\chi_!(\text{rondelle ouverte}) = 1$ ]. Or le ruban de Möbius ouvert (dédié de  $Y_0$  en enlevant une rondelle fermée) a un  $\chi_!$  égal à  $\chi(Y_0) - \chi_!(\text{rondelle fermée})$ , soit  $1 - 1 = 0$ , d'où

$$\chi(Y) = 1 - (\gamma + \mu), (1)$$

pour une surface  $Y$  compacte connexe avec un bord à  $\mu$  composantes non orientable de genre  $\gamma$ .

D'autre part, on a

$$\chi(X) = \chi(X \setminus X^\sigma);$$

or  $X^\sigma$  est une réunion de cercles donc son  $\chi$  est nul. Or, comme  $X \setminus X^\sigma$  est un revêtement étale d'ordre 2 de  $Y$ , on a

$$\chi(X \setminus X^\sigma) = 2\chi(\text{Int}(Y))$$

enfin

$$\chi(Y) = \chi(Y \setminus \partial Y) = \chi(\text{Int}(Y));$$

pour la même raison que tantôt ( $\chi(\partial Y) = 0$ ), d'où enfin

$$\chi(X) = 2\chi(Y) = 2(1 - (\gamma + \mu)), (2)$$

ou encore, puisque  $\chi(X) = 2 - 2g$

$$g = \gamma + \mu. (3)$$

Donc on trouve

**Proposition:** <sup>76</sup> La catégorie des surfaces orientées connexe compactes de genre  $g$  munies d'une anti-involution  $\sigma$  est équivalente à celle des variétés compactes à bord *non orientables*, de type  $(\gamma, \nu)$  ( $\gamma$  le genre,  $\mu$  le nombre de trous), avec  $\gamma + \nu = g$ .

---

<sup>76</sup>Non, on ne trouve qu'une sous-catégorie pleine de celle de tous les  $(X, \sigma)$ . Il y a d'autre part aussi les doublements orientés  $\coprod_{\partial Y} Y$  des surfaces *orientables* compactes à bord non vide – si  $Y$  est de type  $(\gamma, \mu)$ ,  $X$  est de genre  $g$  avec  $g = 2\gamma + \mu - 1$  (ou  $\gamma \geq 0, \mu \geq 1$ ).

## A. GROTHENDIECK

**Corollaire:** <sup>77</sup> Il y a exactement  $g + 1$  classes d'isomorphisme de systèmes  $(X, \sigma)$ , classifiés par  $\sigma \leq \mu \leq g$ , où  $\mu = \text{card}(\pi_0(X^\sigma))$ .

Si  $X = X_g$  est une surface orientée compacte de genre  $g$ , cela signifie aussi que dans le groupe  $A_g = \text{Aut}(X_g)$ , il y a exactement  $g + 1$  classes de conjugaison d'éléments  $\sigma$  satisfaisant

$$\sigma^2 = 1, \quad \text{sg}(\sigma) = +1(4)$$

(i.e. qui soient des anti-involutions). Elles fournissent  $g + 1$  classes de conjugaison d'éléments de  $A_g/A_g^\circ = \mathfrak{X}_g$ , satisfaisant les mêmes relations. Nous montrerons (on l'espère!) que ces classes sont distinctes et que tout  $\sigma \in \mathfrak{X}_g$  satisfaisant les relations (4) est dans l'une de ces classes.

On admettra le

**Lemme:** Toute anti-involution du disque unité ou de  $C$  est conjugué de  $z \mapsto \bar{z}$ , et par suite l'ensemble de ses points fixes est homomorphe à  $\mathbb{R}$ , et en particulier est *connexe*.

**Théorème:** Soit  $U$  une surface orientée séparée connexe, paracompacte, *non isomorphe* à  $S^2$ ,  $\sigma$  une anti-involution de  $U$ ,  $\tilde{U}$  un revêtement universel de  $U$ , d'où  $\pi = \text{Aut}(\tilde{U}/U)$  et une extension  $E$  de  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  par  $\pi$ , formée des automorphismes topologiques de  $\tilde{U}$  compatibles avec la relation d'équivalence définie par  $\tilde{U} \setminus U$ , et induisant sur  $U$  l'automorphisme  $\text{id}_U$  ou  $\sigma$ . Alors:

- a) (Pour mémoire)  $U^\sigma$  est une sous-variété fermée de  $U$  de dimension 1.
- b) Pour tout  $x \in U^\sigma$ , on trouve une classe de  $\pi$ -conjugaison de scindages de l'extension  $E$ , à la façon habituelle, d'où une application

$$U^\sigma \longrightarrow \text{Sc}(E, \mathbb{Z}/2), (5)$$

où  $\text{Sc}(E, \mathbb{Z}/2)$  désigne l'ensemble des classes de  $\pi$ -conjugaison de scindages de  $E$  sur  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , ou encore des éléments d'ordre 2 de  $E$  qui ne sont pas dans  $\pi$ . Cette application se factorise en une *bijection*

$$\pi_0(U^\sigma) \simeq \text{Sc}(E, \mathbb{Z}/2). (6)$$

---

<sup>77</sup>Ça ne marche qu'en se limitant aux  $(X, \sigma)$  tels que  $X/\sigma$  non orientable – cf. ci-contre (i.e. (\*)) pour le cas orientable.

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

c) Soit  $Z_i$  une composante connexe de  $U^\sigma$ , correspondant à un scindage  $\sigma_i^-$  d'ordre 2. Alors

$$\pi^{\sigma_i} = \{1\} \quad \text{si et seulement si} \quad Z_i \simeq \mathbb{R}. (7)$$

d) Si  $Z_i \not\simeq \mathbb{R}$ , i.e.  $Z_i \simeq S^1$ , alors, pour une orientation choisie de  $Z_i$ , désignant par  $g_i$  l'élément de  $\pi = \pi_1(U)$  qu'il définit (défini à conjugaison près), et par  $\varphi_i : \mathbb{Z} \longrightarrow \pi$  l'homomorphisme  $\varphi_i(n) = g_i^n$  de  $\mathbb{Z}$  dans  $\pi$ , on a :

1°)  $\varphi_i$  est injectif;

2°) quitte à remplacer  $\varphi_i$  par un conjugué, on a

$$\pi^{\sigma_i} = \text{Im } \varphi_i. (8)$$

Démonstration. On trouve l'application (5) en prenant, pour tout  $x \in U^\sigma$ , l'opération canonique de  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  sur le revêtement universel  $\tilde{U}(x)$  ponctué en  $x$ , et en prenant les opérations correspondantes sur  $\tilde{U}$ , déduites par les isomorphismes  $\tilde{U} \simeq \tilde{U}(x)$ . On voit que les opérations  $\sigma'$  obtenues sur  $\tilde{U}$  (pour  $x$  fixé) sont celles pour lesquelles  $\tilde{U}^{\sigma'}$  a un point au-dessus de  $x$  – donc l'ensemble des  $x$  qui donnent naissance à la classe d'un  $\sigma'$ , sont les éléments de l'image de  $\tilde{U}^{\sigma'}$  par la projection  $\tilde{U} \longrightarrow U$ . Comme par le lemme  $\tilde{U}^{\sigma'}$  est non vide et connexe, il s'ensuit que son image dans  $U^\sigma$  l'est aussi – on va voir que son image est exactement une composante connexe de  $U^\sigma$  – ce qui à la fois prouvera la factorisabilité de (5) par  $\pi_0(U^\sigma)$  (assez triviale de toutes façons) et le fait que l'application déduite de (6) est *bijective*.

Soit  $\tilde{Z}_i$  un revêtement universel de  $Z_i$ , et prenons le revêtement universel correspondant  $\tilde{U}_i$  de  $U$ , de sorte qu'on a

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Z}_i & \longrightarrow & \tilde{U}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_i & \longrightarrow & U \end{array} (9)$$

et par fonctorialité  $\sigma$  opère aussi sur ce diagramme (en opérant trivialement sur  $Z_i, \tilde{Z}_i$ ), soit  $\sigma_i$  son opération sur  $\tilde{U}_i$ . On voit donc que  $\tilde{Z}_i$  s'envoie dans  $\tilde{U}_i^{\sigma_i}$ , qui s'envoie donc *sur*  $Z_i$  – ce qui achève déjà de prouver b).

Considérons l'image de  $\tilde{Z}_i$  dans  $\tilde{U}_i|_{Z_i}$ ; c'est une partie *ouverte* et fermée (comme image d'un homomorphisme de revêtements étales sur la même composante  $Z_i$ ), donc c'est a fortiori une partie ouverte et fermée de  $\tilde{U}_i^{\sigma_i}$ , et comme cet espace est connexe, il lui est égal. De

## A. GROTHENDIECK

plus  $\tilde{Z}_i \longrightarrow \tilde{U}_i^{\sigma_i}$  fait de  $Z_i$  un revêtement étale de son image  $\tilde{U}_i^{\sigma_i}$  dans  $\tilde{U}^{\sigma_i}|Z_i$ , et comme  $\tilde{U}^{\sigma_i}$  est simplement connexe, on trouve finalement

$$\tilde{Z}_i \xrightarrow{\sim} \tilde{U}_i^{\sigma_i}. (10)$$

Lorsque  $Z_i$  est simplement connexe, i.e.  $\tilde{Z}_i \simeq Z_i$ , cela signifie aussi que  $\tilde{U}_i^{\sigma_i}$  est un homéomorphisme (donc  $\tilde{Z}_i = Z_i \longrightarrow \tilde{U}_i^{\sigma_i}$  est l'homéomorphisme inverse). Comme, pour  $x \in Z_i$  et  $\tilde{x} \in (\tilde{U}_i^{\sigma_i})_x$ , les  $\tilde{x}'$  de  $\tilde{U}_i^{\sigma_i}$  au-dessus de  $x$  sont les éléments de la forme  $\tilde{x}\gamma$ , avec  $\gamma \in \pi_i^{\sigma_i}$  ( $\pi_i = \text{Aut}(\tilde{U}_i/U)$ ), il s'ensuit que l'on a bien

$$\pi_i^{\sigma_i} = 1 (11)$$

ce qui est essentiellement la formule (7). Dans le cas  $Z_i$  non simplement connexe, posant

$$T_i = \text{Aut}(\tilde{Z}_i/Z_i) \simeq \pi_1(Z_i; \tilde{Z}_i) (12)$$

on trouve un homomorphisme canonique

$$\varphi_i : T_i \longrightarrow \pi_i (13)$$

et l'injectivité dans (10) équivaut au fait que (13) est injectif. Bien entendu, le choix d'un générateur  $g_i^\circ$  de  $T_i$  équivaut au choix d'une orientation de  $Z_i$ , et  $g_i = \varphi_i(g_i^\circ) \in \pi$  est alors l'élément correspondant de  $\pi_1(U)$  dont il est question dans l'énoncé (moins précis, car on n'y parle que de classe de conjugaison). Il est clair que  $\sigma_i$  (opérant trivialement sur  $T_i$ , et sur  $\pi_i$  par transport de structure) commute à l'homomorphisme injectif  $\varphi_i$ , donc  $\varphi_i$  induit  $T_i \longrightarrow \pi_i^{\sigma_i}$ . Je dis que c'est en fait un *isomorphisme*

$$\varphi_i : T_i \xrightarrow{\sim} \pi_i^{\sigma_i} (14)$$

– il reste à prouver la surjectivité. Mais si  $\gamma \in \pi_i^{\sigma_i}$ , alors  $\tilde{x}\gamma \in \tilde{U}_i^{\sigma_i}$ , donc  $\tilde{x}\gamma \in \varphi_i(\tilde{Z}_i)$  ce qui signifie que  $\tilde{x}\gamma = \tilde{x}\varphi_i(g)$  pour  $g \in T_i$ , donc  $\gamma \in \text{Im } \varphi_i$ , cqfd.

**Corollaire 1:** Soit  $\sigma_i \in \mathfrak{S}_g$  ( $1 \leq i \leq g$ ), correspondant à une anti-involution  $\sigma_i$  de  $X_g$  telle que  $\text{Card } \pi_0(X_g^{\sigma_i}) = i$  et  $X_g/\sigma$  non orientable. Alors

a) Il y a exactement  $i$  classes de  $\pi_g$ -conjugaison d'automorphismes effectifs d'ordre 2 de  $\pi_g$  dans la classe  $\sigma_i$  (ce qui prouve que si  $i \neq j$ ,  $\sigma_i$  et  $\sigma_j$  ne sont pas conjugués dans  $\mathfrak{S}_g$ ...);

## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

b) Si  $u_i \in \mathfrak{S}_g = \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi_g)$  est d'ordre 2 dans la classe  $\sigma_i$ , alors

$$\pi_g \simeq \mathbb{Z}; (14)$$

c) Si  $u_i, u'_i \in \mathfrak{S}_g$  sont d'ordre 2, de classe  $\sigma_i$ , alors  $\exists h \in \mathfrak{S}_g^+$  tel que

$$u'_i = h u_i h^{-1} = \text{int}(h) u_i. (15)$$

(NB. Nécessaire, l'image de  $h$  dans  $\mathfrak{Z}_g^+$  sera dans  $(\mathfrak{Z}_g^+)^{\sigma_i} = \text{Centr}_{\mathfrak{Z}_g^+}(\sigma_i)^+$ .)

Démonstration. a) et b) sont des cas particuliers du théorème, appliqué à une anti-involution  $\sigma_i$  de  $X_g$ , avec  $\pi_0(X_g^{\sigma_i})$  de cardinal  $i$ . Soit  $Y_{g,i} = X_g^{\sigma_i}$  surface compacte à bord non orientable connexe de type  $(g-i, i)$ ; il est bien connu et immédiat que le groupe des automorphismes d'une telle variété est transitif sur  $\pi_0(\partial Y)$ , donc en remontant à  $(X_g, \sigma_i)$ , que le groupe des automorphismes de  $(X_g, \sigma_i)$  est transitif sur  $\pi_0(X_g^{\sigma_i})$ , qu'on peut interpréter aussi comme l'ensemble des classes de  $\pi_g$ -conjugaison de  $u_i$ , comme dans b), c). Cela implique donc qu'il existe  $\dot{h} \in \mathfrak{Z}_g^+$ , commutant à  $\sigma_i$ , tel que – désignant par  $h$  un relèvement dans  $\mathfrak{S}_g^+$  – on ait  $u'_i$   $\pi$ -conjugué à  $\text{int}(h) u_i$ , ce qui signifie aussi qu'on peut (quitte à modifier  $h$ ) le choisir de façon qu'on ait (15).

**Corollaire 2:** Sous les conditions du corollaire précédent, posant  $\pi_g^{u_i} = T (\simeq \mathbb{Z})$ , on a un diagramme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & \mathfrak{S}_g^{+u_i} & \longrightarrow & \mathfrak{Z}_g^{+\sigma_i} \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & \mathfrak{S}_g^{u_i} & \longrightarrow & \mathfrak{Z}_g^{\sigma_i} \end{array} \quad (16)$$

et l'indice de  $\mathfrak{S}_g^{+u_i}$  dans  $\mathfrak{Z}_g^{+\sigma_i}$  (et de  $\mathfrak{S}_g^{u_i}$  dans  $\mathfrak{Z}_g^{\sigma_i}$ ) est  $i$ .

Comme les deux dernières flèches verticales sont des inclusions de sous-groupes d'indice 2, il suffit de traiter l'assertion concernant  $\mathfrak{S}_g^+, \mathfrak{Z}_g^+$ . Or  $\mathfrak{Z}_g^{+\sigma_i}$  opère trivialement sur l'ensemble des classes de  $\pi$ -conjugaison de  $u'_i$ , d'après c); d'autre part le stabilisateur dans  $\mathfrak{Z}_g^{+\sigma_i}$ , pour cette action, de  $u_i$ , est formé des  $\dot{\gamma} \in \mathfrak{Z}_g^{+\sigma_i}$  tels que  $\text{int}(\gamma) u_i$  soit  $\pi$ -conjugué à  $u_i$ , i.e. tels qu'il existe  $\alpha \in \pi$ , avec  $\text{int}(\gamma) u_i = \text{int}(\alpha) u_i$ , i.e.  $\alpha^{-1} \gamma \in \mathfrak{S}_g^{+u_i}$ , ce qui signifie que  $\dot{\gamma}$  est dans l'image de  $\mathfrak{S}_g^{+u_i}$ , cqfd.

J'ai envie de construire une figure géométrique où on puisse mettre en évidence simultanément des anti-involutions topologiques qui donnent naissance aux  $\sigma_i \in \mathfrak{Z}_g$  (à conjugaison

## A. GROTHENDIECK

près, et aux divers  $u_i \in \mathfrak{S}_g$  associés à un  $\sigma_i$  (ce qui sera alors facile, par la recette générale). Nous savons que  $\sigma_i \in \mathfrak{S}_g$  s'obtient en regardant un  $X_g$  comme doublement orienté d'un  $Y = Y_{g-i,i}$ , donc en partant du plan projectif réel  $Y_0$ , en y faisant  $g$  trous, dont on rebouche  $g-i$  par des rubans de Möbius, en laissant les  $i$  autres trous tels quels. Soient  $D_j$  ( $1 \leq j \leq g$ ) les disques disjoints fermés correspondant aux "trous" donc

$$V_{0,j} = Y_0 \setminus \cup_j D_j^\circ (17)$$

est une variété à bord (non orientable), contenue à la fois dans  $Y_0$  et dans  $Y = Y_{g-i,i}$ , et coïncidant même avec  $Y$  en les points de

$$\partial Y = \bigcup_{g-i+1 \leq j \leq g} \partial D_j.$$

Soit  $X_0$  la sphère orientée qui revêt  $Y_0$ , et  $U_0 = X_0 \setminus V_0$  sa restriction sur  $\cup D_j$ , c'est donc le complémentaire d'une réunion de  $2g$  disques

$$U_0 = X_0 \setminus \bigcup_{1 \leq j \leq g} \Delta_j (18)$$

où  $\Delta_j \longrightarrow D_j$  est un revêtement trivial à 2 feuillets de  $D_j$  ( $\Delta_j = \Delta'_j \amalg \Delta''_j \simeq D_j \times \varepsilon_j$ , où  $\varepsilon_j$  est un ensemble à 2 éléments qui s'identifie à l'ensemble des deux orientations de  $D_j$ ....). Soit d'autre part  $M_j$  ( $1 \leq j \leq g-i$ ) le ruban de Möbius dont le bord a été recollé à  $V_0$  par un homomorphisme

$$\partial M_j \simeq \partial D_j. (19)$$

Soit

$$M = \coprod_{1 \leq j \leq g-i} M_j (20)$$

de sorte que

$$Y_{g-i,i} = V_0 \amalg_{\partial M} M. (21)$$

Soit donc  $X = X_g$  le doublement orienté de  $Y_{g-i,i}$  défini par (21), soit  $\tilde{M} = \coprod_{1 \leq j \leq g} \tilde{M}_j$  l'image inverse de  $M$  dedans, qui est un revêtement étale de degré 2 de  $M$ :

$$X_{g,i} = X_g \setminus \text{Int}(\tilde{M}), (22)$$

et on aura

$$X_g = X_{g,i} \amalg_{\partial \tilde{M}} \tilde{M} (23)$$

pour un homéomorphisme bien déterminé de  $\partial \tilde{M}$  avec une partie ouverte et fermée de  $\partial X_{g,i}$ . D'ailleurs, on aura une application continue canonique:

$$\mathcal{U}_0 \longrightarrow X_{g,i} \quad (24)$$

qui définit un homéomorphisme de  $X_{g,i}$  avec la surface obtenue en contractant les  $\partial \Delta_j \subset \mathcal{U}_0$  ( $\partial \Delta_j = (\partial D_j) \times \varepsilon_j$ ), pour  $g-i+1 \leq j \leq g$  à l'aide des projections  $\partial \Delta_j \simeq (\partial D_j) \times \varepsilon_j \longrightarrow D_j$ .

D'autre part, chaque  $\tilde{M}_j$  ( $1 \leq j \leq g-i$ ), revêtement des orientations du ruban du Möbius, est isomorphe au cylindre  $S^1 \times I$ , et son anti-involution canonique est sans point fixe, et s'identifie à  $(z, t) \longrightarrow (-z, -t)$  (où  $S^1$  est identifié aux nombres complexes de module 1, et  $I$  à  $[-1, +1]$ ). D'ailleurs,  $X_0$  orienté avec son anti-involution de revêtement de  $Y_0$  s'identifie à la sphère ordinaire (dans un espace vectoriel euclidien de dimension 3), avec l'anti-involution  $x \longmapsto -x$ . En résumé:

**Proposition:** On peut obtenir (pour  $1 \leq i \leq g$  fixé) les couples  $(X_g, \sigma_i)$ , à homéomorphisme près, en prenant la sphère (euclidienne orientée)  $X_0$ , avec son antipodisme standard  $\tau$ , en prenant un ensemble de  $2g$  disques  $D_j$  ( $j \in J$ ) mutuellement disjoints, stable par  $\tau$ , et une partie  $I' \subset J/\tau = I$  ( $I$  de cardinal  $g$ ) avec  $\text{card}(I') = i$ , et en procédant ainsi: pour tout  $j \in I$ , soient  $\Delta_j = D'_j \cup D''_j$  la réunion des deux disques correspondants, et  $S_j = \partial \Delta_j / \tau$ , de sorte que  $S_j$  est un cercle; soit

$$T_j = S_j \times I^{\varepsilon_j}$$

(où  $I = [-1, +1]$ ,  $\varepsilon_j = \{j \in I \mid j \text{ sur } i\} \simeq$  l'ensemble des orientations de  $S_i$ ,  $I^{\varepsilon_j}$  tordu par  $\varepsilon_j$ , de sorte qu'on a un homéomorphisme canonique:

$$\partial T_j \simeq \partial \Delta_j, \quad (25)$$

de sorte que  $X_g = \mathcal{U}_0 \amalg_{\partial \Delta} T$  (où  $\Delta = \coprod_1^g \Delta_j$ ,  $T = \coprod_1^g T_j$ ) est *orientée*. [NB.  $T_j$  est canoniquement orienté et l'isomorphisme (25) *respecte* comme il se doit l'orientation, i.e.  $\partial T \simeq \partial V_0$  la renverse.] Ceci posé, l'antipodisme  $\tau$  induit sur chaque  $\tilde{M}_i \simeq S_j \times \varepsilon_j$  l'anti-involution canonique provenant de cette expression des  $\partial T_i$ , qui échange les deux composantes connexes. Pour tout  $j \in I$ , on prolonge  $\tau|_{\partial T_j}$  à  $T_j$  en deux anti-involutions  $\hat{\tau}_j$ ,  $\hat{\tau}'_j$  de  $T_j$  de telle façon que

a)  $\hat{\tau}_j$  soit sans points fixes,

## A. GROTHENDIECK

b)  $\dot{\tau}'_j$  ait un ensemble de points fixes homéomorphe à  $S_j$  par la projection  $T_j^{\dot{\tau}'_j} \longrightarrow S_j$  (cf. plus bas pour des choix particuliers explicites – on verra qu'on peut même supposer  $T_j^{\dot{\tau}'_j} = S_j \times \{0\}$ ).

Soit, pour toute partie  $I' \subset I$ ,  $\tau_{I'}$  l'anti-involution de  $X_g = V_0 \Pi_{\partial T} T$  (où  $V_0 = X_0 \setminus \bigcup_{j \in I} D'_j$ ) qui coïncide avec  $\tau$  sur  $V_0$ , avec  $\tau'_j$  sur  $T_j$  pour  $j \in I'$ , avec  $\tau_j$  pour  $j \in I \setminus I'$ . Alors on a

$$X_g^{(\tau_{I'})} = \bigcup_{j \in I'} (S_j \times \{0\}) \quad (26)$$

donc si  $\text{card}(I') = i$  ( $0 \leq i \leq g$ ), alors  $\tau_{I'}$  est un  $\sigma_i$ .

Choix de  $\dot{\tau}_j, \dot{\tau}'_j$ . On choisit un isomorphisme  $S_j \simeq U \stackrel{\text{def}}{=} \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ , d'où une orientation de  $S_j$ , et une bijection  $\varepsilon_j \simeq \{\pm 1\}$ , d'où  $I^{\varepsilon_j} \simeq I = [-1, +1]$  et on prend

$$\dot{\tau}(z, t) = (-z \exp(i\pi t), -t) \dot{\tau}'(z, t) = (z, -t). \quad (27)$$

[NB. Pour la définition des  $\dot{\tau}'_j$ , on n'a pas besoin du choix d'un isomorphisme  $S_j \simeq U$ .]

On a bien  $\dot{\tau}^2 = \dot{\tau}'^2 = id$ ,  $\dot{\tau}|\partial\tau = \dot{\tau}'|\partial\tau = \tau|\partial\tau$ .

D'ailleurs on note que:

$$(\dot{\tau}'\dot{\tau})^2 = \dot{\tau}'\dot{\tau}\dot{\tau}'\dot{\tau} = ((z, t) \longmapsto (z \exp(2i\pi t), t)).$$

Ce n'est pas l'application identique – l'ensemble de ses points fixes est égal à l'ensemble des  $(z, t)$  tels que  $t \in \{-1, 0, +1\}$  – i.e.

$$T_j^{(\dot{\tau}'_j \dot{\tau}_j)^2} = S_j \times [\partial I^{\varepsilon_j} \cup \{0\}]. \quad (28)$$

Soit

$$\dot{\rho}_j = \dot{\tau}'_j \dot{\tau}_j, \quad [(z, t) \longmapsto (-z \exp(i\pi t), t)] \quad (29)$$

– c'est un automorphisme de  $T_j$  qui est l'identité sur  $\partial T_j$ . Pour toute partie  $I'$  de  $I = J/\tau$ , soit

$$\rho_{I'} = \text{l'automorphisme de } X_g \text{ qui est l'identité sur } V_0 = X_g \setminus \bigcup_{j \in I \setminus I'} T_j, \quad (30)$$

et qui est  $\rho_j$  sur  $T_j$  pour  $j \in I'^{78}$ .

---

<sup>78</sup>Posant  $\rho_j = \rho_{\{j\}}$ , on aura simplement  $\rho_J = \prod_{j \in J} \rho_j$ . Sauf erreur,  $\rho_j$  engendre le groupe  $\text{ST}^{!+}(T_j)(?) \simeq \mathbb{Z}$ , donc les  $\rho_j$  engendrent un groupe  $\simeq \mathbb{Z}^I$ . NB. On a  $\rho_j = \tau_{\{j\}} \tau_{\emptyset}$ .



On aura donc

$$\tau_{I'}\tau_{I''} = \rho_{I'_0}\rho_{I''_0}^{-1} \quad (32)$$

où  $I'_0 = I' \setminus I' \cap I''$ ,  $I''_0 = I'' \setminus I' \cap I''$ ; d'autre part on aura évidemment

$$[\rho_J, \rho_K] = 1 \text{ pour } J, K \subset I. \quad (33)$$

**Remarque:** Au lieu d'un isomorphisme  $S_j \simeq \mathbb{U}$  supposons donné plutôt sur  $S_j$  une structure de torseur sous  $\mathbb{U}^{\varepsilon_j}$  ( $\mathbb{U}$  tordu par  $\varepsilon_j$ , grâce à l'automorphisme d'ordre 2,  $z \mapsto z^{-1} = \bar{z}$  de  $\mathbb{U}$ ). On peut donc définir

$$\exp : \mathbb{R}^{\varepsilon_j} \longrightarrow \mathbb{U}^{\varepsilon_j} \quad (36 \text{ [sic]})$$

où  $I_j^\varepsilon \subset \mathbb{R}^{\varepsilon_j}$ , de façon évidente, d'où des anti-involutions  $\tau_j, \tau'_j : T_j \xrightarrow{\sim} T_j$  par les formules (27).

Si par exemple on choisit des disques  $D'_j$  tels que leurs bords soient des *cercles* euclidiens, alors il y a sur chaque  $\partial D'_j$  une structure de torseur sous un groupe  $\mathbb{U}^{\varepsilon_j}$ , invariante par antipodisme, et qui passe donc au quotient. Dès lors tout automorphisme de  $(X_0, (D'_j))$  qui respecte cette structure supplémentaire de torseur – et notamment tout automorphisme qui respecte la structure *métrique*, opère sur  $X_g$  en commutant au système des  $\tau_j, \tau'_j$  au sens évident.

Egalement, si on retient sur  $X$  la structure conforme seulement, et si on choisit dans chaque  $D_j$  un “centre”  $a_j$ , de façon compatible avec l'involution, alors le choix des  $a_j \in \text{Int}(D'_j)$  définit une structure de torseur sur  $M_j$  et ces structures sont invariantes par transformations conformes qui respectent l'ensemble de points  $a_j$ . [NB. On ne suppose plus nécessairement que  $\partial D_j$  soit un cercle, seulement que  $\partial D_j$  pas trop sauvage. Si  $\partial D_j$  est un cercle cette définition coïncide avec la précédente si et seulement si  $a_j$  est le centre du cercle.]

Pour définir  $\tau_j$  sur  $T_j$ , il suffit de nettement moins de données que d'une structure de torseur topologique sur  $T_j$ . Ecrivant, pour  $(z, t) \in S_j \times I^{\varepsilon_j}$

$$\tau_j(z, t) = (u_t(z), -t) \quad (37)$$

où  $u_t : S_j \xrightarrow{\sim} S_j$  est un homéomorphisme dépendant continûment de  $t$ , écrivant que  $\tau_j|_{\partial T_j} = \tau|_{\partial T_j}$  on trouve la condition

## A. GROTHENDIECK

a)  $u_t = \text{id}$  si  $t \in \partial I^{\varepsilon_j} \simeq \varepsilon_j$  (ça s'écrit, si  $S_j$  est orienté,  $u_1 = u_{-1} = 0$ );

écrivait que  $\tau_j^2 = \text{id}$ , on trouve la condition

b)  $u_{-t} = u_t^{-1}$  ( $t \in I^{\varepsilon_j}$ ),

et écrivait que  $T_j^{\tau_j} = \emptyset$  on trouve la condition

c)  $u_0$  sans points fixes.

Si une orientation est choisie, les  $j \mapsto u_j$  satisfaisant a), b), c) correspondent aux applications  $[0, 1] \rightarrow \text{Aut}(S_j)$  par  $t \mapsto u_t$ , telles que  $u_1 = \text{id}$ ,  $u_0$  sans point fixe et d'ordre 2 (le cas envisagé plus haut est celui-ci où  $t \mapsto u_{1-t}$  provient d'une représentation continue  $\mathbb{R} \mapsto \text{Aut}(S_j)$ ).

**Remarques:** On peut se proposer de déterminer la structure de toutes les anti-involutions  $\tau$ , sur un cylindre orienté  $T \simeq S \times I^{\varepsilon_j}$  ( $\varepsilon = \text{Or}(S)$ ) qui n'ont pas de point fixe sur le bord – ce qui implique déjà que  $\tau$  permute les deux composantes connexes du bord. Plus généralement, les anti-involutions  $\tau$  d'une surface à bord orientée  $X$ , n'ayant pas de point fixe sur  $\partial X$ , correspondent aux variétés à bord munies d'une partie à la fois ouverte et fermée  $(\partial Y)'$  de  $\partial Y$  – en associant à une telle  $(Y, (\partial Y)')$  son “doublement” orienté relativement à  $(\partial Y)'$  – à  $X, \sigma$  correspondant  $(X/\sigma, \text{Im} X^\sigma \rightarrow X/\sigma)$ . Si  $X$  est connexe compact,  $Y$  est compacte *non orientable*<sup>79</sup>; supposons que son type soit  $(\gamma, j)$ , et soit  $i = \text{card}(\pi_0((\partial Y)')) = \text{card}(\pi_0(X^\sigma))$ . Donc  $0 \leq i \leq j$ , et  $\chi(Y) = 1 - (\gamma + j)$ , et on voit de suite que

$$\chi(X) = \chi_!(X \setminus (X|\partial Y)) = \chi_!(X|\text{Int}(Y))$$

(car le  $\chi$  d'un cercle est nul)

$$= 2\chi_!(\text{Int}(Y)) = 2\chi(Y) = 2(1 - (\gamma + j));$$

donc si  $X$  est de type  $(g, \nu)$ , on aura  $\chi(X) = 2 - 2g, 2 - 2g - \nu = 2(1 - (\gamma + j))$ , i.e.

$$g + \nu/2 = \gamma + j \quad (38)$$

(cela exige que  $\nu$  soit pair, ce qui était évident a priori, car  $\sigma$  doit permuter les éléments de  $\pi_0(\partial X)$  entre eux, sans y avoir de points fixes...). Mais j'ai oublié de noter que  $\nu$  est déterminé

---

<sup>79</sup>Pas vrai! Si  $Y$  est orientable de type  $(\gamma, j)$ , avec  $0 \leq i \leq j$ , on aura  $g + \nu/2 = 2\gamma + j - 1, \nu = 2(j - i)$ , i.e.  $i = j - \nu/2$  comme dans le cas ci-contre [celui du texte qui suit].

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

en fonction de  $(\gamma, j, i)$  où  $i = \text{card}((\partial Y)')$  par

$$\nu = 2(j - i), (39)$$

i.e.  $i = j - \nu/2$ . Donc il faut ici (pour  $g = 0, \nu = 2$ ) chercher  $(\gamma, j, i)$  avec  $\gamma \in \mathbb{N}, 0 \leq i \leq j \in \mathbb{N}$ , tels que l'on ait  $\nu = 2(j - i)$ , i.e.  $j - i = 1$  i.e.  $i = j - 1$ , et  $\gamma + j = 1$ , ce qui donne la seule possibilité (comme  $i \geq 0$ , donc  $j \geq 1$ )

a)  $\gamma = 0, j = 1, i = 0$ .

Le cas a) correspond au cas où  $T^\sigma = \emptyset$ ; il se déduit du plan projectif réel en y faisant un trou à bord (d'où ruban de Möbius), et en prenant le doublement orienté.

Le cas où  $T^\sigma \neq \emptyset$  donnera nécessairement un quotient  $Y$  orienté, on doit avoir que pour son type  $(\gamma, [??])$ , le seul cas:

b)  $\gamma = 0, j = 2, i = 1$  (quotient *orienté*)

déduit de la sphère à deux trous, i.e. du cylindre, en prenant le doublement orienté par rapport à *un* des trous.

C'est bien les deux cas donnés respectivement par  $\hat{\tau}$  et  $\hat{\tau}'$  dans les formules (27).

Je voudrais maintenant construire une situation sous les conditions de la proposition mettant en évidence un maximum de symétries – il est vrai que l'on pourrait travailler avec tous les automorphismes de  $X_0$  commutant à l'antipodisme  $\tau$ , invariant l'ensemble des  $D_j$ , et respectant (disons) des structures de torseur topologique sur l'ensemble des  $\partial D_j$  – ou ce qui revient naturellement au même (à indétermination de multiplication par 2 près)<sup>80</sup> les automorphismes de  $Y_0$  qui invarient  $D = \cup_{i \in I} D_i$ , et respectent des structures de torseur sur les composantes connexes  $\partial D_j$  de  $\partial D$ . On prévoit que (travaillant modulo isotopie) on aura un groupe qui sera voisin d'un groupe de tresses, et sans doute calculable sans grand mal – et en le mettant ensemble avec le groupe engendré par les opérateurs précédents, on trouvera peut-être un démarrage pour engendrer par exemple  $\mathfrak{S}_g$  par générateurs (anti-involutifs) et relations.

Considérons le sous-groupe  $\mathcal{G}$  de  $A_g = \text{Aut}(X_g)$  engendré par les  $\tau_{I'}, I' \subset I$ . Soit  $\mathcal{H}$  le sous-groupe engendré par les  $\rho_j, (j \in I)$ . On a

$$\tau_{I'} \rho_j \tau_{I'} = \tau_{I'} (\tau_{\{j\}} \tau_\emptyset) \tau_{I'} = (\tau_{I'} \tau_{\{j\}}) (\tau_\emptyset \tau_{I'}) \in \mathcal{H}$$

---

<sup>80</sup>Non, *sans* indétermination, en relevant à la sphère de façon à repsecter l'orientation.

## A. GROTHENDIECK

par la formule (32) donc  $\mathcal{H}$  est un sous-groupe invariant. Les formules (32) montrent que  $\mathcal{G}/\mathcal{H}$  est un groupe *commutatif*, et même qu'il est isomorphe à  $\pm 1$  par le caractère d'orientation tous les  $\tau'_I$  sont égaux mod  $\mathcal{H}$ .

Considérons comme élément de référence de  $\mathcal{H}$  l'élément

$$\tau = \tau_{\emptyset} \quad (40)$$

(anti-involution sans points fixes de  $X_g$ ). On trouve alors par (32) que pour  $I' \subset I$ ,

$$\tau_{I'} = \rho_{I'} \tau = \left( \prod_{j \in I'} \rho_j \right) \cdot \tau^{81}, \quad (41)$$

d'ailleurs on aura, pour  $j \in I$ ,

$$\begin{aligned} \tau \rho_i \tau &= \tau_{\emptyset} (\tau_{\{i\}} \tau_{\emptyset}) \tau_{\{0\}} = \tau_{\emptyset} \tau_{\{j\}} = \rho_j^{-1} \\ \tau \rho_i \tau^{-1} &= \rho_i^{-1}. \end{aligned} \quad (42)$$

Ainsi  $\mathcal{G}$  apparait comme le produit semi-direct de  $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^I$ , et de  $\{\pm 1\} \simeq \{1, \tau\}$  y opérant par la symétrie  $\rho \mapsto \rho^{-1}$ . Donc pour *tout*  $\rho \in \mathcal{H}$ , on a  $(\tau \rho)^2 = 1$ , i.e. pour tout  $\sigma \in \mathcal{H}^{-1}$ ,  $\sigma$  est une *anti-involution*. Comme  $\sigma$  coïncide avec  $\tau$  sur  $V_0 = X_g \setminus \cup_{i \in I} \text{Int}(T_i)$ , on voit que l'ensemble des points fixes de  $\sigma$  est contenu dans  $\cup_{i \in I} \text{Int}(T_i)$ , et pour calculer l'indice de  $\sigma$ , i.e.  $\text{card}(\pi_0(X_g^\sigma))$ , il suffit de prendre la somme des indices dans les  $T_j$ . Or dans  $T_j$ , on a par (29)  $\rho_j(z, t) = (-z \exp(i\pi t), t)$ , et par récurrence,

$$\rho_j^{n_j}(z, t) = ((-1)^{n_j} z \exp(i\pi n_j t), t) \quad (43)$$

donc

$$\tau \rho_j^{n_j}(z, t) = ((-1)^{n_j+1} z \exp(i\pi(n_j+1)t), -t) \quad (44)$$

et  $(z, t) \in T_j$  est point fixe de  $\tau \rho_j^{n_j}$  si et seulement si  $t = 0$ , et  $n_j$  est *impair*, donc

$$T_j^{\tau \rho_j^{n_j}} = \emptyset \text{ si}$$

$$n_j \text{ pair} \quad S_j \times \{0\} \text{ si } n_j \text{ impair} \quad (45)$$

*donc*

---

<sup>81</sup>On veut du reste, comme  $\tau^2 = 1$ ,  $\tau_{I'}^2 = 1$ , que  $\tau_{I'} = \tau_{I'}^{-1} = \tau \rho_{I'}^{-1}$  donc  $\tau \rho_{I'} \tau = \rho_{I'}^{-1}$ , ce qui est (42).

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Indice de  $u = \tau \prod_j \rho_j^{n_j} = (46)$  = cardinal de l'ensemble  $I'_n$  des  $j \in I$  tels que  $n_j$  soit impair.

Il en résulte pour des raisons générales que  $u$  est conjugué dans  $A_g = \text{Aut}(X_g)$  (par un élément de  $A_g^+$ ) à  $\tau_{I'} = \rho_{I'} \tau = \tau \rho_{I'}^{-1}$ , ou aussi  $\rho_{I'}^{-1} \tau = \tau \rho_{I'}$ .

Mais si  $\tau \rho', \tau \rho'' \in \mathcal{G}$ , ( $\rho', \rho'' \in \mathcal{H}$ ), et si  $\rho \in \mathcal{H}$ , la relation

$$\rho(\tau \rho') \rho^{-1} = \tau \rho''$$

équivalait à

$$\tau \rho \tau \rho' \rho^{-1} = \rho''$$

(où  $\tau \rho \tau = \rho^{-1}$ ), i.e.  $\rho^2 = \rho' \rho''^{-1}$ ; donc  $\tau \rho'$  et  $\tau \rho''$  sont conjugués par un élément de  $\mathcal{H}$  si et seulement si  $\rho' \rho''^{-1} \in \mathcal{H}^2$  – ce qui précise l'observation précédente...

La façon la plus riche en symétries simples pour disposer les  $2g$  trous antipodiques  $D_j$  me semble la suivante. On considère la sphère euclidienne, avec l'action du groupe diédral  $\mathbb{D}_{2g}$  – par exemple quand c'est la sphère de Riemann qui est considérée comme riemannienne, par le choix de antipodisme comme étant

$$\tau z = -\frac{1}{\bar{z}}; (47)$$

on prend l'action type du groupe diédral (avec comme pôles les points  $0, \infty$ , et comme équateur le cercle unité  $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ ), en écrivant  $\mathbb{D}_n$  comme  $\subset O(2, \mathbb{R})$ , comme produit semi-direct de  $\{\pm 1\}$  par  $\mu_n(\mathbb{C}) = \mu_n$ , le couple  $(\xi, \alpha)$  ( $\xi \in \mu_n, \alpha \in \{\pm 1\}$ ) opérant par  $(\xi, \alpha)(z) = \xi z^\alpha$ . On peut d'ailleurs l'élargir en un groupe  $\tilde{\mathbb{D}}_n \simeq \mathbb{D}_n \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , où le deuxième facteur  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  est engendré par l'antipodisme (47) (qui commute à  $\mathbb{D}_n$  – de même d'ailleurs que l'anti-involution  $z \mapsto 1/\bar{z}$ , qui a comme ensemble de points fixes  $U$  et n'est autre que la symétrie par rapport à l'équateur, leur composé  $z \mapsto -z$  étant la symétrie par rapport à l'axe des pôles...) donc on regarde les transformations

$$u_{\xi, \alpha, \beta} = u_{\xi, \alpha} \tau^\beta, \quad \xi \in \mu_n, \quad \alpha \in \{\pm 1\}, \quad \beta \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

donc

$$u_{\xi, \alpha, \beta} z = u_{\xi, \alpha}(z) = \xi z^\alpha s i$$

$$\beta = 0 u_{\xi, \alpha}(\frac{-1}{\bar{z}}) = -\xi \bar{z}^{-\alpha} s i \beta = 1$$

*maison sera appelée raque*

## A. GROTHENDIECK

$\tau$  renverse l'orientation, donc est à manier avec réserve pour ce qui concerne le “transport de structure” dans la situation présente. Ici  $n = 2g$ ,  $\mathbb{D}_{2g}$  est d'ordre  $4g$ , et  $\tilde{\mathbb{D}}_n$  d'ordre  $8g$ . On prend sur l'équateur une trajectoire de  $\mu_n = \mu_{2g}$ , par exemple justement l'ensemble  $\mu_{2g}$ , de racines  $2g$ -ièmes de l'unité lui-même (en tant que sous-ensemble de la sphère) comme l'ensemble des “centres” des disques  $D'_i$ . On choisit un disque  $D'_0$  autour du point  $P_0$  (assez petit pour ce qui va suivre)<sup>82</sup>, et on prend les transformés de  $D'_0$  par les  $\xi \in \mu_n$ . Ces choix étant faits, la surface  $X_g$  est déterminée sans ambiguïté, et le groupe  $\mathbb{D}_{2g}$  y opère par transport de structure, en permutant entre eux les  $g$  cylindres  $T_i$ , correspondant aux éléments de  $J/\tau = J/\{\pm 1\}$ , i.e. aux paires d'éléments antipodiques de  $S$ , i.e. aux “diagonales” du polygone à  $2\mu$  côtés qu'ils déterminent sur l'équateur. Le groupe  $\mathbb{D}_{2g}$  normalise le groupe  $G$ ; de façon précise on aura, pour  $u \in \mathbb{D}_{2g}$ ,

$$u \tau_{I'} u^{-1} = \tau_{u(I')} \quad (49)$$

pour  $I' \subset I = J/\tau$ , en tenant compte de l'opération de  $\mathbb{D}_{2g}$  sur  $I$ . On aura donc en particulier, désignant par  $\tau_g = \tau_\emptyset$  l'extension de l'antipodisme de la sphère  $X_0$  (ou plutôt de  $\tau|V_0$ ) en un antipodisme sans points fixes de  $X_g$ , noté  $\tau$  précédemment

$$u \tau_g u^{-1} = \tau_g \quad (50)$$

i.e.  $\tau_g$  commute à l'action de  $\mathbb{D}_n$ , et

$$u \rho_j u^{-1} = \rho_{u(j)}. \quad (51)$$

On peut donc dire que  $\mathbb{D}_{2g}$  opère sur  $\mathcal{G}$ , d'où un produit semi-direct  $\mathbb{D}_{2g} \cdot \mathcal{G}$ , qui opère donc sur  $X_g$ .

Quant à la question de prolonger de même l'action sur  $X_0$  de  $\tilde{\mathbb{D}}_{2g}$  tout entier en une action sur  $X_g$ , ça a été fait sans crier gare, à  $\tau_{X_0}$  correspondant naturellement  $\tau_{X_g} = \tau_g$ , qui a en effet le bon goût de commuter à l'action de  $\mathbb{D}_{2g}$ . [Il pourrait sembler plus naturel, il est vrai, dans un esprit de “transport de structure (envers et contre tout?)”, de faire correspondre à  $\tau_{X_0}$  l'opération  $\tau_I$  donnée par (27), qui en chaque  $T_j$  serait égal à  $\tau_j$  (et sur  $V_0$ , bien sûr, coïncide avec  $\tau_{X_0}$ ),  $\tau_j(z, t) = (z, -t)$ , l'ensemble des points fixes de  $\tau_I$  étant formé des  $g$  cercles médians  $S_j \times \{0\}$  des  $g$  tubes  $T_j$ . On aura par (41)  $\tau_I = \rho_I \tau_g$ , donc  $\tau_I$  commute également à  $\mathbb{D}_n$ , puisque  $\tau$  et  $\rho_I = \prod_{i \in I} \rho_i$  y commutent. Mais il ne semble pas important

---

<sup>82</sup>Il faut simplement que  $D'_0$  ne rencontre pas  $\xi D'_0$ , où  $\xi = \exp(2i\pi/2g)$ .

pour le moment quelle convention nous adoptons.] On peut donc dire aussi que le groupe  $\tilde{\mathbb{D}}_{2g}$  opère sur  $\mathcal{H}$  – cette opération prolongeant celle de  $\tau_g$ , identifié maintenant à un élément de  $\tilde{\mathbb{D}}_{2g}$ , i.e. à l’antipodisme dans  $\tilde{\mathbb{D}}_{2g}$  – et le produit semi-direct

$$\tilde{\mathbb{D}}_{2g} \cdot \mathcal{H} \supset \mathcal{G} = \langle 1, \tau_g \rangle \cdot \mathcal{H} \quad (52)$$

opère sur  $X_g$ .

Il faudrait maintenant, dans cette voie:

1) Expliciter l’action extérieure de ce produit semi-direct sur le groupe fondamental  $\pi_g$ , avec une attention toute particulière à l’action du groupe  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \subset \tilde{\mathbb{D}}_{2g}$  qui stabilise un des cylindres  $T_j$  – qui dans l’espace euclidien de dimension 3 s’interprète comme le groupe des changements de signe relatif au système d’axes orthonormés correspondant.

2) Etendre l’action sur  $\pi_g$  du groupe de Teichmüller (plus ou moins) “spécial” de données chacun des  $T_j$ , en l’action d’un groupe analogue d’un ensemble plus grand obtenu en lui rajoutant une “lanière”  $L$  (d’où un tore à un trou, et son groupe de Teichmüller spécial, qui s’introduisent de façon naturelle)<sup>83</sup> voire l’ensemble encore plus grand obtenu en mettant également la lanière antipodique  $L'$  (cet ensemble se présente comme un cylindre  $(L \cup L')$  ou “buse”, où on aurait mis un tube ( $T_j$ ) en travers, et a la structure topologique d’un tore à deux trous). Il est possible qu’il faille considérer de près ce dernier, pour étudier les relations entre les éléments de  $\mathfrak{T}_g$  provenant des ensembles précédents.... Un travail amusant sera de se débrouiller pour écrire les générateurs du groupe  $\pi_g$ , et surtout la fameuse relation, dans une disposition géométrique relative des “anses”, qui est une disposition “panachée” – et non plus sagement à la queue-leu-leu!

En attendant d’entrer ainsi dans le vif de la structure du groupe de Teichmüller, je vais déjà essayer de décrire des générateurs et relations pour le sous-groupe intéressant qu’on vient d’écrire,  $\tilde{\mathbb{D}}_{2g} \cdot \mathcal{H}$ . Je vais prendre les sempiternels générateurs  $\varepsilon_0, \varepsilon_1$  de  $\mathbb{D}_{2g}$ <sup>84</sup>,

$$\varepsilon_0^2 = \varepsilon_1^2 = 1, \quad (\varepsilon_0 \varepsilon_1)^{2g} = 1$$

<sup>83</sup>C’est essentiellement un  $SL(2, \mathbb{Z})$  – plutôt une extension centrale remarquable de  $SL(2, \mathbb{Z})$  par  $\mathbb{Z}$ , qui rappelle celle de  $SL(2, \mathbb{R})$  par  $\mathbb{Z}$ ... (revêtement universel de  $SL(2, \mathbb{R})$ ).

<sup>84</sup>NB.  $\varepsilon_0$  bouge le sommet du repère,  $\varepsilon_1$  l’arête et pas le sommet, donc  $\varepsilon_1(j_0) = j_0$ .

## A. GROTHENDIECK

et y joindre  $\tau = \tau_g$ , et  $\rho_0 \tau = \tau'$  ( $\rho_0 = \rho_{j_0}$ ,  $j_0$  point marqué de  $I = J/\tau$ ) satisfaisant

$$\tau^2 = \tau'^2 = 1,$$

$$(\tau \varepsilon_0)^2 = (\tau \varepsilon_1)^2 = 1$$

exprimant la commutation de  $\tau$  à  $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ ;

$$(\varepsilon_1 \tau')^2 = 1,$$

i.e.  $\varepsilon_1$  commute à  $\tau'$ ,

$$((\varepsilon_0 \varepsilon_1)^g \tau')^2 = 1$$

(l'involution  $(\varepsilon_0 \varepsilon_1)^g$  commute à  $\tau'$ ); sauf erreur, ça fait un ensemble de générateurs et relations pour  $\tilde{\mathbb{D}}_{2g} \cdot \mathcal{H}$  – en résumé  $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \tau, \tau'$ :

$$\varepsilon_0^2 = \varepsilon_1^2 = \tau^2 = \tau'^2 = 1(\tau \varepsilon_0)^2 = (\tau \varepsilon_1)^2 = (\tau' \varepsilon_1)^2 = 1(\varepsilon_0 \varepsilon_1)^{2g} = 1(\tau'(\varepsilon_0 \varepsilon_1)^g)^2 = 1. (52)$$

C'est peut-être pas très astucieux comme choix de générateurs, en ce sens que  $\varepsilon_0, \varepsilon_1$  ne sont pas du tout sur le même pied que  $\tau, \tau'$  – ce ne sont pas des *anti*-involutions. Il vaudrait mieux prendre  $\varepsilon'_0 = \tau \varepsilon_0, \varepsilon'_1 = \tau \varepsilon_1$ , de façon à obtenir:

$$\varepsilon'^2_0 = \varepsilon'^2_1 = \tau^2 = \tau'^2 = 1(\tau \varepsilon'_0)^2 = (\tau \varepsilon'_1)^2 = (\tau'(\tau \varepsilon'_1))^2 = 1(\varepsilon'_0 \varepsilon'_1)^{2g} = 1(\tau'(\varepsilon'_0 \varepsilon'_1)^g)^2 = 1. (52 \text{ bis})$$

Ce sont essentiellement les “mêmes” relations sauf la dernière de la deuxième ligne.

Peut-être ce petit jeu avec le tout petit groupe  $\tilde{\mathbb{D}}_n$  opérant sur  $\mathcal{H}$  est un peu une amusette – le groupe  $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^g$  dans  $\mathfrak{F}_g$  suggère beaucoup la situation d'un tore maximal dans un groupe semi-simple; on a vraiment envie d'en avoir une caractérisation intrinsèque dans  $\mathfrak{F}_g$  – ou dans  $\mathfrak{S}_g$ , ce qui est possible puisqu'en tant que groupe de transformations topologiques effectives, il laisse fixe les points de  $V_0 \subset X_g$  – par exemple les deux pôles, qu'on peut prendre comme points base pour construire revêtement universel et groupe fondamental. Ce sont peut-être les sous-groupes abéliens-libres maximaux. On aimerait étudier le normalisateur – est-ce exactement ce qui provient des automorphismes de  $X_g \setminus \cup T_i^\circ \simeq V_0$ ? Les  $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$  associés aux “lanières” à travers le tube  $T_j$ , jouent-ils un rôle analogue à celui des groupes  $\mathrm{SL}(2, K)$  où  $\mathrm{GP}(1, K)$  “de rang 1” dans la théorie des groupes algébriques réductifs? Si \*\*\* ne “mord” pas à la situation, la soumettre peut-être à \*\*\*, qui est à l'aise tant avec les groupes discrets et leurs générateurs et relations, qu'avec la théorie des semi-simples – et la topologie...



§ 33bis. — ÉTUDE DES REVÊTEMENTS FINIS - RELATION ENTRE  
LES  $\mathcal{N}_{g,\nu}, \Gamma_{g,\nu}$  POUR  $g$  VARIABLE

---

Soient  $\pi$  un groupe extérieur à lacets profini arithmétisé de type  $(g, \nu)$ ,  $\pi'$  un sous-groupe connexe de  $\pi$ , d'où une application injective

$$\text{Discrét}(\pi) \hookrightarrow \text{Discrét}(\pi');$$

on voudrait prouver qu'elle est compatible avec la relation d'équivalence de l'arithmétisation, de sorte que toute arithmétisation de  $\pi$  en donne une de  $\pi'$ , et de même pour les prédiscrétifications. On voudrait établir en même temps que les applications

$P^+(\pi) \longrightarrow P^+(\pi')$  sur les prédiscrétifications orientées et  $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  sur les arithmétisations sont injectives. Pour prouver ces points, on est ramené au cas où  $\pi'$  invariant caractéristique (cf. §28, diagramme (7)). Choissant une discrétification  $\pi_0$  de  $\pi$ , donc  $\pi'_0$  de  $\pi'$ , on trouve donc  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$  et on a:

L'homomorphisme  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$  envoie  $\mathcal{M}(\pi_0)$  dans  $\mathcal{M}(\pi'_0)$ .

On aura donc un diagramme (variante de celui du §28):

$$\begin{array}{ccccc} \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi_0) & \hookrightarrow & \mathcal{M}(\pi_0) & \hookrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi'_0) & \hookrightarrow & \mathcal{M}(\pi'_0) & \hookrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0) \end{array} \quad (1)$$

qui implique qu'une discrétification  $\pi_1$  sur  $\pi$  qui donne même prédiscrétification orientée que  $\pi_0$  (resp. même arithmétisation) définit une discrétification  $\pi'_1$  de  $\pi'$  qui donne même prédiscrétification orientée (resp. même arithmétisation) que  $\pi'_0$ .

## A. GROTHENDIECK

Donc on a bien  $P^+(\pi) \longrightarrow P^+(\pi'), A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$  et il faut encore exprimer l'injectivité, qui revient aux relations

$$\hat{\mathfrak{S}}^+(\pi_0) = \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi'_0) \cap \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0), \quad \mathcal{M}(\pi_0) = \mathcal{M}(\pi'_0) \cap \hat{\mathfrak{S}}(\pi_0) \quad (2)$$

i.e. un automorphisme à lacets de  $\pi$  qui, sur  $\pi'$ , appartient à  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0)$ , resp. à  $\mathcal{M}(\pi'_0)$ , est déjà dans  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi_0)$ , resp. dans  $\mathcal{M}(\pi'_0)$ .

L'assertion repérée étant admise, l'assertion non repérée signifie aussi que l'homomorphisme canonique:

$$\Pi_a = \mathcal{M}_a(\pi) / \hat{\mathfrak{S}}_a^+(\pi) \longrightarrow \Pi'_a = \mathcal{M}'_a(\pi') / \hat{\mathfrak{S}}_{a'}^+(\pi') \quad (3)$$

est *injectif*. Par construction (via  $\Pi_Q$ ), c'est aussi surjectif, donc on trouverait: l'homomorphisme canonique (3) est bijectif et on trouverait aussi une bijection

$$P_a(\pi) \longrightarrow P'_a(\pi') \quad (4)$$

entre arithmétisation de  $\pi$  de type  $a$  et arithmétisation de  $\pi'$  de type  $a'$ , *compatible* avec l'isomorphisme (3).

Enfin, ces résultats dans les cas  $\pi'$  invariant caractéristique s'étendraient aussitôt au cas d'un  $\pi' \subset \pi$  ouvert quelconque.

Procédant par exemple comme dans le §28 à coups de "correspondances" arithmétiques extérieures entre "courbes potentielles", on trouve un groupoïde connexe (ponctué par les  $\hat{\pi}_{g,\nu}$ , par exemple, qui y sont canoniquement isomorphes), dont le  $\pi_1$  extérieur est la valeur commune des  $\Pi_{g*} = \Pi_{g,\nu}$ . Pour trouver un isomorphisme canonique entre  $\Pi_{g,\nu}$  et  $\Pi_{g',\nu'}$ , on choisit une correspondance entre  $\pi_{g,\nu}$  et  $\pi_{g',\nu'}$ , par exemple on regarde l'un et l'autre (quitte à passer de  $g, \nu$  à  $g, \tilde{\nu}$  avec  $\tilde{\nu} \geq \nu$ , et de même pour  $g', \nu'$  à  $g', \tilde{\nu}'$  avec  $\tilde{\nu}' \geq \nu'$ ) comme des sous-groupes [d'indices] finis du même  $\pi_{0,3}$ , d'où  $\Pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \Pi_{g,\tilde{\nu}}, \Pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \Pi_{g',\tilde{\nu}'}$ .

On aimerait maintenant voir ce qui, dans le yoga précédent, est indépendant de toute conjecture. Par exemple, le fait que les homomorphismes surjectifs canoniques

$\Pi_{g,\nu} \longrightarrow \Pi_{g,\nu'}$  ( $g$  le même,  $\nu'$  constant) n'est pas établi. Cependant, si on savait que dans la situation du  $(\pi, \pi')$  avec  $\pi'$  invariant caractéristique, on a  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi'_0) \cap \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi_0) = \hat{\mathfrak{S}}^+(\pi_0)$  (qui est un énoncé de nature relativement anodine sur des groupes à lacets profinis), on concluerait à la *bijektivité* de  $\Pi_{\pi_0} \longrightarrow \Pi_{\pi'_0}$  dans cette situation, et on en concluerait que le noyau de

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

$\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{0,3}$  s'envoie *trivialement* dans les  $\Pi_{g,\nu}$  pour tout  $\nu$  – i.e. qu'il s'envoie dans les  $\Pi_{g,\nu}$  par l'*intermédiaire* de  $\Pi_{0,3}$  – et que de plus  $\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi_{g,\nu}$  est un *isomorphisme* pour tout  $(g, \nu)$  avec  $\nu$  assez grand – il suffit que la surface de type  $(g, \nu)$  (ou de type  $(g, \nu')$  avec un  $\nu' \leq \nu$ ) puisse s'obtenir comme revêtement étale de  $X_{0,3}$ , i.e. que  $\pi_{g,\nu'}$  se réalise (avec sa structure à lacets) comme sous-groupe d'indice fini de  $\pi_{0,3}$ . Alors, considérant un  $\pi'' = \pi_{g'',\nu''} \subset \pi_{g,\nu}$  d'indice fini et contenu dans  $\pi_{0,3}$ , on aura un diagramme commutatif:

$$\begin{array}{ccc} \Pi_{0,3} & \xrightarrow{\sim} & \Pi_{g'',\nu''} \\ \uparrow & & \uparrow \wr \\ \Pi_Q & \longrightarrow & \Pi_{g,\nu'} \end{array}$$

d'où notre assertion  $\Pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \Pi_{g,\nu'}$  et a fortiori l'homomorphisme surjectif  $\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi_{g,\nu}$  qui le factorise ( $\nu \geq \nu'$ ) est bijectif. Notons par exemple que les  $\Pi_{0,\nu} \longrightarrow \Pi_{0,3}$  ( $\nu \geq 3$ ) sont alors bijectifs. Mais on notera qu'en tout état de cause, on ne trouve de résultat pour un  $g, \nu$  que si  $\nu \geq 3$  – donc ceci ne dit rien sur la fidélité éventuelle, par exemple de  $\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi_{g,0} = \Pi_g$  ( $g \geq 2$ ), ou  $\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi_{1,1} = \Pi_1$ .

Soit une courbe algébrique  $\mathcal{U}$  de type  $g, \nu$ <sup>85</sup>, définie sur un sous-corps  $K$  fini sur  $Q$  de  $\overline{Q}_0$ , donc elle définit une action extérieure du sous-groupe ouvert  $\Gamma = \Gamma_K \subset \Gamma_Q$  sur  $\pi_1(\mathcal{U}_{\overline{Q}_0})$ . Quitte à agrandir  $K$ , et à agrandir  $\nu$  ou  $\nu'$  (i.e. faire des trous) pour trouver  $\mathcal{U}'$  on peut supposer que  $\mathcal{U}'$  est un revêtement étale de  $(\mathcal{U}_{0,3})_K$ . On pose  $\pi' = \pi_1(\mathcal{U}'_{\overline{Q}_0})$ ,  $\pi = \pi_1(\mathcal{U}_{\overline{Q}_0})$ . Soit alors  $\theta$  le noyau de

$$\Gamma (\subset \Pi_Q) \longrightarrow \Pi_{0,3},$$

il opère donc par automorphismes intérieurs sur  $\hat{\pi}_{0,3}$ , donc l'image de  $\theta' = \Gamma' \cap \theta$  dans le groupe des automorphismes extérieurs de  $\pi' \subset \hat{\pi}_{0,3}$  est un sous-groupe fini – a fortiori son image dans  $\Pi_{\pi'}$ , et dans  $\mathcal{N}(\pi)$ , et dans  $\Pi_{\pi}$ . Il en est de même (choisissant un point base rationnel sur  $K$  dans  $\mathcal{U}'$ ) de l'opération effective sur  $\pi_1(\mathcal{U}, P)$  car il suffit d'appliquer le résultat précédent à  $\mathcal{U} \setminus \{P\}$ . On en conclut aussi que les noyaux des homomorphismes  $\Pi_{0,\nu} \longrightarrow \Pi_{0,3}$  ( $\nu \geq 3$ ) sont *finis*. On voit facilement que pour tout V.A. [Valuation Arithmétique]  $A$  définie sur  $K$ , l'opération de  $\theta'$  sur  $\prod_{\ell} T_{\ell}(A)$  se fait à travers un groupe quotient fini.

Il devient très difficile de s'imaginer comment il pourrait se faire que  $\theta'$  n'opère pas en fait trivialement! J'ai même l'impression que je peux montrer, grâce au résultat du russe que

<sup>85</sup>On ne fait plus d'hypothèse conjecturale (telle que l'injectivité dans (3)).

m'a signalé Deligne, que  $\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{0,3}$  est un isomorphisme! Cela signifierait que les actions extérieures de  $\Pi_Q$  sur des  $\pi_1 \simeq \overline{\pi_{g,\nu}}$  peuvent s'interpréter (au moins pour  $\nu$  assez grand,  $g$  étant fixé) comme des scindages de l'extension  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  de  $\Pi_{g,\nu}$  par  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$  – ou de l'extension  $\mathcal{M}_{g,\nu}$  de  $\Pi_{g,\nu}$  par  $\hat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ , quand il s'agit d'actions effectives.

Bien entendu, la question essentielle qui se pose alors (admettant  $\Pi_Q \simeq \Pi_{0,3}$ ) est de caractériser  $\Pi_{0,3}$  algébriquement, ainsi que les  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  – et de donner une description algébrique également des scindages “admissibles” – i.e. correspondant bel et bien à des courbes algébriques sur des corps de nombres algébriques, que ce sont exactement les actions relevant l'action extérieure donnée, qui ne normalisent aucun sous-groupe à lacets, ou encore telle que  $\hat{\pi}_{0,3}^{\Gamma''+}$  (mais il est concevable qu'il faille y ajouter de conditions plus subtiles, faisant intervenir les Frobenius...). On peut se proposer de trouver une description des actions *extérieures* “admissibles”, sans avoir à passer par des actions effectives admissibles – et à s'embarasser d'en donner une définition plus ou moins plausible. La difficulté bien sûr provient du fait que si  $\Gamma''$  opère *extérieurement* sur  $\hat{\pi}_{0,3}$ , il n'opère pas extérieurement pour autant sur un sous-groupe ouvert donné  $\pi'$  de  $\hat{\pi}_{0,3}$ . Mais on va supposer justement qu'il *existe* une telle action, de telle façon que  $\pi' \longrightarrow \hat{\pi}_{0,3}$  soit compatible avec les actions extérieures, et que l'action de  $\Gamma'$  sur  $\pi$  se déduise (modulo isomorphisme) de [??].

Pour ce deuxième point, on a une réponse immédiate (supposant connus déjà les  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ ). Soit un  $(\pi, a)$  de type  $g, \nu$ , avec relèvement partiel de  $\Pi_a$  en  $\Gamma'_a \hookrightarrow CN_a$ . Elle sera admissible si et seulement si on peut trouver un  $(\pi', a')$  de type  $(g, \nu')$  et un plongement de  $\pi'$  comme sous-groupe d'indice fini de  $\hat{\pi}_{0,3}$  compatible avec  $a'$ , et un sous-groupe ouvert  $\Gamma''$  de  $\Pi_{0,3}$ , et une action effective admissible de  $\Gamma''$  sur  $\hat{\pi}_{0,3}$  qui relève l'action extérieure donnée, et qui invarie  $\pi'$ , de façon qu'à isomorphisme près,  $(\pi, a)$ , et le germe d'action de  $\Gamma'$  dessus se déduise de  $(\pi', a')$  par l'action de  $\Gamma''$  dessus, par “bouchage” d'un paquet de trous (et oubli d'une action effective au profit de l'action extérieure). Il faut dans cette approche de simplement savoir préciser algébriquement ce qu'on entend par action “admissible” de  $\Gamma'' \subset \Pi_{0,3}$  sur  $\hat{\pi}_{0,3}$  – sous-entendant que ça doit correspondre aux points de  $\mathcal{U}_{0,3}$  rationnels sur le corps de nombres défini par  $\Gamma''$ . On peut conjecturer celle-ci, par “bouchage de trous”.

Il semble qu'on puisse sur le même principe donner une description des  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  (donc de  $\Pi_{g,\nu}$ ) en termes de  $\Pi_{0,3}$ . Utilisant les homomorphismes de transition  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu'}$ , il suffit de le faire, quand  $g$  est fixé, pour des  $\nu$  grands – assez grands pour qu'il existe une courbe

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

algébrique de type  $g, \nu$  sur  $Q$  qui soit un revêtement étale de  $\mathcal{U}_{0,3}$  sur  $Q$ . On considère donc un plongement correspondant de  $\pi_{g,\nu}$  dans  $\pi_{0,3}$ , et on décrète que si on peut faire opérer extérieurement  $\Pi_{0,3}$  dans  $\pi_{g,\nu}$ , de façon que  $\pi_{g,\nu} \longrightarrow \pi_{0,3}$  commute à ces actions extérieures, *alors* le sous-groupe de  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$  engendré par  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$  et  $\Pi_{0,3}$  est  $\mathcal{N}_{g,\nu}$ .

§ 34. — DESCRIPTION HEURISTIQUE PROFINIE DE LA  
CATÉGORIE DES COURBES ALGÈBRIQUES  
DÉFINIES SUR DES SOUS-EXTENSIONS FINIES  $K$  DE  $\overline{\mathbb{Q}_0}/\mathbb{Q}$  (I.E.  
DE  $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ )

---

On se borne aux courbes géométriques connexes (par commodité) anabéliennes (par nécessité provisoire), cf. plus bas sur la façon de se débarrasser de cette restriction. La donnée d'un revêtement de  $\mathcal{U}_{\overline{\mathbb{Q}_0}}$  définit une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \Sigma \longrightarrow \Gamma^+ \longrightarrow 1(1)$$

ou encore on a un homomorphisme

$$E \longrightarrow \Pi(2)$$

(image  $\Gamma$  ouverte, de noyau appelé  $\pi$ ) où  $\Gamma \subset \Pi_Q \simeq \Pi_{0,3}$  est le sous-groupe ouvert correspondant à  $K$ . Se donner une telle extension (moyennant  $\text{Centre}(\pi) = 1$ ) revient à se donner une action extérieure de  $\Gamma'$  sur  $\pi$ . Une première question: faut-il mettre la structure à lacets de  $\pi$  dans les données de l'objet (1) (ou (2)) censé décrire  $\mathcal{U}/K$ ?

*Conjecture:* Ce n'est pas la peine – la structure à lacets de  $\pi$  est la seule structure à lacets invariante par l'action extérieure de  $\Gamma$  (ou de  $\Gamma^{\text{h}}$ ). Les sous-groupes à lacets  $L_i$  sont les sous-groupes maximaux dans  $\pi$ , tels que  $\text{Norm}_E(L_i) \longrightarrow \Gamma$  ait comme image un sous-groupe ouvert de  $\Gamma$ <sup>86</sup>. Je présume aussi que tout homomorphisme entre extensions  $E$  de  $\Gamma^+$  par un

---

<sup>86</sup>et tout sous-groupe  $\neq \{1\}$  de  $\pi$  qui a cette propriété est contenu dans un unique  $L_i$ ...

$\pi, E'$  de  $\Gamma$  par un  $\pi'$  ( $E, E'$  provenant de courbes algébriques  $\mathcal{U}, \mathcal{U}'$ ) et tel que l'image de  $E$  dans  $E'$  soit ouverte respecte nécessairement la structure à lacets, et en fait provient d'un homomorphisme (unique, on le sait) de courbes algébriques.

En tout cas, si on admet la description des sous-groupes à lacets, il sera clair que l'image par  $\pi$  d'un  $L_i$  sera ou bien (1), ou bien contenu dans un unique  $L_j$ ...

Ceci signifierait que le foncteur des courbes algébriques sur  $K$  ([avec comme] morphismes les morphismes dominants) vers les groupes profinis extérieurs sur lesquels  $\Gamma$  opère, serait pleinement fidèle. Le foncteur “extension du corps de base” de  $K$  à  $K'$  correspond au foncteur restriction d'un groupe extérieur (ou d'une structure d'extension) de  $\Gamma$  à  $\Gamma'$  (sous-groupe ouvert). Les revêtements étales finis de  $\mathcal{U}$  correspondent aux  $E$ -ensembles ( $\widetilde{\mathcal{U}}$  étant choisi)...

Pour décrire l'image essentielle de ce foncteur, on n'est pas réduit aux conjectures. On part de l'extension canonique  $E_{0,3}$  de  $\Pi_{0,3} = \Pi$  par  $\hat{\pi}_{0,3}$ , on prend un sous-groupe ouvert  $E'$  de  $E_{0,3}$ , d'image  $\Gamma \subset \Pi_{0,3}$ , noyau  $\pi' \subset \hat{\pi}_{0,3}$ , et dans la structure à lacets canonique de  $\pi'$  de genre  $g$  (induite par celle de  $\pi_{0,3}$ ), on prend un  $I \subset I(\pi')$  tel que  $2g + \text{card}(I) \geq 3$ , stable par  $\Gamma$ , et on “bouche les trous” en  $I(\pi') \setminus I$ . De même, pour décrire quand une action effective, relevant une action extérieure admissible, est elle-même admissible – i.e. peut-être obtenue à partir d'une courbe algébrique  $\mathcal{U}$ , *ponctuée* par un point rationnel sur  $K$ . Ceci ne signifie pas pour autant, que si  $\mathcal{U}$  est donnée par une action extérieure de  $\Gamma$  sur un  $\pi$ , que les classes de conjugaison de relèvements admissibles de cette action proviennent bien toutes de points de  $\mathcal{U}$  rationnels sur  $K$ . Mais on voit de suite que ceci sera le cas, dès que l'on admet la pleine fidélité pour les *isomorphismes*.

(NB. Même pour les automorphismes de  $\mathcal{U}_{0,3} = \mathbb{P}_Q^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ , cette pleine fidélité n'est pas du tout claire. Il faudrait prouver que le commutant de  $\Pi_{0,3}$  dans  $\hat{\mathfrak{S}}_{0,3}$  est réduit à  $\mathfrak{S}_3$ . La situation est moins sans espoir, quand on se donne, avec la structure de groupe profini extérieur à opérateur  $\Gamma$ , une arithmétisation de  $\pi$  (ce qui suppose qu'on a explicité une structure à lacets) invariante par  $\Gamma$  – donc dans  $\hat{\mathfrak{S}}(\pi)$  on dispose d'un  $\mathcal{N}(\pi)$ , et  $\Gamma \hookrightarrow CN(\pi)$ . Dans ce point de vue, pour un homomorphisme de  $\Gamma$ -groupes extérieurs (arithmétisés)  $\pi' \longrightarrow \pi$ , il est sous-entendu qu'il est compatible avec les arithmétisations, i.e. si  $\pi''$  est l'image de  $\pi'$  dans  $\pi$ , on veut que l'arithmétisation de  $\pi''$  déduite de celle de  $\pi'$  par “passage au quotient”, soit celle induite par  $\pi$ . En particulier, pour les automorphismes extérieurs de  $\pi$ , il est sous-entendu que non seulement ils commutent à  $\Gamma$ , mais encore qu'ils sont dans  $\mathcal{N}(\pi)$  (ce qui

implique qu'ils sont dans  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ , car le centralisateur dans  $\pi$  de tout sous-groupe ouvert de  $\Pi_\pi$  est  $\{1\}$ !) Dans le cas de  $\mathcal{U}_{0,3}$ , on a  $\mathcal{N}_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3 \times \Pi_{0,3}$ , et on sait que le centre de  $\Pi_{0,3} \simeq \Pi$  est triviale – donc on trouve bien que le groupe des automorphismes de cette structure est réduit à  $\mathfrak{S}_3$ !

Ce point de vue est néanmoins probablement superflu – car on présume que pour l'action extérieure donnée de  $\Gamma$ , il y a une unique arithmétisation invariante par  $\Gamma$ , et que les homomorphismes “admissibles” de  $\Gamma$ -groupes extérieurs “admissibles”, tels qu'ils ont été définis précédemment, respectent automatiquement cette arithmétisation. S'il n'en était rien, il faudrait bien entendu introduire les arithmétisations dans la structure.

Il se pose la question de trouver une description plus simpliste des actions extérieures d'un  $\Gamma$  sur un  $\pi$  qui sont “admissibles”. Ici, on va partir d'un  $\pi$  dont on fixe déjà une structure à lacets et une arithmétisation  $a$  (invariantes par  $\Gamma$ ), de sorte que  $\Gamma \subset \mathcal{N}(\pi)$ ,  $\Gamma \longrightarrow \Pi_\pi$  injective à image ouverte, i.e.  $\Gamma$  correspond à un scindage partiel (ou germe de scindage) de

$$1 \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi) \longrightarrow \mathcal{N}(\pi) \longrightarrow \Pi_\pi \longrightarrow 1.$$

Soit  $(g, \nu)$  le type de  $\pi$ ; si  $g \geq 1$  le critère la plus simple, c'est que les “ $\Gamma^\natural$ -points” de  $\pi'$  déduits de  $\pi$  en bouchant tous les trous, soient distincts. (NB. Si  $g = 1$ , en bouchant tous les trous on tombe dans un cas abélien – mais ça ne fait rien). Si  $g = 0$ , il n'y a pas de condition pour  $\nu = 3$ , et si  $\nu > 3$ , mettant à part une partie  $I' \subset I(\pi)$  avec  $\text{card}(I') = 3$ , la condition c'est qu'en bouchant les trous en  $I \setminus I'$ , les  $\Gamma^\natural$ -points de  $\pi$  déduits des points de  $I \setminus I'$  soient distincts.

On notera que dans cette optique conjecturale, dans les cas limites  $(g, 0)$  ( $g \geq 2$ ),  $(1, 1)$ ,  $(0, 3)$ , on n'impose aucune condition a priori sur les relèvements. C'est peut-être très brutal – et il se pourrait qu'on trouve des relèvements qui ne correspondent pas à une courbe algébrique – i.e. qui en fait ne sont *pas* admissibles, même s'ils le paraissent.

Pour y comprendre quelque chose, il me semble qu'il faut revenir à une interprétation des germes de scindages dits “admissibles” d'une extension telle que

$$1 \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu} \longrightarrow \mathcal{N}_{g,\nu} \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

où  $\Pi_{g,\nu} \simeq \Pi_Q \simeq \Pi_{0,3}$ , comme correspondants aux points algébriques d'une *variété* (plutôt ici, une multiplicité) modulaire  $\mathcal{M}_{g,\nu,Q}$ , dont  $\mathcal{N}_{g,\nu}$  est le groupe fondamental arithmétique, et  $\hat{\mathfrak{Z}}_{g,\nu}$  le groupe fondamental géométrique. J'aimerais examiner cette situation de plus près, par la suite. Pour le moment, il semble prudent de ne pas faire de conjectures hâtives pour une



description *directe* (i.e. *pas* via  $\mathcal{U}_{0,3}$ ) des opérations extérieures “admissibles”. On travaillera donc pour le moment avec cette notion sous la forme constructive (via  $\mathcal{U}_{0,3}$ ).

Si on a un  $\pi$  extérieur de type  $(g, \nu)$  avec opération extérieure admissible de  $\Gamma \subset \mathbb{I}$ , on prévoit qu’il y aura une prédiscrétification stricte canonique sur  $\pi$  (pas invariante pas  $\Gamma$ , bien sûr – mais telle que l’arithmétisation correspondante le soit). On va même, pour une action effective admissible de  $\Gamma^\natural$  sur  $\pi$  (relevant l’action extérieure donnée), définir une discrétification orientée correspondante canonique  $\pi_0 \subset \pi$  (remplacée par une conjuguée, quand on conjugue le relèvement  $\Gamma^\natural$  par un  $g \in \pi$ ) – toutes ces discrétifications orientées (correspondant aux différents “points” de  $B_{\pi, \Gamma^\natural}$ ) définissent une même prédiscrétification orientée – et même une même prédiscrétification orientée *stricte*.

L’action effective de  $\Gamma^\natural$  sur  $\pi$  peut s’obtenir (à isomorphisme près) comme suit: on prend un sous-groupe ouvert  $E'_{0,3}$ , d’où extension  $1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \Gamma' \longrightarrow 1$  avec  $\pi' \subset \hat{\pi}_{0,3}$ , donc  $\pi' = \hat{\pi}'_0$  ( $\pi'_0 = \pi' \cap \pi_{0,3}$ ). On a une opération de  $\Gamma'$  sur  $I(\pi') = I(\pi'_0)$ , on la prend triviale (quitte à passer à un sous-groupe ouvert de  $\Gamma'$ ), on choisit  $i \in I' \subset I(\pi')$ , on bouche les trous en  $I'$ , d’où  $\pi$ , avec discrétification orientée  $\pi_0$ , et une action extérieure de  $\Gamma'$  dessus, qui est relevée en une action effective grâce à  $i$ . On trouvera bien ainsi un “réseau” – une discrétification orientée dans  $\pi$  – je dis qu’il ne dépend pas des choix qui ont été faits – en particulier, que les automorphismes de  $(\pi, a, \Gamma^\natural)$  transforment  $\pi_0$  en lui-même. De plus, si on a deux points  $x, y$  de  $B_{\pi, \Gamma^\natural}$ , d’où  $\pi(x), \pi(y)$ , parmi les classes de chemins de  $x$  à  $y$  (qui font un bitorseur sous  $\pi(y), \pi(x)$ ) il y a en a pour lesquelles  $\pi(x) \longrightarrow \pi(y)$  envoie  $\pi_0(x)$  dans  $\pi_0(y)$  – quand on se limite à ceux-ci, on trouve un sous-groupe du groupe fondamental  $\Pi(\pi, \Gamma^\natural)$ , qui est cette fois-ci un groupe *connexe* à lacets. On fera attention que  $\Gamma$  n’opère *pas* sur ce groupe, bien qu’il opère sur l’ensemble de ses objets.

## § 35. — L'INJECTIVITÉ DE $\Pi_Q \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{0,3})$

---

**Théorème 1:** <sup>87</sup> Soit  $\Pi = \text{Gal}(\overline{Q}_0/Q)$ , où  $\overline{Q}_0$  est la clôture algébrique de  $Q$  dans  $\mathbb{C}$ , considérons l'homomorphisme canonique

$$\Pi \xrightarrow{\Theta} \hat{\mathfrak{Z}}_{0,3} = \text{Autext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{0,3}).(1)$$

Cet homomorphisme est *injectif*.

Démonstration.

**Lemme 1:** Soit  $x \in Q$ ,  $x \neq 0, 1$  i.e.  $x \in \mathcal{U}_{0,3}(Q)$ ; choisissons un chemin sur  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$  de  $P = -\bar{j}$  (point base pour définir  $\pi_{0,3} = \pi_1(\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}), P)$ , (NB.  $\mathcal{U}_{0,3} = \mathbb{P}^1(Q) \setminus \{0, 1, \infty\}$ ), d'où un isomorphisme  $\pi_1(\mathcal{U}_{0,3}(\overline{Q}_0), x) \simeq \hat{\pi}_{0,3}$ , et par transport de structure une action effective de  $\Pi$  sur  $\hat{\pi}_{0,3}$  (pas seulement extérieure). Alors  $K = \text{Ker } \Theta$  opère trivialement sur  $\hat{\pi}_{0,3}$ .

Démonstration. Il suffit de voir que l'opération *extérieure* de  $K$  sur  $\pi_1(\overline{V})$  où  $V = \mathcal{U}_{0,3} \setminus \{x\}$ , est triviale. D'après le résultat de Belyi, il existe un morphisme (*défini sur  $Q$* , ceci est essentiel)

$$\mathbb{P}^1 Q \longrightarrow \mathbb{P}^1 Q,$$

étale au-dessus de  $\mathcal{U}_{0,3} = \mathbb{P}^1 Q \setminus \{0, 1, \infty\}$ , et tel que  $x \longmapsto 0$ . Soit  $\mathcal{U}'$  le revêtement étale de  $\mathcal{U}_{0,3} = \mathcal{U}$  induit,  $\pi' = \pi_1(\overline{\mathcal{U}}')$  son groupe fondamental géométrique, sur lequel  $\Pi$  donc  $K \subset \Pi$  opère extérieurement. Alors  $\pi(\overline{V})$  est un quotient de  $\pi'$ , avec respect des opérations extérieures de  $\Pi$ , et il suffit de prouver que  $K$  opère trivialement sur  $\pi'$ . Mais  $\pi'$  s'identifie à

---

<sup>87</sup>Démontré modulo le lemme 2 plus bas.

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

un sous-groupe ouvert de  $\hat{\pi}_{0,3} = \pi$  (avec respect des opérations extérieures de  $K$ ), sur lequel l'opération extérieure de  $K$  est triviale. Il s'ensuit que l'opération extérieure de  $K$  sur  $\pi'$  se fait à travers un groupe quotient *fini*.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi' & \longrightarrow & E'_K & \longrightarrow & K \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & E_K & \longrightarrow & K \longrightarrow 1 \end{array}$$

[En effet, l'action extérieure de  $K$  se fait à travers l'action effective du groupe extérieur  $E_K$ , laquelle par construction de  $K$  se fait par un homomorphisme  $E_K \longrightarrow \Pi/\mathcal{Z}$  ( $\mathcal{Z} = \text{Centre}(\pi)$ ), et l'action de  $E'_K$  induite se fait par le composé  $E'_{KK} \longrightarrow \pi/\mathcal{Z}$ , dont l'image est dans  $\mathcal{N}/\mathcal{Z}$ , où  $\mathcal{N}$  est le normalisateur de  $\pi'$  dans  $\pi$ . Donc l'image de  $K$  dans  $\text{Autext}(\pi')$  est contenue dans celle de  $\mathcal{N}/\mathcal{Z} \longrightarrow \text{Autext}(\pi')$ , or  $\mathcal{N}/\pi'$  est fini.]

Repassant à  $\pi_1(\bar{V})$ , on voit donc que l'image de  $K$  dans  $\text{Autext}(\pi_1(\bar{V}))$  est finie, donc l'image de  $K$  dans  $\text{Aut}(\hat{\pi}_{0,3})$  est finie. Elle est d'ailleurs formée d'automorphismes intérieurs, donc le lemme 1 sera conséquence du

**Lemme 2:** Tout automorphisme intérieur d'ordre fini de  $\hat{\pi}_{0,3}$  (groupe profini libre à deux générateurs) est trivial. De façon plus précise:  $\hat{\pi}_{0,3}$  a un centre réduit à  $\{1\}$ , et tout élément de  $\hat{\pi}_{0,3}$  d'ordre fini est réduit à 1.

Ceci est un énoncé d'algèbre profini pure, que je reporte pour plus tard, pour en terminer avec la partie "géométrique" de la démonstration du théorème.

**Lemme 3:** Pour tout ouvert non vide  $V \subset \mathbb{P}^1 Q$ , considérant l'action extérieure de  $\Pi$  sur  $\pi_1(\bar{V})$ , la restriction de celle-ci à  $K$  est triviale.

Quitte à passer à un ouvert plus petit, on peut supposer par Belyi que  $V$  est un revêtement étale de  $\mathcal{U}_{0,3}$  – et le raisonnement précédent montre alors que l'action extérieure de  $K$  se fait via un groupe quotient fini – mais cela n'est pas suffisant pour notre propos, et n'implique pas par lui-même que cette action soit triviale. D'ailleurs, au point où j'en suis, on aurait pu remplacer  $\mathcal{U}$  par n'importe quelle courbe algébrique quasi projective lisse géométriquement connexe – pour trouver que  $K$  opère sur le groupe extérieur  $\pi_1(\bar{V})$  via un groupe fini. Mais ici l'hypothèse  $V \subset \mathbb{P}^1 Q$  implique qu'il existe  $y \in V(Q)$ , soit  $x \in \mathcal{U}(Q)$  son image dans  $\mathcal{U} = \mathcal{U}_{0,3}$ . Prenant  $y, x$  comme points base pour les groupes fondamentaux, on trouve

## A. GROTHENDIECK

maintenant un homomorphisme effectif de groupes fondamentaux

$$\pi' = \pi_1(\overline{V}, y) \hookrightarrow \pi(\simeq \hat{\pi}_{0,3}) = \pi_1(\overline{\mathcal{U}}, x),$$

compatible avec une action *effective* de  $\Pi$  sur ces groupes. Par le lemme 1 l'action induite de  $K$  sur  $\pi = \pi_1(\overline{\mathcal{U}}, x)$  est triviale, donc aussi son action sur le sous-groupe  $\pi'$ . A fortiori l'action extérieure est triviale, cqfd.

On peut maintenant prouver le

**Lemme 4:**  $K = \{1\}$  (i.e. le théorème!)

En effet, sous les conditions du lemme 2, l'action de  $\Pi$  sur l'ensemble  $I = S(\overline{Q}_0)$ , où  $S = \mathbb{P}_Q^1 \setminus V$ , est déduite de l'action extérieure de  $\Pi$  sur  $\pi_1(\overline{V})$  si  $\text{card}(I) \geq 2$ , comme l'action sur les classes de conjugaison de “sous-groupes lacets”. Comme  $K$  opère trivialement sur le groupe extérieur, il opère trivialement sur  $I$ . Ceci étant vrai pour tout  $V$ , on voit que l'action de  $K$  sur  $\mathbb{P}^1(\overline{Q}_0) = \overline{Q}_0 \cup \{\infty\}$  est triviale, i.e. son action sur  $\overline{Q}_0$  l'est, donc  $K = \{1\}$ , cqfd.

Ouf!

Il reste à reporter la démonstration du lemme 2, que je vais reformuler sous une forme plus générale:

**Théorème 2:** Soit  $\pi$  un groupe profini libre sur un ensemble fini  $I$  de cardinal  $\geq 2$ . Alors:

- a) Le centre de  $\pi$  est égal à  $\{1\}$ .
- b) Il n'y a pas dans  $\pi$  d'élément d'ordre fini autre que 1.

Finalement je cale sur a) – tout comme je ne vois pas pourquoi le centre de  $\Pi$  (et de tout sous-groupe ouvert) doit être réduit à  $\{1\}$ . Consulter Deligne à ce sujet!

Pour b), voici un expédient. Soit  $K$  un corps algébriquement clos de caractéristique 0, et considérons le corps des fonctions  $L = K(X)$  de  $\mathcal{U} = \mathbb{P}_K^1 \setminus \{n+1 \text{ points}\}$  ( $n = \text{card}(I)$ ). Alors  $\pi \simeq \pi_1(\mathcal{U})$ , et c'est un quotient de  $E_L = \text{Gal}(\overline{L}/L)$ . Comme  $\pi$  est libre,  $E_L \longrightarrow \pi$  se relève en  $\pi_L$ , et il suffit de voir que  $E_L$  n'a pas d'élément d'ordre fini  $\neq 1$ . Mais d'après Artin, il n'y a pas d'automorphisme d'ordre fini  $\neq 1$  d'un corps algébriquement clos  $\overline{L}$ , sauf dans le cas où  $\overline{L}$  est extension quadratique d'un corps ordonné maximal  $R$ , qui soit le corps des invariants de  $\tau$  (donc  $\tau$  d'ordre 2 exactement).

Mais en l'occurrence on aurait  $R \supset L$ , et  $L \supset K$ , or dans  $K$  l'élément  $-1$  est un carré, donc  $R$  ne peut être ordonné – absurde!

**Corollaire 1 du théorème 1:** Soit  $X$  une courbe algébrique (lisse, géométriquement connexe, quasi-projective), sur  $k$  extension finie de  $Q$ . (Je présume que l'action extérieure de  $E_k^{\bar{k}}$  sur  $\pi_1(X_{\bar{k}})$  est fidèle si  $\mathcal{U}$  anabélien – à défaut de pouvoir le prouver, j'énonce:) Alors il existe une partie ouverte non vide  $V$  de  $X$  telle que l'action extérieure de  $E_k^{\bar{k}}$  sur  $\pi_1(V_{\bar{k}})$  soit fidèle.

Démonstration. D'après Belyi, on sait qu'on peut trouver  $V \subset X$  qui soit un revêtement étale de  $\mathcal{U} = (\mathcal{U}_{0,3})_k$ , je dis que ce  $V$  là convient. Soit donc  $K$  le noyau de l'opération extérieure de  $\Gamma = E_k^{\bar{k}}$  sur  $\pi' = \pi_1(V_{\bar{k}})$ . Soit  $y$  un point fermé de  $V$ , rationnel sur l'extension finie  $k'$  de  $k$  correspondant à un sous-groupe ouvert  $\Gamma' = E_{k'}^{\bar{k}}$  de  $\Gamma$ , soit  $K' = \Gamma' \cap K$ . Soit  $x$  l'image de  $y$  dans  $\mathcal{U}$ : on a

$$\pi' = \pi_1(V_{\bar{k}}, y) \hookrightarrow \pi = \pi_1(\mathcal{U}_{\bar{k}}, x),$$

et par construction l'action extérieure de  $K'$  sur  $\pi'$  est triviale, donc  $K'$  opère sur  $\pi'$  par automorphismes intérieurs. Or on a le

**Lemma 5:** <sup>88</sup> Soit  $\pi$  un groupe profini à lacets,  $\pi'$  un sous-groupe ouvert; alors tout automorphisme  $u$  de  $\pi$  qui laisse stable  $\pi'$  et induit sur  $\pi'$  un automorphisme intérieur (resp. l'identité) est intérieur (resp. l'identité).

Admettons pour l'instant ce lemme – il en résulte que les éléments de  $K'$ , qui opèrent sur  $\pi$  en induisant sur  $\pi'$  des automorphismes intérieurs, induisent sur  $\pi$  lui-même des automorphismes intérieurs, i.e. que l'action extérieure de  $K'$  sur  $\pi$  est triviale. D'après le théorème 1, on sait d'autre part que l'action extérieure de  $\Gamma'$  sur  $\pi$  est fidèle, donc  $K' = \{1\}$ . Il en résulte que  $K$  est *fini*. Mais par Artin on sait que les seuls sous-groupes finis  $\neq \{1\}$  de  $\Gamma$  sont ceux engendrés par une “conjugaison complexe”  $\tau$ , correspondant à un sous-corps ordonné maximal entre  $k$  et  $\bar{k}$ . Mais pour un tel  $\tau$  on a  $\chi(\tau) = -1$ , donc l'action extérieure de  $\tau$  ne peut être triviale – on gagne. En fait, la démonstration a montré ceci:

**Corollaire:** Soient  $k$  un corps de caractéristique 0,  $\mathcal{U}$  une courbe algébrique (lisse etc.) sur

---

<sup>88</sup>prouvé seulement modulo vérification de (2), (4) ci-dessous – pour le Corollaire 1; (2) est d'ailleurs suffisant...

## A. GROTHENDIECK

$k$ , telle que  $E_k^{\bar{k}} = \Gamma$  opère fidèlement sur  $\pi_1(\mathcal{U}_{\bar{k}})$  (opération extérieure). Alors pour tout revêtement étale géométriquement connexe  $V$  de  $\mathcal{U}$ , l'opération extérieure de  $\Gamma$  sur  $\pi_1(V_{\bar{k}})$  est également fidèle.

Reste à prouver le lemme 5. Il suffit de le prouver dans le cas “respé” – l'autre s'en déduit aussitôt. Si  $\pi$  a au moins une classe de lacets (cas d'une courbe algébrique affine i.e. non propre), alors  $\pi$  est libre – et le lemme 5 est valable justement pour de tels groupes. Si  $(l_i)_{1 \leq i \leq \nu}$  est un système de générateurs, soit  $L_i$  le sous-groupe fermé engendré par  $l_i$ , nous admettrons que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$L_i = \text{Centr}_{\pi}(L_i^n)^{89}.(2)$$

Ceci posé, si l'automorphisme  $u$  de  $\pi$  induit l'identité sur  $\pi'$ ,  $\exists n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\forall 1 \leq i \leq \nu$ ,  $u(l_i^n) = l_i^n$ , donc  $u(l_i)$  centralise  $l_i^n = u(l_i)^n$ , donc par (2) on a  $u(l_i) \in L_i$ , i.e.  $u(L_i) \subset L_i$ , mais on a  $\text{Aut}(L_i) \simeq \hat{\mathbb{Z}}^*$ , et un automorphisme d'un  $\hat{\mathbb{Z}}$ -module libre de rang 1 est connu quand on le connaît sur  ${}_u L_i \xleftarrow{\sim} L_i$ . Donc  $\forall i$  on a  $u(l_i) = l_i$ , donc  $u = \text{id}$ , cqfd.

Dans le cas où  $\pi$  n'est pas libre, prenons un bon  $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq g}$  – de sorte que  $\pi$  soit défini par la relation génératrice

$$\prod_1^g [x_i, y_i] = 1.(3)$$

Soient  $\Lambda_i, \Lambda'_i$  les sous-groupes fermés engendrés par  $x_i, y_i$ . (Ils sont d'ailleurs tous conjugués sous  $\text{Aut}(\pi)$ ...). J'admets que ces groupes sont  $\simeq \hat{\mathbb{Z}}$  (i.e. que les homomorphismes surjectifs  $\hat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda_i, \hat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda'_i$  envoyant 1 dans les  $x_i, y_i$  sont injectifs – c'est d'ailleurs trivial en passant à  $\pi_{\text{ab}}$ ) et qu'on a, en analogie avec (2), pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Centr}_{\pi}(\Lambda_i^n) = \Lambda_i, \quad \text{Centr}_{\pi}(\Lambda_i'^n) = \Lambda'_i,$$

et on termine comme ci-dessus.

**Remarque:** Le résultat le plus fort de fidélité dans la direction du présent paragraphe, concernant des actions de  $\Pi$  et de ses sous-groupes ouverts, serait le suivant: si  $V$  est une courbe algébrique anabélienne sur l'extension finie  $k$  de  $Q$ , avec la clôture algébrique  $\bar{k}$ , alors non seulement l'action extérieure de  $E_k^{\bar{k}} = \Gamma$  sur  $\pi_1(V_{\bar{k}})$  devrait être fidèle, i.e.

$$\Gamma \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}(\pi)^{90}$$

---

<sup>89</sup>pas prouvé!

<sup>90</sup>Cet homomorphisme se factorise automatiquement par le sous-groupe  $\mathcal{N}(\pi)$  qui normalise  $\hat{\mathfrak{Z}}(\pi)$ .

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

injective, mais même l'homomorphisme composé

$$\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}(\pi) \longrightarrow \mathcal{N}(\pi)/\hat{\mathfrak{Z}}^+(\pi) \simeq \Pi_\pi$$

devrait être injectif (auquel cas ce sera même un isomorphisme, puisqu'il est surjectif par construction même de  $\mathcal{N}(\pi)$ ,  $\Pi_\pi$ ...). Des raisonnements heuristiques faits précédemment (moins convaincants sans doute que ceux du présent paragraphe!) semblent indiquer que ce serait le cas au moins lorsque  $V$  est un revêtement étale de  $\mathcal{U} = (\mathcal{U}_{0,3})_k$ , auquel cas en effet l'homomorphisme  $\Gamma \longrightarrow \Pi_\pi$  s'insère dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & \Gamma & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ \Pi_{\pi_0} & & \Pi_\pi & \longrightarrow & \Pi_{\pi'} \end{array}$$

où  $\pi_0 = \pi_1(\mathcal{U}_{\bar{k}})$ , de sorte que  $\pi$  est un sous-groupe ouvert de  $\pi_0$ , et  $\pi'$  est un sous-groupe ouvert convenable, *caractéristique* dans  $\pi_0$ . Si on pouvait montrer que  $\Pi_{\pi_0} \longrightarrow \Pi_{\pi'}$  est injectif (ce qui est plus ou moins une histoire d'algèbre profinie), il en serait de même du composé  $\Gamma \hookrightarrow \Pi_{\pi_0} \longrightarrow \Pi_{\pi'}$ , donc aussi de  $\Gamma \longrightarrow \Pi_\pi$ . Donc modulo cette hypothèse sur les groupes profinis, et utilisant Belyi, on trouve que pour toute courbe algébrique  $V$  sur  $k$ , il existe  $V' \subset V$  ouvert non vide, tel que

$$\Gamma \longrightarrow \Pi_{\pi'}$$

(où  $\pi' = \pi_1(V'_{\bar{k}})$ ) soit injectif. Quant à savoir si  $\Gamma \longrightarrow \Pi_\pi$  est lui-même déjà injectif – ou ce qui revient au même, si  $\Gamma \longrightarrow \Pi_g$  pour  $g \geq 2$  et  $\Gamma \longrightarrow \Pi_{1,1}$  sont injectifs, je n'ai pas de raison heuristique plausible pour m'en convaincre à présent – peut-être est-ce tout à fait faux? L'argument plus ou moins convaincant rappelé précédemment (à supposer qu'on arrive à le justifier) montrerait seulement que si  $\Gamma \longrightarrow \Pi_\pi$  est injectif pour *un*  $\pi$  (ce qui ne dépend que de son type  $(g, \nu)$ ) alors il l'est pour les  $\pi'$  ouverts dans  $\pi$ . On le sait à présent (modulo peu de chose, tout au moins) pour les types  $(0, \nu)$  ( $\nu \geq 3$ ) exactement – ni plus ni moins – et on pourrait peut-être le déduire pour les types  $(g, \nu)$  qui s'en déduisent par “revêtement fini”. Mais il est clair déjà qu'on n'obtient pas les types  $(g, 0)$  comme cela ( $g \geq 2$ ), ni même aucun  $(g, \nu)$  avec  $g \geq 1, \nu \in \{0, 1, 2\}$ . C'est dire qu'on est loin du compte... Le premier cas bien intéressant serait donc le cas  $(1, 1)$  (tore à un trou!), où  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ \simeq \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})^\wedge$  opérant extérieurement sur  $\hat{\pi}_{1,1}$  (groupe libre à deux générateurs, encore – comme par hasard – l'action “arithmétique” de  $\Pi_Q$  sur  $\hat{\pi}_{1,1}$  (i.e. l'action extérieure *mod*  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ \simeq \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})^\wedge$ ) est-elle fidèle?

### § 36. — L'ISOMORPHISME $\Pi_Q \xrightarrow{\sim} \Pi_{1,1}$

---

(<sup>91</sup>) Soit  $\pi'_{0,3}$  le groupe quotient de  $\Pi_{0,3}$  défini par les relations

$$l_1^2 = l_\infty^3 = 1; (1)$$

c'est donc le groupe “cartographique orienté pour structures triangulées”, les  $\pi'_{0,3}$ -ensembles finis correspondant aux cartes orientées finies (pouvant avoir des boucles aplaties) dont les faces sont des triangles ou des mono-angles. L'opération extérieure de  $\Pi_Q$  (mais non celle de  $\mathfrak{S}_3$  !) sur  $\hat{\pi}_{0,3}$  passe au quotient en une action sur  $\hat{\pi}'_{0,3}$ . On peut améliorer le théorème 1 du paragraphe précédent par la

**Proposition:**

L'action extérieure de  $\Pi_Q$  sur  $\hat{\pi}'_{0,3}$  est fidèle.

Pour le montrer, on va plonger  $\pi_{0,3}$  comme sous-groupe d'indice fini dans  $\pi'_{0,3}$ , d'où un plongement analogue

$$\hat{\pi}_{0,3} \hookrightarrow \hat{\pi}'_{0,3}$$

qui sera compatible avec l'action extérieure de  $\Pi_Q$ .

Considérons pour cela le schéma quotient  $Y = \mathbb{P}_Q^1 / \mathfrak{S}_3 = X / \mathfrak{S}_3$  avec les trois points  $a_0, a_1, a_\infty$  de  $Y$ , rationnels sur  $Q$ ,  $a_0$  correspondant à la trajectoire  $\{0, 1, \infty\}$ ,  $a_1$  à la trajectoire  $\{-1, \frac{1}{2}, 2\}$  et  $a_\infty$  à la trajectoire  $\{j, \bar{j}\}, (j = \exp \frac{2i\pi}{3})$  de  $\mathfrak{S}_3$  (ce qui épuise l'ensemble des

---

<sup>91</sup>Les réflexions du présent paragraphe, un peu cahin caha, seront reprises de façon moins pesante au paragraphe suivant.



trajectoires “singulières” géométriques). On sait que  $Y$  est une droite projective (sur  $\overline{Q}$  a priori), qu’on épingle par  $a_0, a_1, a_\infty$  comme points  $0, 1, \infty$ , donc  $Y \simeq \mathbb{P}_Q^1$ ; l’homomorphisme  $X \longrightarrow Y$  s’identifie donc à un morphisme bien déterminé

$$f : X = \mathbb{P}_Q^1 \longrightarrow \mathbb{P}_Q^1 = Y(3)$$

qui fait de  $X$  un revêtement galoisien de  $Y$ , de groupe  $\mathfrak{S}_3$ , étale au dessus de  $\mathbb{P}_Q^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ , avec comme indices de ramifications en ces points 2,2,3. Du point de vue de la géométrie des cartes (se plaçant sur le corps de base  $C$ ), on considère la carte déterminée sur  $X$  par le triangle sphérique  $(0, 1, \infty)$  (sur l’axe réel comme équateur) – qui est donc la carte pondérée universelle – comme image inverse de la carte universelle (ayant un seul sommet 0, une seule arête repliée  $0 \longrightarrow 1$ , une seule face, de centre  $\infty$ ). Tout revêtement étale topologique de  $\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}) \subset X$  donne ainsi un revêtement étale topologique de  $\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}) \subset Y$ , ayant au dessus de 1 la ramification 2, au dessus de l’infini la ramification 3 exactement, ce qui correspond au foncteur “oubli” de la pondération, où une carte triangulaire pondérée est considérée comme une carte tout court. Du point de vue des groupes fondamentaux, on trouve ainsi une équivalence de catégories:

$$(4) \quad \begin{array}{c} \text{Revêtements étales de } X \setminus \{0, 1, \infty\} = \mathcal{U}_{0,3} \simeq \pi_{0,3}\text{-ensembles} \\ \downarrow \wr \\ \text{Revêtements de } Y \setminus \{0, 1, \infty\} = \mathcal{U}_{0,3} / (\text{l'objet } X \setminus \{0, 1, \infty\} \text{ de la dite catégorie}) \\ \simeq \pi'_{0,3}\text{-ensembles}/E \end{array}$$

où:

- les revêtements de  $Y \setminus \{0, 1, \infty\}$  considérés sont ceux dont la ramification est subordonnée à la signature  $2\{1\} + 3\{\infty\}$ ,
- $E$  est le  $\pi'_{0,3}$ -ensemble correspondant à l’objet  $X \setminus \{0, 1, \infty\}$  de la catégorie des revêtements étales de  $Y \setminus \{0, 1, \infty\}$  à ramification subordonnée à  $2\{1\} + 3\{\infty\}$ .

Ici, le point base de  $Y \setminus \{0, 1, \infty\}$  choisi pour décrire les revêtements (à ramification subordonnée à...) par un groupe fondamental à ramification, étant encore  $P = -\overline{j}$ , on aura:

$$E = f_{\mathbb{C}}^{-1}(P)(5)$$

et on peut expliciter ainsi la catégorie  $(\pi'_{0,3}\text{-ens.})/E$ , où  $E$  est un espace homogène, isomorphe au quotient de  $\pi'_{0,3}$  par le sous-groupe  $\pi_{0,3}^0$ , noyau de l’homomorphisme surjectif idoine,

## A. GROTHENDIECK

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & \pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \\
 & l_0 \longmapsto \text{éléments d'ordre 2} \\
 & \text{QuadQuadQuad } l_1 \longmapsto \text{éléments d'ordre 2} \\
 & l_\infty \longmapsto \text{éléments d'ordre 3}
 \end{aligned}$$

[en marge:] A calculer!.

On choisit un  $Q_0 \in E$  comme “origine” de  $E$  – pour pouvoir identifier  $E$  comme  $\pi'_{0,3}$ -ensemble à  $\pi'_{0,3}/\pi'^0_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3$  – alors  $\text{Ens}(\pi'_{0,3})/E$  s’identifie, par le foncteur  $F \longrightarrow F_{Q_0}$ , à  $\text{Ens}(\pi'^0_{0,3})$ .

On trouve donc en résumé une équivalence de catégories (dépendant du choix de  $Q_0$ )

$$\pi_{0,3} - \text{ensembles} \xrightarrow{\sim} \pi'^0_{0,3} - \text{ensembles}$$

qui est elle-même décrite par un bitorseur sous  $(\pi'^0_{0,3}, \pi_{0,3})$  et, à isomorphisme (non unique!) près par un isomorphisme

$$\pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \pi'^0_{0,3},$$

les isomorphismes ainsi obtenus (pour des origines variables du bitorseur) formant exactement une classe de conjugaison par  $\pi'^0_{0,3}$ , i.e. un *isomorphisme extérieur*  $\pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \pi'^0_{0,3}$ . Quand de plus le choix de  $Q_0$  varie, on trouve un composé  $\pi_{0,3} \longrightarrow \pi'^0_{0,3} \longrightarrow \pi'_{0,3}$  exactement une classe de  $\pi'_{0,3}$ -conjugaison, i.e. un homomorphisme extérieur.

J’ai beaucoup turbiné pour pas grand chose – à défaut d’avoir écrit les functorialités [?] très générales [??] pour les “groupes fondamentaux avec ramification”. Par exemple le bifoncteur  $I$  mystérieux de tantôt est formé des classes de chemins de  $P \in X(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\}$  (point base pour calculer  $\pi_{0,3}$ ) vers  $Q_0$  (jouant le rôle d’un nouveau point base, ayant le mérite de s’envoyer sur celui –  $P$  – qui sert à calculer  $\pi'_{0,3}$ , groupe fondamental à ramification sur  $Y(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\} \dots$ ). Il serait peut-être plus commode de définir directement un foncteur en sens inverse,

$$\begin{aligned}
 (7) \quad & \text{Revêtements de } Y(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\} \longrightarrow \text{Revêtements étales de } X(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\} \\
 & \text{subordonnés à la signature } 2\{1\} + 3\{\infty\}
 \end{aligned}$$

par image inverse, suivi d’une *normalisation*.

Ici on utilise le fait que l’objet  $X(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\}$  de la catégorie des revêtements à ramification maximum imposée, réalise justement un maximum sur les points  $1, \infty$  où la condition

intervient. On trouve que le foncteur correspondant

$$\pi'_{0,3} - \text{ensembles} \longrightarrow \pi_{0,3} - \text{ensembles} \quad (7 \text{ bis})$$

a les propriétés d'exactitude d'un foncteur associé à un morphisme de topos galoisiens

$$B_{\pi_{0,3}} \longrightarrow B_{\pi'_{0,3}}$$

(commute aux limites inductives, exact à gauche) et est donc défini par un  $(\pi_{0,3}, \pi'_{0,3})$ -ensemble qui soit un torseur (à droite) pour  $\pi'_{0,3}$ <sup>92</sup>. Le choix d'une origine pour ce torseur définit alors aussi un homomorphisme correspondant  $\pi_{0,3} \longrightarrow \pi'_{0,3}$ .

Revenons à la situation arithmétique sur  $Q$ , où on dispose non seulement des groupes fondamentaux géométriques profinis  $\hat{\pi}_{0,3}, \hat{\pi}'_{0,3}$ , mais aussi d'extensions

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}'_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_{0,3} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \end{array} \quad (8)$$

qui s'interprètent comme des groupes fondamentaux de  $\mathcal{U}_{0,3}$ , resp. de  $\mathcal{U}_{0,3}$  avec ramification subordonnée à  $2\{1\} + 3\{\infty\}$ . Les raisonnements précédents s'étendent à ce cadre et fournissent donc un homomorphisme d'extension

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}'_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_{0,3} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \end{array} \quad (9)$$

défini modulo composition par un automorphisme intérieur de  $\pi'_{0,3}$  [ $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\pi}'_{0,3}$  s'insère dans une suite exacte

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\pi}'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \quad (9 \text{ bis})$$

et itou pour les groupes discrets,  $1 \longrightarrow \pi_{0,3} \longrightarrow \pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3$ ].

Ceci dit, soit  $K$  le noyau de l'opération extérieure de  $\Pi$  sur  $\pi'_{0,3}$ . On voit alors que l'opération extérieure de  $K$  sur le sous-groupe ouvert  $\hat{\pi}_{0,3}$  se fait par un groupe fini (en fait par l'intermédiaire de  $\hat{\pi}'_{0,3}/\hat{\pi}_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3 \dots$ ) – ce qui implique, par le théorème 1 du paragraphe

<sup>92</sup>Ce bitorseur est aussi l'ensemble des  $Y_{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$  homomorphismes du “revêtement universel” à ramification imposée de cet espace sur le revêtement universel ordinaire de  $X(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\}$ .

## A. GROTHENDIECK

précédent, que le groupe  $K$  lui-même est fini. Donc par Artin on a  $K = 1$  ou  $K = (1, \tau)$ ,  $\tau$  la conjugaison complexe. Mais comme  $\chi(\tau) = -1$ , il est évident que l'opération extérieure de  $\tau$  sur  $\pi'_{0,3}$  (où même sur  $\pi'_{0,3\text{ab}} (\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ ) n'est pas triviale. Cela prouve la proposition.

J'ai envie maintenant d'interpréter  $\pi'_{0,3}$  comme  $\mathfrak{X}_{1,1}^+ / (\text{centre})$  (le centre est isomorphe à  $\{\pm 1\}$ ), et itou pour  $\hat{\pi}'_{0,3} \simeq \hat{\mathfrak{X}}_{1,1} / \{\pm 1\}$ , isomorphisme qui soit compatible avec l'action extérieure de  $\Pi$ . On a (pour mémoire)

$$\mathfrak{X}_{1,1} \xrightarrow{\sim} GL(2, \mathbb{Z}), (10)$$

l'isomorphisme étant obtenu ainsi

$$\mathfrak{X}_{1,1} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{X}_{1,0} \xrightarrow{\sim} \text{Autext}(\pi_{1,0}) \simeq \text{Autext}(\mathbb{Z}^2) \simeq GL(2, \mathbb{Z}) (11)$$

[où le premier isomorphisme est celui de bouchage de trou].

On a donc

$$\mathfrak{X}_{1,1}^+ \simeq SL(2, \mathbb{Z}) (12)$$

et

$$\text{Centre}(\mathfrak{X}_{1,1}) \simeq \{\pm 1\} (13)$$

(s'identifie au groupe des homothéties de  $SL(2, \mathbb{Z})$ ). Il est connu qu'on a dans  $SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\}$  deux générateurs  $\lambda_2, \lambda_3$  satisfaisant respectivement

$$\lambda_3^3 = 1, \lambda_2^2 = 1 (14)$$

et tels que ces relations soient une *présentation* de  $SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\}$ . Sauf erreur ces éléments proviennent d'éléments  $u_4, u_6$  de  $SL(2, \mathbb{Z})$  lui-même, satisfaisant

$$u_6^6 = 1, u_4^4 = 1, (15)$$

et qui correspondent aux seuls éléments d'ordres 6 et 4 (à conjugaison et passage à l'inverse près). En fait, tout élément d'ordre fini de  $SL(2, \mathbb{Z})$  est conjugué à une puissance de  $u_4$  ou  $u_6$ . Les sous-groupes engendrés respectivement par  $u_4$  et  $u_6$ , cycliques d'ordre 4 et 6, sont les groupes des automorphismes des deux courbes elliptiques exceptionnelles (dîtes “anharmoniques”) (en caractéristique 0).

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Je n'ai pas de formule sous la main pour "placer"  $u_4$  et  $u_6$ , de façon qu'ils engendrent le groupe  $SL(2, \mathbb{Z})$  modulo son centre (ce qui implique sans doute qu'ils engendrent  $SL(2, \mathbb{Z})$ ) – mais on fera attention à la relation supplémentaire, s'ajoutant à (15)

$$u_4^2 = u_6^3 (16)$$

(c'est justement l'élément  $-1$  du centre de  $SL(2, \mathbb{Z})$ ). Je n'ai peut-être pas besoin de la formule explicite pour  $u_4$  et  $u_6$ . On définit alors

$$\pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\} (17)$$

par

$$l'_1 \mapsto \lambda_2, l'_\infty \mapsto \lambda_3 (18)$$

(donc  $l'_0 \mapsto (\lambda_3 \lambda_2)^{-1} = \lambda_2 \lambda_3^{-1} = \lambda_2 \lambda_3^2$ ), où  $l'_0, l'_1, l'_\infty$  sont les générateurs de  $\pi'_{0,3}$  correspondants à ceux  $l_0, l_1, l_\infty$  de  $\pi_{0,3}$ , avec les relations de définition

$$l'_\infty l'_1 l'_0 = 1, l_1'^2 = 1, l_\infty'^3 = 1, (19)$$

de sorte que  $\pi'_{0,3}$  est bien le groupe de générateurs  $l'_1, l'_\infty$  satisfaisant à  $l_1'^2 = 1, l_\infty'^3 = 1$ .

Je veux maintenant me convaincre que l'homomorphisme correspondant à (17),

$$\hat{\pi}'_{0,3} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\} \simeq \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ / \{\pm 1\} (20)$$

est compatible avec l'opération extérieure de  $\Pi = \Pi_Q$ . Pour ceci, j'ai envie de définir directement le composé avec  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\pi}'_{0,3}$ , i.e.  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ / \{\pm 1\}$ , et même de le relever en un homomorphisme

$$\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+. (21)$$

Au niveau des groupes discrets, on définit bien

$$\pi_{0,3} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}) (22)$$

$$\text{par } l_1 \mapsto u_4, l_\infty \mapsto u_6, l_0 \mapsto (u_6 u_4)^{-1} = u_4^{-1} u_6^{-1},$$

et  $SL(2, \mathbb{Z}) \simeq \mathfrak{Z}_{1,1}^+$  s'identifie au quotient de  $\pi_{0,3}$  par le sous-groupe engendré par les éléments

$$l_1^4, l_\infty^6, (l_1^2)(l_\infty^3)^{-1}.$$

## A. GROTHENDIECK

D'ailleurs  $\pi_{0,3}$  peut s'interpréter comme un groupe de Teichmüller  $\mathfrak{Z}_{0,4}^{!+}$ <sup>93</sup>, et (22) comme un homomorphisme

$$\mathfrak{Z}_{0,4}^{!+} \longrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1}^+(23)$$

dont je soupçonne qu'il se prolonge en un homomorphisme

$$\mathfrak{Z}_{0,4}^! \longrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1} \simeq SL(2, \mathbb{Z})(24)$$

[le premier membre étant] une extension de  $(1, \tau)$  par  $\pi_{0,3}$ , qui n'est autre que le groupe cartographique triangulé pondéré non orienté.

J'interprète le premier membre de (23) comme le  $\pi_1$  "géométrique transcendant" du topos modulaire  $\mathbb{M}_{0,4}^!$ , classifiant les droites projectives avec quatre points distincts numérotés de 1 à 4; et le deuxième membre de (23) est le  $\pi_1$  transcendant du topos modulaire  $\mathbb{M}_{1,1}$ , classifiant les courbes elliptiques (avec une origine fixée). On devrait donc pouvoir définir, au niveau des multiplicités modulaires sur  $Q$ ,

$$(\mathbb{M}_{0,4}^!)_Q \longrightarrow (\mathbb{M}_{1,1})_Q, (25)$$

qui donnerait naissance à (23).

Mais on voit de suite qu'on a un isomorphisme canonique

$$\mathbb{M}_{0,4}^! \simeq \mathcal{U}_{0,3}(26)$$

(je laisse tomber les indices  $Q$ ), et la donnée de (25) revient donc aussi à la donnée d'une famille de courbes elliptiques sur  $\mathcal{U}_{0,3}$ . Mais si  $\lambda$  est la "variable  $\in \mathcal{U}_{0,3}$ ", en prenant "le" revêtement quadratique  $E_\lambda$  de  $\mathbb{P}^1$  ramifié en  $0, 1, \infty, \lambda$ , on trouve une courbe elliptique, avec quatre points marqués – au dessus de  $0, 1, \infty, \lambda$  – dont on peut prendre le point au dessus de 0 comme origine – alors les trois autres points sont les trois points d'ordre 2, indexés respectivement par  $1, \infty, \lambda$ .

De façon plus précise: sur un schéma de base quelconque  $S$ , sauf que 2 y soit inversible (caractéristique résiduelle différente de 2), on a un foncteur qui va de la catégorie des systèmes  $(E, \alpha, \beta)$  d'une courbe elliptique (homogène) relative sur  $S$ , et  $\alpha, \beta$  deux sections de  $E$  formant une base de  ${}_2E$ , en tant que schéma localement constant en  $\mathbb{F}_2$  – modules (ou système local de  $\mathbb{F}_2$ -modules) de  $S$  (donnant naissance à  $\gamma = \alpha + \beta$ , comme troisième larron -

---

<sup>93</sup>En effet  $\mathfrak{Z}_{g,v}^!$  est extension de  $\mathfrak{Z}_{g,v-1}^!$  par  $\pi_{g,v-1}$  (si  $(g, v-1)$  anabélien) et itou pour les  $\mathfrak{Z}^+$ ;  $\mathfrak{Z}_{0,3}^{!+} = \{1\}!$

de sorte que  $(\beta, \gamma)$  etc. sont en fait aussi des bases)<sup>94</sup> – vers la catégorie des fibrés en droites projectives  $P$  sur  $S$ , avec quatre sections  $u_0, u_1, u_\infty, \lambda$  marquées distinctes en chaque point, en associant à  $E$  le quotient  $E/\pm 1$ , muni des sections  $u_0, u_1, u_\infty, \lambda$  qui sont images respectivement de  $0, \alpha, \beta, \gamma = \alpha + \beta$ ; et ce foncteur est *presque* une équivalence de catégories. Ce qui lui manque pour l’être, c’est que pour une courbe elliptique relative  $E$ , la symétrie  $x \longrightarrow -x$  de  $E$  – qui est un automorphisme non trivial – opère trivialement sur l’objet correspondant  $E/\{\pm 1\}$ <sup>95</sup>. Donc il faut prendre le champ sur  $(Sch)$ , déduit de celui des courbes elliptiques en commençant par prendre  $\text{Isom}(E, F)' = \text{Isom}(E, F)/\pm 1$ , puis on prendra le champ associé à un préchamp (les objets sur  $S$  sont les “courbes elliptiques relatives à symétrie près sur  $S$ ”). Le champ est représentable par une multiplicité modulaire  $M'_{1,1}$ , ayant comme groupe fondamental géométrique  $SL(2, \mathbb{Z})'/\{\pm 1\}$  justement, déduit par exemple des variétés modulaires à rigidification de Jacobi déchelonné  $n$ ,  $M_{1,1}[n]$  – avec un groupe  $SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  opérant dessus, de sorte que

$$M_{1,1} \simeq (M_{1,1}[n], SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})) \quad (27)$$

et en outre que le sous-groupe central  $\{\pm 1\}$  de  $SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  opère trivialement sur  $M_{1,1}[n]$ ; donc on peut faire opérer le groupe quotient  $SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})' = SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/\{\pm 1\}$ , et poser

$$M'_{1,1} = (M_{1,1}[n], SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})') \quad (28)$$

(ce qui manifestement ne dépend pas du choix de  $n$ ,  $n \geq 2$ ). On trouve ainsi un homomorphisme

$$M'_{0,4} \simeq \mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow M'_{1,1}, \quad (29)$$

qui fait de  $M'_{0,4}$  un revêtement galoisien de groupe  $\mathfrak{S}_3$  de  $M'_{1,1}$ , et de façon plus précise

$$M'_{0,4} \xrightarrow{\sim} M_{1,1}[2]' \longrightarrow M'_{1,1} \quad (30)$$

[la deuxième flèche définissant un] revêtement galoisien de groupe  $SL(2, \mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ , le groupe fondamental géométrique de  $M_{1,1}[2]$  étant d’ailleurs isomorphe au noyau de l’homomorphisme  $SL(2, \mathbb{Z})' \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$  qui factorise l’homomorphisme canonique  $SL(2, \mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ .

<sup>94</sup>Il revient au même de dire que l’on a trois sections  $\alpha, \beta, \gamma$  de  ${}_2E$  sur  $S$ , qui sont distinctes en tout  $s \in S$  et partant  $\neq 1$ .

<sup>95</sup>Les pages qui suivent sont inutilement compliquées, avec l’introduction de  $\mathbb{M}'_{1,1}, \mathfrak{Z}'_{1,1}$  etc. il suffit d’y aller brutalement avec la courbe elliptique  $y^2 = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$  sur  $\mathcal{U}_{0,3}$ , pour avoir  $\mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow \mathbb{M}_{1,1}$ ; cf. plus bas...

## A. GROTHENDIECK

Passant aux groupes fondamentaux pour  $M'_{0,4} = \mathcal{U}_{0,3}$  et  $M'_{1,1}$ , on trouve un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} = \mathfrak{Z}_{0,4}^! & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} = \mathcal{N}_{0,4} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \wr \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^{'+} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_{1,1} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \end{array} \quad (31)$$

([avec]  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^{'+} = \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ / \{\pm 1\} \simeq SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\}$ ), qui identifie  $\mathcal{E}_{0,3}$  à un sous-groupe ouvert d'indice 6 dans  $\mathcal{E}'_{1,1} = \mathcal{E}_{1,1} / \{\pm 1\}$ , et itou pour  $\hat{\pi}_{0,3}$  dans  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^{'+}$ . On trouve ainsi un isomorphisme

$$\hat{\pi}_{0,3} \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(\mathfrak{Z}_{1,1}^{'+} \longrightarrow \mathfrak{S}_3) \simeq (\text{Ker}(\mathfrak{Z}_{1,1}^+ \longrightarrow \mathfrak{S}_3)) / \{\pm 1\} \quad (32)$$

compatible avec les actions extérieures de  $\Pi$ . On peut dire aussi qu'on a une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1}^{'+} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1 \quad (33)$$

(i.e.  $1 \longrightarrow \hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \longrightarrow 1$ ) compatible avec les actions de  $\Pi$  ( $\Pi$  opérant trivialement sur  $\mathfrak{S}_3$ ).

Je finis par m'apercevoir que ce qu'on obtient ici est loin de (22) – cet homomorphisme (22) n'a rien d'injectif, par contre il est surjectif, et ses valeurs sont, non dans  $SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\}$ , mais dans  $SL(2, \mathbb{Z})$  lui-même! Il faudra donc que je revienne encore sur une façon de donner un sens arithmético-géométrique remarquable à (22), et son extension aux groupes profinis correspondants. Pour le moment, je m'en tiens à exploiter un peu (33). Tout d'abord je note que les arguments faits dans le cadre schématique marchent aussi dans le cas transcendant, analytique complexe, et fournissent alors

$$\pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(\mathfrak{Z}_{1,1}^{'+} \longrightarrow \mathfrak{S}_3) = \text{Ker}(SL(2, \mathbb{Z}) / \{\pm 1\} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \quad (34)$$

compatible avec (32), ou encore une suite exacte,

$$1 \longrightarrow \pi_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1}^{'+} = SL(2, \mathbb{Z}) / \pm 1 \longrightarrow \mathfrak{S}_3 = SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \longrightarrow 1. \quad (35)$$

On aimerait interpréter (35) et (33), comme correspondant aux suites exactes analogues liées au diagramme (9), reliant  $\pi_{0,3}$  et  $\pi'_{0,3}$  – en identifiant  $\pi'_{0,3}$  à  $\mathfrak{Z}_{1,1}^{'+}$ ,  $\hat{\pi}'_{0,3}$  à  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^{'+}$ . J'y reviendrai tantôt.



**Remarque:** On peut se demander si l'homomorphisme

$$\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z})^\wedge / \{\pm 1\} \simeq \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ / \{\pm 1\}$$

se remonte <sup>96</sup>Oui, on peut remonter, et c'est plus ou moins trivial... cf. plus bas... (de façon plus ou moins naturelle) en un homomorphisme

$$\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z})^\wedge \simeq \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+,$$

et itou pour les groupes discrets

$$\pi_{0,3} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}) \simeq \mathfrak{Z}_{1,1}^+.$$

Bien sûr, comme  $\pi_{0,3}$  et  $\hat{\pi}_{0,3}$  sont libres (avec deux générateurs) on peut toujours remonter – d'exactly *quatre* façons d'ailleurs (qui nécessairement, dans le cadre profini, respectent les réseaux discrets). Mais peut-on le faire en respectant les opérations de  $\Pi$ ? Il suffirait pour cela qu'on puisse remonter  $\mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow M'_{1,1}$  en  $\mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow M_{1,1}$  (NB.  $M_{1,1}$  est une  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -gerbe au dessus de  $M'_{1,1}$ ), et je suspecte, d'après le yoga “anabélien” que j'essaye de développer, que l'inverse doit être vrai <sup>97</sup> – que tout relèvement de  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$  commutant aux opérations de  $\Pi$  est défini par un tel relèvement  $\mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow M_{1,1}$ . Or l'existence d'un tel relèvement  $\mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow M_{1,1}$  signifierait exactement l'existence d'une famille de courbes elliptiques sur  $\mathcal{U}_{0,3}$ , avec rigidification de Jacobi d'échelon 2, qui corresponde à l'invariant tautologique  $\lambda$ . Je doute qu'il en existe une, comme je doute que le relèvement en termes de groupes profinis à opération puisse se faire.

A vrai dire, comme  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge$  n'a plus de centre trivial, il n'est plus raisonnable de vouloir “tout exprimer” par les opérations extérieures de  $\Pi$  sur  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$ , il faut plutôt revenir à l'extension  $\mathcal{E}_{1,1} = \mathcal{E}_{M_{1,1}}$  de  $\Pi$  par  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$ , et la question est si l'homomorphisme

$$\mathcal{E}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E}'_{1,1} = \mathcal{E}_{1,1} / \{\pm 1\}$$

se remonte en

$$\mathcal{E}_{0,3} \xrightarrow{?} \mathcal{E}_{1,1},$$

---

<sup>96</sup>(\*)

<sup>97</sup>Pas tout fait, cf. page suivante pour une formulation plus raisonnable...

ce qui est plus fort que de trouver un relèvement  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$ , compatible avec les opérations extérieures de  $\Pi$ . Pour apprécier cette différence, je note que  $\Pi$  opère sur l'ensemble  $E$  des quatre relèvements  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$  (interprétés comme homomorphismes extérieurs), et la question posée sous la forme faible est s'il existe un élément de  $E$  invariant par  $\Pi$ . S'il n'existait pas, il y aurait en tous cas un sous-groupe ouvert de  $\Pi$ , d'indice 2 ou 4, qui laisserait invariant un élément – donc, quitte à passer à l'extension finie correspondante de  $Q$ , on trouve un relèvement, et quitte à passer à une extension un peu plus grande, les *quatre* relèvements possibles commutent à l'action extérieure de  $\Pi$ . Par contre, rien ne prouve que l'on puisse trouver un “germe de relèvement” de  $\mathcal{E}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E}'_{1,1}$  en  $\mathcal{E}_{0,3}^{\natural} \longrightarrow \mathcal{E}_{1,1}^{\natural}$  (germes pris par rapport aux sous-groupes ouverts de  $\mathcal{E}_{0,3}$  contenant  $\hat{\pi}_{0,3}$ , ou même tous les sous-groupes ouverts). L'obstruction à remonter sur  $\mathcal{E}_{0,3}$  lui-même, i.e. à *scinder* une certaine extension de  $\mathcal{E}_{0,3}$  par  $\{\pm 1\}$ , est

$$\alpha \in H^2(\mathcal{E}_{0,3}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), (36)$$

et rien ne dit que cette classe de cohomologie puisse s'effacer, en passant à un sous-groupe ouvert de  $\mathcal{E}_{0,3}$ .

Mais en termes géométriques, les courbes elliptiques relatives cherchées sur  $\mathcal{U}_{0,3}$  forment les sections d'un champ sur  $(\mathcal{U}_{0,3})'_{\text{ét}}$  – qui est une  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -gerbe – l'obstruction se trouve donc dans un groupe de Brauer,

$$\beta \in H^2(\mathcal{U}_{0,3}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), (37)$$

ou comme  $\mathcal{U} = \mathcal{U}_{0,3}$  est une courbe algébrique affine sur un corps (il suffirait qu'elle ne soit pas de type 0,0), il s'en suit que l'homomorphisme canonique (à coefficients de torsion quelconques)

$$H^*(\mathcal{E}_{\mathcal{U}}, -) \longrightarrow H^*(\mathcal{U}, -)$$

est un isomorphisme. D'ailleurs, il doit être plus ou moins trivial que  $\beta$  est l'image de  $\alpha$  – ce qui confirme l'intuition que si le relèvement est possible au niveau des groupes fondamentaux profinis (arithmético-géométriques), il l'est aussi au niveau des multiplicités modulaires elles-mêmes, donc qu'on a une existence d'une courbe elliptique relative sur  $\mathcal{U}_{0,3}$  qui...

Il est vrai qu'il est bien connu qu'une classe de cohomologie (37) à coefficients de torsion s'efface, en passant à une extension finie du corps de base ( $Q$  en l'occurrence). En fait, on a une suite spectrale

$$H^*(\mathcal{U}_{0,3}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \leftarrow E_2^{p,q} = H^p(Q, H^q(\overline{\mathcal{U}_{0,3}}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})), (38)$$

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

et ici  $H^q(\overline{\mathcal{U}_{0,3}}) = 0$  pour  $q \geq 2$ , donc on trouve une suite exacte

$$\begin{aligned} \dots E_2^{0,1} = H^q(Q, H^1(\overline{\mathcal{U}})) &\longrightarrow E_2^{2,0} = H^q(Q, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \longrightarrow H^2(\mathcal{U}_{0,3}) \longrightarrow \\ &\longrightarrow E_2^{1,1} = H^p(Q, H^1(\overline{\mathcal{U}}) \simeq \mathbb{F}_2^2) \longrightarrow E_2^{3,0} = H^3(Q, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

Je me rends compte enfin que l'existence d'un relèvement – i.e. de la courbe elliptique hypothétique sur  $\mathcal{U}_{0,3}$  – est tout à fait triviale, il suffit de le définir par l'équation

$$y = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)},$$

$$\text{i.e. } y^2 - x(x-1)(x-\lambda) = F(x, y; \lambda) = 0,$$

ce qui définit une courbe plane affine, ou passer en coordonnées projectives

$$F(x, y, z; \lambda) = y^2 z - x^3 + (1 + \lambda)x^2 z - \lambda x z^2 = 0.$$

Je ne vais pas approfondir la question ici, dans quelle mesure ce choix est “naturel”.

Il donne en tous cas un homomorphisme tout ce qu'il y a de précis

$$\mathbb{M}_{0,4}^! \simeq \mathcal{U}_{0,3} \longrightarrow \mathbb{M}_{1,1}, (39)$$

d'où un homomorphisme d'extensions

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} = \mathfrak{S}_{0,4}^{!+} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} = \mathcal{N}_{0,4}^! & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\mathfrak{S}}_{1,1}^+ = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge & \longrightarrow & \mathcal{E}_{1,1} = \mathcal{N}_{1,1} & \longrightarrow & \Pi \longrightarrow 1 \end{array} \quad (39)$$

défini modulo automorphisme intérieur par un élément de  $\hat{\mathfrak{S}}_{1,1}^+ = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge$ , et au niveau des groupes discrets,

$$\pi_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{S}}_{1,1}^+$$

et même,

$$\pi_{0,3} \hookrightarrow \Gamma_2 = \text{Ker}(\hat{\mathfrak{S}}_{1,1}^+ = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow \mathfrak{S}_3 = SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) (42)$$

(et itou pour les groupes profinis). Ici  $\pi_{0,3}$  est tel que le sous-groupe de congruence du deuxième membre [?], soit  $\Gamma_2$  soit produit direct [??] sous-groupe  $\pi_{0,3}$  et de son centre  $\{\pm 1\}$ . Mais en fait, il y a exactement quatre sous-groupes dans  $\Gamma_2$  qui réalisent cette décomposition. Pour

ne pas faire de jaloux, on pourrait regarder l'intersection des quatre, qui est un sous-groupe de  $\Gamma_2$  d'indice un diviseur de  $24=16$  [?] <sup>98</sup>; c'est l'intersection des noyaux de quatre homomorphismes  $\Gamma_2 \longrightarrow \text{Centre}(\Gamma_2) = \{\pm 1\}$ . En tant que sous-groupe de  $\pi_{0,3}$ , il est d'indice un diviseur de 8 [c'est vrai et c'est même trivial...] – ça ne m'étonnerait pas que ce soit justement le groupe des commutateur de  $\pi_{0,3}$ , qui est d'indice 4 – il y a là toute une situation à élucider...

Bien entendu, il faudrait aussi expliciter l'homomorphisme (42) (défini modulo automorphismes intérieurs) par ses valeurs sur les générateurs  $l_0, l_1, l_\infty$  – j'y reviendrai peut-être tantôt <sup>99</sup>.

**Théorème:**

L'action extérieure naturelle de  $\Pi_Q$  sur  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$ , et même sur  $\mathfrak{Z}_{1,1}' = \mathfrak{Z}_{1,1}^+ / \{\pm 1\}$ , est fidèle.

On utilise le fait qu'on a un homomorphisme extérieur injectif

$$\hat{\pi}_{0,3} \hookrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+,$$

compatible avec l'action de  $\Pi$ , en procédant comme pour la proposition du début (où  $\hat{\pi}'_{0,3}$  jouait le rôle de  $\hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$ ).

**Corollaire:**

Les homomorphismes canoniques (surjectifs)

$$\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{1,\nu} \quad (\nu \geq 1), (43)$$

sont injectifs, donc des isomorphismes.

Il suffit de le prouver pour  $\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{1,1}$  (puisque  $\Pi_{1,1}$  est un quotient de  $\Pi_{1,\nu}$ ,  $\nu \geq 1$ ...), or on a un homomorphisme canonique  $\Pi_{1,1} \longrightarrow \text{Autext } \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+$  et on peut considérer le composé,

$$\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{1,1} \longrightarrow \text{Autext } \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^+ \longrightarrow \text{Autext } \mathfrak{Z}_{1,1}';$$

par le théorème précédent ce composé est injectif, donc aussi  $\Pi_Q \longrightarrow \Pi_{1,1}$ , cqfd.

<sup>98</sup>NB. Ça doit être le noyau de  $SL(2, \mathbb{Z}) \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ .

<sup>99</sup>Il n'est pas clair si  $\pi_{0,3}$  est invariant en tant que sous-groupe de  $\mathfrak{Z}_{1,1}^+ = SL(2, \mathbb{Z})$ , i.e. stable par l'action extérieure de  $\mathfrak{S}_3$  sur  $SL(2, \mathbb{Z})$  – je présume que oui, puisque  $\mathfrak{S}_3$  agit aussi extérieurement sur  $\pi_{0,3}$  a priori...  $\mathfrak{Z}_{1,1}^+ / \pi_{0,3}$  serait une extension centrale intéressante de  $\mathfrak{S}_3$  par  $\{\pm 1\}$ ...

**Remarque:** On a vraiment l'impression, avec la proposition du début, et le résultat précédent baptisé "théorème", d'avoir démontré deux fois la même chose, et avec la même démonstration encore! Donc il est temps, après ce détour, de s'assurer qu'il en est bien ainsi, i.e. que l'homomorphisme  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\mathfrak{Z}}_{1,1}^{'+}$  qu'on vient d'utiliser s'identifie bel et bien à l'homomorphisme  $\hat{\pi}_{0,3} \longrightarrow \hat{\pi}'_{0,3}$ , moyennant un isomorphisme convenable (qui reste à décrire) commutant aux actions extérieures de  $\Pi$ , qu'on se proposait de construire (cf. (10) à (20)) – et on l'a perdu en route, en essayant de trouver  $\pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Z}_{1,1}^{'+}$  par factorisation dans l'homomorphisme composé  $\pi_{0,3} \longrightarrow \pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1}^{'+}$  [la première flèche étant donnée par la surjection canonique] – et on s'est en un sens fourvoyé, car l'homomorphisme "naturel"  $\pi_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1}^{'+}$  sur lequel on est tombé n'était *pas* du tout celui qu'on avait en vue: j'étais à côté de mes pompes. Donc il me faut revenir à la charge!

## § 37. — THÉORIE DES MODULES DES COURBES ELLIPTIQUES VIA LEGENDRE

### (rigidification d'échelon 2)

Je me rends compte que j'ai pas mal compliqué des choses pourtant bien simples, au paragraphe précédent. D'abord un remords de topologie des surfaces:

**Proposition:**<sup>100</sup> Soit  $X$  une surface topologique paracompacte,  $G$  un groupe discret opérant proprement sur  $X$ ; on suppose que pour tout  $x \in X$ , le stabilisateur  $G_x$  opère fidèlement sur un voisinage de  $x$  (de sorte que  $G$  opère fidèlement – en fait les deux doivent être équivalents) en préservant l'orientation locale (donc  $G_x$  est un groupe cyclique) de sorte que  $Y = X/G$  est une surface topologique paracompacte. Considérons l'ensemble  $X' = \{x \in X \mid G_x \neq (1)\}$  – qui est une partie discrète de  $X$  stable sous  $G$  – et l'image  $Y' \subset Y$  de  $X'$  – partie discrète de  $Y$  – et la “signature” sur  $(Y, Y')$ , pour laquelle le coefficient  $d_y$  ( $y \in Y'$ ) est l'indice de ramification  $\text{ord}(G_x)$  en les  $x \in X$  au dessus de  $y$ . Pour tout  $G$ -revêtement  $X'$  de  $X$ , considérons alors  $X'/G = Y'$  comme espace au dessus de  $Y$ . Alors:

a)  $Y'$  est une surface topologique, revêtement ramifié de  $Y$ , subordonné à la signature  $\underline{d} = \underline{d}(X/Y)$ .

---

<sup>100</sup>**Variante:**  $\mathcal{G}$  opère sur  $X$  avec sous-groupe *invariant*  $G$  satisfaisant les conditions ci-contre [i.e. ci-dessus] on a alors, posant  $Y = X/G$  avec opération de  $\mathcal{G}/G = \mathcal{H}$  dessus:  $\underline{\text{Rev}}(X, \mathcal{G}) \simeq \underline{\text{Rev}}((Y, \underline{d}), \mathcal{H})$ , qui donne  $\pi_1(X, \mathcal{G}, x) \xrightarrow{\sim} \pi_1((Y, \underline{d}, \mathcal{H}), y)$ . Application:  $\mathfrak{S}_{0,3} \simeq \mathfrak{Z}'_{1,1} (\simeq GL(2, \mathbb{Z})^+ / \pm 1)$  (où  $\mathfrak{S}_{0,3}$  est une extension de  $\mathfrak{S}_{0,3} = \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  par  $\pi_{0,3}$ ).

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

b) Le foncteur  $X' \longmapsto Y' = X'/G$  est une équivalence de catégories:

$$\mathrm{Rev}(X, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Rev}_{\underline{d}}(Y). (1)$$

N.B. On peut expliciter un foncteur quasi-inverse, en associant à tout revêtement ramifié  $Y'$  de  $Y$  compatible avec  $\underline{d}$ , le  $(X, G)$ - revêtement “normalisé” (en un sens topologique facile à expliciter) de  $X \times_Y Y'$ . On a un énoncé analogue pour les schémas localement noethériens réguliers de dimension 1, où le foncteur quasi-inverse s’obtient en normalisant  $X \times_Y Y'$ .

**Corollaire:** Soient  $x \in X \setminus X'$ ,  $y$  son image dans  $Y$ . On suppose  $Y$  connexe (i.e. que  $G$  opère transitivement sur l’ensemble des composantes connexes de  $X$ ). Alors on a un isomorphisme canonique

$$\pi_1(X, G, x) \xrightarrow{\sim} \pi_1((Y, \underline{d}), y) (2)$$

d’où, pour  $X$  connexe, une suite exacte canonique

$$1 \longrightarrow \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1((Y, \underline{d}), y) \longrightarrow G \longrightarrow 1. (3)$$

N.B. On a un corollaire analogue dans le contexte schématique,  $X$  et  $Y$  étant des schémas réguliers de dimension 1 – ou, le cas échéant, des schémas relatifs lisses de dimension relative 1 sur un  $S$ , mais dans ce cas il faudrait (si j’en ai besoin) faire un peu attention de préciser l’énoncé en forme raisonnable.

**Exemple:** Prenons  $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\} = \mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C})$ ,  $G = \mathfrak{S}_3$  opérant de façon habituelle, donc (avec les conventions du paragraphe précédent), identifiant  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})/(G = \mathfrak{S}_3)$  à  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ , avec:

$$\begin{aligned} (0, 1, \infty) &\longmapsto 0 & d_0 &= 2 \\ (2, -1, 1/2) &\longmapsto 1 & d_1 &= 2(4) \\ (j, \bar{j}) &\longmapsto \infty & d_\infty &= 3, \end{aligned}$$

on trouve  $Y = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ , et  $\underline{d} = 2\{1\} + 3\{\infty\}$ . On trouve donc un isomorphisme canonique:

$$\pi_1((\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}), \mathfrak{S}_3), x) \simeq \pi_1((\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0\}, \underline{d}), y), (5)$$

où malheureusement on ne peut prendre  $x = P = j$ ; il faut prendre  $x \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty, 2, -1, -1/2, j, \bar{j}\}$  et le plus commode sera de prendre  $x$  tel que  $y = f(x)$  soit le

## A. GROTHENDIECK

point base typique  $Q = y$  pour calculer le  $\pi_1$  à ramification – pour un tel  $x$  on trouve donc un isomorphisme canonique

$$\pi_1((\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}), \mathfrak{S}_3), x) \simeq \pi'_{0,3}(5 \text{ bis})$$

et en choisissant une  $\mathfrak{S}_3$ -classe de chemins du point base initial  $P = y$  sur  $X = \mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C})$  vers  $x$ , d'où un isomorphisme correspondant du premier membre de (5 bis) avec  $\pi_{0,3}$ , on trouve un isomorphisme canonique

$$\pi_1((\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}), \mathfrak{S}_3), P) \simeq \pi'_{0,3}(6)$$

(qui change par automorphisme intérieur quand on modifie le choix d'une  $\mathfrak{S}_3$ -classe de chemins), d'où la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_{0,3} \longrightarrow \pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1, (7)$$

qui n'est autre que (9 bis) du paragraphe précédent, mais interprétée ici de façon bien plus transparente comme suite exacte d'homotopie pour  $\mathfrak{S}_3$  opérant sur  $\mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C})$ . Et on trouve de même, dans le cadre arithmético-géométrique, travaillant sur le schéma  $\mathcal{U}_{0,3} = \mathcal{U}_{0,3,Q}$  et son quotient  $\mathcal{U}_{0,3}/\mathfrak{S}_3 \simeq \mathbb{P}_Q^1 \setminus \{0\}$ , avec la signature  $2\{1\} + 3\{\infty\}$  dessus, le diagramme de suites exactes:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & 1 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} = \hat{\mathfrak{Z}}_{0,4}^+ & \longrightarrow & \hat{\pi}'_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & E_{0,3} = \mathcal{N}_{0,4}' & \longrightarrow & E'_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1(8) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \Pi_{0,4} = \Pi_Q & = & \Pi_Q & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

Nous voulons maintenant mettre en relation  $\mathcal{U}_{0,3}$ , avec l'action de  $\mathfrak{S}_3$  dessus, avec la multiplicité modulaire  $M_{1,1}$  pour les courbes elliptiques (indices  $Q$  sous-entendus). C'est dommage d'ailleurs de travailler seulement sur  $Q$  - je vais travailler plutôt sur  $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$  - i.e. en caractéristique résiduelle différente de 2.



Au paragraphe précédent j’ai identifié, un peu vaseusement,  $\mathcal{U}_{0,3} = M_{0,4}^!$  à  $M_{1,1}[2]'$  (sous lequel  $M_{1,1}[2]$  est une gerbe liée par  $\mathbb{Z}/2$ ). Les ennuis techniques (plutôt les complications conceptuelles) tiennent au fait que pour les courbes elliptiques (plus généralement pour les variétés abéliennes de dimension quelconque), si  $n$  est un entier  $\geq 3$ , la “rigidification de Jacobi d’échelon  $n$ ” est bel et bien une rigidification, i.e. tout automorphisme d’une courbe elliptique relative  $E$  qui induit l’identité sur  ${}_nE$  – sous schéma noyau de  $n \text{ id}_E$  – est l’identité; mais il n’en est plus de même pour  $n = 2$ , où  $n$  est l’identité  $\text{id}_E$  au-dessus d’une partie ouverte fermée de  $S$  et  $-\text{id}_E$  sur le complémentaire. Ceci suggère, pour une meilleure compréhension, de coiffer  $M_{1,1}[2]$  par un  $M_{1,1}[n]$ , où  $n$  est un multiple de 2; donc  $M_{1,1}[n]$  sera un schéma ordinaire de type fini sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  (son image dans  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  sera l’ouvert  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ ) et au-dessus de  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ , le topos modulaire  $M_{1,1}$  se récupère comme

$$M_{1,1} \simeq (M_{1,1}[n], GL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \Gamma_n)(9)$$

au-dessus de  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ .<sup>101</sup> Ici  $M_{1,1}[n]$  est le schéma qui représente le foncteur sur (Sch):

$S \longmapsto$  ensemble des courbes elliptiques relatives sur  $S$

*munies* d’un isomorphisme  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S^2 \longrightarrow {}_nE$ <sup>102</sup>

sur lequel le groupe  $\Gamma_n = GL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \text{Aut}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2)$  opère de façon évidente. Le schéma modulaire “grossier” (par opposition à la multiplicité ou topos modulaire) est décrit au-dessus de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  par

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq M_{1,1}[n]/\Gamma_n(10)$$

au-dessus de  $\mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ .

N.B. Le schéma  $\widetilde{M}_{1,1}$  sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  peut se décrire comme “l’enveloppe représentable” du foncteur non-représentable

$S \longmapsto$  classes d’isomorphisme de courbes elliptiques relatives sur  $S$ ...

– itou sur un schéma de base (par exemple  $Q$  ou  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ ), quelconque...

Il faut faire attention qu’en tant que schéma sur  $\mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$  (ou sur  $Q$ , en passant à la fibre générique),  $M_{1,1}[n]$  n’est pas relativement connexe (i.e. n’est pas à fibres géométriquement connexes). En effet, un isomorphisme

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S^2 \simeq {}_nE$$

<sup>101</sup> Attention, c’est bien  $GL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  et non  $SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  qu’il faut prendre ici.

<sup>102</sup> Ce foncteur est représentable si et seulement si  $n \geq 3$  (donc il ne l’est pas pour  $n = 1, 2$ ).

## A. GROTHENDIECK

implique par passage à la seconde puissance extérieure, un isomorphisme

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S \xrightarrow{\sim} \bigwedge_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^2 E \simeq \mu_n^{\otimes -1}(S)$$

d'où un isomorphisme

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mu(S)$$

qui s'identifie (prenant l'image de 1 mod  $n$ ) à une section de  $\mu_n^*(S)$  où  $\mu_n^*$  est le  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ -torseur relatif sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$  des “racines primitives  $n$ -ièmes de 1”. On a donc un morphisme canonique

$$M_{1,1}[n] \longrightarrow \mu_n^*(11)$$

et c'est ce morphisme qui est à fibres géométriques connexes en caractéristique 0. Passant à la limite sur  $n$  variable, on trouve *sur*  $Q$

$$M_{1,1}[\infty] = \varprojlim M_{1,1}[n] \longrightarrow \mu_\infty^* \simeq \text{Spec } \Sigma(12)$$

où le dernier isomorphisme est canonique et  $\Sigma \subset \mathbb{C}$  est la sous-extension cyclotomique maximale de  $\overline{Q}_0$ .

On récupère les  $M_{1,1}[n']$ , pour  $n'|n$ ,  $n' \neq 1, 2$ , à partir de  $M_{1,1}[n]$  avec l'action de  $\Gamma_n$  dessus par

$$M_{1,1}[n'] \simeq M_{1,1}[n] \times_{\Gamma_n} \Gamma_{n'} \simeq M_{1,1}[n]/K_{n,n'}(13)$$

sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ , où

$$K_{n,n'} = \text{Ker}(\Gamma_n \longrightarrow \Gamma_{n'}).^{103}(14)$$

Si on applique cependant cette formule dans les cas non licites  $n'=1$  ou  $2$ , on trouve pour le cas  $n'=1$ , non  $M_{1,1}$  mais  $\widetilde{M}_{1,1}$  (schéma modulaire grossier), et pour  $n'=2$ , non  $M_{1,1}[2]$  (qui n'est pas non plus un schéma), mais ce qu'on avait appelé au paragraphe précédent  $M_{1,1}[2]'$ .

On peut expliciter  $M_{1,1}$  et  $\widetilde{M}_{1,1}$  sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  tout entier en termes des  $M_{1,1}[n]$  en les décrivant au-dessus des schémas ouverts  $\text{Spec}(\mathbb{Z}[\frac{1}{n}])$ ,  $\text{Spec}(\mathbb{Z}[\frac{1}{n'}])$  qui recouvrent  $\text{Spec}(\mathbb{Z})$  (i.e. pour  $(n, n')=1$ ) par (9) et (10) en y prenant d'abord  $n$  puis  $n'$ , et en “recollant” au-dessus de  $\text{Spec}(\mathbb{Z}[\frac{1}{nn'}])$ , par ces mêmes formules appliquées à  $nn'$ ...

On a d'ailleurs (pour mémoire)

---

<sup>103</sup>  $K_{n,n'}$  opère *librement* sur le schéma si  $n'|n$ ,  $n' \neq 1, 2$  mais pas bien sûr si  $n' = 1$  ou  $2$ .

**Théorème:**  $\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1$  (sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$ ).

On peut épingler un tel isomorphisme (défini à priori modulo le groupe affine entier  $X \mapsto \pm X + n, n \in \mathbb{Z}$ ), en notant qu'il y a dans  $\widetilde{M}_{1,1}$  deux sections privilégiées sur  $\mathbb{Z}$ , dont les valeurs au point générique correspondent aux deux classes d'isomorphisme de courbes elliptiques en caractéristique 0 (sur  $C$  par exemple) qui ont des automorphismes différents de  $\text{id}$ ,  $-\text{id}$  – les deux groupes d'automorphismes qu'on obtient sont d'ailleurs  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  (très facile, par exemple par voie transcendante). Ce sont ce qu'on appelle sauf erreur les courbes elliptiques “anharmoniques”. Sur un

$M_{1,1}[n]$ , le groupe des automorphismes rationnels sur  $k$  d'une courbe elliptique décrite par un point  $x$  de  $M_{1,1}[n](k)$  s'identifie canoniquement au stabilisateur de  $x$  dans  $\Gamma_n$ :

$$\text{Aut}(E_x) \simeq (\Gamma_n)_x. (15)$$

Bien sûr on a des énoncés idoines sur un schéma de base quelconque, pas nécessairement un corps. Cela montre déjà que les automorphismes des courbes elliptiques sont liés de façon essentielle à la *ramification* de  $\Gamma_n$  opérant sur  $M_{1,1}[n]$ . On trouve ainsi:

**Proposition:** (Sur  $\text{Spec } Q$ , si  $n \neq 1, 2$ ) Il y a exactement deux orbites de  $\Gamma_n$  opérant sur  $M_{1,1}[n]$  qui sont “critiques”, et qui correspondent à des stabilisateurs isomorphes respectivement à  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ , qui sont les groupes d'automorphismes des courbes elliptiques (“anharmoniques”) correspondantes.

On montre que  $\Gamma_n$  n'opère pas fidèlement sur  $M_{1,1}[n]$  – le noyau de cette opération est le sous-groupe central  $\{\pm 1\}$ , image du groupe correspondant de  $GL(2, \mathbb{Z})$  – il correspond au groupe des automorphismes “universels”  $\pm \text{id}_E$  des courbes elliptiques  $E$ . Le groupe quotient

$$\Gamma'_n := \Gamma_n / \{\pm 1\} (16)$$

opère fidèlement, et on peut regarder le “topos mixte”  $(M_{1,1}[n], \Gamma'_n)$  – on trouve aussitôt qu'il ne *dépend pas* (à équivalence canonique près) *du choix de  $n$*  [à cela près que l'ouvert de  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  sur lequel “il a un sens” dépend de  $n...$ ] <sup>104</sup> – et en fait, on a:

$$(M_{1,1}[n], \Gamma'_n) \simeq M'_{1,1} (17)$$

---

<sup>104</sup> donc à condition de se placer au dessus d'un schéma de base tel  $\text{Spec}(\mathbb{Z}[\frac{1}{nn'}])$  où  $n, n'$  sont tous deux inversibles...

au-dessus de  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{n}]$ , où la multiplicité schématique modulaire  $M'_{1,1}$  est décrite, en termes de courbes elliptiques “définies modulo symétries”, comme au paragraphe précédent.

**Remarque:** La proposition précédente semble dépendre de  $n$ , mais on voit a priori (grâce au fait que les  $\Gamma_{n,n'}, n'|n, n' \neq 1, 2$  opèrent librement) que si elle est valable pour *un*  $n$ , elle est valable pour tous.

Notons aussi

**Corollaire de la Proposition:** En caractéristique 0, les stabilisateurs *dans*  $\Gamma'_n$  (le groupe qui opère fidèlement sur  $(M_{1,1}[n])$  des points des deux orbites critiques sont respectivement  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ .<sup>105</sup>

On a supposé ici que  $n \neq 1, 2$ , mais rien ne nous empêche de regarder aussi

$$M_{1,1}[2]' \stackrel{\text{def}}{=} M_{1,1}[2m]/\Gamma_{2m,2} = M_{1,1}[2m]/\Gamma_{2m,2} \quad (18)$$

(où  $m$  est un entier quelconque  $\geq 2$ ). L'action de  $\Gamma_2 \simeq GL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathfrak{S}_3 \simeq \Gamma_{2m}/\Gamma_{2m,2}$ . Il n'est plus vrai, certes, que  $\Gamma_{2m,2}$  opère librement sur  $M_{1,1}[2m]$  – car  $\Gamma_{2m,2}$  contient l'élément  $-1 \in \Gamma_{2m}$  correspondant à la symétrie universelle  $-\text{id}_E$  – i.e. à l'élément  $-1$  de  $GL(2, \mathbb{Z})$ . Mais le résultat général de rigidité rappelé au début implique que

$$\Gamma_{2m,2} := \Gamma'_{2m,2}/\pm 1 \simeq \text{Ker}(\Gamma'_{2m} \longrightarrow \Gamma'_2 \simeq \mathfrak{S}_3)$$

opère encore *librement* sur  $M_{1,1}[2m]$  – et cela implique que le corollaire de la proposition est valable encore pour l'action de  $\Gamma'_2(\simeq \Gamma_2 \simeq \mathfrak{S}_3)$  sur  $M_{1,1}[2]'$ .

**Digression terminologique:**  $M_{1,1} = M_{1,1}[1]$  et les  $M_{1,1}[n]$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , sont définies a priori comme des *multiplicités* schématiques modulaire, i.e. a) comme des topos localement annelés localement isomorphes au topos étale d'un schéma (en l'occurrence de type fini sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$ , ou sur  $Q$  si on travaille en caractéristique 0) et b) définis, à équivalence près définie elle-même à isomorphisme unique près, comme “représentant” les foncteurs correspondants

$$\begin{aligned} S &\longmapsto \text{catégorie des courbes elliptiques relatives sur } S, \text{ avec rigidification} \\ &\text{d'échelon } n, \text{ i.e. isomorphisme } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S \simeq_n E \\ &= Ell_n(S) \end{aligned}$$

donc par construction, on a pour tout schéma  $S$  une équivalence:

$$Ell_n(S) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(S, (M_{1,1}[n]))$$

---

<sup>105</sup>valable pour  $n \geq 2$ , cf. plus bas.

[où les homomorphismes sont des homomorphismes de topos localement annelés, i.e. homomorphismes de multiplicités).] Pour que les catégories  $Ell_n(S)$  soient *discrètes*, ou encore que  $(M_{1,1}[n])$  soit un schéma, ou encore que les automorphismes d'une courbe elliptique respectant une rigidification de Jacobi d'échelon  $n$  soient l'identité, il faut et il suffit que  $n \geq 3$ , i.e.  $n \neq 1, 2$ . Donc  $M_{1,1}[2]$  n'est pas un schéma, mais  $M_{1,1}[2]'$  en est un, et  $M_{1,1}[2] \longrightarrow M_{1,1}[2]'$  est un isomorphisme local (décrit entièrement par une  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -gerbe sur  $M_{1,1}[2]'$ ). Il faut quand même prendre la peine de définir:

$$M_{1,1}[2] \xrightarrow{\text{“théor.”}} (M_{1,1}[2m], \Gamma_{2m,2}) \longrightarrow M_{1,1}[2]' \xrightarrow{\text{“défini”}} M_{1,1}[2m]/\Gamma'_{2m,2} \quad (20)$$

(on a aussi  $M_{1,1}[2m]/\Gamma'_{2m,2} = M_{1,1}[2m]/\Gamma_{2m,2}$ ) comme l'homomorphisme canonique de “passage au quotient grossier” qui a un sens chaque fois qu'un groupe discret (disons)  $G$  opère sur un schéma (disons)  $X$ , comme un morphisme

$$(X, G) \longrightarrow X/G = Y \quad (21)$$

dont le foncteur image inverse (faisceaux sur  $Y = X/G \longrightarrow G$ -faisceaux sur  $X$ ) est évident. Ici on a un sous-groupe invariant  $z$  de  $G$  qui opère trivialement sur  $X$ , tel que  $G/z$  opère librement, ce qui signifie que le morphisme (21) se factorise en

$$(X, G) \longrightarrow (X, G/z =: G') \longrightarrow Y = X/G = X/G' \quad (22)$$

de sorte que le morphisme de multiplicité (21) s'identifie aussi, simplement, à:

$$(M_{1,1}[2m], \Gamma_{2m,2}) \longrightarrow (M_{1,1}[2m], \Gamma'_{2m,2}) \simeq M_{1,1}[2]' \quad (23).$$

Par contre, si on veut descendre jusqu'à  $M_{1,1}[1]' = M'_{1,1}$ , en passant au quotient (au sens “grossier”) dans  $M_{1,1}[n]$  par  $\Gamma'_n$ , l'homomorphisme

$$(M_{1,1}[n], \Gamma'_n) = M'_{1,1} \longrightarrow M_{1,1}[n]/\Gamma'_n = \widetilde{M}_{1,1} \quad (24)$$

n'est plus un “isomorphisme”, i.e. n'est plus une équivalence, car  $\Gamma'_n$  n'opère pas librement – il a (même en caractéristique 0) de la ramification de degrés 2, 3. [Si cependant en excluant les courbes elliptiques anharmoniques, ça marcherait – ce n'est “qu'au voisinage” de ces courbes elliptiques que (24) n'est pas un isomorphisme...].

## A. GROTHENDIECK

En fait les raisonnements du paragraphe précédent établissent un isomorphisme (valable sur  $\text{Spec}\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ )<sup>106</sup>

$$M_{1,1}[2]' \simeq M_{0,4}^! \simeq \mathcal{U}_{0,3}(25)$$

et cet isomorphisme est compatible avec les opérations de

$$\Gamma_2' \simeq \Gamma_2 = GL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})(26)$$

sur  $M_{1,1}[2]'$  d'une part, de  $\mathfrak{S}_3$  sur  $\mathcal{U}_{0,3}$  d'autre part, quand on considère l'isomorphisme

$$\Gamma_2 = GL(2, \mathbb{F}_2) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3(27)$$

qui associe, à tout automorphisme de  $\mathbb{F}_2^2$ , son action sur les trois éléments non nuls  $\underline{\alpha} = (1, 0)$ ,  $\underline{\beta} = (0, 1)$  et  $\underline{\gamma} = (1, 1) = \underline{\alpha} + \underline{\beta}$  (de sorte qu'on a d'ailleurs)

$$\gamma = \alpha + \beta, \alpha = \beta + \gamma, \beta = \gamma + \alpha.(28)$$

Il faudrait expliciter cette compatibilité, en considérant l'action naturelle de  $\mathfrak{S}_4$  sur  $M_{0,4}^!$ ,  $M_{0,n}^!$  étant la multiplicité modulaire définie par

(29)  $\underline{\text{Hom}}_{\text{multipl}}(S, M_{0,n}^!) \simeq$  catégorie des courbes relatives sur  $S$ , localement

QuadQuadQuadQuadQuad isomorphes à  $\mathbb{P}_S^1$  et munies de  $n$  sections mutuellement

QuadQuadQuadQuadQuad disjointes numérotées  $S_1, S_2, \dots, S_n$ .

N.B. C'est représentable bel et bien par une multiplicité si et seulement si  $n \geq 3$ , i.e. si le champ des groupoïdes qu'on veut représentés est "rigide",<sup>107</sup> et alors cette multiplicité est même un schéma, isomorphe d'ailleurs canoniquement au sous-schéma

$\underline{\text{Mon}}(I_{n-3}, \mathcal{U}_{0,3}) \subset \mathcal{U}_{0,3}^{I_{n-3}}$ , où ici  $I_{n-3} = \{i \in \mathbb{N} \mid 3 \leq i \leq n\}$  – ainsi  $M_{0,3}^! \simeq \text{Spec}\mathbb{Z}$  (schéma fini), et  $M_{0,4}^! \simeq \mathcal{U}_{0,3} = \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1 \setminus \{\text{sections } 0, 1, \infty\} = \text{Spec}\mathbb{Z}[T][1/\{T(T-1)\}]$ .

Mais on fera attention qu'il y a une opération naturelle de  $\mathfrak{S}_n$  sur  $M_{0,n}^!$ , donc sur  $\underline{\text{Mon}}(I_{n-3}, \mathcal{U}_{0,3})$  – alors que l'on ne voit a priori que l'action de  $\mathfrak{S}_3 \times \mathfrak{S}_{n-3}$  sur ce dernier: l'isomorphisme canonique

$$M_{0,n}^! \simeq \underline{\text{Mon}}((I_{n-3}, \mathcal{U}_{0,3}) \subset \mathcal{U}_{0,3}^{I_{n-3}} \text{ (où } I_{n-3} = \{i \in \mathbb{N} \mid 3 < i \leq n\}))(30)$$

<sup>106</sup>L'image de  $M_{1,1}[2]'$  dans  $\text{Spec}\mathbb{Z}$  est  $\text{Spec}\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$  tandis que celle de  $M_{0,4}^! \simeq \mathcal{U}_{0,1}$  est  $\text{Spec}\mathbb{Z}$  tout entier.

<sup>107</sup>Si on veut une représentabilité pour  $n = 0, 1, 2$ , il ne suffit plus de travailler avec une topologie étale – il faut des topologies fppf par exemple.

## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

ne tient compte que des opérations naturelles du sous-groupe

$$\mathfrak{S}_3 \times \mathfrak{S}_{n-3} \subset \mathfrak{S}_n (31)$$

de  $\mathfrak{S}_n$  sur  $M_{0,n}^!$ , et pas de celle de  $\mathfrak{S}_n$  tout entier. Dans le cas de  $n = 4$ , l'opération de  $\Gamma'_2 = GL(2, \mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$  sur  $M_{0,4}^!$  qui nous intéresse est celle qui correspond au sous-groupe  $\mathfrak{S}_1 \times \mathfrak{S}_3$  qui fixe le premier élément (correspondant à la section nulle d'une courbe elliptique) et qui permute les trois suivants (correspondant aux trois éléments d'ordre 2 d'une courbe elliptique générique en caractéristique différente de 2, qui sont les trois autres points fixes de  $x \mapsto -x$ ), alors que l'opération naïve de  $\mathfrak{S}_3$  sur  $\mathcal{U}_{0,3}$  correspond au sous-groupe  $\mathfrak{S}_3 \times \mathfrak{S}_1$  dans  $\mathfrak{S}_4$ , qui fixe les trois premiers éléments. Petite question de gymnastique schématique (indépendante maintenant de la géométrie des courbes elliptiques, mais histoire de géométrie projective de dimension 1): comment passer d'une de ces actions de  $\mathfrak{S}_3$  à l'autre? On a envie de prouver que ce sont les mêmes !

Notons que si  $I$  est un ensemble à 4 éléments, alors il lui est associé un ensemble à 3 éléments de "partitions de type  $(2, 2)$ ",  $P_{2,2}(I) = \tilde{I}$ , et l'homomorphisme

$$\mathfrak{S}_I \simeq \mathfrak{S}_4 \longrightarrow \mathfrak{S}_{\tilde{I}} \simeq \mathfrak{S}_3 (32)$$

est surjectif – son noyau est un sous-groupe isomorphe (non canoniquement) à  $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$  – donc un groupe commutatif  $V(I)$  annulé par 2, i.e. un espace vectoriel sur  $\mathbb{F}_2$ , et en tant que tel de dimension 2. En fait,  $V(I)$  opérant sur  $I$  fait de  $I$  un  $V(I)$ -torseur – donc  $I$  est muni canoniquement d'une structure de plan affine sur  $\mathbb{F}_2$ , et  $V(I) \subset \mathfrak{S}_I$  est le groupe de ses translations.  $\mathfrak{S}_I$  s'interprète comme le groupe des automorphismes affines de  $I$  (*toute* permutation de  $I$  est affine – il y a sur l'ensemble  $I$  une et une seule structure de plan affine sur  $\mathbb{F}_2$ ), et  $\mathfrak{S}_{\tilde{I}}$  comme le groupe  $\text{Aut}(V(I))$  – ce qui suggère d'interpréter  $\tilde{I}$  comme l'ensemble des trois éléments non nuls de  $V(I)$ , et en fait, on constate que l'on a une bijection canonique

$$\tilde{I} \xrightarrow{\sim} V(I)^* \stackrel{\text{def}}{=} V(I) \setminus \{0\} (33)$$

en associant à une partition  $I = I' \cup I''$ , avec  $I', I''$  de cardinal 2, la seule permutation de  $I$  qui invarie  $I', I''$  et induit sur chacun une permutation non triviale (les éléments de  $\mathfrak{S}_I$  obtenus ainsi sont les *permutations paires d'ordre 2*, qui avec l'identité forment donc le sous-groupe  $V(I)$ ).

## A. GROTHENDIECK

On trouve, si  $i \in I$ , d'où  $I \setminus \{i\}$  de cardinal 3, une application canonique

$$I \setminus \{i\} \longrightarrow \tilde{I} \quad (34)$$

en associant à  $j \in I \setminus \{i\}$  la partition de  $I$  en  $\{i, j\}$  et en son complémentaire. Cette bijection étant compatible avec le transport de structure, on en conclut que l'isomorphisme correspondant

$$\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}} \simeq \mathfrak{S}_{\tilde{I}} \quad (35)$$

est aussi le composé

$$\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}} \hookrightarrow \mathfrak{S}_I \longrightarrow \mathfrak{S}_{\tilde{I}}, \quad (35)$$

( $\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}}$  étant le stabilisateur de  $i$  dans  $\mathfrak{S}_I$ ) donc les quatre sous-groupes symétriques d'indice 3  $\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}}$  de  $\mathfrak{S}_I$  ( $i \in I$ ) sont canoniquement isomorphe à  $\mathfrak{S}_{\tilde{I}}$  – donc entre eux, par des isomorphismes qui sont d'ailleurs déduits des bijections canoniques

$$I \setminus \{i\} \xrightarrow{\sim} I \setminus \{j\} \quad (i \neq j, i, j \in I), \quad (37)$$

égales à la *transposition* (non à l'identité) sur  $I \setminus \{i, j\}$ . Cette bijection en effet est le composé

$$I \setminus \{i\} \xrightarrow{\sim} \tilde{I} \xrightarrow{\sim} I \setminus \{j\},$$

et pour  $i, j$  variables, ces isomorphismes forment un système transitif d'isomorphismes.

Revenant à l'action de  $\mathfrak{S}_4$  sur  $M_{0,4}^!$ , la clef de la compréhension est donnée par ceci:

**Proposition:** Considérons le sous-groupe  $V(I)$  de  $\mathfrak{S}_I$  formé de l'identité et des involutions paires. Alors l'action de  $V(I)$  sur  $M_{0,I}^!$ <sup>108</sup> est triviale, donc  $\mathfrak{S}_I$  agit sur  $M_{0,I}^!$  par l'intermédiaire de  $\mathfrak{S}_I/V(I) = \mathfrak{S}_{\tilde{I}}$ .

**Corollaire:** Soit  $i \in I$ , alors l'action de  $\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}} \subset \mathfrak{S}_I$  sur  $M_{0,I}^!$  est déduite de celle de  $\mathfrak{S}_{\tilde{I}}$  via l'isomorphisme  $\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_I$  provenant de  $I \setminus \{i\} \xrightarrow{\sim} \tilde{I}$ .

En particulier, pour  $I = [1, 2, 3, 4]$ , pour comparer l'action de  $\mathfrak{S}_{\{1,2,3\}}$  et de  $\mathfrak{S}_{\{2,3,4\}}$  sur  $M_{0,4}^! \simeq \mathcal{U}_{0,3}$  – où la première est l'action standard de  $\mathfrak{S}_3$  sur  $\mathcal{U}_{0,3}$ , la deuxième celle de  $\mathfrak{S}_3$  sur  $M1, 1[2]'$ , on utilise l'isomorphisme

$$\mathfrak{S}_{\{1,2,3\}} \simeq \mathfrak{S}_{\{2,3,4\}} \quad (38)$$

---

<sup>108</sup>N.B.  $M_{0,I}^!$  se définit en termes de  $I$ , pour tout ensemble  $I$  de cardinal  $\geq 3$  comme  $M_{0,4}^!$



## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

explicité dans (37), correspondant à la bijection

$$1 \longmapsto 4, 2 \longmapsto 3, 3 \longmapsto 2$$

des ensembles d'indices, qui correspond donc à l'automorphisme

$$\text{int}(\sigma_1) : \mathfrak{S}_3 \longrightarrow \mathfrak{S}_3(39)$$

en identifiant maintenant les deux ensembles d'indices  $[1, 2, 3], [2, 3, 4]$  à  $[0, 1, \infty]$ , et en désignant par  $\sigma_i \in \mathfrak{S}_{\{0,1,\infty\}}$  (pour  $i \in \{0, 1, \infty\}$ ) la transposition des éléments  $\neq i$ . Donc

**Corollaire:** L'isomorphisme canonique

$$\mathcal{U}_{0,3} \xrightarrow{\varphi} M_{1,1}[2]' \quad (\text{sur } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]),$$

quand on fait opérer  $\mathfrak{S}_3 = \mathfrak{S}_{\{0,1,\infty\}}$  sur l'un et l'autre membre, est compatible avec ces opérations, *via* l'automorphisme  $\text{int}(\sigma_1)$ , i.e.

$$\varphi(u \cdot x) = (\sigma_1 u \sigma_1^{-1}) \cdot \varphi(x) \quad (40)$$

Il faut quand même démontrer la proposition 4, qui équivaut bien sûr à ceci:

**Corollaire:** Soit  $X$  une droite projective relative sur un schéma  $S$ ,  $I$  un ensemble à quatre éléments,  $(S_i)_{i \in I}$  une famille de sections mutuellement disjointes, et  $\sigma$  une involution paire de  $I$  (correspondant à une partition  $I = \{i_1, i_2\} \cup \{i_3, i_4\}$  par  $\sigma i_1 = i_2, \sigma i_2 = i_1, \sigma i_3 = i_4, \sigma i_4 = i_3$ ). Alors il existe un automorphisme (évidemment unique)  $u$  de  $X$ , tel que  $u \circ s_i = s_{\sigma i}$ .

Démonstration: On peut supposer que  $X = \mathbb{P}_S^1, s_1 = 0, s_2 = \infty$ ; donc  $s_3, s_4$  s'identifient à des sections de  $\mathcal{O}_S^*$ ; on prendra  $u$  défini par

$$u(z) = \frac{\lambda}{z}, \quad \lambda \in \Gamma(S, \mathcal{O}_X^*)$$

qui échange 0 et  $\infty$ , et la condition pour échanger  $s_3, s_4$  s'écrit  $\frac{\lambda}{s_3} = s_4, \frac{\lambda}{s_4} = s_3$ , i.e.  $\lambda = s_3 s_4$  (N.B. il suffirait que  $(s_1, s_2, s_3)$  et  $(s_1, s_2, s_4)$  soient mutuellement disjointes – pas la peine que  $s_3, s_4$  soient mutuellement disjointes...)

Plaçons nous à nouveau sur  $Q$  (pour fixer les idées), et considérons les groupes fondamentaux des multiplicités modulaires  $M_{1,1}, M'_{1,1}$ . On part de

$$M_{1,1} \simeq (M_{1,1}[n], \Gamma_n)$$

## A. GROTHENDIECK

$$n \geq 3 M'_{1,1} \simeq (M_{1,1}[n], \Gamma'_n = \Gamma_n / \pm 1) \quad n \geq 2 \quad (41)$$

(ou pour

$n=2$  on remplace  $M_{1,1}[2]$  par  $M_{1,1}[2]'$ ), qui donne des isomorphismes de groupes extérieurs

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(M_{1,1}) \simeq \pi_1(M_{1,1}[n], \Gamma_n) & (n \geq 3) & \\ \downarrow & \downarrow & \\ \pi_1(M'_{1,1}) \simeq \pi_1(M_{1,1}[n], \Gamma'_n) & (n \geq 2) & \end{array} \quad (42)$$

(où comme au (41) si  $n = 2$ ), et comme  $M_{1,1}[n]$  est connexe (même s'il n'est pas géométriquement connexe)<sup>109</sup>, on trouve

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}[n]) & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}) & \longrightarrow & \Gamma_n \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}[n]) & \longrightarrow & \pi_1(M'_{1,1}) & \longrightarrow & \Gamma'_n \longrightarrow 1 \end{array} \quad (43)$$

qui permet de reconstruire  $\pi_1(M_{1,1})$ , en tant qu'extension de  $\Gamma_n$ , quand on connaît  $\pi_1(M'_{1,1})$  comme extension de  $\Gamma'_n$ , par image inverse via  $\Gamma_n \longrightarrow \Gamma'_n$ . On trouve comme de juste

**Proposition:**  $\pi_1(M_{1,1})$  est une extension centrale de  $\pi_1(M'_{1,1})$  par  $\{\pm 1\}$ .

D'autre part, on a les suites exactes d'homotopie sur  $\text{Spec } Q$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{M_{1,1}}) & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}) & \longrightarrow & \Pi_Q \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) & \longrightarrow & \pi_1(M'_{1,1}) & \longrightarrow & \Pi_Q \longrightarrow 1 \end{array} \quad (44)$$

(avec les isomorphismes  $\pi_1(\overline{M_{1,1}}) \simeq \mathfrak{S}_{1,1}^+$ ,  $\pi_1(M_{1,1}) \simeq \mathfrak{S}_{1,1} \simeq \mathcal{N}_{1,1}$ ) et la théorie transcendante fournit des isomorphismes extérieurs canoniques<sup>110</sup>

$$\pi_1(\overline{M_{1,1}}) \simeq SL(2, \mathbb{Z})^\wedge, \quad \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) \simeq SL(2, \mathbb{Z})^\wedge = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge / \pm 1, \quad (45)$$

On a la compatibilité essentielle suivante entre (43), (44), (45): la commutativité de

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{M_{1,1}}) \simeq SL(2, \mathbb{Z})^\wedge & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}) & \longrightarrow & \Pi_Q \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \text{surj} & & \downarrow & & \downarrow \chi_n \\ 1 & \longrightarrow & SL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \hookrightarrow \Gamma_n = GL(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\det} & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* & \longrightarrow & 1 \end{array} \quad (46)$$

<sup>109</sup>c'est le théorème de Kronecker d'irréductibilité de l'équation cyclotomique.

<sup>110</sup>Attention; ne pas confondre  $SL(2, \mathbb{Z})^\wedge$  avec  $SL(2, \hat{\mathbb{Z}})$  !!!

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

(où  $\chi_n$  est le caractère cyclotomique).

Passant à la limite sur  $n$ , ceci donne un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{M_{1,1}}) \simeq SL(2, \mathbb{Z})^\wedge & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}) & \longrightarrow & \Pi_Q \longrightarrow 1 \\
 & & \downarrow \text{surj} & & \downarrow & & \downarrow \chi \\
 1 & \longrightarrow & SL(2, \hat{\mathbb{Z}}) \hookrightarrow & GL(2, \hat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \hat{\mathbb{Z}}^* & \longrightarrow 1
 \end{array} \quad (47)$$

diagramme sur lequel nous allons revenir.

Pour l'instant je vais exploiter le deuxième isomorphisme (42) pour  $n = 2$ :

$$\pi_1(M'_{1,1}) = \mathcal{N}'_{1,1} \simeq \pi_1(M_{1,1}[2]', \Gamma_2 = \mathfrak{S}_3) \simeq \pi_1(\mathcal{U}_{0,3}, \mathfrak{S}_3), \quad (48)$$

où le dernier isomorphisme correspond à l'isomorphisme  $\text{int}(\sigma_1) : \mathfrak{S}_3 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3$ , explicité dans (40). On trouve donc bien, comme prévu au paragraphe précédent – et de façon entièrement conceptuelle, l'isomorphisme d'extension

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) & \longrightarrow & \pi_1(M'_{1,1}) & \longrightarrow & \Pi_Q \longrightarrow 1 \\
 & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \parallel \\
 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{\mathcal{U}_{0,3}}, \mathfrak{S}_3) & \longrightarrow & \pi_1(\mathcal{U}_{0,3}, \mathfrak{S}_3) & \longrightarrow & \Pi_Q \longrightarrow 1
 \end{array} \quad (49)$$

où l'on a  $\pi_1(\overline{M'_{1,1}}) = \hat{\mathfrak{X}}_{1,1}^{'+} \simeq SL(2, \mathbb{Z})^\wedge$ ,  $\pi_1(M'_{1,1}) \simeq \mathcal{N}'_{1,1}$ ,  $\pi_1(\overline{\mathcal{U}_{0,3}}, \mathfrak{S}_3) \simeq \hat{\pi}'_{0,3}$  et  $\pi_1(\mathcal{U}_{0,3}, \mathfrak{S}_3) \simeq \mathcal{E}'_{0,3}$ . D'ailleurs, reprenant ces réflexions dans le contexte transcendant, on voit que cet isomorphisme

$$\hat{\pi}_{0,3}/\{l_1^2, l_\infty^3\} = \hat{\pi}'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge = SL(2, \mathbb{Z})^\wedge / \pm 1 \quad (50)$$

est associé à un isomorphisme

$$\pi_{0,3}/\{l_1^2, l_\infty^3\} = \pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} SL(2, \mathbb{Z})' = SL(2, \mathbb{Z}) / \pm 1 \quad (51)$$

déduit de l'isomorphisme de multiplicités analytiques complexes

$$M'_{1,1}{}^{\text{an}} \simeq (\mathcal{U}_{0,3}^{\text{an}}, \mathfrak{S}_3). \quad (52)$$

Il faudrait quand même expliciter l'homomorphisme (51) – qui n'est défini que modulo automorphisme intérieur, a priori, par des formules explicites – alors que sa définition ici sort de

façon purement conceptuelle, “géométrique” (au sens de la géométrie algébrique relative, des courbes rationnelles et elliptiques sur des espaces analytiques arbitraires). C’est là un calcul clef, sûrement instructif, qui ne devrait pas présenter de difficulté particulière...

J’ai un peu laissé tomber en chemin dans tout ça le schéma modulaire “grossier”  $\widetilde{M}_{1,1}$ , après avoir affirmé qu’il est isomorphe à  $\mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1$  et qu’il y a deux sections marquées, dont les valeurs en caractéristique 0 correspondent aux deux classes d’isomorphisme de courbes elliptiques anharmoniques. En termes de l’isomorphisme

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq M_{1,1}[2]'/\Gamma_2' \simeq \mathcal{U}_{0,3}/\mathfrak{S}_3 (53)$$

(valable sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ ), on trouve bien, au dessus de  $S = \text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ , que  $\widetilde{M}_{1,1}$  se déduit d’un schéma relatif  $Y$  qui est localement (au sens étale) isomorphe à  $\mathbb{P}_S^1$ , en enlevant une section  $s$ , dont l’existence implique déjà que  $Y$  est globalement isomorphe à  $\mathbb{P}_S^1$  – donc  $Y \setminus s(S)$  isomorphe à  $\mathbb{E}_S^1$ . Dans cette approche, on a donc envie de désigner par  $\infty$  (non par 0, comme en théorie des cartes !) cette section, qui correspond aux “points à l’infini”  $(0, 1, \infty)$  de  $\mathcal{U}_{0,3}$ , ou encore au “point à l’infini” de  $\widetilde{M}_{1,1}$ . Il est d’ailleurs facile de vérifier a priori (par la compactification de Deligne-Mumford de  $M_{1,1}$  et de  $\widetilde{M}_{1,1}$ ) que  $\widetilde{M}_{1,1}$  sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  tout entier est de la forme  $Y \setminus \text{Im } s$ , où  $Y$  est lisse et propre sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}$  tout entier, et  $s$  une section – dès lors ce qu’on connaît par exemple sur la fibre géométrique, et le fait que  $\mathbb{Z}$  est principal, impliquent que  $Y \simeq \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ , et qu’on a donc  $\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1$ . Pour choisir cet isomorphisme, on utilise les deux sections de  $\mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1$ , correspondant aux courbes anharmoniques. Ces deux sections *ne sont pas disjointes*, elles se rencontrent en caractéristique 2 et en caractéristique 3 (pour ce qui se passe en caractéristique  $\neq 2$ , i.e. sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ , on le voit bien par l’isomorphisme (53) – car en caractéristique 3 les deux orbites  $(2, -1, \frac{1}{2})$  et  $(j, \bar{j})$  coïncident et se collapsent en un seul et même point). Mais prenant l’une de ces sections comme section nulle (sauf erreur c’est celle qui correspond à la courbe elliptique la plus riche en symétries, à savoir le groupe  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ , qu’on prend – c’est une question de convention bien sûr – c’est donc aussi l’orbite  $\{j, \bar{j}\}$ , correspondant à un stabilisateur isomorphe à  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ), cela détermine l’isomorphisme  $\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1$  au signe près. L’autre section devient alors un entier de la forme  $\pm 2^a 3^b$  ( $a, b \in \mathbb{N}^*$  – entiers bien déterminés dont je ne sais pas la valeur par coeur), et on achève de normaliser en exigeant que le signe soit *plus*. Donc

**Théorème:** (pour mémoire – c’est bien connu)

## LA LONGUE MARCHE À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Il y a un isomorphisme unique

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1(54)$$

qui en caractéristique 0 donne à la courbe anharmonique de groupe d'automorphisme  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  l'invariant 0, et à celle de groupe  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  un invariant  $> 0$  (qui sera nécessairement  $2^a 3^b$ , avec  $a, b \in \mathbb{N}^*$  bien déterminés, mais par moi oubliés...  $b = 3$ , cf. ci-dessous).

En termes de l'isomorphisme

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathcal{U}_{0,3}/\mathfrak{S}_3 \subset \mathbb{P}^1/\mathfrak{S}_3$$

valable sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ , ceci correspond à un isomorphisme entre  $\mathbb{P}^1/\mathfrak{S}_3$  et  $\mathbb{P}^1$  qui à l'orbite  $(0, 1, \infty)$  associe  $\infty$  (non 0), et à l'orbite  $(j, \bar{j})$  associe 0 (non  $\infty$ ), à l'orbite  $(2, -1, \frac{1}{2})$  le fameux  $2^a 3^b$  (et non 1). La fonction (invariant modulaire)

$$\mathcal{J}(\lambda) \in Q(\lambda)(55)$$

qui réalise cet isomorphisme, i.e. le morphisme

$$\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1 \xrightarrow{\mathcal{J}} \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1(56)$$

correspondant (de degré 6, avec  $\mathcal{J} \circ u = \mathcal{J}, u \in \mathfrak{S}_3$ ) est donc lié à celle inspirée de la théorie des cartes, soit  $f(\lambda)$ , par

$$\mathcal{J}(\lambda) = 2^a 3^b f(\lambda)^{-1}(57).$$

D'ailleurs,  $f(\lambda)$  (ou  $\mathcal{J}(\lambda)$ ) se calcule aisément par la connaissance de ses zéros et de ses pôles, avec leurs multiplicités, et la “normalisation” pour la valeur de  $f$  (ou de  $\mathcal{J}$ ) sur une des sections  $2, -1, \frac{1}{2}$ ; on trouve immédiatement

$$f(z) = \frac{3^3}{2^2} \frac{z^2(z-1)^2}{(z^2-z+1)^3}, (58)$$

donc,

$$\mathcal{J}(z) = 2^{a+2} 3^{b-3} \frac{(z^2-z+1)^3}{z^2(z-1)^2}. (59)$$

Comme  $\mathcal{J}(\lambda)$  doit garder un sens en caractéristique 3, et ne peut pas être constante, ceci montre d'ailleurs que  $b = 3$ , donc (59) s'écrit aussi

$$\mathcal{J}(z) = 2^{a+2} \frac{(z^2-z+1)^3}{z^2(z-1)^2},$$

## A. GROTHENDIECK

mais on se rappellera que cette formule n'est pertinente – ne permet de calculer l'invariant d'une courbe elliptique – que si la caractéristique est différente de 2, heureusement! Pour décrire

$$M_{1,1} \longrightarrow \mathbb{E}_{\mathbb{Z}}^1(60)$$

(et en particulier pour déterminer l'autre invariant modulaire critique  $2^a 3^3$ , i.e. pour déterminer  $a$ ) aussi au voisinage de 2 – disons en caractéristique différente de 3 – il faut une étude des courbes elliptiques qui ne passe plus par la représentation (de Legendre, sauf erreur)  $y^2 = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$ , ou encore, par la rigidification de Jacobi d'échelon 2, mais par celle d'échelon 3.

**Remarques:** on voit tout de suite que le quotient  $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1/\mathfrak{S}_3$  s'identifie à  $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$  de façon unique en prenant comme images des orbites  $(0, 1, \infty)$  et  $(j, \bar{j})$  les sections 0 et  $\infty$  (par exemple, en suivant la convention qui correspond à la théorie des cartes), et en prenant comme image de l'orbite  $(2, -1, \frac{1}{2})$  un nombre rationnel qui soit  $> 0$ .

Ceci est possible a priori, car on note que les orbites  $(0, 1, \infty)$  et  $(j, \bar{j})$  ne coïncident en aucune caractéristique, donc correspondent à des sections disjointes de  $Y = \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1/\mathfrak{S}_3$ , tandis que l'orbite constante  $(2, -1, \frac{1}{2})$  coïncide avec la première en caractéristique 2, avec la deuxième en caractéristique 3 (et ce sont là les deux seules coïncidences qui peuvent arriver).

On voit donc a priori que la troisième section sera de la forme  $2^\alpha/3^\beta$ , avec  $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$ . Le calcul explicite est d'ailleurs évident; l'homomorphisme composé

$$\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1 \xrightarrow{f_1} \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1/\mathfrak{S}_3 \simeq \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1(61)$$

doit être de la forme  $f_1 = c f$ , avec la constante  $c \in Q$  choisie de telle façon que  $c f$  se réduise bien en toute caractéristique (ce qui détermine  $c$  modulo le signe), et que  $f_1(-1) = c f(-1) = c > 0$  (ce qui lève l'indétermination du signe). On trouve alors

$$f_1(\lambda) = \frac{\lambda^2(\lambda-1)^2}{(\lambda^2-\lambda+1)^2} = \frac{2^2}{3^3} f(\lambda), (62)$$

donc

$$f_1(-1) = \frac{2^2}{3^3} \quad (\text{donc } \alpha = 2, \beta = 3). (63)$$

Mais on fera attention qu'au voisinage de la caractéristique 2, ces calculs ne se rapportent plus à  $\widetilde{M}_{1,1}$  et  $\widehat{M}_{1,p}$  où la configuration des trois sections n'est pas la même qu'ici...

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Sur la lancée de ces réflexions, il serait naturel de regarder de plus près le schéma

$$M_{1,1}[4] \text{ sur lequel agit } \Gamma_4 = GL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \text{ via } \Gamma'_4 = \Gamma_4 / \pm 1(64)$$

et l'homomorphisme

$$M_{1,1}[4] \longrightarrow M_{1,1}[2]' \simeq \mathcal{U}_{0,3}(65)$$

compatible avec

$$\Gamma'_4 = GL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) / \pm 1 \longrightarrow \Gamma'_2 = \Gamma_2 \simeq GL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathfrak{S}_3.^{111}$$

Un calcul immédiat, compte tenu que  $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \simeq \{\pm 1\}$  donne

$$\text{Card } \Gamma_4 = 2 \text{Card } SL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = 8 \text{Card } SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 16 \text{Card } \Gamma_2 = 16 \times 6.$$

Donc

$$\text{Card}(\Gamma'_{4,2} = \text{Ker}(\Gamma'_4 \longrightarrow \Gamma'_2)) = 8(66)$$

i.e.  $M_{1,1}[4]$  est un revêtement galoisien de  $M_{1,1}[2]'$  d'ordre 8. Notons qu'il n'est pas géométriquement connexe sur  $Q$ , ou sur  $\text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ , puisque  $M_{1,1}[4]$  se trouve sur l'extension quadratique  $\mu_4^*$ , de  $\text{Spec } \Lambda$  où  $\Lambda = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ , qui n'est autre que  $\Lambda(i)$ . On a une factorisation de  $M_{1,1}[4] \longrightarrow M_{1,1}[2]'$ :

$$\begin{array}{ccccc} M_{1,1}[4] & \longrightarrow & (\mathcal{U}_{0,3})_S & \xrightarrow{2} & M_{1,1}[2]' \simeq \mathcal{U}_{0,3} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & S^1 = \mu_4^* & \xrightarrow{2} & \text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = S \end{array} \quad (67)$$

[où les flèches horizontales sont galoisiennes du degré indiqué et] où maintenant

$$M_{1,1}[4] \longrightarrow M_{1,1}[2]''_S = (\mathcal{U}_{0,3})'_S$$

est un revêtement galoisien dont le groupe est le noyau de  $\Gamma'_{4,2} \xrightarrow{\det} \{\pm 1\}$ , ou encore celui de  $SL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})' \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ , que nous allons désigner par  $S\Gamma'_{4,2}$ , qui est d'ordre 4.

---

<sup>111</sup>En fait le noyau de l'homomorphisme  $GL(k, A) \longrightarrow GL(k, A/\mathcal{J})$  est toujours un groupe commutatif – et même un  $A/\mathcal{J}$ -module isomorphe à  $(A/\mathcal{J})^4$  – si  $\mathcal{J}$  est un idéal de carré nul d'un anneau  $A$ . Donc ici  $\text{Ker}(GL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow GL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$  est un groupe *commutatif*, et même un espace vectoriel sur  $\mathbb{F}_2$ ; il est isomorphe à  $\mathbb{F}_2^4$ .

**Proposition:** Le groupe

$$ST_{4,2} = \text{Ker}(SL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \quad (68)$$

est isomorphe à  $\mathcal{T}L(2, \mathbb{F}_2)$  (groupe des matrices de trace nulle à coefficients dans  $\mathbb{F}_2$ ), avec l'opération évidente de  $SL(2, \mathbb{F}_2)$  dessus, et le sous-groupe  $\{\pm 1\}$  correspond aux matrices scalaires – le quotient  $ST'_{4,2}$  des deux est isomorphe à  $\mathbb{F}_2^2$  (de façon idiote et pas canonique du tout!). Regardant  $M_{1,1}[4]$  comme un revêtement galoisien de  $M'_{1,1}[2]_{S'} = (\mathcal{U}_{0,3})_{S'}$ , on trouve géométriquement “le” revêtement *abélien* universel de  $\mathcal{U}_{0,3}$  de groupe annulé par 2 (et pour cause), qui a comme groupe de Galois  $(\mathbb{F}_2)^{\{0,1,\infty\}}/(\text{diagonale})$ .<sup>112</sup>

Enfin, tout est essentiellement tautologique, mais un calcul amusant à faire sera de redécrire l'action de  $SL(2, \mathbb{F}_2)$  sur  $\mathcal{T}L(2, \mathbb{F}_2)/$  (matrices scalaires), de façon à l'identifier à l'action de  $\mathfrak{S}_3$  sur  $\mathbb{F}_2^{\{0,1,\infty\}}/(\text{diagonale})$ . Comme revêtement de

$$\widetilde{M_{1,1S'}} \simeq M_{1,1}[4]/ST'_4 \simeq M_{1,1}[2]_{S'}/\Gamma'_2 \quad (69)$$

$M_{1,1}[4]$  est un revêtement galoisien d'ordre 24 (=4·6) de groupe  $SL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})'$ . Ce serait bien qu'on n'ait pas un isomorphisme

$$SL(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})' \simeq \mathfrak{S}_4 \quad (70)$$

(où  $\mathfrak{S}_4$  est le groupe des automorphismes de l'octaèdre), et que  $M_{1,1S'}$  ne soit le revêtement de  $\mathbb{P}_{S'}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ , avec ramification compatible avec  $2\{1\} + 3\{\infty\}$ , qui correspond à l'*octaèdre* dans la théorie des cartes – on devrait avoir sur  $S' = \text{Spec } \mathbb{Z}[\frac{1}{2}][i]$  un isomorphisme canonique

$$M_{1,1}[4]_{S'} \simeq \text{courbe de Fermat } x^r + y^r + z^r = 0 \text{ (sur } S')^{113} \quad (71)$$

dont le groupe d'automorphismes est justement une extension de  $\mathfrak{S}_3$  par

$$\mu_2^{\{0,1,\infty\}}/(\text{diagonale})!$$

<sup>112</sup>NB Ce sont les 4 supplémentaire de ce sous-espace  $\mathbb{F}_2 \hookrightarrow \mathcal{T}L(2, \mathbb{F}_2)$  qui forment un torseur sur le dual de  $V = \mathcal{T}L(2, \mathbb{F}_2)$ , qui devraient correspondre aux quatre relèvements en  $\pi_{0,3} \hookrightarrow \mathfrak{Z}_{1,1}^+ = SL(2, \mathbb{Z})$ ; cf. plus haut sur ces questions.

<sup>113</sup>Il vaudrait mieux écrire l'équation de Fermat ici  $x_0^r + x_1^r + x_\infty^r = 0$ .



## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

Pour bien faire, il faudrait expliciter la relation entre courbes elliptiques  $E$  (sur un schéma  $S$  au dessus de  $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}][i]$ ) munies d'une rigidification de Jacobi d'échelon 4,  $e_1, e_2$  avec  $e_1 \wedge e_2 = [i]^{-1}$ , et solutions "non triviales" de l'équation

$$x^r + y^r + z^r = o(72)$$

sur  $S$ , i.e. les systèmes de sections  $x, y, z \in \Gamma(S, O_S^*)$  satisfaisant (72), modulo multiplication par un "scalaire"  $\alpha \in \Gamma(S, O_S^*)$  – ou encore, rompant la symétrie en posant  $X = x/z, Y = y/z$ , les solutions de l'équation

$$X^r + Y^r = -1 (= i^2), X, Y \in \Gamma(S, O_S^*) \dots (73)$$

On a ainsi interprété  $M_{1,1}[2]'$  et (modulo des vérifications et une étude un peu plus poussée)  $M_{1,1}[4]$ , en relation avec deux cartes triangulaires pondérées régulières – la carte "diédrale" ou carte triangulaire pondérée universelle (trois sommets  $0, 1, \infty$ , trois arêtes, deux faces qui sont des triangles, type  $(p, q) = (3, 3)$ ), et la carte *octogonale*, qui est un revêtement d'ordre 4 de celle-ci (étale en dehors de  $\{0, 1, \infty\}$ ).

Il serait bien aussi de regarder de plus près les variétés modulaires congruentielles  $M_{1,1}[3]$  et  $M_{1,1}[5]$ , correspondant à des groupes modulaires "géométriques":

$$ST'_3 = SL(2, \mathbb{F}_3) / \pm 1 \text{ (d'ordre 12)} \subset GP(1, \mathbb{F}_3) \text{ (d'ordre 24)} \simeq \mathfrak{S}_4 \quad \text{en fait on doit avoir } ST'_4 \simeq \mathfrak{A}_4, ST'_5 = SL(2, \mathbb{F}_5)$$

Sauf erreur, ces groupes sont respectivement les groupes  $\mathfrak{A}_4$  du *tétraèdre* orienté et celui  $\mathfrak{A}_5$  de l'icosaèdre orienté. Si je me rappelle bien, les cas  $n = 2, 3, 4, 5$  épuisent les cas de courbes modulaires congruentielles  $M_{1,1}[n]$  qui soient *rationnelles*. C'est une chose remarquable qu'on trouve par exemple tous les polyèdres réguliers finis à faces des triangles [sauf un, à arêtes repliées - celui de la figure (76), cf. plus bas...]; il était clair a priori, par l'isomorphisme entre  $\mathfrak{S}'_{1,1}$  et le "groupe cartographique triangulé orienté"  $\pi'_{0,3}$ , qu'on devrait retrouver tous les polyèdres réguliers finis à faces des triangles de cette façon, mais non pas que ce soit des sous-groupes de congruences, très exactement. Le tableau obtenu est alors le suivant:

QuadQuad    groupe  $G = ST'_n$     courbe modulaire    type du polyèdre

$$D_3 \simeq \mathfrak{S}_3 \text{ QuadQuad } M_{1,1}[2]' \text{ triangles phrique } \mathfrak{A}_4 \text{ QuadQuadQuadQuad } M_{1,1}[3] \text{ ttradre } \mathfrak{S}_4 \text{ QuadQuad}$$

## A. GROTHENDIECK

Comme autres courbes modulaires (pas congruentielles) rationnelles galoisiennes sur  $\tilde{M}_{1,1}$ , il y aurait encore les quotients des précédents par les sous-groupes invariants de  $ST'_n$ , distincts du groupe entier et de 1. On trouve comme quotients possibles:

- a) Cas  $\mathfrak{S}_3$ : le quotient  $\{\pm 1\}$  (via signature).
- d) Cas  $\mathfrak{A}_4$ : le quotient  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \mathfrak{A}_3$  (via  $\mathfrak{S}_4 \longrightarrow \mathfrak{S}_3$  induisant  $\mathfrak{A}_4 \longrightarrow \mathfrak{A}_3$ ).
- c) Cas  $\mathfrak{S}_4$ : le quotient  $\mathfrak{S}_3$ , et le quotient  $\{\pm 1\}$  de celui-ci.
- (pour d il n'y a rien,  $\mathfrak{A}_5$  étant un groupe simple).

Les courbes modulaires rationnelles obtenues se réduisent aux deux cas a) et b) (qui sont retrouvés dans c)). Dans le cas a), on trouve le revêtement quadratique de  $Y = \mathbb{P}_1(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\}$ , qui est non ramifié en  $\infty$  (car l'indice de ramification devrait diviser 2 et 3), qui correspond donc au revêtement  $y = \sqrt{x(x-1)}$  et à la carte sphérique de type (2,1) (sommets d'indice 2, faces d'indice 1), formée d'un sommet avec une arête (équateur) délimitant deux faces qui sont des monogones.

Le cas b) est le revêtement cyclique d'ordre 3, ramifié seulement en 0 et en  $\infty$  (en 1, l'indice de ramification doit être diviseur de 2 et de 3, donc est 1) avec carte sphérique de type (3,3), avec des arêtes qui sont des boucles repliées:

(76) 1 seul sommet, 3 arêtes repliées qui en sortent, une face triangulaire.

Les variétés modulaires sont trop proches de  $\tilde{M}_{1,1}$  – avec un groupe d'automorphismes (quotient de  $\Gamma'_\infty = SL(2, \mathbb{Z})$ ) trop petit, pour pouvoir être rigidifiantes; il faudrait que le groupe de Galois-Poincaré du revêtement soit multiple de 12 (multiple de 4 et 6!), pour que la courbe modulaire ait une chance d'être rigidifiante. Ces cas semblent donc nettement moins intéressants.

Il y aurait lieu par ailleurs, dans chacun des trois cas restants de (75) (mis à part donc le premier cas, qui correspond à  $M_{1,1}[2]'$  et est à peu près compris), d'expliciter la relation entre les points des courbes rationnelles correspondantes, et entre courbes elliptiques à rigidification de Jacobi, d'échelon respectivement 3,4,5. Il y a sûrement des choses précises dans Klein, mais on aimerait faire des choses un peu plus fines, qui soient valables simultanément en toute caractéristique, i.e. sur des schémas de base généraux. Ce souci semble intuitivement lié à la question des opérations de  $\Pi_Q$  sur les classes d'isomorphismes des cartes, et plus particulièrement des cartes sphériques régulières. C'est assez extraordinaire que \*\*, depuis trois ans que la question est là, n'y ait pas encore touché. Dieu sait qu'elle est juteuse!

## LA LONGUE MARCHÉ À TRAVERS LA THÉORIE DE GALOIS

### Complément sur les rapports anharmoniques:

Soient  $x_1, x_2, x_3, x_4$  des sections partout distinctes de  $\mathbb{P}_S^1$ , on veut construire la section correspondante de  $\mathcal{U}_{0,3} = \mathbb{P}_S^1 \setminus \{0, 1, \infty\}_S$ . Soient  $a, b, c, d$  sections locales de  $\underline{O}_S$ , avec  $ad - bc$  inversible, telles que:

$$u = u_{a,b,c,d} : z \longmapsto \frac{az + b}{cz + d} \quad (77)$$

transforme  $(x_1, x_2, x_3)$  en  $(0, 1, \infty)$  – on aura donc

$$\lambda = u(x_4). \quad (78)$$

Les conditions sur  $(a, b, c, d)$  pour  $ux_1 = 0$  etc sont

$$ax_1 = 0, \quad ax_2 + b = cx_2 + d, \quad cx_3 + d = 0$$

qui donnent, si par exemple  $a$  est inversible (sinon on peut supposer  $c$  inversible), en résolvant en  $b, c, d$  [ici quelques lignes de calcul élémentaire omises]:

$$\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{(x_4 - x_1)(x_2 - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_4 - x_3)}. \quad (79)$$

En tant que fonction rationnelle en  $x_1, x_2, x_3, x_4$  (à coefficients dans un anneau intègre fixé),  $\lambda$  est caractérisé par les deux propriétés:

- a) invariance par rapport à une (même) transformation homographique sur les variables  $x_1, x_2, x_3, x_4$ ,  $f(ux_1, ux_2, ux_3, ux_4) = f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ , et
- b)  $f(0, 1, \infty, x_4) = x_4$  (avec un grain de sel pour donner un sens au premier membre).

On a de plus

- c) une propriété remarquable de symétrie, qu'on explicite en définissant un homomorphisme de  $\mathfrak{S}_4$  dans le groupe homographique (moralement,  $GP(1)$ )

$$\begin{array}{ccc} \sigma \in \mathfrak{S}_4 & \xrightarrow{\sigma \mapsto \varphi_\sigma} & GP(1) \\ & \searrow & \nearrow \\ & \mathfrak{S}_3 & \end{array}$$

de telle façon qu'on ait

$$\lambda(x_{\sigma^{-1}1}, x_{\sigma^{-1}2}, x_{\sigma^{-1}3}, x_{\sigma^{-1}4}) = \varphi_\sigma(\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4)) \dots \quad (80)$$

## NOTES

## § STRUCTURE À L'INFINI DES $M_{g,\nu}$

---

### 1. Courbes standard

Soit  $k$  un corps algébriquement clos. Une “courbe standard” sur  $k$  est un schéma  $X$  sur  $k$  satisfaisant les conditions suivantes :

- a)  $X$  quasi-projectif, toute composante irréductible est de dim 1
- b) Tout point de  $X$  est soit lisse, soit un “point quadratique” (ordinaire) - i.e. isom (loc. ét) à la courbe  $\text{Spec}(k[X, Y]/XY)$  au point 0.

Il est connu qu'on peut []  $\widehat{X}$  de  $X$ , telle que  $X$  soit un schéma propre, []  $X$  s'identifie à un ouvert dense de  $\widehat{X}$ , et que  $\widehat{X}$  soit lisse sur les points de  $\widehat{X} \setminus X = I$ . Alors  $\widehat{X}$  est une courbe projective,  $I$  est une partie finie de  $\widehat{X}(k)$  contenant [] ouvert des points des lissité de  $\widehat{X}$ . []  $A$  des points singuliers de  $X$  s'identifie à []

La donnée de  $X$  équivaut à celle des  $(\widehat{X}, I)$ , où  $\widehat{X}$  est un schéma projectif, dont toute composante irréductible est de dim 1, et dont l'ensemble singulier est formé des points [] ordinaires - et  $I$  est un sous-schéma fini étale de  $\widehat{X}^{lisse}$ , ou ce qui revient au même, une partie finie de  $\widehat{X}^{lisse}(k)$ .

Soit

Ainsi, à la courbe standard  $X$  nous avons associé les systèmes de données suivantes :

[]

Inversement, [] on construit une courbe standard  $X$  en passant au quotient dans  $\widetilde{A}_k Y \setminus I_k$  par l'involution  $\sigma$  - i.e.  $X$  est universel [] pour la donnée  $p$ :

[]

soumise à  $(pi)\sigma = pi$ .

Ainsi la catégorie des courbes standard sur  $k$  [] apparaît comme équivalente à celle des systèmes a) b) c) ci-dessus. (pour les iso)...

**N.B.** On récupère  $\widehat{X}$  comme quotient de  $Y$  par  $\sigma$ .

### Généralisation sur une base quelconque.

Une *courbe standard* sur  $S$  (multiplicité schématique, disons) [] défini constructivement en termes d'un système a), b), c) comme ci-dessus, i.e.

[]

On construit alors  $\widehat{X} = Y/\sigma$ , contenant  $A = \widetilde{A}/\sigma$  et  $I$  comme sous-schémas fermés finis étales sur  $S$ , et []  $X = \widehat{X} \setminus I$ . On peut montrer que le foncteur

$$(Y, \widetilde{A}, \widehat{I}, \sigma_{\widehat{A}}) \mapsto X$$

des systèmes (5) (pour les iso) vers les schémas relatifs [], est *pleinement fidèle* (<sup>1</sup>).

**N.B.** []

[]

(par abus de langage, puisque c'est non seulement le schéma relatif  $Y$ , mais  $Y$  avec la structure supplémentaire  $\widetilde{A}, I, \sigma_{\widehat{A}}...$ ).

## 2. Graphe associé à une courbe standard

Revenons au cas d'un corps de base  $k$  algébriquement clos, pour commencer. Soit  $X$  une courbe standard, d'où  $Y, I, \widetilde{A}, \sigma_{\widehat{A}}$ .

Posons

$$S = \pi_o(Y) \simeq [] \text{ des corps irréductibles de } X(7)$$

On a alors le diagramme d'application canoniquement entre ensembles finis

$$[](8)$$

où  $q$  est de degré 2 et définit l'involution  $\sigma_{\widehat{A}}$ . Les applications  $\sigma$  et  $p$  sont induites par les [] en passant aux  $\pi_o$ .

---

<sup>1</sup>faux tel quel

Le système  $(\tilde{A} \xrightarrow{\sigma} S, \sigma_{\tilde{A}})$  où  $[\ ]$ , peut être considéré comme définissant un *graphe*, dans  $S$  est l'un des sommets, et  $\tilde{A}$  l'un des  $[\ ]$  l'application  $\sigma$  étant l'application "origine d'un  $[\ ]$ ". Ce graphe ne dépend que de  $\widehat{X}$ , pas de  $X$  i.e. des choix de  $I \subset \widehat{X}(k)$ . C'est  $[\ ]$  compte de ce choix que l'on considère,  $[\ ]$  plus de la structure de graphe, le donnée supplémentaire

$$I \longrightarrow S(9)$$

Le graphe indique comment les composantes irréductibles de  $X$  (figurés par les sommets) se récupèrent deux à deux - les points d'intersections, i.e. les points singuliers ("doubles"  $[\ ]$ ) de  $X$ , correspondant aux arêtes. Si une composante irréductible  $X_\alpha$  correspond au sommet  $\alpha$  des graphes, alors les  $[\ ]$  fermés en  $\alpha$  correspondent biunivoquement aux points doubles de  $X_\alpha$  - donc  $[\ ] X_\alpha$  sont lisses  $[\ ]$  l'extrémité.

Il est clair que tout graphe fini peut être obtenue (à iso près) par une  $\widehat{X}$  convenable - et même avec des composantes  $X_\alpha$  de genre  $g_\alpha$  donné (i.e. des  $\tilde{X}_\alpha$  de genre  $g_\alpha$ ...). De plus,  $[\ ] I \longrightarrow S$  ( $I$   $[\ ]$  fini), cela peut être réalisé par un  $I \subset \widehat{X}^{lisse}$ , i.e. par une courbe standard  $S$ .

La *maquette* d'une courbe standard  $X$  consiste, pour définition, en les données suivantes  $[\ ]$

Une structure formée d'un graphe fini  $G = (S, \tilde{A}, \sigma)$ , d'un ensemble fini  $I$  au dessus de l'une des sommets de  $G$ , et d'une application "genre":  $S \xrightarrow{g} N$ ,  $[\ ]$  appelé ici une "maquette".

*Proposition. — Considérons la maquette d'une courbe standard  $X$*

- a) Soient  $\alpha, \beta \in S$ , alors  $\alpha, \beta$  appartiennent à la même composante connexe de graphe  $G$ , si et seule si  $X_\alpha$  et  $X_\beta$  appartiennent à la même composante connexe de  $X$ . Donc on a une bijection canonique*

$$\pi_0(G_X) \simeq \pi_0(X), (11)$$

*en particulier  $X$  est connexe si et seule si  $G_X$  est connexe.*

- b) Supposons  $X$  connexe i.e.  $\widehat{X}$  connexe, i.e.  $[\ ]$  on a alors  $[\ ]$  i.e.  $[\ ]$  où  $[\ ]$*

.

### 3. Courbes "stables" et MD-graphes

Une courbe standard (sur  $k$  algébriquement clos) est "stable", si elle satisfait à l'un des conditions équivalentes suivantes

## A. GROTHENDIECK

- a)  $\text{Aut } X$  est fini
- b) Pour tout  $\alpha$ ,  $(Y_\alpha, I_\alpha \cup \tilde{A}_\alpha)$  est anabélien i.e.  $2g_\alpha + \hat{\nu}_\alpha \geq 3$  i.e.  $2g_\alpha - 2 + \hat{\nu}_\alpha \geq 1$ , i.e.
  - 1) Si  $g_\alpha = 1$ , on a  $\hat{\nu}_\alpha \geq 1$
  - 2) Si  $g_\alpha = 0$ , on a  $\hat{\nu}_\alpha \geq 3$
- c) Tout champ de vecteurs sur  $Y$  nul sur  $I \cup \tilde{A}$  est nul.
- d)  $\underline{\text{Aut}}_{(Y, \tilde{A}_k, I)}$  est un schéma en groupes fini étale sur  $k$ . On voit que cette condition (sous la forme b)) ne dépend que de la *maquette* de la courbe. On dit que  $X$  est une *MD-courbe* (MD, initiale de “Mumford-Deligne” ou de “modulaire”) si elle est stable, et 0-connexe (i.e. connexe non vide).

Les maquettes de telles courbes sont les maquettes 0-connexes et stables (i.e. dont les sommets de guère 1 sont de poids total  $\geq 1$ , et les sommets de guère 0 sont de poids total  $\geq 3$ ), on les appellera les MD-graphes.

**NB.** Une maquette est une MD-graphe si et seule si

- a) elle est 0-connexe (i.e. le graphe  $G$  est connexe  $\neq \emptyset$ )
- b) elle n'est pas réduit à un seul sommet de guère 1, de poids total 0 []
- c) les sommets []

Proposition. — Si  $(G = (S, \tilde{A}, \sigma), I, \underline{g} : S \longrightarrow N)$  est une MD-graphe, son type  $(g, \nu)$  est anabélien, i.e.  $2g + \nu \geq 3$ .

Si on avait  $g = 1, \nu = 0$ , alors la relation

$$g = 1 = \sum g_\alpha + h_1$$

montre que ou bien tous les  $g_\alpha$  sont nuls et  $h_1$  [], ou bien tous les  $g_\alpha$  sauf une  $g_{\alpha_0}$  sont nuls, []

[]

Soit  $G$  une maquette. On dit qu'une courbe standard sur un corps algébriquement clos est *de type*  $G$ , si sa maquette est isomorphe à  $G$ , on dit qu'elle est *G-épinglée* si on se donne un isomorphisme entre sa maquette et  $G$  (c'est donc une structure []).



Soit  $(\widehat{X}, \underline{I})$  une courbe standard sur une base  $S$  quelconque, on dit qu'elle est de type  $G$  si ses fibres géométriques sont de type  $G$ . Alors les maquettes des fibres géométriques de  $(\widehat{X}, \underline{I})$  forment les fibres d'une schéma en maquettes (ou un MD-graphe) sur  $S$   $(\underline{S}, \underline{\tilde{A}}, \sigma_{\underline{\tilde{A}}}, \underline{I}, \underline{\tilde{A}} \longrightarrow \underline{S}, \underline{I} \longrightarrow \underline{S}, \underline{S} \xrightarrow{g} N_S)$  (système de revêtements finis étales de  $S$  et de morphismes entre ceux-ci), localement isomorphe à la maquette  $G$  donnée. On appelle  $G$ -épinglage entre  $(\widehat{X}, \underline{I})$  tout isomorphisme entre  $G_S$  et  $\underline{G}(\widehat{X}, \underline{I})$ . Si

$$\Gamma = \text{Aut } G(18)$$

(groupe fini), les  $G$ -épinglages de  $(\widehat{X}, \underline{I})$  s'identifient aux sections d'une certain  $\Gamma_S$ -torseur, appelé *torseur de  $G$ -épinglages* de  $(\widehat{X}, \underline{I})$ .

Considérons, sur une base  $S$  fixée, le catégorie  $([])$  des courbes standard  $G$ -épinglées. Pour tout  $\alpha \in S$

**N.B.** Si  $\text{card } J = \nu$ , alors

$[]$  Il en est donc de même dans  $M_{g,J}$ , donc ainsi de  $M_G$  (pour  $G$  semi-stable) et de  $M_{[G]} = (M_G, \Gamma)$ .

#### 4. La théorie de Mumford-Deligne

Soient  $S$  une multiplicité schématique,  $X$  un schéma relatif sur  $S$ , propre sur  $S$ ,  $\underline{I}$  une sous-schéma fermé de  $X$ . On dit que  $(X, \underline{I})$  est une MD-courbe relative sur  $S$ , si  $X, \underline{I}$  sont plats de présentation finie sur  $S$ , et si pour tout point géométrique de  $S$ , la fibre  $(X_{\bar{s}}, \underline{I}_{\bar{s}})$  est une MD-courbe géométrique sur  $k(s)$  i.e.  $X_{\bar{s}}$  est 0-connexe, de dimension 1,  $[]$  c'est une fonction localement constant sur  $S$ .

Fixons nous une type numérique  $(g, \nu)$  *anabélien* ( $2g + \nu \geq 1$ ), et considérons, pour  $S$  variable, le groupoïde fibré

$$S \mapsto \widehat{M}_{g,\nu}(S) = \text{MD-courbes relatives sur } S, \text{ de type numérique égal à } (g, \nu)(24)$$

On a alors le vraiment  $[]$  théorème suivant :

*Théorème de Mumford-Deligne <sup>(2)</sup>. — Le groupoïde fibré  $S \mapsto \widehat{M}_{g,\nu}/S$  sur  $\text{Sch}$  (plus généralement, sur les multiplicités schématiques...) est représentable pour une multiplicité schématique*

---

<sup>2</sup>On suppose  $2g + \nu \geq 3$  (cas anabélien)

$\widehat{M}_{g,v}$ , qui est lisse et propre sur  $\text{Spec } Z$ , D'autre part  $M_{g,v}$  est un ouvert de Zariski de  $\widehat{M}_{g,v}$ , schématiquement dense fibre par fibre.

On en déduit aisément p. ex. la connexité des fibres géométriques  
[ ]. Nous allons revenir là dessus maintenant.

## 5. Spécialisation des MD-graphes

Soit

6. Morphismes de [ ] de graphes et de maquettes

7. Étude des [ ] de  $\dim \leq 2$  [ ] détermination des graphes correspondantes

8. Structure [ ]

9. Structure groupoïdale des multiplicités modulaires de Teichmüller variables ([ ] MDT-structure) : cas [ ],

10. Structures MDT analytiques : [ ]

11. Digression : [ ] Structure à l'infini des groupoïdes fondamentaux

12. Digression (suite) : topos canoniques associés à une [ ] et leur dévisages en "topos élémentaires"

13. Digression sur stratification "locales" [ ]

Une stratification globale

## § NOTES ANABÉLIENNES

---

**I. Résultats de fidélité**

**II. La question de pleine fidélité**

**III. Étude des sections de  $E_U$  sur  $\Gamma$**

**IV. Sections d'extensions et anneaux de valuations généraux**