

GÉOMÉTRIE ALGÈBRE. — *Représentations linéaires de schémas en groupes affines*. Note (*) de M. NEANTRO SAAVEDRA RIVANO, transmise par M. Henri Cartan.

La correspondance qui, à un schéma en groupes affine, associe la catégorie de ses représentations linéaires, permet d'établir un dictionnaire entre groupes affines et certaines \otimes -catégories.

1. LA CATÉGORIE $\text{Rep}(G)$.

1.1. Soient S un schéma, G un S -monoïde affine [(1), I, 4]. On note $\text{Rep}(G)$ la catégorie des représentations linéaires de G dans des \mathcal{O}_S -Modules quasi-cohérents (i.e., G - \mathcal{O}_S -Modules quasi-cohérents à gauche),

$$\omega^G : \text{Rep}(G) \rightarrow \text{Qcoh}(S)$$

le foncteur « oubli de l'action G ». On notera que $\text{Rep}(G)$ est canoniquement une \otimes -catégorie ACU, ω^G un \otimes -foncteur ACU (2), et que la formation de la \otimes -catégorie $\text{Rep}(G)$ au-dessus de $\text{Qcoh}(S)$ est fonctorielle en le monoïde G . Si $u : G \rightarrow G'$ est un morphisme de S -monoïdes affines, on notera $\text{Rep}(u) : \text{Rep}(G') \rightarrow \text{Rep}(G)$ le \otimes -foncteur ACU qu'il induit.

Supposons que G soit S -plat, ce qui pour S affine équivaut à la commutation de ω^G avec les limites projectives finies, et entraîne que $\text{Rep}(G)$ est une catégorie abélienne. On appelle *foncteur fibre* sur $\text{Rep}(G)$ un \otimes -foncteur $\text{ACU} \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -linéaire $\omega : \text{Rep}(G) \rightarrow \text{Qcoh}(S)$ qui soit fidèle, exact et qui commute avec les limites inductives. En prenant comme morphismes les \otimes -morphisms unifères, on obtient une catégorie $\text{Fib}(G)$ dont l'ensemble des classes d'isomorphisme d'objets sera noté $\text{fib}(G)$.

1.2. Soient C une \otimes -catégorie ACU, a, b des \otimes -foncteurs $\text{ACU } C \rightarrow \text{Qcoh}(S)$. On note $\text{Hom}^\otimes(a, b)$ le préfaisceau sur la catégorie Sch_S qui à un S -schéma S' associe l'ensemble

$$\text{Hom}^\otimes(a, b) = \text{Hom}^\otimes(a_{S'}, b_{S'})$$

des \otimes -morphisms unifères de $a_{S'}$ dans $b_{S'}$, la notation $a_{S'}$ désignant le \otimes -foncteur ACU composé de a et de l'extension des scalaires $\text{Qcoh}(S) \rightarrow \text{Qcoh}(S')$. On définit de même $\text{Isom}^\otimes(a, b)$, $\text{End}^\otimes(a)$, $\text{Aut}^\otimes(a)$. Il s'agit en fait de faisceaux pour la topologie fidèlement plate quasi compacte (fpqc) [(1), VII, 4].

Revenant à la situation de 1.1, la définition même de G - \mathcal{O}_S -Module montre qu'on dispose d'un morphisme canonique de faisceaux en monoïdes sur S :

$$(1.2.1) \quad G \rightarrow \text{End}^\otimes(\omega^G)$$

(2)

qui associe à $g \in G(S')$ le \otimes -endomorphisme de $(\omega^G)_{S'}$ induisant sur chaque G - \mathcal{O}_S -Module \mathcal{F} la multiplication par g dans $\omega^G(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$.

PROPOSITION 1.3. — Soient S un schéma, G un S -monoïde affine. Alors, (1.2.1) est un isomorphisme.

On en déduit aisément :

COROLLAIRE 1.4. — Soient G, G' des S -monoïdes affines. L'application $u \mapsto \text{Rep}(u)$ induit une bijection de l'ensemble $\text{Hom}_{S\text{-mon}}(G, G')$ des morphismes de monoïdes $u : G \rightarrow G'$ sur l'ensemble des foncteurs

$$F : \text{Rep}(G') \rightarrow \text{Rep}(G)$$

tels que $\omega^G \circ F = \omega^{G'}$.

THÉOREME 1.5. — Soient S un schéma affine, G un S -groupe affine et plat, et soient ω, ω' , des foncteurs fibre sur $\text{Rep}(G)$. On a alors :

(a) $\text{Isom}^\otimes(\omega, \omega') = \text{Hom}^\otimes(\omega, \omega')$;

(b) ω et ω' sont localement isomorphes pour la topologie fpqc, i.e., il existe un recouvrement $\{S_i \rightarrow S\}$ de S au sens de la topologie fpqc, et des \otimes -isomorphismes $\omega_{S_i} \simeq \omega'_{S_i}$.

Si on note $\text{Tors}(G)$ la catégorie des torseurs à droite sous G [(^o), chap. II], on peut déduire du théorème qui précède et de 1.3 :

COROLLAIRE 1.6. — La correspondance $\omega \mapsto \text{Isom}^\otimes(\omega^G, \omega)$ induit une équivalence de catégories

$$(1.6.1) \quad \text{Fib}(G) \rightarrow \text{Tors}(G),$$

et en particulier une bijection

$$(1.6.2) \quad \text{fib}(G) \rightarrow H^1(S_{\text{fpqc}}, G),$$

où S_{fpqc} désigne le site des S -schémas munis de la topologie fpqc.

Remarque 1.7. — Si le S -groupe affine et plat G est de présentation finie (resp. lisse), on peut dans l'assertion (b) de 1.5 remplacer la topologie fpqc par la topologie fppf (resp. étale).

2. CONDITIONS DE FINITUDE.

2.1. Il s'agit ici d'exhiber des sous- \otimes -catégories de $\text{Rep}(G)$, qui soient de nature « finie », et qui donnent des résultats semblables à ceux présentés au paragraphe précédent. On va se limiter au cas où S est le spectre d'un corps k , où les résultats sont plus sympathiques.

Soit G un k -monoïde affine. On note $\text{Rep}_0(G)$ la sous- \otimes -catégorie pleine de $\text{Rep}(G)$ des G - k -modules de rang fini sur k , $\omega_0^G : \text{Rep}(G) \rightarrow \text{Modf}(k)$ le foncteur « oubli de l'action de G ». Si T est un k -schéma, et on note $\text{Loclib}(T)$ la \otimes -catégorie ACU k -linéaire des \mathcal{O}_T -Modules localement libres de rang fini, on appelle foncteur fibre sur $\text{Rep}_0(G)$ à valeurs dans T un \otimes -foncteur ACU k -linéaire $\omega : \text{Rep}_0(G) \rightarrow \text{Loclib}(T)$ qui soit fidèle et exact. On obtient encore une catégorie $\text{Fib}_0(G, T)$.

(3)

De même que dans 1.2, on a un morphisme canonique de faisceaux en monoïdes

$$(2.1.1) \quad G \rightarrow \text{End}^{\otimes}(\omega_0^G).$$

PROPOSITION 2.2. — Soient k un corps, G un k -monoïde affine, T un k -schéma. On a alors :

- (a) Le morphisme (2.1.1) est un isomorphisme.
- (b) Si ω, ω' sont des foncteurs fibre sur $\text{Rep}_0(G)$ à valeurs dans T , et si G est un groupe, ω et ω' sont localement isomorphes pour la topologie fpqc.

La collection des catégories $\text{Fib}_0(G, T)$ définit de façon naturelle une catégorie fibrée $[(^0), \text{VI}, 6.1]$ au-dessus de Sch_k , qu'on notera $\text{FIB}_0(G)$. Si $\text{TORS}(G)$ dénote la catégorie fibrée au-dessus de Sch_k des torseurs sous G_T pour T variable $[(^0), \text{loc. cit.}]$, la proposition 4.2 peut encore s'énoncer comme suit :

COROLLAIRE 2.3. — Le foncteur $\omega \mapsto \text{Isom}^{\otimes}(\omega_0^G, \omega)$ définit une équivalence de catégories fibrées

$$(2.3.1) \quad \text{FIB}_0(G) \xrightarrow{\sim} \text{TORS}(G)$$

au-dessus de Sch_k .

La partie (a) de 2.2 avait été signalée par Cartier $[(^0), \text{th. 1}]$ dans le cas d'un groupe algébrique linéaire.

3. UN THÉORÈME D'EXISTENCE.

3.1. On peut donner une caractérisation axiomatique des catégories $\text{Rep}(G)$ pour G un S -monoïde affine, et S un schéma affine. Si S est le spectre d'un corps k , celle-ci prend la forme suivante :

THÉORÈME 3.2. — Soit C une \otimes -catégorie ACU k -linéaire. Alors C est \otimes -équivalente à une \otimes -catégorie $\text{Rep}_0(G)$ avec G un k -monoïde affine si et seulement s'il existe un \otimes -foncteur ACU k -linéaire, exact et fidèle $\omega : C \rightarrow \text{Mod}(k)$. Le k -monoïde G est un groupe si et seulement si C possède des objets Hom $(^1)$.

4. QUELQUES TRADUCTIONS. — La correspondance établie plus haut entre groupes et \otimes -catégories permet de traduire des propriétés de théorie des groupes dans un langage catégorique. Avant d'en donner quelques exemples, posons une définition. Si V est un objet d'une \otimes -catégorie ACU abélienne C , on dit que V est un \otimes -générateur de C , si tout objet de C est quotient d'un sous-objet d'un objet de la forme $P(V)$, $P \in \mathbb{N}[t]$, où dans l'expression $P(V)$, la somme (resp. le produit) est remplacé par \oplus (resp. \otimes).

Soient G, G' des k -groupes (k un corps), $u : G \rightarrow G'$ un morphisme de k -groupes, V un G - k -module de rang fini sur k .

(4)

(i) G est de type fini sur k si et seulement si la \otimes -catégorie $\text{Rep}_0(G)$ possède un \otimes -générateur.

(ii) L'action de G dans V est fidèle si et seulement si $V \oplus \check{V}$ est un \otimes -générateur de $\text{Rep}_0(G)$, ou encore si et seulement si tout objet de $\text{Rep}_0(G)$ est quotient d'un sous-objet d'un objet de la forme $P(V, \check{V})$, $P \in \mathbb{N}[t_1, t_2]$.

(iii) u est un épimorphisme de faisceaux fpqc si et seulement si u est un morphisme fidèlement plat, ou encore si et seulement si

$$\text{Rep}_0(u) : \text{Rep}_0(G') \rightarrow \text{Rep}_0(G)$$

est pleinement fidèle et identifie $\text{Rep}_0(G')$ à une sous-catégorie de $\text{Rep}_0(G)$ stable par sous-objets.

(iv) u est un monomorphisme si et seulement si u est une immersion fermée, ou encore si et seulement si tout objet de $\text{Rep}_0(G)$ est quotient d'un sous-objet d'un objet de la forme $\text{Rep}_0(u)(V')$, où $V' \in \text{ob}[\text{Rep}_0(G')]$.

(*) Séance du 11 janvier 1971.

(1) M. ARTIN, A. GROTHENDIECK et J.-L. VERDIER, SGA 4, I. H. E. S.

(2) J. BENABOU, *Comptes rendus*, 256, 1963, p. 1887. Le signe ACU est pour Associatif, Commutatif, Unifère, et on assume que les contraintes ACU sont compatibles entre elles. Enfin, pour nous, si F est un \otimes -foncteur, la flèche $F(X) \otimes F(Y) \rightarrow F(X \otimes Y)$ est un isomorphisme.

(3) P. CARTIER, *Comptes rendus*, 242, 1956, p. 322.

(4) M. DEMAZURE et A. GROTHENDIECK, SGA 3, Lecture Notes in Mathematics n°s 151, 152 et 153, Springer-Verlag.

(5) J. GIRAUD, *Cohomologie non abélienne*, Notes miméographiées, Columbia University.

(6) A. GROTHENDIECK, SGA 1, I. H. E. S.

(7) On dit qu'une \otimes -catégorie ACUC possède des objets Hom si, pour deux objets quelconques X, Y de C , le foncteur $Z \mapsto \text{Hom}(Z \otimes X, Y)$ est représentable.

(Institut des Hautes Études
Scientifiques,
35, route de Chartres,
91-Bures-sur-Yvette,
Essonne.)