

Cher Illusie,

Le travail avance, mais avec une lenteur ridicule. J'en suis encore aux préliminaires sur les groupes de Barsotti-Tate sur une base quelconque - il n'est pas encore question de mettre des puissances divisées dans le coup ! La raison de cette lenteur réside en partie dans le manque de fondements divers. Les sorites préliminaires sur les groupes de BT (par Tate, Raynaud) étaient faits en se plaçant dans le cadre des anneaux de base proartinien, à coups de référence à Gabriel SGA 3 VII<sub>B</sub>. Cette méthode ne marche plus du tout sur des bases quelconques. A chaque fois que j'ai voulu alors démontrer quelque chose sur un groupe de BT  $G = \varprojlim G(n)$  ( $G(n) = \text{Ker } p^n \cdot \text{id}_G$ ), j'ai été obligé de démontrer des choses plus précises sur les  $G(n)$  séparément. En un sens c'est tant mieux, car on comprend finalement mieux ~~que~~ ce qui se passe; mais il m'a fallu du temps avant d'en prendre mon parti ! De plus, à certains moments, je suis obligé d'utiliser une théorie de déformations pour des schémas en groupes plats mais non lisses, qui doit certainement être correcte, et qui devrait sans doute figurer dans ta thèse, mais que tu n'as pas dû écrire encore sans doute. Je vais donc commencer par te soumettre ce que tu devras bien prouver.

1. Théorie des déformations des schémas en groupes plats localement de présentation finie.

Si  $G$  est un tel groupe sur une base  $S$ , le complexe cotangent relatif  $L_{G/S}^{\bullet}$  est parfait et d'amplitude parfaite contenue dans  $[-1, 0]$  ( $G$  étant une intersection complète relative sur  $S$ ), et il est isomorphe à l'image inverse d'un complexe canonique sur  $S$ ,

$$\chi_{\bullet}^G \in D_{\text{parf}}(S) ,$$

qui est l'image inverse du complexe  $L_{\bullet}^{G/S}$  par la section unité.   
 l'ont observé Mazur et Robert, une suite exacte

$$0 \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow G'' \rightarrow 0$$

de groupes donne lieu à un triangle exact

$$\begin{array}{ccc} & \chi_{\bullet}^{G'} & \\ \nearrow & & \nwarrow \\ \chi_{\bullet}^{G''} & \xrightarrow{\chi_{\bullet}^{G''}} & \chi_{\bullet}^G \end{array} ,$$

d'où une suite exacte à six termes que je me dispense d'écrire. (   
 évidemment  $\chi_{\bullet}^G$  dépend de façon contravariante de  $G$ ).

Dans le cas général, il faudrait sans doute considérer plutôt  $\chi_{\bullet}^G$  comme un complexe dans  $D_{\text{parf}}(B_G)$  ( $B_G$  le topos classifiant de  $G$ , i.e. un complexe de Modules à opérations de  $G$ . Pour la suite, je m'intéresserai uniquement au cas  $G$  commutatif, où il faut considérer les opérations en question comme triviales, i.e. il n'est plus la peine d'en parler. Je te recommande néanmoins d'étudier également le cas non commutatif, bien que je n'en connaisse pas d'application pour le moment. Note d'ailleurs que même le cas lisse (commutatif ou non) est intéressant et apparemment pas trivial, cf. ma lettre à Giraud il y a un an.

Supposons maintenant ~~xxx~~ comme d'habitude que  $S$  soit un voisinage infinitésimal du premier ordre du sous-schéma  $S_0$  (je me dispense d'introduire encore les deux sempiternels idéaux  $J \subset K$ ,  $JK=0$  ... défini par l'Idéal  $J$ . Soient  $G, H$  deux schémas en groupes plats et localement de présentation finie sur  $S$  et commutatifs (je n'en considérerai pas d'autres, pour simplifier). Soit

$$u_0: G_0 \rightarrow H_0$$

un homomorphisme des groupes restreints à  $S_0$ , on se propose de

prolonger en un homomorphisme de groupes

$$u: G \rightarrow H.$$

L'indétermination à ce Pb est, comme il est bien connu, dans

$$(1.1) \quad \text{Hom}(G_0, \hat{\text{Hom}}(\omega_{H_0}, J)) \simeq \text{Ext}^0(G_0, \check{\omega}_{H_0}^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}}^L J),$$

où on pose comme d'habitude

$$\check{\omega}_{H_0}^{\vee} = \text{RHom}_{\mathbb{Z}}(\omega_{H_0}, \mathbb{Z})$$

Il faut d'autre part définir une obstruction

$$(1.2) \quad \delta(u_0) \in \text{Ext}^1(G_0, \check{\omega}_{H_0}^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}}^L J),$$

dont l'annulation soit nécessaire et suffisante pour l'existence d'un prolongement  $u$ . Cette obstruction doit avoir les propriétés de transitivité habituelles pour un composé d'homomorphismes.

Partons maintenant d'un  $G_0$  sur  $S_0$ , et étudions toutes les façons de le prolonger en un  $G$  sur  $S$ . Si on a deux tels prolongements, on peut grâce à ce qui précède définir leur "différence" comme un élément du  $\text{Ext}^1$  de (1.2). On doit prouver alors que l'on obtient de cette façon sur l'ensemble des solutions du problème une structure de pseudo-torseur sous le  $\text{Ext}^1$ .

Enfin, il faut définir une classe canonique

$$(1.3) \quad c(G_0) \in \text{Ext}^2(G_0, \check{\omega}_{H_0}^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}}^L J),$$

ne dépendant que du Groupe  $G_0$  sur  $S_0$  et de l'extension infinitésimale  $S$  de  $S_0$  (donc, finalement, d'un homomorphisme  $L_{S_0/\mathbb{Z}} \rightarrow J$  de degré 1 dans  $D(S_0)$ ), dont l'annulation soit nécessaire et suffisante pour qu'il existe un  $G$  prolongeant  $G_0$ . Les situations analogues que tu sais suggèrent que ces obstructions, pour des  $S$  variables, se déduisent toutes d'un même morphisme canonique (ne dépendant plus que du Groupe  $G_0$  sur  $S_0$ )

$$(1.4) \quad G_0 \otimes_{\mathbb{Z}}^L \mathbb{Z}^{G_0} \longrightarrow L_{\mathbb{Z}}^{S_0/\mathbb{Z}} \quad \text{i.e.} \quad G_0 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(\chi_{S_0}^{G_0}, L_{\mathbb{Z}}^{S_0/\mathbb{Z}})$$

qui soit un morphisme de degré 1 dans  $D(S_0, \mathbb{Z})$  resp. dans  $D(S_0, \mathbb{Z})$ .

Cet homomorphisme serait sans doute une sorte de dérivée logarithmique généralisée. Peut-être est-elle déjà dans tes papiers ?

En fait, tout ceci est encore un peu trop particulier, comme de juste. En J'ai en effet besoin d'une théorie des déformations pour des groupes ~~non~~ annulés par un entier  $n$  fixé (savoir, des groupes tels que  $G(n)$ , où  $G$  est un BT) ! <sup>(qui est annulé par  $p^n$ )</sup> Tout ce qui précède doit rester alors valable, à condition que  $n$  annule  $\mathbb{O}_S$  et qu'on remplace les  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i$  par des  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^i$ . En fait, la condition que  $n$  annule  $\mathbb{O}_S$ , assez naturelle dans le contexte concret où j'ai à travailler, l'est beaucoup moins ici. Pour bien faire, il faudrait une théorie commune au cas de schémas de  $\mathbb{Z}$ -modules et de schémas de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -modules, en se fixant un anneau  $R$  de "multiplication complexe", et en étudiant la question des déformations de schémas en groupes (et d'homomorphismes de tels) sur lesquels  $R$  opère. Alors  $R$  opère également sur  $\chi_{S_0}^G$ , et il faudrait alors définir, plus précisément,  $\chi_{S_0}^G$  comme un objet

$$(1.5) \quad \chi_{S_0}^G \in \text{Ob } D(S, R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{O}_S) .$$

La définition serait sans doute analogue à celle de  $\chi_{S_0}^G$  comme objet de  $D(B_G)$  dans le cas non commutatif, qui correspondrait à l'opération de  $G$  (jouant le rôle de  $R$ ) sur lui-même par automorphismes intérieurs et on s'attend à une formulation commune (en termes de groupes à opérateurs  $\pm$  quelconques). De même  $\chi_{S_0}^G$  serait regardé comme un complexe de  $R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{O}_S$ -Modules (mais le  $\vee$  se rapportant toujours à la structure de complexe de  $\mathbb{O}_S$ -Modules sous-jacente !), ce qui donnerait un sens aux  $\text{Ext}_R^i(G_0, \chi_{S_0}^G \otimes_{\mathbb{O}_S}^L J)$ , et ce seraient eux les groupes

La dérivée  
log. est  
de degré 0 !  
 $g \mapsto \frac{g'(s)}{g(s)} ds$

qui devraient remplacer (pour  $i=0,1,2$ ) les groupes  $\text{Ext}^i$  envisagés plus haut. Dans quelle mesure il faudra prendre pour  $R$  un anneau constant ou pourra-t-on le remplacer par un Anneau  $\pm$  quelconque, je n'ai pas essayé d'y réfléchir.

## 2. Relations avec le calcul des $\text{Ext}^i$ par résolutions canoniques.

Pour simplifier je prends le cas  $R=\mathbb{Z}$ . Je ne doute pas qu'on puisse trouver également une résolution canonique dans la catégorie des  $R$ -Modules ( $R$  Anneau quelconque) tronquée ~~aux~~ <sup>au</sup> degré 3, par essentiellement les mêmes considérations qui m'ont fait trouver la résolution qu'il fallait dans le cas  $R=\mathbb{Z}$ ; le cas du tronqué ~~aux~~ <sup>degré</sup> 2 est d'ailleurs explicité dans mon exposé SGA 7 VII, quelque part et remarque.

Si  $M$  est un Groupe abélien sur un topos, je rappelle comment on définit sa résolution canonique tronquée:

$$(2.1) \quad L.(M): \quad L_3(M) \xrightarrow{d_3} L_2(M) \xrightarrow{d_2} L_1(M) \xrightarrow{d_1} L_0(M) \rightarrow 0$$

$\downarrow \scriptstyle \cong$   
 $M$

dont les composantes sont, en degré  $i$ , des sommes directes finies de faisceaux de la forme  $\mathbb{Z}[M^j]$ , avec  $j \leq i$ :

$$(2.1) \quad \begin{cases} L_0(M) = \mathbb{Z}[M] \\ L_1(M) = \mathbb{Z}[M \times M] \\ L_2(M) = \mathbb{Z}[M \times M \times M] + \mathbb{Z}[M \times M] \\ L_3(M) = \mathbb{Z}[M \times M \times M \times M] + \mathbb{Z}[M \times M \times M] + \mathbb{Z}[M \times M] + \mathbb{Z}[M] \end{cases}$$

L'opérateur différentiel est donné par

$$\begin{array}{c} d_3 \\ \downarrow \\ d_2 \\ \downarrow \\ d_1 \\ \downarrow \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} m, m^1 \\ m+m^1 \\ m \\ m^1 \end{array}$$

$$(2.3) \left\{ \begin{array}{l} L[x] = x \\ d_1[x, y] = -([x+y] - [x] - [y]) = [y] - [x+y] + [x] \\ d_2[x, y, z] = [y, z] - [x+y, z] + [x, y+z] - [x, y] \\ d_2[x, y] = [x, y] - [y, x] \\ d_3[x, y, z, t] = [y, z, t] - [x+y, z, t] + [x, y+z, t] - [x, y, z+t] + [x, y, z] \\ d_3[x, y, z] = [x, y, z] - [y, x, z] + [y, z, x] - ([x, y+z] - [x, y] - [x, z]) \\ d_3[x, y] = [x, y] + [y, x] \\ d_3[x] = [x, x] \end{array} \right.$$

Je ne garantis pas à 100% les signes, n'ayant pas refait les calculs.  $L.(M)$  désigne un complexe quelconque prolongeant le complexe tronqué précédent. On aura donc, pour tout groupe abélien  $N$ ,

$$(2.4) \quad \text{Ext}^1(M, N) \simeq \text{Ext}^1(L.(M), N) \quad \text{pour } i \leq 2,$$

et d'autre part on a la suite spectrale habituelle

$$(2.5) \quad \text{Ext}^*(L.(M), N) \Leftarrow E_2^{p,q} = H^p(1 \mapsto \text{Ext}^q(L_1(M), N)).$$

Enfin, les  $\text{Ext}^q(L_1(M), N)$  intervenant dans le terme initial s'explicitent (pour  $i \leq 3$ ) en termes de la cohomologie des puissances spatiales des puissances cartésiennes  $M^i$  de  $M$  ( $i \leq 4$ ) à coefficients dans  $N$ , grâce à la formule générale

$$(2.6) \quad \text{Ext}^q(\underline{Z}[X], N) \simeq H^q(X, N_X).$$

On obtient ainsi une façon très efficace de se "calculer" les  $\text{Ext}^i$  ( $i \leq 2$ ). (Je ne doute pas que la résolution (2.1) peut se prolonger une résolution du même type, mais infinie, de sorte que l'on obtiendra un mode de calcul des  $\text{Ext}^i$  pour  $i$  quelconque.) Supposons par exemple qu'on travaille sur un schéma affine, ~~et~~ que  $N$  soit un Module quasi-cohérent  $S$  et  $M$  un schéma affine sur  $S$ ? Alors la suite spectrale dégénère et fournit un calcul des  $\text{Ext}^i$  par cochaines, via

$$(2.7) \quad \text{Ext}^i(L.(M), N) \simeq H^i(\text{Hom}(L.(M), N)).$$

Sous les mêmes hypothèses, sauf  $S$  affine, on trouve de même un calcul



phisme sans plus  $G \times G \rightarrow G$ : cette obstruction doit s'interpréter comme un élément du  $\text{Ext}_{\text{co}}^{1,1} \simeq E_{\text{ex}}^{1,1}$ . Enfin,  $G, u$  étant trouvé, on essaie de corriger successivement  $G$  et  $u$ , pour satisfaire à la condition d'associativité et de commutativité, et on doit trouver maintenant une obstruction dans  $E_{\text{co}}^{2,0} = E_2^{2,0} / \text{Im } E_2^{0,1}$ . Je n'ai pas vérifié en détail que toutes ces interprétations des groupes d'obstructions successives sont correctes, mais j'avais fait la vérification dans le temps dans le cas lisse, et je te conseille de le faire dans le cas présent, pour te familiariser avec la manipulation de la résolution canonique et de la suite spectrale associée. Je suis d'ailleurs convaincu que cette résolution canonique sera indispensable pour prouver les conjectures que j'ai énoncées au n° 1.

### 3. Théorème de nullité pour $\text{Ext}^2(G, M)$ , pour $M$ quasi-cohérent.

C'est le suivant:

Théorème 3.1. Soient  $G$  un schéma en groupes commutatif plat localement de présentation finie sur  $S$ ,  $M$  un ~~schéma~~<sup>faisceau</sup> en groupes sur  $S$  (on travaille avec une topologie sur  $(\text{Sch})/S$  intermédiaire entre fppf et fpqc, disons dont la restriction au sous-site des schémas  $S'$  plats sur  $S$  soit isomorphe au faisceau défini par un Module quasi-cohérent convenable sur  $S$ ). Alors ~~xxxx~~ dans chacun des deux cas <sup>(a), (b)</sup> suivants on a que

$$\text{Ext}^2(G, M) = 0$$

et  $\text{Ext}^1(G, M)$  est quasi-cohérent pour  $i \leq 2$ , enfin

$$\text{Ext}^2(G, M) = 0$$

si on suppose de plus  $S$  affine.

a)  $S$  est artinien, la fibres géométriques des groupes  $G/G^0$  sont des  $\mathbb{Z}$ -modules de type fini (cette dernière condition était donc automatique si  $G$  est de présentation finie sur  $S$ ).



En fait pour la topologie envisagée,  $G$  admet une suite de  
dont les quotients successifs sont <sup>chacun</sup> tous d'un des types

1) groupe  $\mathbb{Z}_S$ .

2) groupe de type multiplicatif.

3) groupe additif  $G_a$ .

4) schéma abélien.

5) schéma en groupes fini localement libre.

Faux!

$\text{Ext}^2(\mathcal{O}_2, G_a) \neq 0$   
(BUTEN)

Je ne vais pas donner d'indication de la démonstration ici, qui est  
(que tu pourras consulter si tu le désires.)  
Les notes ~~à la~~ détaillées, Bien entendu, elle s'appuie de

sur la résolution canonique du n°2. Il n'est pas  
évident qu'on ait la nullité du  $\text{Ext}^2$  sans hypothèse supplémentaire  
a) ou b), même si  $G$  est étale quasi-fini et séparé sur  $S$ :

Prendre  $G$  de la forme  $\mathbb{A}^1_S \wedge [U]$ , où  $U$  est un ouvert de  
la forme  $\mathbb{A}^1_S$ ,  $n$  annihilant  $\mathcal{O}_S$ : alors le  $\text{Ext}^2$  est une  
fonction de  $H^2_*(M)$  par  $R^1 i_*(M)$ . Il est possible cependant que  
les 3.1 restent valables dès que  $G$  est affine (donc la  
théorie s'applique).

Suppose d'une théorie du type du n°1, 3.1 a des conséquences  
pour la théorie des déformations de  $G$  (sous les hypothèses  
1) déformer  $G$  au dessus de tout voisinage infinitésimal  
2) soit lisse et que  
3) soit affine! J'ignore si cette conclusion est  
vraie pour tout schéma en groupes commutatifs lisse sur une base affine.  
Les exemples donnés après 3.1 ne donnent évidemment pas  
raison à cela.

Suppose également  $G_0$  plat et localement de présentation  
finie et satisfaisant à une des conditions a), b) de 3.1, alors la théorie

$$R\text{-Hom}(S/S_0; \epsilon, H) = R\text{Hom}((0 \rightarrow G), (H_0 \rightarrow H))$$

(calculé sur le  $\text{Top}(S_0 \xrightarrow{i} S)$ )

annulé par l'anneau unifiant en question.

du n°1 montrerait seulement que l'obstruction à prolonger se trouve dans  $\text{Ext}^1(G_0, \text{Ext}^1(\gamma^{G_0}, J))$ , puisque  $\text{Ext}^2(G_0, \text{Ext}^0(\gamma^{G_0}, J)) = 0$  en vertu de 3.1. Sauf erreur, cette obstruction peut effectivement être non nulle, car si mes souvenirs sont exacts, on montre que  $\alpha_p$  ne se ramonte pas en car. nulle.

#### 4. Relations avec le tapis Mazur-Roberts.

Ceci est un retour sur à la situation du n°1 ; ~~il s'agit~~ il s'agit de choses dont apparemment on peut se passer pour les groupes de BT.

4.1. Soit d'abord

$$i: S_0 \longrightarrow S$$

un morphisme de topos annelés. Si  $E$  et  $H$  sont des (complexes de) Modules sur  $S$ , on désigne par  $G_0, H_0$  leurs images inverses sur  $S_0$  (au sens des catégories dérivées, bien sûr; en fait, on va s'intéresser surtout au cas où  $S, S_0$  sont annelés par un même anneau constant, par exemple  $\mathbb{Z}$ ). On définit alors le RHom relatif

$$(4.1.1) \quad \text{RHom}(S/S_0; G, H) \in \mathcal{D}(A_b)$$

donnant lieu à des  $\text{Ext}^i$  relatifs

$$(4.1.2) \quad \text{Ext}^i(S/S_0; G, H) \in \mathcal{A}_b,$$

par le triangle exact

$$(4.1.3) \quad \begin{array}{ccc} & \text{RHom}(G_0, H_0) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{RHom}(S/S_0; G, H) & \longrightarrow & \text{RHom}(G, H) \end{array},$$

qui donne naissance à une suite exacte longue de  $\text{Ext}^i$  sur  $S$ , sur  $S_0$  et relatifs sur  $S/S_0$ , que je me dispense d'écrire. Lors que  $G$  est l'anneau structural de  $S$  (disons  $\mathbb{Z}$ ) on trouve des invariants

$$(4.1.4) \quad R\Gamma(S/S_0, H), \quad H^i(S/S_0, H),$$

ne dépendant pas essentiellement de la structure de Module de  $H$  (mais

seulement de sa structure de groupe, donnant lieu à une suite exacte analogue. On définit de même, si on y tient,  $R\text{Hom}(S/S_0; \quad, \quad)$ ,  $R\Gamma(S/S_0, \quad)$  de la façon évidente, en particulier le deuxième est défini par le triangle exact

(4.1.5) 
$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma_*(H_0) & \\ \swarrow & & \searrow \\ R\Gamma(S/S_0, H) & \longrightarrow & H \end{array}$$

On peut alors expliciter les invariants (4.1.1) en termes de  $R\Gamma(S/S_0, \quad)$

(4.1.6) 
$$R\text{Hom}(S/S_0; G, H) \simeq R\text{Hom}(G, R\Gamma(S/S_0, H))$$

donc

(4.1.7) 
$$\text{Ext}^i(S/S_0; G, H) \simeq \text{Ext}^i(G, R\Gamma(S/S_0, H))$$

Le triangle exact (4.1.3) est déduit du triangle (4.1.5) en lui appliquant le foncteur exact  $R\text{Hom}(G, -)$ , et de même pour la suite exacte longue correspondante.

La signification géométrique des  $\text{Ext}^i(S/S_0; G, H)$  en basses dimensions ( $i \leq 2$ ) est claire (supposant pour simplifier  $G, H$  de degré zéro):

- (4.1.8)  $\left\{ \begin{array}{l} i=0 : \text{homomorphismes de } G \text{ dans } H \text{ qui deviennent nuls sur } S_0; \\ \text{classes d'isomorphie d'} \\ i=1 : \text{extensions de } G \text{ par } H \text{ munies d'une trivialisation sur } S_0; \\ i=2 : \text{groupe où prennent leurs valeurs les obstructions à "descendre"} \\ \text{à } S, \text{ comme extension de } G \text{ par } H, \text{ une extension donnée } E \\ \text{de } G_0 \text{ par } H_0; \end{array} \right.$

Lorsque  $G$  est l'anneau structural de  $S$ , on trouve de même pour les  $H^i(S/S_0, H)$  ( $i \leq 2$ ) des interprétations en termes de sections nulles sur  $S_0$ , de toseurs trivialisés sur  $S_0$ , et de gerbes neutralisées sur  $S_0$  (pour faire plaisir à Giraud). Tout ceci montre donc que les invariants introduits sont bons.

Nous revenons maintenant au cas d'une immersion nilpotente d'ordre 1 comme au n°1,  $G$  étant un schéma en groupes commutatifs plat locale-

ment de présentation finie sur  $S$ . Je propose alors l'isomorphisme suivant (suggéré par le travail de Mazur-Roberts):

(4.1.9) 
$$R\Gamma(S/S_0, G) \leftarrow \left( \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_i^G \otimes_{\mathcal{O}_S} J \right) = R\Gamma(R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{I}^{G_0}, J))$$

Pour ceci, je rappelle d'abord la suite exacte évidente "de Mazur-Roberts"

(4.1.10) 
$$0 \rightarrow H^0(\mathcal{H}(L^*)) \rightarrow G(\mathcal{H}) \rightarrow i_*(G(\mathcal{H}) \otimes_{\mathcal{O}_S} L^*) \rightarrow H^1(\mathcal{H}(L^*))$$

provenant de la théorie générale d'obstructions au prolongement infini-  
simal de sections. Dans certains cas (malheureusement trop restrictifs)  
Mazur-Roberts prouvent qu'on peut mettre un zéro à droite. Je ne crois  
pas trop déraisonnable d'espérer qu'il en est toujours ainsi. D'autre

part, je crois qu'il ne doit pas être difficile de définir une flèche  
canonique

(4.1.11) 
$$[G(\mathcal{H}) \rightarrow i_*(G(\mathcal{H}) \otimes_{\mathcal{O}_S} L^*) \rightarrow (L^*)]$$

telle que les flèches induites sur les  $H^0$  et  $H^1$  donnent naissance aux  
à la suite exacte (4.1.10). Si  $\mathcal{I}^{G_0} = L$  est représenté par un complexe  
explicite  $\dots L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow 0$ , du general non-sense (plus ou moins  
explicité par Deligne dans SGA 4 XVIII) doit montrer que la donnée d'un  
homomorphisme  
flèche (4.1.11) revient à la donnée d'un facteur de "champs de Picard"  
qui, à tout torseur sous  $G$  muni d'une trivialisation du torseur associé  
de Groupe  $G_0$  (ou ce qui revient au même, d'une trivialisation de sa  
restriction à  $S_0$ ) associe une extension de  $L_0$  par  $J$ , une trivialisation  
de l'image inverse de celle-ci sur  $L_1$ , cette trivialisation étant telle  
que son image inverse sur  $L_2$  est la trivialisation évidente ... Or  
j'ai l'impression qu'un tel homomorphisme de champs doit pouvoir s'obte-  
nir par pull-back à partir de la situation universelle, en utilisant  
le fait que pour tout torseur individuellement (sous  $G$ ,  
trivialisé par sur  $S_0$ ),  
l'obstruction à remonter la trivialisation doit peut se décrire  
comme une extension de  $L_0$  par  $J$  etc. Ce que je dis est bien vaseux,

je suis néanmoins convaincu qu'un général non-sensé convenable doit  
ner (4.1.11).

Si ceci est correct, et si on peut mettre un zéro à droite dans  
(4.1.10), il en résulterait donc qu'on a même un isomorphisme (4.1.11).

On en conclurait en tous cas un homomorphisme (4.1.9), et ce dernier  
induirait

est un isomorphisme pour les  $H^i$  pour  $i \leq 1$ . ~~Parce que~~ Comme les  $H^i$  du  $P$

(resp. de  $R\Gamma(S/S_0, G)$ ) pour  $i \leq 2$  sont nuls (resp. sont isomorphes aux

$R^{i-1}\Gamma_*(G_0)$ ), on voit que le fait que (4.1.9) soit un isomorphisme serait

alors équivalent aux relations

$$(4.1.11) \quad R^i\Gamma_*(G_0) = 0 \quad \text{pour} \quad i \geq 1.$$

Je ne sais trop s'il y a lieu d'espérer que ces relations sont bien <sup>(4.1.11)</sup>

faites. Du moins est-il facile de vérifier que l'on a

$$(4.1.12) \quad R^1\Gamma_*(G_0) = 0,$$

utilisant le fait que tout torseur sous  $G_0$  est une intersection complète

relative sur  $S_0$ , donc splittable, après extension étale surjective à

base, par un morphisme fini surjectif localement libre qui est également d'intersection

complète, donc qui se remonte à  $S$  ... Donc sous réserve ~~aux~~ que le

reste marche bien, on trouvera un homomorphisme (4.1.9) qui est induit

un isomorphisme pour les  $H^i$  pour  $i \leq 2$ , donc un isomorphisme pour  $2$

$\text{Ext}^i(?, ?)$  pour  $i \leq 2$ , ce qui est suffisant pour les applications

géométriques qu'on a à envisager. Voici les applications en question

A) ~~Soient~~ <sup>Parmi</sup> ~~xxxxxx~~  $H$  comme précédemment sur  $S$ ,

soit  $H$  un Groupe commutatif quelconque sur  $S$ . On se donne une extension

$E_0$  de  $H_0$  par  $H_0$ , et on se propose d'étudier les prolongements

possibles en une extension  $E$  de  $G$  par  $H$ . Les sorites cohomologiques nous

disent que l'indétermination se trouve dans  $\text{Ext}^1(G_0, R\Gamma(S/S_0, H))$ ,

et l'obstruction à l'existence est dans  $\text{Ext}^2(G, \text{RI}'(S/S_0, H))$ . Moyennant l'isomorphisme (4.1.9), <sup>pour  $H_0$</sup>  ces deux groupes s'interprètent comme  $\text{Ext}^1(G_0, L^*)$  et  $\text{Ext}^2(G_0, L^*)$ , avec  $L^* = \text{Hom}_{S_0}^L(J, J)$ , les  $\text{Ext}^i$  étant calculés sur  $S_0$ .

B) Dans le cas particulier où  $G = \mathbb{Z}_S$ , on trouve la théorie des extensions déformations de toseurs sous  $H$ , que je t'avais proposée après la lecture de Mazur-Roberts.

à intervenir avec A)!

C) Application à la définition de l'obstruction  $J(u_0)$  de 1.2. C'est clair, grâce à la suite exacte longue déduite de (4.1.5) en appliquant  $\text{Ext}^1(G, -)$ , et notant que l'homomorphisme

$$\text{Ext}^1(G, H) \rightarrow \text{Ext}^1(G_0, H_0)$$

s'identifie à l'homomorphisme obtenu en appliquant  $\text{Ext}^1(G, -)$  à  $H \rightarrow \text{RI}_*(H_0)$ . En fait, ici on n'a même pas besoin du zéro à droite dans (4.1.10) (on doit calculer un  $\text{Ext}^1$ , par un  $\text{Ext}^2$ ), il suffit de savoir définir (4.1.11), ce qui fournira en effet un homomorphisme injectif

$$\text{Ext}^1(G, \text{RI}'(S/S_0, H)) \simeq \text{Ext}^1(G, [H \rightarrow i_*(H_0)]) \hookrightarrow \text{Ext}^1(G, i_*(L^*))$$

(le conoyau étant précisément contenu dans  $\text{Hom}(G, Q)$ , où  $Q$  est le conoyau de la dernière flèche de (4.1.10), - mais peu importe).

Bien entendu, ici encore, il faudrait pour bien faire introduire un anneau de multiplication complexe  $R$ . Pour traiter les extensions de groupes de BT, on aura par exemple besoin du cas  $R = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$  !

À suivre: fascicule de résultats sur les groupes de BT et les groupes de BT trivialisés (part "positive"). Mais j'ai déjà fait partie de vos notes, sans attendre d'avoir écrit le reste. Bien cordialement A Grothendieck

## 5. Propriétés cohomologiques des groupes de Barsotti-Tate tronqués.

5.1.  $S$  désigne un schéma. On munit  $(Sch)_{\mathbb{A}^1_S}$  donc aussi  $(Sch)_S$  d'une topologie intermédiaire entre fppf et fpf, qui jouera un rôle de filtrant pour disposer d'une bonne notion de faisceau. On désigne par  $p$  un nombre premier fixé une fois pour toutes. Pour tout entier  $n \geq 0$ , on pose  $\Lambda_n = \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ . Donc les  $\Lambda_n$ -Modules sur  $S$  sont les Groupes (additifs) sur  $S$  annihilés par  $p^n$ . Si  $G$  est un Groupe sur  $S$ , on posera généralement

$$G(n) = \text{Ker } p^n \text{id}_G = p^n G.$$

C'est un  $\Lambda_n$ -Module. On écrira souvent  $G(n)$  <sup>au lieu de  $G$</sup>  pour indiquer qu'un Groupe est annihilé par  $p^n$  i.e. est un  $\Lambda_n$ -Module.

Soit  $G(n)$  un  $\Lambda_n$ -Module, et soit  $1 \leq i \leq n-1$ . Alors il revient au même que  $G(n)$  soit un  $\Lambda_n$ -Module plat, ou que l'on ait

$$(5.1.1) \quad p^{n-i} G(n) = G(i)$$

(où on pose bien sûr  $G(i) = \text{Ker } p^i \text{id}_{G(n)} = G(n)(i) \dots$ ). Dans ce cas les  $p^i G(n)$  définissent une filtration décroissante dont le gradué associé est simplement  $G(1) \otimes_{\Lambda_1} \text{gr}(\Lambda_n) = G(1) \otimes_{\mathbb{F}_p} [t]/(t^n)$ . Donc  $G(n)$  est alors représentable par un schéma en groupes fini localement libre sur  $S$  si et seulement si  $G(1)$  l'est, et alors tous les  $G(i)$  le sont.

Inversement, si on part d'un  $\Lambda_n$ -Module  $G(n)$  qui est un schéma en groupes fini localement libre sur  $S$ , pour que  $G(n)$  soit plat i.e. pour qu'on ait (5.1.1), il faut et il suffit que l'homomorphisme

$$(5.1.2) \quad p^{n-1} \text{id}_{G(n)}: G(n) \rightarrow G(1)$$

soit plat, et le critère habituel de platitude par fibres (NB on n'a besoin de savoir  $G(1)$  plat, seulement loc. de prés. finie, pour que ce critère marche) montre qu'il revient au même de dire que (5.1.2) soit un épimorphisme fibre par fibre, ou encore soit fidèlement plat. A



tehir donc que c'est une condition géométrique sur les fibres géométriques.

On appellera groupe de Barsotti-Tate tronqué d'échelon  $n$  ( $p$  sous-entendu, sinon on dirait:  $p$ -groupe de BT tronqué ...) un  $G(n)$  qui est à la fois un  $\Lambda_n$ -Module plat et un schéma fini localement libre sur  $S$ . Par abus de langage, on dira parfois, que pour un tel groupe et un  $n' \geq n$  que " $G(n)$  provient d'un  $G(n')$ " si on peut trouver un groupe de BT tronqué d'échelon  $n'$   $G(n')$  tel que  $G(n)$  soit isomorphe à  $G(n')(n)$ .

5.2. Soit  $G$  un Groupe sur  $S$ . On dit que  $G$  est  $p$ -divisible si  $p \cdot \text{id}_G$  est un épimorphisme. Alors les  $G(n)$  sont des  $\Lambda_n$ -Modules plats, et  $G(\infty) = \varinjlim G(n)$  = sous-Groupe de  $p$ -torsion de  $G$  est également  $p$ -divisible. Si  $G$  est un groupe de  $p$ -torsion (i.e.  $G = \varinjlim G(n)$ )  $p$ -divisible, alors il revient au même, en vertu de 5.1, de dire que  $G(1)$  est un schéma fini localement libre sur  $S$ , ou que tous les  $G(n)$  le sont (ou seulement un  $G(n)$ , avec  $n \geq 1$ ). Un tel groupe s'appellera un groupe de Barsotti-Tate sur  $S$  (ou  $p$ -groupe de BT sur  $S$ , si  $p$  n'est pas sous-entendu). Les groupes de Barsotti-Tate sur  $S$  forment une catégorie équivalente à celle des systèmes inductifs de Groupes  $G(n)$ , satisfaisant les conditions :

- a) Le morphisme de transition  $G(n) \rightarrow G(n')$  ( $n' \geq n$ ) induit un isomorphisme  $G(n) \xrightarrow{\sim} G(n')(n)$ .
- b)  $G(n)$  est un  $\Lambda_n$ -Module plat pour tout  $n$ .
- c)  $G(1)$  est un schéma fini localement libre sur  $S$  (ou encore: tous les  $G(n)$  sont des schémas finis localement libres sur  $S$ ).

Les sorites 5.1 montrent d'ailleurs que cette notion, tout comme celle de groupe de BT tronqué, ne dépend pas essentiellement du choix la topologie  $T$ .

Je passe sur les sorites: stabilités par changement de base, extensions de groupes de BT est itou, etc.

Les propriétés cohomologiques de base des groupes de BT tronqués  $G(n)$  concernent d'une part la structure du complexe  $\chi^G(n)$  et sa dépendance de  $n$ , d'autre part le calcul des  $\text{Ext}_{\Lambda_n}^i(G(n), -)$ , où  $-$  désigne un complexe de modules. Voici les faits principaux:

Théorème 5.3. Soit  $N \geq 1$  un entier tel que  $p^N 1_S = 0$ . ~~Alors~~ Soit  $G(n)$  un groupe de BT tronqué d'échelon  $n$  sur  $S$ .

a) Pour tout couple d'entiers  $k, m$  tels que  $k < p^m$ , on a

$$(5.3.1) \quad \text{Inf}^k G \subset G(m+N)^{(-1)},$$

i.e. le  $k$ -ème voisinage infinitésimal  $\text{Inf}^k G$  de la section unité de  $G$  coïncide avec le même voisinage dans  $G(m+N)^{(-1)}$ . En particulier on a  $\text{Inf}^1 G \subset G(N)$ , donc si  $N < n' \leq n$ , l'homomorphisme

$$(5.3.2) \quad \omega_{G(n)} \rightarrow \omega_{G(n')}$$

est un isomorphisme.

Supposons  $n \geq N+1$  dans la suite de l'énoncé.

b) Pour tout entier  $k < p^{n-N+1}$ ,  $G$  est "lisse tronqué d'échelon  $k$  le long de la section unité", i.e. la structure de  $\text{Inf}^k G$  comme schéma augmenté sur  $S$  est ~~exactly~~ la même que si  $G$  était lisse; donc  $\omega_{G(n)}$  est localement libre, et

$$\text{Sym}^i(\omega_{G(n)}) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^i(G(n), e)$$

est un isomorphisme pour  $i \leq k$ .

c) Les Modules

(5.3.3)  $\omega_{G(n)} = H_0(\chi^G(n))$  et  $\pi_{G(n)} = H_1(\chi^G(n))$  sont localement libres de même rang. Si  $n \geq n' \geq N$ , alors l'inclusion

$$G(n') \rightarrow G(n)$$

Corollaire de b) Si  $G$  est de BT sur  $S$  à part loc. nilp. alors  $G$  est formellement lisse sur  $S$ , et  $G = \varprojlim \text{Inf}^k G$  est un groupe de Lie formel sur  $S$ .

induit un isomorphisme

$$(5.3.4) \quad \omega_{G(n)} \xrightarrow{\sim} \omega_{G(n')}$$

(pour mémoire, cf. a)) , et ~~l'isomorphisme~~ si  $n' \leq n-N$  , l'homomorphisme nul

$$(5.3.5) \quad \omega_{G(n)} \xrightarrow{0} \omega_{G(n')} .$$

La projection

$$(5.3.6) \quad G(n) \rightarrow G(n') \quad (\simeq G(n) \otimes_{\Lambda_n} \Lambda_{n'})$$

induit un isomorphisme

$$(5.3.7) \quad \omega_{G(n')} \xrightarrow{\sim} \omega_{G(n)} ,$$

et si  $n' \leq n-N$  , l'homomorphisme nul

$$(5.3.8) \quad \omega_{G(n')} \xrightarrow{0} \omega_{G(n)} .$$

d) Supposons  $n \geq 2N$  , ou  $n \geq N$  et qu'il existe un  $G(2N)$  dont provienne  $G(n)$ . Alors on a un isomorphisme canonique

$$(5.3.9) \quad \omega_{G(n)} \simeq \omega_{G(n)} .$$

Indications sur la démonstration. Une fois admis que  $\omega_{G(n)}$  est localement libre (énoncé dans b)), c) ~~devient~~ devient évident sur en utilisant la suite exacte à six termes associée au triangle exact de Mazur-Roberts d'une extension de groupes. Pour en déduire d), on note que les deux termes de (5.3.9) ne changent pas si on remplace  $n$  par  $N$ , à isomorphismes canoniques près établis dans c), et on prend alors l'isomorphisme cobord associé à l'extension  $G(2N)$  de  $G(N)$  par  $G(N)$ .

D'autre part, les résultats de c) impliquent que si  $n'$  est ~~extrêmement~~ tel que  $N \leq n' \leq n-N$ , alors l'homomorphisme

$$\text{Ext}^1(\mathcal{I}^{G(n')}, \underline{J}) \rightarrow \text{Ext}^1(\mathcal{I}^{G(n)}, \underline{J})$$

déduit de l'inclusion  $G(n') \hookrightarrow G(n)$  est nul, pour tout  $\underline{J}$  quasi-cohérent sur  $S$ , ce qui, géométriquement, implique qu'une obstruction à prolonger

à un voisinage infinitésimal du premier ordre un S-morphisme donné  $X \rightarrow G(n')$ , avec  $X$  affine, devient nul si on regarde  $X$  comme morphisme à valeurs dans  $G(n)$ . On utilise ceci pour se tirer par les lacets de soulier et prouver a) et b) par récurrence sur  $N$  ... C'est un peu alarmé dans mes notes, et je ne me sens guère l'envie de revenir dessus maintenant !

On retiendra entre autres que si  $n \geq 2N$ , il n'y a plus guère qu'un seul Module sur  $\underline{O}_S$  vraiment fondamental associé à la donnée de  $G(n)$  : et des  $G(n')$  correspondant c'est  $\underline{\omega}_{G(n)}$  (ou, au choix, son dual  $\underline{\omega}^\vee = \underline{\text{Lie}}(G(n))$ ), tous les autres Modules canoniques qui s'introduisent en pratique étant canoniquement isomorphes à celui-là !

Théorème 5.4. Soit  $G(n)$  un groupe de BT tronqué d'échelon  $n$ . On suppose, lorsque  $n=1$ , que  $G(n)=G(1)$  provient d'un groupe de BT tronqué d'échelon 2. ~~Soit~~ On suppose  $S$  affine, Soit  $M$  un Groupe sur  $S$  (en pratique, ce sera un  $\underline{O}_S$ -Module) annulé par  $p^n$ , et tel que la restriction de  $M$  aux arguments plats soit isomorphe au Groupe défini par un Module quasi-cohérent sur  $S$ . Sous ces conditions on a

$$(5.4.1) \quad \text{Ext}_{\Lambda_n}^i(G(n), M) = 0 \quad \text{pour } i=1, 2.$$

Compte tenu de la suite exacte infinie  
 $0 \rightarrow \text{Ext}_{\Lambda_n}^1(G, M) \rightarrow \text{Ext}_{\underline{Z}}^1(G, M) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda_n}(G, M) \rightarrow \text{Ext}_{\Lambda_n}^2(G, M) \rightarrow \text{Ext}_{\underline{Z}}^2(G, M) \rightarrow \dots$   
et du fait que le dernier terme écrit est nul par 3.1 b) 5°, notre assertion équivaut aussi à la suivante:

Corollaire 5.5. Soient  $G(n)$ ,  $M$  comme dans 5.4. Alors l'homomorphisme canonique (associant à une classe d'une extension  $E$  de  $G(n)$  par  $M$  l'homomorphisme  $G(n) \rightarrow M$  déduit par passage au quotient de  $p^n \text{id}_E$ )  
(S.S.I)  
 $\text{Ext}_{\underline{Z}}^1(G(n), M) \rightarrow \text{Hom}(G(n), M)$   
est un isomorphisme.

une deuxième fois

La démonstration n'est pas difficile, en utilisant (3.1 b) 5°:

La réduction au cas où  $S$  est le spectre d'un corps et  $M = \mathbb{A}_a$  se fait en utilisant les résolutions canoniques du n°2, et la formule d'adjonction nous ramène (puisque  $G(n) \bigwedge_n^L \mathbb{A}_1 = G(1)$ ) au cas  $n=1$ . Alors la suite exacte

$$0 \rightarrow G(1) \xrightarrow{i} G(2) \xrightarrow{q} G(1) \rightarrow 0$$

nous montre que

$$i^*: \text{Ext}^1(G(2), M) \rightarrow \text{Ext}^1(G(1), M)$$

est surjectif (car  $\text{Ext}^2(G(1), M) = 0$ ; NB tous les  $\text{Ext}^i$  seront sur  $\mathbb{Z}$  sauf mention du contraire), or son composé avec

$$q^*: \text{Ext}^1(G(1), M) \rightarrow \text{Ext}^1(G(2), M)$$

est égal à  $(iq)^* = (p \cdot \text{id}_{G(2)})^* = 0$  (car  $p$  annule  $M$ ), d'où il résulte que  $q^*$  lui-même est nul, donc par la suite exacte des  $\text{Ext}$  que

$$(*) \quad \text{Hom}(G(1), M) \xrightarrow{\gamma} \text{Ext}^1(G(1), M)$$

est surjectif; la même suite exacte montre que cet homomorphisme est injectif, puisque  $\text{Hom}(G(1), M) \rightarrow \text{Hom}(G(2), M)$  est un isomorphisme. Donc  $(*)$  est un isomorphisme, et pour prouver que (5.5.1) est un isomorphisme on est ramené à prouver que le composé de  $(*)$  avec (5.5.1) l'est. Or on constate que c'est l'identité, cqfd.

Pour compléter (5.4.1), il faut expliciter dans certains cas la valeur du  $\text{Ext}^0$ . Pour ceci on introduit le dual de Cartier  $G(n)^*$  de  $G(n)$ , et son algèbre de Lie  $\mathcal{U}^*$ . Avec cette notation, on a

Corollaire 5.6.  $G(n), M$  comme dans 5.4, sauf qu'on ne suppose pas nécessairement  $M$  annulé par  $p^n$  ni qu'il existe un  $G(2)$ . On a un isomorphisme canonique

$$(5.6.1) \quad \text{Hom}(G(n), M) = \text{Hom}(\mathcal{U}_{-G(n)}^*, M),$$

et si  $\text{Ext}^i(G(n), M) = 0$  pour  $i > 0$ , les deux membres sont

isomorphes à  $\Gamma(S, \bigoplus_{j=0}^{\infty} \mathcal{O}_S(j) \otimes M')$  (où  $M'$  est le Module dont il est question dans 5.4).

On est en effet ramené au cas où  $M$  lui-même est un Module quasi-cohérent. Alors (5.6.1) s'obtient en se rappelant que  $\text{Lie}(\mathcal{G}_{mS}) \simeq \mathcal{O}_S$  canoniquement, donc, posant  $D = \text{Spec}(\mathcal{O}_S + M)$  (schéma de nombres donnés) on trouve que le premier membre est isomorphe à

$$\text{Ker}(\text{Hom}(G(n)_D, \mathcal{G}_{mD}) \rightarrow \text{Hom}(G(n), \mathcal{G}_{mS}))$$

par SGA 3 III, donc par définition de  $G(n)^*$  à  $\text{Ker}(G(n)^*(D) \rightarrow G(n)^*(S))$  qui n'est autre que le deuxième membre de 5.6. La dernière assertion provient de 5.3 b).

**Corollaire 5.7.** Soient  $S$  un schéma affine,  $M$  un ~~Module~~ <sup>Module</sup> ~~sur~~ <sup>sur</sup>  $S$  dont la restriction aux arguments plats soit isomorphe au ~~Module~~ <sup>Module</sup> ~~défini~~ <sup>défini</sup> par un Module quasi-cohérent,  $n' \geq n$  des entiers  $0$ ,  $G(n')$  et  $H(n)$  des groupes de BT tronqués à l'échelon  $n'$ , Composant l'homomorphisme de changement de base  $\Lambda_{n'} \rightarrow \Lambda_n$  avec l'homomorphisme ~~déduit de~~ <sup>déduit de</sup> la projection  $H(n') \rightarrow H(n)$ , on trouve un homomorphisme

$$(5.7.1) \quad \text{Ext}_{\Lambda_{n'}}^1(G(n'), \bigoplus_{j=0}^{\infty} \mathcal{O}_S(j) \otimes M) \rightarrow \text{Ext}_{\Lambda_n}^1(G(n), \bigoplus_{j=0}^{\infty} \mathcal{O}_S(j) \otimes M)$$

Cet homomorphisme est surjectif pour  $i=1$ .

On montre en effet que l'homomorphisme (5.7.1) peut s'interpréter comme obtenu en appliquant  $\text{Ext}_{\Lambda_{n'}}^1(G(n'), -)$  à l'homomorphisme

$$(*) \quad \bigoplus_{j=0}^{\infty} \mathcal{O}_S(j) \otimes M \rightarrow \bigoplus_{j=0}^{\infty} \mathcal{O}_S(j) \otimes M \quad \text{dans } D(\Lambda_{n'} S)$$

déduit de  $H(n') \rightarrow H(n)$ , et on insère cette flèche dans le triangle exact de Mazur-Roberts déduit de la structure d'extension

$$0 \rightarrow H(n'-n) \rightarrow H(n') \rightarrow H(n) \rightarrow 0$$

Alors la conclusion ~~de~~ <sup>de</sup> 5.7 résulte de la suite exacte des  $E$

L 40

qui provient elle-même des deux relations (5.4.1) (appliquées respectivement au  $\underline{H}_0$  et au  $\underline{H}_1$  du complexe de coefficients). En fait, (5.4.1) ~~mais donne~~ est essentiellement équivalent à:

Corollaire 5.8. Hypothèses sur  $S, n, G(n)$  comme dans 5.4. Soit  $L^\bullet$  un complexe de  $\wedge_n$ -Modules tel que  $H_x^i(L^\bullet) = 0$  pour  $i \neq 0, 1$  et que  $H_x^i(L^\bullet)$  satisfasse, pour  $i = 0, 1$ , aux conditions énoncées sur  $M$  dans 5.4. Alors

$$(5.8.1) \quad \underset{\uparrow n}{\text{Ext}}^2(G(n), L^*) = 0$$

## 6. Applications aux déformations des groupes de Barsotti-Tate.

Il suffit de conjuguer les résultats cohomologiques du n°5 avec la théorie conjecturale d'obstructions du n°2, pour <sup>obtenir</sup> ~~enoncer~~ les résultats suivants (qui pour l'instant sont donc également conjecturaux).

Dans toute la suite, on se donne une nilimmersion

$$i: S_0 \longrightarrow S$$

d'Ideal  $\underline{J}$  (je ne suppose pas nécessairement  $\underline{J}$  localement nilpotent).

Si on a un Groupe  $G, H$  sur  $S$ ,  $G_0, H_0$  désigne la restriction à  $S_0 \dots$

6.1. "Pour mémoire" d'abord une triviale: supposons  $i$  d'ordre  $k$  et  $p^N \cdot 1_{S_0} = 0$ , alors tout homomorphisme de groupes de BT tronqués  $u(n)$   $G(n) \rightarrow H(n)$ , tel que  $u(n)_0 = 0$ , induit zéro sur  $G(n-kN)$  i.e.

on a  $u(n-kN)$  est nul. Par suite, si  $u: G \rightarrow H$  est un homomorphisme de groupes de BT tel que  $u_0 = 0$ , alors  $u = 0$ , i.e. un homomorphisme  $u: G \rightarrow H$  est connu quand on connaît  $u_0$ .

(NB même en car. p, ce résultat ne s'étend pas à une nilimmersion qui ne se ait pas localement nilpotente. Dans le cas d'une immersion localement nilpotente, ~~je ne sais si~~ le résultat précédent <sup>ne</sup> reste pas,

valable sans supposer  $p$  localement nilpotent sur  $S$ , *exempl.*  $S = \mathbb{D}_M(S_0)$ ,  
 $S_0 = \text{Spec } \mathbb{Z}_p$ ,  $M = \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ ,  $G = (\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)_S : u \in \text{Hom}_{S_0\text{-gr}}(G_0, M) \neq 0$  !

6.2. Gardons les notations hypothèses et notations  $k, N$  de 6.1.

Supposons maintenant  $n \geq N$ , et dans le cas  $n=1$ , supposons que  $G(1)$  provienne d'un  $G(2)$ . On suppose maintenant  $S$  affine. On se donne un homomorphisme

$$u_0(n) : G_0(n) \rightarrow H_0(n),$$

qu'on se propose de prolonger en  $u(n) : G(n) \rightarrow H(n)$ . Alors:

*et  $n \geq 2N$  ou  $n < 2N$  mais,  $G_0(n)$  provient d'un  $G_0(2N)$*   
 a) Si  $k=1$ , on a une obstruction à l'existence de  $u(n)$  qu'on est un élément de

$$\delta(u_0(n)) \in \mathcal{V}_0^* \otimes \mathcal{H}_0 \otimes \mathcal{J}$$

(où  $\mathcal{V}_0^* = \underline{\text{Lie}} G_0(n)^*$ ,  $\mathcal{H}_0 = \underline{\text{Lie}} H_0(n)$  ; ce sont des Modules locaux libres sur l'anneau  $A$  de  $S$ ).

b) Soit  $n'$  tel que  $kN \leq n' \leq n$ . Si  $u_0(n')$  se prolonge en un  $u(n')$ , alors  $u_0(n)$  se prolonge en un  $u(n)$  (mais il ne sera pas vrai en général qu'on pourra choisir  $u(n)$  prolongeant en même temps le  $u(n')$  déjà choisi !).

N.B. *on conclut aussitôt de a) par récurrence sur  $k$ ...*

De ceci, on déduit les mêmes énoncés en remplaçant  $G_0(n), H_0(n)$  par des groupes de BT  $G, H$  sur  $S$ , et partant d'un  $u_0 : G_0 \rightarrow H_0$  qu'on se propose de prolonger en  $u : G \rightarrow H$ . On définira ici l'algèbre de Lie d'un groupe de BT sur un schéma où  $p$  est nilpotent par

$$\underline{\text{Lie}} G = \underline{\text{Lie}} G(n) \quad \text{pour } n \text{ grand,}$$

cela a un sens grâce à 5.3 a) (et on définirait encore  $\underline{\text{Lie}} G$  par recollement, dès que  $p$  est seulement localement nilpotent). Alors  $\mathcal{V}_0^*$  désignera encore  $\underline{\text{Lie}} G_0^*$ , où  $G_0^*$  est le groupe de BT dual de  $G_0$ , défini essentiellement par  $G_0^*(n) = \text{dual } G_0(n)^*$  (dual de Cartier).



6.3. On garde part maintenant d'un groupe de BT tronqué  $G_0(n)$  sur  $S$  <sup>affin</sup> ~~sur~~  $S$ .  
On ne suppose pas nécessairement  $S \times p$  nilpotent sur  $S$ , mais si  $n=1$ , on suppose que  $G_0(1)$  provient d'un  $G_0(2)$ . On a alors ce qui suit:

a) Il existe un groupe de BT tronqué d'échelon  $n$   $G(n)$  sur  $S$  qui prolonge  $G_0(n)$ .

b) Soit  $E(G_0(n), S)$  l'ensemble des classes d'isomorphisme de tels prolongement. Soit  $n' \leq n$ , et considérons l'application canonique

$$(6.3.1) \quad E(G_0(n), S) \rightarrow E(G_0(n'), S)$$

induite par  $G(n) \mapsto G(n')$  ( $=G(n^x)(n')$ ). L'application précédente est surjective.

c) Soient  $k, N$  comme dans 6.1. Alors, si  $n' \geq Nk$ , l'application (6.3.1) est bijective.

d) Supposons de plus  $k=1$ , Alors  $E(G_0(n), S)$  est munie d'une façon naturelle d'une structure de tenseur sous le groupe  $\prod_{j=0}^{\infty} \mathbb{N} / \prod_{j=0}^{\infty} \mathbb{N} J$ .

(Pour a) et b), le passage à la limite habituel nous ramène au cas A noethérien, donc  $J$  nilpotent, soit  $J^{k+1}=0$ . Pour prouver a), on se ramène alors par récurrence au cas  $k=1$ , et on applique 5.8 et 5.7 respectivement (où on n'a pas fait d'hypothèse de nilpotence de  $p$ !). D'autre part c) résulte de 6.2 b), et d) des calculs du n°5 ...)

Un passage à la limite sur  $n$  essentiellement trivial nous donne maintenant le résultat analogue pour les prolongements d'un  $G_0$ :

Théorème 6.4. Soit  $S_0 \xrightarrow{\text{en}} S$  une nilimmersion, avec  $S$  affine,  $G_0$  un groupe de BT sur  $S_0$ .

a) Il existe un groupe de BT  $G$  sur  $S$  prolongeant  $G_0$ .

b) L'application

$$(6.4.1) \quad E(G_0, S) \rightarrow E(G_0(n), S)$$

est surjective.

c) Si  $k, N$  sont comme dans 6.1, alors pour  $n \geq kN$ , l'application précédente (6.4.1) est bijective (mais attention, on ne prétend pas que cela corresponde à une ~~isomorphie~~ équivalence de catégories !).

d) Si de plus  $k=1$ , l'ensemble  $E(G_0, S)$  est de façon naturelle un ~~torseur~~ sous  $\prod_0^{\text{fin}} \prod_0^{\text{fin}} \mathbb{A}^1$ .

Remarques 6.5. Soient  $W$  un anneau local noethérien complet de corps résiduel  $k$  de car.  $p$ ,  $G_0$  un groupe de BT sur  $k$ . Alors le foncteur des déformations de  $G_0$  sur des  $W$ -algèbres locales artiniennes est pro-représentable. (Il résulte de 6.4 que l'algèbre  $B$  sur  $W$  qui le proreprésente est une algèbre de séries formelles sur  $W$  à  $dd^*$  indéterminées, où  $d$  et  $d^*$  sont respectivement les dimensions du groupe formel  $\bar{G}_0$  et  $\bar{G}_0^*$ . ~~Exemple~~ De plus, si  $\underline{G}$  est la déformation universelle de  $G_0$  au dessus de  $B$ , il résulte de 6.4 que la déformation  $\underline{G}(n)$  de  $G_0(n)$  sur  $B$  est verselle au sens de Schlesinger, pour tout  $n \geq 1$ . (Mais bien sûr le foncteur <sup>des</sup> déformations de  $G_0(n)$  n'est pas ~~en~~ en général représentable).

6.6. On obtient un énoncé analogue à 6.3 concernant le problème de prolongement de  $S_0$  à  $S$  d'une extension de groupes de BT tronqués  $E_0(n)$  d'un  $G_0(n)$  par un  $H_0(n)$ , quand on se donne déjà  $G(n)$  et  $H(n)$  sur  $S$ . Je me borne à énoncer le résultat correspondant pour des groupes de Brassati-Tate pas tronqués, qui s'en déduit comme 6.4 de 6.3: On se donne donc des groupes de BT  $G$  et  $H$  sur  $S$ , et une extension  $E_0$  de  $G_0$  par  $H_0$ . On suppose toujours  $S$  affine. Alors

a)  $E_0$  se prolonge en une extension  $E$  de  $G$  par  $H$ .

b) L'application

$$(6.6.1) \quad E(E_0, S) \longrightarrow E(E_0(n), S)$$

qu'on devine est surjective pour tout  $n$ .

c) Si  $k, N$  sont comme dans 6.1, alors (6.6.1) est bijective pour  $n \geq kN$ .

d) Si de plus  $k=1$ , l'ensemble  $E(E_0, S)$  est un toreur sous  $\prod_{j=0}^{\infty} G_j$ .

Remarquons que dans tous les cas,  $E(E_0, S)$  est muni d'une structure de toreur sous le groupe commutatif  $\text{Aut}^1(S/S_0, G, H)$ , et d) ne fait qu'explicitier ce groupe dans le cas particulier envisagé.

Remarques 6.7. On peut encore traduire 6.6 en termes de variétés de modules formelles comme dans 6.5. Une chose nouvelle assez remarquable, c'est que lorsqu'on part d'une extension triviale de  $G_0$  par  $H_0$ , le schéma modulaire obtenu, comme il ~~est~~ pro-représente un foncteur en groupes, est un groupe de Lie formel sur  $W$ . (Dans le cas d'une extension quelconque  $E^0$ , le schéma modulaire formel correspondant est un toreur sous le groupe de Lie formel précédent.) Lorsque par exemple  $G_0 = \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ , il est bien connu que ce groupe formel n'est autre que le groupe formel  $\bar{H}$  associé à  $H$  (NB ici ~~on~~ on a dû partir de groupes de BT  $G$  et  $H$  sur  $W$ , pas sur  $k$ ). En particulier,  $\bar{H}$  est un groupe de BT (du moins sur  $W$  artinien ...). Je suspecte qu'il en est ainsi dans le cas général. Le groupe formel obtenu se comporte à certains égards comme un  $\text{Hom}(G, H)$  interne dans la catégorie des groupes de BT, ou comme un produit tensoriel de  $G^*$  par  $H$ . Je pense qu'il ne devrait pas être difficile, s'inspirant de ce qui précède, de définir un tel groupe formel  $H(G, H)$  pour deux groupes de BT  $G, H$  sur une base quelconque où  $p$  serait nilpotent, et qu'il aura peut-être à jouer un rôle dans le développement de la théorie des groupes de BT.