

Otimização

3.3 Métodos com derivadas

José Firmino Aguilar Madeira

Porquê usar derivadas

Os métodos de 3.2 só comparam valores de f e por isso precisam de muitas avaliações (Rosenbrock: n_f de 166 a 13 445). O gradiente indica **diretamente** a direção local de maior subida — e, portanto, $-\nabla f$ a de maior descida.

Quando usar

f diferenciável, derivadas disponíveis (analíticas, por diferenças finitas ou por diferenciação automática) e **suficientemente fiáveis**. Então podem ser muito mais rápidos.

Quando não usar

f descontínua ou não diferenciável, ou com ruído que torne as derivadas pouco fiáveis: voltar a 3.2.

Variáveis discretas: o gradiente usual não se aplica diretamente — é preciso outra formulação ou outro método.

Nesta secção: o que custa obter derivadas em $\mathbb{R}^n$, o que é uma direção de descida, e três métodos: gradiente (3.3.1), Newton (3.3.2), gradientes conjugados (3.3.3).

Derivadas numéricas em n dimensões

As fórmulas centrais de 2.6, coordenada a coordenada, com passos h_i :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \approx \frac{f(x + h_i e_i) - f(x - h_i e_i)}{2 h_i}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \approx \frac{f(x + h_i e_i) - 2f(x) + f(x - h_i e_i)}{h_i^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \approx \frac{f(x + h_i e_i + h_j e_j) - f(x + h_i e_i - h_j e_j) - f(x - h_i e_i + h_j e_j) + f(x - h_i e_i - h_j e_j)}{4 h_i h_j}$$

	avaliações de f
gradiente (n parciais)	$2n$
diagonal da Hessiana	$2n + 1$ *
fora da diagonal ($n(n-1)/2$)	4 cada
Hessiana completa	$2n^2 + 1$

* reutiliza $f(x \pm h_i e_i)$ se já calculados para o gradiente.

- Para $n = 2$: gradiente 4, Hessiana 9. Para $n = 10$: 20 e 201. Para $n = 100$: 200 e 20 001.
- Mesmo compromisso de 2.6 na escolha de h_i (truncatura vs. arredondamento).
- Exemplo: Rosenbrock em $(-1,5; 2)$, $\nabla f = (-155, -50)$; com $h = 10^{-4}$ o erro é $6 \cdot 10^{-6}$.
- É por isto que os métodos de ordem 1 (3.3.1, 3.3.3) são atrativos quando n é grande.

Do 3.1: o que já sabemos sobre direções?

Revisão rápida (3.1):


- $f(x + \alpha d) \approx f(x) + \alpha \nabla f(x)^T d$ para $\alpha > 0$ pequeno;
- d é **direção de descida** se $\nabla f(x)^T d < 0$ (ângulo com ∇f maior do que 90°);
- para $\|d\|$ fixa, $\nabla f^T d$ é mínimo em $d = -\nabla f$: **descida mais rápida**.

A novidade: uma família de direções de descida

Se M é **definida positiva** e $\nabla f(x) \neq 0$,
 $d = -M \nabla f(x) \Rightarrow \nabla f^T d = -\nabla f^T M \nabla f < 0$.

$M = I$: gradiente (3.3.1). $M = H^{-1}$, $H = \nabla^2 f(x)$, quando H é **definida positiva**: Newton (3.3.2).

A mesma ideia unifica os dois métodos: mudar M é mudar a “métrica” em que se desce.



A figura do 3.1: A e B descem; C é tangente; D sobe.

O esquema comum aos três métodos

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \quad \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k < 0$$

3.3 escolhe $\mathbf{d}_k$

o cap. 2 escolhe α_k

Nos métodos de descida — incluindo Newton quando H_k é definida positiva ou a direção é salvaguardada (3.3.2) — procura-se $\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k < 0$; o Newton puro não o garante se H_k for indefinida.

Método	Direção $\mathbf{d}_k$	Informação
3.3.1 Gradiente (Cauchy)	$-\nabla f(\mathbf{x}_k)$	ordem 1
3.3.2 Newton	$-\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$	ordem 2
3.3.3 Gradientes conjugados (Fletcher-Reeves)	$-\nabla f(\mathbf{x}_k) + \beta_k \mathbf{d}_{k-1}$	ordem 1 + memória

- O passo α_k vem de uma **pesquisa em linha** sobre $\varphi(\alpha) = f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$ (cap. 2). “Exata” = minimizar φ ; “inexata” = descer o suficiente.
- Paragem: $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| \leq \varepsilon_g$; $\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\| / \max(1, \|\mathbf{x}_k\|) \leq \varepsilon_x$; $k \geq k_{\max}$.
- Custo: n_g , n_H contados à parte de n_f (que inclui a pesquisa em linha); com derivadas numéricas tudo se converte em n_f : $2n$ por gradiente, $2n^2 + 1$ por Hessiana com gradiente.
- Sob hipóteses adequadas e pesquisa em linha apropriada, os três procuram *pontos estacionários*; a Hessiana aí, se não degenerada, classifica o ponto (semidefinida: inconclusivo).

Os contadores já feitos: fminunc e o SciPy

Em MATLAB, `fminunc` (quasi-Newton por defeito) devolve `out.funcCount` e `out.iterations`; com 'SpecifyObjectiveGradient' o gradiente é analítico, senão é por diferenças finitas (gradientes progressivos do solver: $n + 1$; nesta UC contamos centrais, $2n - 2.6$).

```
opts = optimoptions('fminunc', 'SpecifyObjectiveGradient', true);  
[x, fx, ~, out] = fminunc(@fg, x0, opts); % fg devolve [f, g]  
out.funcCount, out.iterations
```


A função completa (fg, que só calcula o gradiente quando `nargout > 1`) está no código complementar da UC.

O MESMO EM PYTHON

```
from scipy.optimize import minimize  
r = minimize(f, x0, jac=grad, hess=hess,  
            method='Newton-CG')  
r.nfev, r.njev, r.nhev          # n_f, n_g, n_H  
# com 'CG'/'BFGS': retirar hess= e r.nhev
```

Os contadores n_f , n_g , n_H vêm feitos. O caderno `cap3_comparacao.ipynb` reproduz a comparação dos sete métodos do fim do capítulo com as mesmas regras (mesmo problema, mesmo x_0 , mesmo critério, custo em avaliações).

Três maneiras de escolher d_k



	informação por iteração	custo com derivadas numéricas (+ as avaliações da pesquisa em linha)
Gradiente (3.3.1)	∇f	$2n$
Newton (3.3.2)	∇f e H	$2n^2 + 1$
Gradientes conjugados (3.3.3)	∇f e d_{k-1}	$2n$

Começemos pela informação mais barata: **se só temos o gradiente, qual é a direção natural?** — 3.3.1, o método do gradiente.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006 — caps. 2–3.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996.

Recursos

- Código complementar: fg (f e gradiente). MATLAB: `fminunc`, `optimoptions` ('SpecifyObjectiveGradient'), `out.funcCount`, `out.iterations`.
- Python: `scipy.optimize.minimize(..., method='Newton-CG')` (`r.nfev`, `r.njev`, `r.nhev`).
- Caderno `cap3_comparacao.ipynb`: comparação dos sete métodos do capítulo.