

TP5 – Estructuras Algebraicas - Teoría de Grupos

Agustina Sol Rojas

Ejercicio 1.

Determinar cuáles de las siguientes operaciones están bien definidas sobre el conjunto A dado. Analizar las propiedades en los casos afirmativos

a) $A = \mathbb{N}, a * b = 3ab$

Dado que el producto es una operación cerrada en \mathbb{N} , para todo $a, b \in \mathbb{N}$, se cumple que $ab \in \mathbb{N}$. Además, como $3 \in \mathbb{N}$, al multiplicarlo por otro número natural (nuevamente porque el producto es una operación cerrada) el resultado sigue siendo un número natural. Por lo tanto, la operación $a * b = 3ab$ está bien definida en \mathbb{N} .

Conmutativa:

Como el producto es conmutativo en \mathbb{N} se cumple para todo $a, b \in \mathbb{N}$ que $a * b = 3ab = 3ba = b * a$

Asociativa:

Como el producto es asociativo y conmutativo en \mathbb{N} se cumple para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$ que $(a * b) * c = (3ab) * c = 3(3ab)c = 3a(3bc) = a * (3bc) = a * (b * c)$

Elemento neutro:

Se debe probar que existe en \mathbb{N} un elemento e tal que para todo a en \mathbb{N} valga que $a * e = e * a = a$:

1. Teniendo en cuenta lo siguiente:

i. $a * e = 3ae$

ii. $e * a = 3ea$

2. Se debe encontrar un $e \in \mathbb{N}$ tal que

i. $3ae = a$

$$\text{ii. } 3ea = a$$

3. Despejando las ecuaciones queda:

$$\text{i. } 3e = 1$$

$$\text{ii. } 3e = 1$$

4. Como ningún número natural multiplicado por 3 da como resultado 1, no existe un $e \in N$ tal que $a * e = e * a = a$. Por lo tanto $*$ no tiene un elemento neutro.

Elemento inverso:

Como $*$ no tiene elemento neutro, no tiene elemento inverso.

$$\text{b) } A = Z, a * b = \frac{a+b}{3+ab}$$

Contraejemplo:

1. Dados $a, b \in Z$ tal que $a = -3$ y $b = 1$:

$$-3 * 1 = \frac{-3 + 1}{3 + (-3) \cdot 1} = -\frac{2}{3-3} = \frac{2}{0}$$

2. $\frac{2}{0} \notin Z$, por lo tanto la operación $a * b$ no está bien definida en Z .

$$\text{c) } A = R, x * y = x + y - xy$$

Dado que la suma y el producto son operaciones cerradas en N , para todo $x, y \in R$, se cumple que $x + y - xy \in N$. Por lo tanto, la operación $x * y = x + y - xy$ está bien definida en R .

Conmutativa:

Como el producto es conmutativo en R se cumple para todo $x, y \in R$ que $x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x$

Asociativa:

Como la suma y producto son asociativos y conmutativos en R , y además se cumple la propiedad distributiva se cumple para todo $x, y, z \in R$ que

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * (y + z - yz) = \\ &= x + (y + z - yz) - x(y + z - yz) = \\ &= x + y + z - yz - xy - xz + xyz = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x + y - xy + z - xz - yz + xyz = \\
&= (x + y - xy) + z - (xz + yz - xyz) = \\
&= (x + y - xy) + z - (x + y - xy)z \\
&= (x + y - xy) * z = (x * y) * z
\end{aligned}$$

Elemento neutro:

Se debe probar que existe en R un elemento e tal que para todo x en R valga que $x * e = e * x = x$:

1. Teniendo en cuenta lo siguiente:

$$\text{i. } x * e = x + e - xe$$

$$\text{ii. } e * x = e + x - ex$$

2. Se debe encontrar un $e \in N$ tal que

$$\text{i. } x + e - xe = x$$

$$\text{ii. } e + x - ex = x$$

3. Despejando las ecuaciones queda:

$$\text{i. } x + e - xe = x$$

$$e - ex = 0$$

$$e(1 - x) = 0$$

$$e = 0$$

$$\text{ii. } e + x - ex = x$$

$$e - ex = 0$$

$$e(1 - x) = 0$$

$$e = 0$$

4. Reemplazando en la expresión de 2. por e verificamos que se cumple lo siguiente para cualquier $x \in R$

$$\text{i. } x + 0 - x \cdot 0 = x + 0 = x$$

$$\text{ii. } 0 + x - 0 \cdot x = 0 + x = x$$

5. Por lo tanto existe en R un elemento e tal que para todo x en R vale que $x * e = e * x = x$ y ese $e = 0$

Elemento inverso:

Un elemento x de R se tiene inverso si existe x' en R tal que $x * x' = x' * x = e$

1. Teniendo en cuenta lo siguiente

$$\text{i. } x * x' = x + x' - x \cdot x'$$

$$\text{ii. } x' * x = x' + x - x' \cdot x$$

2. Se debe encontrar un $e \in N$ tal que

i. $x + x' - x \cdot x' = e$

ii. $x' + x - x' \cdot x = e$

3. Despejando las ecuaciones y teniendo en cuenta que $e = 0$ queda:

i. $x + x' - x \cdot x' = 0$

$$x' - x \cdot x' = -x$$

$$x'(1 - x) = -x$$

$$x' = \frac{-x}{1 - x}$$

ii. $x' + x - x' \cdot x = 0$

$$x' - x' \cdot x = -x$$

$$x'(1 - x) = -x$$

$$x' = \frac{-x}{1 - x}$$

4. El inverso existe y es $\frac{-x}{1-x}$ para todo $x \neq 1 \in R$. Cuando $x = 1$ el denominador se hace cero y la expresión no puede resolverse, por lo que no existe inverso para $x = 1$.

i. Esto último es válido.

d) $A = \{0, 1, 2, 3\}$

*	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	1	2	0	2
3	2	3	1	1

Se puede observar en el cuadro que para todo $a, b \in A$ se cumple que el resultado de $a * b \in A$.

Conmutativa:

La operación $*$ sobre A es conmutativa si, para todo a y b en A , resulta $a * b = b * a$

Contraejemplo:

$$2 * 0 = 1$$

$$0 * 2 = 0$$

Se puede observar como $2 * 0 \neq 0 * 2$, por lo tanto, no es conmutativa.

Asociativa:

La operación $*$ sobre A es asociativa si, cualesquiera sean a, b y c en A , resulta $a * (b * c) = (a * b) * c$

Contraejemplo:

$$(3 * 3) * 1 = 1 * 1 = 1$$

$$3 * (3 * 2) = 3 * 1 = 3$$

Se puede observar como $(3 * 3) * 1 \neq 3 * (3 * 2)$, por lo tanto, no es asociativa.

Elemento neutro:

Existe en A un elemento e tal que para todo x en R vale que $x * e = e * x = x$. Se puede observar en el grafico que ese elemento es 1, puesto que para todo $x \in A$ vale que $x * 1 = 1 * x = x$

Elemento inverso:

Un elemento x de R se tiene inverso si existe x' en R tal que $x * x' = x' * x = e$

1. $x = 0$

0 no tiene inverso puesto que nunca sucede que para cualquier $x' \in A$ vale que $0 * x' = x' * 0 = 1$

2. $x = 1$

1 tiene inverso y ese es 1 dado que $1 * 1 = 1 * 1 = 1$

3. $x = 2$

0 no tiene inverso puesto que nunca sucede que para cualquier $x' \in A$ vale que $2 * x' = x' * 2 = 1$

$$2 * 0 = 1, \text{ pero } 0 * 2 = 0.$$

$$3 * 2 = 1, \text{ pero } 2 * 3 = 2$$

4. $x = 3$

3 tiene inverso y ese es 3 dado que $3 * 3 = 3 * 3 = 1$

Ejercicio 2.

Demostrar que:

- a) Dado $M = \{m \in \mathbb{N} : m > 0\}$, $(M, +)$ es un semigrupo pero no es un monoide

Asociativa:

La operación $+$ sobre M es asociativa si, cualesquiera sean a, b y c en A , resulta $a + (b + c) = (a + b) + c$.

Como la operación $+$ es asociativa en \mathbb{N} , $(\mathbb{N}, +)$ es un semigrupo. Debido a que $M \subset \mathbb{N}$, por definición 2.7, $(M, +)$ es un semigrupo (se puede pensar como que la asociatividad se “hereda” de \mathbb{N}).

Elemento neutro

No existe en M un elemento e tal que para todo a en M vale que $a * e = e * a = a$.

El elemento neutro de $(\mathbb{N}, +)$ es el 0 y este es único. Por definición del conjunto M , $0 \notin M$ por lo tanto no existe un elemento neutro para la operación $+$ sobre el conjunto M .

Como no existe en M elemento neutro para $+$, $(M, +)$ no es un monoide.

- b) El conjunto de un solo elemento $M = \{e\}$ con la operación definida por $e * e = e$ es un monoide

Asociativa

La operación $*$ sobre M es asociativa si, cualesquiera sean a, b y c en M , resulta $a * (b * c) = (a * b) * c$

1. Sean a, b y $c \in M$

i. $a * (b * c) = a * e = e$

ii. $(a * b) * c = e * c = e$

2. Como $a * (b * c) = (a * b) * c$, la operación $*$ sobre M es asociativa

Elemento neutro:

Se debe demostrar que existe en M un elemento e tal que para todo a en M valga que $a * e = e * a = a$.

1. Sea $a \in M$

i. $a * e = e$

- ii. $e * a = e$
- 2. Como $a \in M$ y el unico elemento de M es e , necesariamente $a = e$
- 3. Por lo tanto existe en M un elemento neutro para $*$

Como $*$ es asociativa y existe un elemento neutro, $(M,*)$ es un monoide.

- c) Dado un conjunto no vacío A , el conjunto de las partes de A $P(A)$ con la operación intersección de conjuntos es un monoide conmutativo

Asociativa:

La operación \cap sobre $P(A)$ es asociativa si, cualesquiera sean X, Y y Z en $P(A)$, resulta $X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z$

- 1. Sean $X, Y, Z \in P(A)$, como la \cap entre conjuntos es asociativa se cumple que

$$X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z$$

Elemento neutro:

Se debe demostrar que existe en $P(A)$ un elemento E tal que para todo X en $P(A)$ valga que $X \cap E = E \cap X = X$.

- 1. Sea X un elemento cualquiera de $P(A)$. Para que se cumpla $X \cap E = E \cap X = X$, a E deben pertenecer los mismos elementos que pertenecen a X . Los únicos conjuntos que cumplen con esto son el propio X y A . Si se toma como elemento neutro a X siendo X cualquier elemento de $P(A)$, este no va a ser único, puesto que va a haber un elemento neutro distinto para cada elemento de $P(A)$ por lo que se toma como elemento neutro a A .
- 2. Para cualquier $X \in P(A)$, al ser $X \subseteq A$ se cumple que:
 - i. $X \cap A = X$
 - a. La intersección entre un conjunto y su subconjunto da el subconjunto.
 - ii. $A \cap X = X$
 - a. La intersección entre un conjunto y su subconjunto da el subconjunto.

Conmutativa

La operación \cap sobre $P(A)$ es conmutativa si, cualesquiera sean X y Y en $P(A)$, resulta $X \cap Y = Y \cap X$

1. Sean $X, Y \in P(A)$, como la \cap entre conjuntos es conmutativa se cumple que
$$X \cap Y = Y \cap X$$

Como \cap es asociativa, existe un elemento neutro y es conmutativa $(P(A), \cap)$ es un monoide conmutativo.

Ejercicio 3.

Demostrar que si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e un elemento del conjunto, a , tiene inverso entonces este es único.

1. Sean $a, b, c \in A$, suponiendo que $b \neq c$ y ambos son inversos de a se cumple:
 - i. $a * b = b * a = e$
 - ii. $a * c = c * a = e$.
2. Como e es el elemento neutro del conjunto se cumple:
 - i. $b = b * e$
3. Como por 1.i. $e = a * c$:
 - i. $b * e = b * (a * c)$
4. Por asociatividad:
 - i. $b * (a * c) = (b * a) * c$
5. Por hipótesis $(b * a) = e$
 - i. $(b * a) * c = e * c$
6. Como e es el elemento neutro del conjunto se cumple:
 - i. $e * c = c$
7. Se llega a que $b = c$, por lo tanto si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e un elemento del conjunto y a tiene inverso entonces este es único.

Ejercicio 4.

Sea R una relación de congruencia sobre un semigrupo $(S, *)$ demostrar que $(S/R, \odot)$ (el conjunto cociente y la operación inducida por $*$ sobre las clases de equivalencia) es un semigrupo llamado Semigrupo Cociente

1. Teniendo en cuenta que $S/R = \{\bar{s} \in S\}$ y siendo $a, b \in S$, $\bar{a} \in S/R$ y $\bar{b} \in S/R$
 - i. $\bar{a} \odot \bar{b} = \overline{a * b}$
2. \odot es una operación bien definida puesto que al ser $(S, *)$ un semigrupo, $a * b \in S$, y por lo tanto $\overline{a * b} \in S/R$.
3. \odot es asociativa. Sean $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in S/R$ y teniendo en cuenta que $(S, *)$ es un semigrupo (asociatividad de $*$):
 - i.
$$\begin{aligned}\bar{a} \odot (\bar{b} \odot \bar{c}) &= \bar{a} \odot (\overline{b * c}) = \bar{a} \odot (\overline{b * c}) = \overline{a * (b * c)} = \\ &= \overline{(a * b) * c} = (\overline{a * b}) \odot \bar{c} = (\bar{a} \odot \bar{b}) \odot \bar{c}\end{aligned}$$
 - ii. Como se llega a que $\bar{a} \odot (\bar{b} \odot \bar{c}) = (\bar{a} \odot \bar{b}) \odot \bar{c}$, \odot es asociativa.
4. Como \odot es una operación bien definida y \odot es asociativa, $(S/R, \odot)$ es un semigrupo llamado Semigrupo Cociente.

Ejercicio 5.

Analizar si las siguientes son estructuras de grupo:

- a) $(\mathbb{Z}, +)$, los enteros con la suma usual

Asociativa:

La operación $+$ sobre \mathbb{Z} es asociativa ya que para cualesquiera sean a, b y c en \mathbb{Z} , se cumple que $a + (b + c) = (a + b) + c$.

Elemento neutro:

Existe en \mathbb{Z} un elemento e tal que para todo a en \mathbb{Z} vale que $a + e = e + a = a$ y ese $e = 0$.

Elemento inverso:

Para todo elemento a de \mathbb{Z} existe a' en \mathbb{Z} tal que $a + a' = a' + a = e$ y ese $a' = -a$

Como $+$ es asociativa, existe un elemento neutro y todos los elementos de Z tienen un inverso $(Z, +)$ es un grupo.

b) (Z, \cdot) , los enteros con el producto usual

Asociativa:

La operación \cdot sobre Z es asociativa ya que para cualesquiera sean a, b y c en Z , se cumple que $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.

Elemento neutro:

Existe en Z un elemento e tal que para todo a en Z vale que $a \cdot e = e \cdot a = a$ y ese $e = 1$.

Elemento inverso:

No se cumple que para todo elemento a de Z existe a' en Z tal que $a \cdot a' = a' \cdot a = 1$. Esto solamente se cumple para $a = 1$ y $a = -1$.

Contraejemplo:

Sea $a \in Z$ con $a = 2$, no existe ningún $a' \in Z$ tal que $2 \cdot a' = a' \cdot 2 = 1$. Por lo tanto no se cumple que para todo elemento a de Z existe a' en Z tal que $a \cdot a' = a' \cdot a = 1$.

Como no todos los elementos de Z tienen un inverso (Z, \cdot) no es un grupo.

c) $(R^2, +)$, los pares ordenados de reales con la suma usual

Asociativa:

La operación $+$ sobre R^2 es asociativa ya que para cualesquiera sean a, b y c en R^2 , se cumple que $a + (b + c) = (a + b) + c$. Esto sucede debido a que la operación $+$ es asociativa en R .

Demostración:

1. Sean a, b y $c \in R^2$, con $a = (a_1, a_2)$, $b = (b_1, b_2)$, $c = (c_1, c_2)$. Dado a que la operación $+$ es asociativa en R se cumple que:

$$\begin{aligned}
 a + (b + c) &= (a_1, a_2) + ((b_1, b_2) + (c_1, c_2)) = (a_1 + (b_1 + c_1), a_2 + (b_2 + c_2)) \\
 &= ((a_1 + b_1) + c_1, (a_2 + b_2) + c_2) = ((a_1, a_2) + (b_1, b_2)) + (c_1, c_2) \\
 &= (a + b) + c
 \end{aligned}$$

Elemento neutro:

Existe en Z un elemento e tal que para todo a en Z vale que $a + e = e + a = a$ y ese $e = (0,0)$.

Demostración:

1. Sea $a \in R^2$, con $a = (a_1, a_2)$. Dado a que el elemento neutro para la operación $+$ en R es 0 se cumple que:

- i. $a + e = (a_1, a_2) + (0,0) = (a_1 + 0, a_2 + 0) = (a_1, a_2)$
- ii. $e + a = (0,0) + (a_1, a_2) = (0 + a_1, 0 + a_2) = (a_1, a_2)$

Elemento inverso:

Para todo elemento a de Z existe a' en Z tal que $a + a' = a' + a = e$ y ese $a' = -a$

Demostración:

1. Sea $a \in R^2$, con $a = (a_1, a_2)$ y $-a = (-a_1, -a_2)$. Dado a que para todo elemento $x \in R$ se verifica que $x + (-x) = 0$ se cumple que:

- i. $a + (-a) = (a_1, a_2) + (-a_1, -a_2) = (a_1 + (-a_1), a_2 + (-a_2)) = (0,0)$
- ii. $-a + a = (-a_1, -a_2) + (a_1, a_2) = (-a_1 + a_1, -a_2 + a_2) = (0,0)$

Como $+$ es asociativa, existe un elemento neutro y todos los elementos de R^2 tienen un inverso $(R^2, +)$ es un grupo.

d) $(M_{2 \times 2}, +)$, las matrices de 2x2 con la suma usual de matrices

Asociativa:

La operación $+$ sobre $M_{2 \times 2}$ es asociativa ya que para cualesquiera sean a, b y c en $M_{2 \times 2}$, se cumple que $a + (b + c) = (a + b) + c$. Esto sucede debido a que la operación $+$ es asociativa en R .

Elemento neutro:

Existe en $M_{2 \times 2}$ un elemento e tal que para todo a en $M_{2 \times 2}$ vale que $a + e = e + a = a$ y ese $e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Esto se cumple debido a que el elemento neutro para la operación $+$ en R es 0.

Elemento inverso:

Para todo elemento $a = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$ de $M_{2 \times 2}$ existe a' en $M_{2 \times 2}$ tal que $a + a' = a' + a = e$ y ese $a' = -a$ siendo $-a = \begin{pmatrix} -a_1 & -a_2 \\ -a_3 & -a_4 \end{pmatrix}$. Esto sucede dado que para todo elemento $x \in R$ se verifica que $x + (-x) = 0$.

Como $+$ es asociativa, existe un elemento neutro y todos los elementos de $M_{2 \times 2}$ tienen un inverso $(M_{2 \times 2}, +)$ es un grupo.

- e) $(P(A), \cup)$, A cualquier conjunto y $P(A)$ indica el conjunto de partes de A

Asociativa:

La operación \cup sobre $P(A)$ es asociativa ya que para cualesquiera sean X, Y y Z en Z , se cumple que $X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z$.

Elemento neutro:

Existe en $P(A)$ un elemento E tal que para todo X en $P(A)$ vale que $X \cup E = E \cup X = X$ y ese $E = \emptyset$.

Elemento inverso:

No se cumple que para todo elemento X de $P(A)$ existe X' en $P(A)$ tal que $X \cup X' = X' \cup X = \emptyset$. Nunca sucede que la unión de un conjunto con otro del vacío, salvo que ambos conjuntos sean el vacío.

Como no todos los elementos de $P(A)$ tienen un inverso $(P(A), \cup)$ no es un grupo.

Ejercicio 6.

Probar que en todo Grupo el único elemento idempotente es el neutro

1. Existe un elemento $a \in G$, siendo $(G,*)$ un grupo, tal que a es idempotente:

$$a * a = a.$$

2. Como $(G,*)$ es un grupo entonces existe un $a^{-1} \in G$ tal que:

$$a^{-1} * (a * a) = a^{-1} * a.$$

3. Como $(G,*)$ es un grupo, $*$ es asociativa:

$$(a^{-1} * a) * a = a^{-1} * a$$

4. Teniendo en cuenta que $a^{-1} * a = e$, reemplazando queda:

$$e * a = e$$

5. Teniendo en cuenta que $e * a = a$

$$a = e$$

6. Esto nos deja que el a idempotente es e , por lo tanto el único elemento idempotente es el elemento neutro.

Ejercicio 7.

Mostrar que en todo grupo vale la propiedad cancelativa

1. Sea $a, b, c \in G$ y siendo $(G,*)$ un grupo valiendo que:

$$a * b = a * c$$

2. Como $(G,*)$ es un grupo, todo elemento de G tiene un inverso por la operación $*$, operando en ambos lados de la igualdad con el inverso de a nos queda:

$$a' * (a * b) = a' * (a * c)$$

3. Como $*$ es asociativa:

$$(a' * a) * b = (a' * a) * c$$

4. Como $a' * a = e$

$$e * b = e * c$$

5. Como $e * b = b$ y $e * c = c$:

$$b = c$$

6. Por lo tanto vale la propiedad cancelativa.

7. De modo similar se prueba para:

$$b * a = c * a$$

$$\text{i.} \quad (b * a) * a' = (c * a) * a'$$

$$\text{ii.} \quad b * (a * a') = c * (a * a')$$

$$\text{iii.} \quad b * e = c * e$$

$$\text{iv.} \quad b = c$$

Ejercicio 8.

Sea $(G,*)$ un grupo tal que todo elemento es su propio inverso, probar que G es abeliano

1. Sea $a, b \in G$ y siendo $(G,*)$ un grupo valiendo que para todo $x \in G$ se cumple que:

$$x = x^{-1}$$

2. Teniendo en cuenta que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$, $b * b^{-1} = b^{-1} * b = e$, $a = a^{-1}$, $b = b^{-1}$ y la asociatividad de $*$:

$$\begin{aligned} a * b &= e * (a * b) * e = (b^{-1} * b) * (a * b) * (a * a^{-1}) = b * (b * a) * (b * a) * a \\ &= b * (b * a) * (b * a)^{-1} * a = b * e * a = b * a \end{aligned}$$

3. Por lo tanto $a * b = b * a$, valiendo la conmutatividad para $*$ haciendo que G sea abeliano.

Ejercicio 9.

Dado un grupo $(G,*)$, probar que G es abeliano si y sólo si para cualquier x, y en G vale que: $(x * y)^2 = x^2 * y^2$

Se quiere demostrar que G es abeliano \leftrightarrow para cualquier x, y en G vale que: $(x * y)^2 = x^2 * y^2$

- $(x * y)^2 = (x * y) * (x * y)$
- $x^2 * y^2 = (x * x) * (y * y)$

1. Se quiere demostrar que G es abeliano \rightarrow para cualquier x, y en G vale que:

$$(x * y)^2 = x^2 * y^2$$

- i. Suponiendo que G es abeliano, por asociatividad vale que:

$$(x * y)^2 = (x * y) * (x * y) = x * (y * x) * y$$

- ii. Por conmutatividad vale que:

$$x * (y * x) * y = x * (x * y) * y$$

- iii. Por asociatividad vale que:

$$x * (x * y) * y = (x * x) * (y * y)$$

- iv. Teniendo en cuenta que $(x * x) * (y * y) = x^2 * y^2$ se cumple que

$$(x * y)^2 = x^2 * y^2$$

2. Se quiere demostrar que G es abeliano \leftarrow para cualquier x, y en G vale que:

$$(x * y)^2 = x^2 * y^2$$

i. Si se tiene $(a * b) * (a * b)$ se cumple por definición e hipótesis que:

$$(a * b) * (a * b) = (a * b)^2 = a^2 * b^2 = (a * a) * (b * b)$$

ii. Entonces se tiene la siguiente igualdad:

$$(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$$

iii. Como G es un grupo, cada elemento tiene su inverso para la operación $*$, multiplicando por el inverso de a en ambos lados de la igualdad queda:

$$a^{-1} * ((a * b) * (a * b)) = a^{-1} * ((a * a) * (b * b))$$

iv. Por asociatividad vale que:

$$(a^{-1} * a) * b * (a * b) = (a^{-1} * a) * a * (b * b)$$

v. Teniendo en cuenta que $a * a^{-1} = e$ nos queda:

$$e * b * (a * b) = e * a * (b * b)$$

vi. Como G es un grupo, para cualquier x en G vale que $x * e = e * x = x$, esto nos deja:

$$b * (a * b) = a * (b * b)$$

vii. Por asociatividad:

$$(b * a) * b = (a * b) * b$$

viii. Multiplicando en ambos lados de la igualdad por el inverso de b nos queda:

$$(b * a) * b * b^{-1} = (a * b) * b * b^{-1}$$

ix. Teniendo en cuenta que $b * b^{-1} = e$ nos queda:

$$(b * a) * e = (a * b) * e$$

x. Como G es un grupo, para cualquier x en G vale que $x * e = e * x = x$, esto nos deja:

$$b * a = a * b$$

xi. Como $b * a = a * b$, al ser G un grupo y conmutativo, G es abeliano.

Ejercicio 10.

Dados los Grupos $(G, *)$ y (F, \diamond) se define en el conjunto $G \times F$ la ley \bullet tal que $(x, y) \bullet (z, t) = (x * z, y \diamond t)$. Probar que $(G \times F, \bullet)$ es Grupo (Grupo Producto):

Sean $x, z \in G$ y $y, t \in F$, la operación \bullet esta bien definida ya que al estar $*$ bien definido en G , $x * z \in G$ y al estar \diamond bien definido en F , $y \diamond t \in F$, por lo tanto $(x * z, y \diamond t) \in G \times F$.

Asociativa:

La operación \bullet sobre $G \times F$ es asociativa ya que para cualesquiera sean a, b y c en $G \times F$, se cumple que $a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c$.

Demostración:

1. Sean $a, b, c \in G \times F$, con $a = (a_1, a_2)$, $b = (b_1, b_2)$, $c = (c_1, c_2)$. Por asociatividad de $*$ y \diamond se cumple que:

$$\begin{aligned} a \bullet (b \bullet c) &= (a_1, a_2) \bullet ((b_1, b_2) \bullet (c_1, c_2)) = (a_1 * (b_1 * b_2), a_2 \diamond (b_2 \diamond c_2)) \\ &= ((a_1 * b_1) * c_1, (a_2 \diamond b_2) \diamond c_2) = ((a_1, a_2) \bullet (b_1, b_2)) \bullet (c_1, c_2) \\ &= (a \bullet b) \bullet c \end{aligned}$$

Elemento neutro:

Existe en $G \times F$ un elemento e tal que para todo a en $G \times F$ vale que $a \bullet e = e \bullet a = a$ y ese $e = (e_G, e_F)$, siendo e_G y e_F los elementos neutros de G y F respectivamente.

Demostración:

1. Sea $a \in G \times F$, con $a = (a_1, a_2)$. Dado a que e_G y e_F son los elementos neutros para las operaciones $*$ en G y \diamond en F se cumple que:

- i. $a \bullet e = (a_1, a_2) \bullet (e_G, e_F) = (a_1 * e_G, a_2 \diamond e_F) = (a_1, a_2)$
- ii. $e \bullet a = (e_G, e_F) \bullet (a_1, a_2) = (e_G * a_1, e_F \diamond a_2) = (a_1, a_2)$

Elemento inverso:

Para todo elemento $a = (a_1, a_2)$ de $G \times F$ existe a' en $G \times F$ tal que $a \bullet a' = a' \bullet a = e$ y ese $a' = -a$, con $-a = (-a_1, -a_2)$ y $e = (e_G, e_F)$.

Demostración:

1. Sea $a \in G \times F$, con $a = (a_1, a_2)$ y $-a = (-a_1, -a_2)$. Dado a que para todo elemento $x \in G$ se verifica que $x * (-x) = e_G$ y para todo elemento $x \in F$ se verifica que $x \diamond (-x) = e_F$ se cumple que:

- i. $a \bullet (-a) = (a_1, a_2) \bullet (-a_1, -a_2) = (a_1 * (-a_1), a_2 \diamond (-a_2)) = (e_G, e_F)$
- ii. $-a \bullet a = (-a_1, -a_2) \bullet (a_1, a_2) = (-a_1 * a_1, -a_2 \diamond a_2) = (e_G, e_F)$

Como \bullet es asociativa, existe un elemento neutro y todos los elementos de $G \times F$ tienen un inverso ($G \times F, \bullet$) es un grupo.

Ejercicio 11.

Estudiar si son Subgrupos de los grupos indicados:

- a. Los enteros pares de $(\mathbb{Z}, +)$

Asociativa:

La operación $+$ sobre los enteros pares de \mathbb{Z} es asociativa ya que para cualesquiera sean a, b y c en \mathbb{Z} , se cumple que $a + (b + c) = (a + b) + c$. Esto lo “hereda” de \mathbb{Z} .

Elemento neutro:

Existe en los enteros pares de \mathbb{Z} un elemento e tal que para todo a en los enteros pares de \mathbb{Z} vale que $a + e = e + a = a$ y ese $e = 0$. Como el $0 \in$ los enteros pares, y el elemento neutro es único, se sigue cumpliendo $a + e = e + a = a$.

Elemento inverso:

Para todo elemento a de los enteros de \mathbb{Z} pares existe a' en \mathbb{Z} tal que $a + a' = a' + a = e$ y ese $a' = -a$.

Como $+$ es asociativa, existe un elemento neutro y todos los elementos de \mathbb{Z} tienen un inverso (los enteros pares, $+$) es un grupo.

*Puedo demostrar asociativa y elemento inverso al mismo tiempo demostrando que $a * b^{-1} \in$ los enteros pares de \mathbb{Z} .*

- b. Las matrices simétricas de 2×2