

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

1er Cuatrimestre 2025

Laboratorio N° 6: Método de la Potencia.

1 Ejercicios

Ejercicio 1. Hacer un programa que reciba una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y un entero positivo k y que aplique k iteraciones del método de la potencia con un vector aleatorio inicial $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. El programa debe devolver un vector $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^k$, donde \mathbf{a}_i sea la aproximación al autovalor obtenida en el paso i .

Recomendaciones:

Recordar normalizar el vector en cada paso.

Pueden comparar con `np.linalg.eigvals()` para verificar resultados.

Ejercicio 2.

(a) Tomar una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{100 \times 100}$ de coordenadas aleatorias y utilizar el programa para realizar 100 iteraciones del método.

(b) Graficar las aproximaciones obtenidas en función del número de iteraciones.

¿Considera que el método converge rápidamente?

Recomendaciones:

En este caso comparar con un vector (`np.linalg.eigvals()`) no es útil. Queremos comparar sólo con el autovalor de módulo máximo de ese vector ¿Qué norma vectorial podemos usar?

Analíticamente, puede verse que la velocidad de convergencia está dada por la relación entre el segundo autovalor de mayor módulo y el primer autovalor de mayor módulo.

Más precisamente, el error en cada paso se multiplica aproximadamente por $\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^2$.

Ejercicio 3.

(a) Tomar una matriz $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{100 \times 100}$ de coordenadas aleatorias y considerar la matriz simétrica $\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{C} + \mathbf{C}^t)$ (de esta forma nos aseguramos una matriz con todos sus autovalores reales). Definir $\mathbf{B} = \mathbf{A} + 500\mathbf{I}$ y aplicar 100 pasos del método de la potencia a \mathbf{B} .

(b) Llamamos λ_{\max} al autovalor de mayor módulo de \mathbf{B} y definimos el vector de errores $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{100}$:

$$\mathbf{e}_i = |\lambda_{\max} - \mathbf{a}_i|.$$

Graficar los errores en función del número de iteración ¿Puede decir que función es?

(c) Graficar $\log(\mathbf{e}_i)$ y volver a pensar el ítem (b).

Sabiendo que el factor por el que se multiplica el error es aproximadamente $\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^2$, la pendiente de la recta obtenida debería ser aproximadamente $2 \log\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)$.

Para comparar los valores obtenidos experimentalmente, en el mismo gráfico representar la función $y(x) = 2 \log\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)x + \log(\mathbf{e}_0)$.

Recomendaciones:

Se puede usar la función `sorted()` para ordenar los coeficientes de un vector. En este caso que trabajamos con una matriz simétrica también puede ser útil la función `np.linalg.eigh()`.