PARÁMETRO	DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE		ESTIMACIÓN
μ	$X_i \sim Normal$	σ^2 $conocida$	**Estandarización exacta** de la media muestral. Se utiliza la distribución $\boldsymbol{Z}$. La variabilidad poblacional es un dato cierto, fijo y conocido.
		σ^2 $desconocida$	**Estimación por *t-Student***. Ante el desconocimiento de σ, se utiliza la desviación estándar muestral ($\boldsymbol{S}$). Esto añade incertidumbre, por lo que el estadístico sigue una distribución t con $n-1$ grados de libertad.
	$X_i \sim$ d$esconocida$ y $n > 30$		**Aproximación por TLC**. Se usa $\boldsymbol{S^2}$ en lugar de $\boldsymbol{\sigma^2}$, por el gran tamaño de la muestra $S \approx \sigma$.
p	$X_i \sim Binomial$		**Aproximación por TLC** (Teorema de Moivre-Laplace). La proporción de éxitos observada se estandariza asumiendo un comportamiento normal. El error estándar se estima con los datos de la propia muestra ($\hat{\boldsymbol{p}}$).
σ^2	$X_i \sim Normal$		Relación de varianzas muestral y poblacional. Se utiliza la distribución $\boldsymbol{\chi^2}$ (**Chi-cuadrado**) con $n-1$ grados de libertad, que mide la dispersión de los desvíos cuadráticos muestrales respecto a la media.
$\mu_1 - \mu_2$	$X_i \sim Normal$	σ_1^2 y σ_2^2 conocidas	**Estandarización directa** ($\boldsymbol{Z}$). Se conoce la dispersión exacta de ambas poblaciones.
		$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma$ desconocida	**Varianza común** ($\boldsymbol{Sp}$) (pooled). Como se asume que ambas poblaciones tienen la misma variabilidad, se promedian sus varianzas muestrales para obtener varianza común agrupada. El estadístico sigue una ***t-Student*** con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.
		$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ desconocidas	**Test de Welch**. Sin varianza común, se combinan errores estándar individuales y se ajustan los grados de libertad ($\boldsymbol{\nu}$) con **Aproximación de Satterthwaite** para estimar por **t-Student**.
	$X_i \sim$ $dist.$ $desconocida$	$n_1 > 30$ $n_2 > 30$	**Aproximación por TLC**. La diferencia de medias se aproxima a una Normal y las varianzas muestrales son buenos estimadores.
$p_1 - p_2$	$X_i \sim Binomial$	$n_1 > 30$ $n_2 > 30$	**Comparación de tasas** ($\boldsymbol{Z}$). Se estandariza la diferencia observada sumando las variabilidades individuales de cada gruipo bajo la curva Z.
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$X_i \sim Normal$		**Comparación de precisiones**. (***F-Fisher*** con $n_1 - 1, n_2 - 1$ grados de libertad). Evalúa el cociente de las varianzas muestrales para detectar diferencias de dispersión.