

## Formulaire statistiques descriptives

	Notation	Définition/formule
Etendu	E	$E = X_{\max} - X_{\min}$
Amplitude	$a_i$	$a_i = b_s - b_i$
Densité	$d_i$	Cas d'effectif : $\frac{n_i}{a_i}$ ; Cas de fréquence : $\frac{f_i}{a_i}$
Centre de classe	$C_i$	$C_i = \frac{b_s + b_i}{2}$
Mode	$M_o$	C'est la valeur de la variable qui a été observer la plus grande fois. En cas de variable continue : $M_o = x_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} a_i$ $\Delta_1$ : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe précédente $\Delta_2$ : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe suivante
Moyenne arithmétique	$\bar{x}$	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i = \sum f_i x_i$ Cas continu : on remplace $x_i$ par $c_i$
1 <sup>er</sup> quartile	$Q_1$	Cas discret : On calcule $\frac{N}{4}$ puis on détermine le 1 <sup>er</sup> ECC dépassant $\frac{N}{4}$ (ou FCC dépassant $\frac{1}{4}$ ) cela correspond à $Q_1$ cas continue ou classé: $Q_1 = x_i + \frac{\frac{N}{4} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ Où : $N_i$ est le 1 <sup>er</sup> ECC dépassant $\frac{N}{4}$ et $N_{i-1}$ est le ECC précédant $x_i$ : $b_i$ : borne inferieur

2 <sup>eme</sup> quartile (médiane)	Q <sub>2</sub> ou M <sub>e</sub>	<p>Cas discret :</p> <p>On calcule <math>\frac{N}{2}</math> puis on détermine le 1<sup>er</sup> ECC dépassant <math>\frac{N}{2}</math> (ou FCC dépassant <math>\frac{1}{2}</math>) cela correspond a Q<sub>2</sub> ou la médiane</p> <p>cas continue ou classé:</p> $M_e = x_i + \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ <p>Où : N<sub>i</sub> est le 1<sup>er</sup> ECC dépassant <math>\frac{N}{2}</math>  et N<sub>i-1</sub> est le ECC précédant  x<sub>i</sub> : b<sub>i</sub> : borne inférieure</p>
3 <sup>eme</sup> quartile	Q <sub>3</sub>	<p>Même que Q<sub>1</sub> mais en remplaçant <math>\frac{N}{4}</math> par <math>\frac{3N}{4}</math>  ou <math>\frac{1}{4}</math> par <math>\frac{3}{4}</math> ( cas de fréquence)</p>
Intervalle interquartile	I	$I = Q_3 - Q_1$
Coefficient de Yule	Cy	$Cy = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$ <p>si Cy &lt; 0, la distribution est étalée à gauche  si Cy = 0, la distribution est symétrique  si Cy &gt; 0, la distribution est étalée à droite</p>
Coefficient de Pearson	Cp	$Cp = \frac{\bar{x} - Mo}{\sigma}$ ; même commentaire précédant
Moment simple	m <sub>r</sub>	$m_r = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^r = \sum f_i x_i^r$ <p>cas particuliers : m<sub>1</sub> = <math>\bar{x}</math> ; m<sub>2</sub> = <math>\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = Q_x^2</math></p>
Moment centré	μ <sub>r</sub>	$\mu_r = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^r = \sum f_i (x_i - \bar{x})^r$ $\mu_2 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = V(x) = Q_x^2 - \bar{x}^2 = m_2 - m_1$
Coefficient de Fisher	C <sub>F</sub>	$C_F = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^3}{\left( \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2} \right)^3}$
Coefficient d'aplatissement de Fisher	a	$a = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$ ; avec $\mu_4 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^4$ a=3 pour une distribution qui suit une loi normale centrée réduite a>3 la distribution n'est pas aplatie a<3 la distribution est aplatie
Moyenne géométrique	G <sub>x</sub>	$G_x = \sqrt[N]{x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k}}$ $= (x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k})^{\frac{1}{N}}$

		$= (x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times \dots \times x_k^{f_k})$
Moyenne quadratique	$Q_x$	$Q_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2} = \sqrt{\sum f_i x_i^2}$
Moyenne harmonique	H	$\frac{1}{H} = \frac{1}{N} \sum \frac{n_i}{x_i} \rightarrow H = \frac{N}{\sum \frac{n_i}{x_i}} = \frac{1}{\sum \frac{f_i}{x_i}}$
Variance	$V(x)$	$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = (\bar{Q})^2 - (\bar{X})^2$ $= \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2$
L'écart-type	$\sigma$	$\sigma = \sqrt{V(x)}$
Coefficient de variation	CV	$\frac{\sigma}{\bar{x}}$
Médiale	$M^{le}$	<p>1<sup>ere</sup> étape : détermination de la classe médiale : c'est la classe qui correspond au :  1<sup>er</sup> <math>(n_i c_i) \nearrow</math> dépassant <math>\frac{\sum n_i c_i}{2}</math> (ou 1<sup>er</sup> <math>Q_i</math> dépassant 0,5)  2<sup>eme</sup> étape :</p> $M^{le} = B_i + a_i \frac{\frac{\sum n_i c_i}{2} - (n_i c_i)_{-1}}{(n_i c_i) - (n_i c_i)_{-1}}$ $= B_i + a_i \frac{0.5 - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$ <p>Avec <math>q = \frac{n_i c_i}{\sum n_i c_i}</math> et <math>Q</math> est <math>q \nearrow</math> (cumulé croissant)</p>
Indice de Gini	IG	$IG = 1 - \sum f_i (Q_i + Q_{i-1})$ 0 < IG < 0.5: faible concentration 0.5 ≤ IG ≤ 1: forte concentration
Indicateur de concentration	$I_c$	$I_c = \frac{\Delta M}{Etendu} = \frac{M^{le} - Me}{\omega} ; 0 < I_c < 1$